

Zeitschrift:	Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles
Herausgeber:	Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles
Band:	106 (1983)
Artikel:	Helminthes parasites du Paraguay V : Polystoma lopezromani Combes et Laurent, 1979 et utilisation d'une technique inédite d'observation des hamuli chez les Polystomatidae (Monogenea)
Autor:	Vaucher, Claude
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-89200

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 13.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

HELMINTHES PARASITES DU PARAGUAY V:
POLYSTOMA LOPEZROMANI
COMBES ET LAURENT, 1979
ET UTILISATION D'UNE TECHNIQUE INÉDITE
D'OBSERVATION DES HAMULI
CHEZ LES POLYSTOMATIDAE (MONOGENEA)

par

CLAUDE VAUCHER

AVEC 6 FIGURES ET 1 TABLEAU

Polystoma lopezromani a été décrit récemment chez une grosse Rainette arboricole sud-américaine, *Phrynohyas venulosa* (Laur.), par COMBES et LAURENT (1979). Lors des deux expéditions du Muséum d'histoire naturelle de Genève au Paraguay (1979, 1982), nous avons également rencontré ce parasite chez son hôte-type. Malgré le faible nombre de spécimens récoltés (7 ind.), il nous paraît utile de faire connaître nos observations, d'autant plus que la morphologie et la taille des hamuli, critères d'identification fondamentaux, montrent une variabilité plus forte que dans le matériel original argentin. De plus, nous avons été amené à disséquer les hamuli, afin de pouvoir les observer dans les meilleures conditions. Ce procédé qui permet de tirer des informations plus complètes de récoltes peu abondantes, ne semble pas utilisé et il nous paraît judicieux de le décrire.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

P. venulosa est un Amphibiens peu facile à récolter car il se tient souvent très haut dans les arbres. À part quelques captures de mâles chanteurs, les rencontres avec cette Rainette ont été fortuites. En 1979, 7 spécimens ont été disséqués et, en 1982, 5 seulement. Néanmoins, le taux de parasitisme de l'espèce doit être relativement important, puisque 3 hôtes sur les 13 examinés se sont révélés positifs: 2 novembre 1979, Rio Carapa (prov. Canediyu), 6 individus examinés, 1 parasité par 1 Polystome (N° 979.502); 14 novembre 1979: Col. Pdte Stroessner (prov. Alto Parana): 1 individu indemne; 14 mars 1980, même localité, 1 individu indemne (C. Dlouhy leg.); 6 octobre 1982, San Lorenzo (prov. Central); 2 individus examinés, 1 parasité par 2 Polystomes (N° 982.1553); 28 octobre 1982, Santa Maria (prov. Itapua), 1 individu indemne; 30 octobre 1982, San Benito, Pastoreo (prov. Itapua): 1 individu indemne; 2 novembre 1982, Salto Tembey (prov. Itapua), 1 individu parasité par 4 Polystomes (N° 982.1554).




Fig. 1. Dissection des hamuli de Polystomatidae, schéma des incisions à effectuer.

Extraits de la vessie de l'hôte, les parasites ont été fixés soit en légère compression entre lame et lamelle avec du formol à 4% froid, soit précipités dans du formol de même concentration bouillant.

L'observation des hamuli est souvent contrariée par leur mauvaise position sur les spécimens montés en préparation totale. Même les individus fixés entre lame et lamelle peuvent présenter ce défaut. Afin de pouvoir également utiliser des Vers dont les crochets se trouvaient dans une position défectueuse, nous avons procédé à leur dissection et à leur montage séparé. Mieux que de longues explications, le schéma de la figure 1 montre les incisions à effectuer pour séparer les crochets. Les hamuli sont pratiquement libérés par les trois traits de scalpel et peuvent être ensuite facilement détachés avec un petit pinceau. La figure 5 prouve que le hapeur n'est guère abîmé par cette manipulation, et les mesures classiques de sa largeur, de sa hauteur, du diamètre des ventouses peuvent encore être effectuées après la dissection. Le microscalpel utilisé est constitué d'un éclat de lame de rasoir monté dans un mandrin porte-aiguille. Ces manipulations sont pratiquées sur des spécimens colorés et éclaircis à l'Eugenol. Les crochets sont montés au Baume du Canada ou dans un autre milieu adéquat.

OBSERVATIONS

Nos spécimens présentent les caractères typiques de l'espèce (fig. 2): tube digestif fortement anastomosé, hapeur comparativement petit, mesurant environ le cinquième de la longueur du corps, hamuli de grande taille, présentant une profonde encoche (fig. 3, 4, 6).

Ils se distinguent cependant de ceux figurés par COMBES et LAURENT dans la description originale, par le fait qu'ils sont toujours accompagnés de granules kératinisés réfringents, alors que nos collègues insistent sur leur absence dans leur matériel. D'autre part, la variation de taille est plus considérable, comme le montre le tableau ci-dessous qui résume et com-




Fig. 2. *Polystoma lopezromani* Combes et Laurent, 1979. Un individu fixé sans compression (MHNG 982.1154).

	COMBES et LAURENT (1979)	MHNG 979.502	MHNG 982.1153	MHNG 982.1154
Longueur (mm)	6,99 - 8,16	5,8	7,1 - 7,9	5,9 - 6,3
Largeur (mm)	2,22 - 2,73	2,5	2,8 - 3,2	1,4 - 1,8 ¹
Hauteur du haptiteur (mm)	1,16 - 1,36	1,55	1,37 - 1,57	1,33 - 1,43
Largeur du haptiteur (mm)	1,6 - 2,11	1,59	2,16 - 2,20	1,47 - 1,63 ¹
Ventouses antérieures (μm)	310 - 409	459	418 - 448	395 - 401
Ventouses médianes (μm)	362 - 429	499	434 - 454	368 - 384
Ventouses postérieures (μm)	384 - 459	491	407 - 421	372 - 462
Hamuli (μm)	544 - 606	626	475 - 524	519 - 601
Pharynx (μm)	292 - 330 × 201 - 241	384 × 270	327 - 335 × 229	311 - 335 × 221 - 229

¹ Fixés sans compression.

pare les dimensions du matériel original avec le nôtre. A relever également que les hamuli figurés par COMBES et LAURENT sont très uniformes dans leur morphologie: échancrure profonde séparant manche et garde du crochet, épaisseur de ces éléments pratiquement identique. Dans notre matériel (fig. 6), au contraire, on observe des crochets à faible échancrure, certains possédant un petit lobe médian supplémentaire; le manche du crochet peut être très mince et la garde, au contraire, massive. Comme indiqué dans la description originale, les hamuli dépassent toujours en longueur le diamètre des ventouses postérieures. Un Polystome ne possède qu'un unique hamulus.

Le tube digestif est souvent d'observation difficile, surtout lorsqu'il est peu rempli. Néanmoins, la structure en réseau anastomosé est toujours reconnaissable (fig. 2).

Tous nos spécimens sont adultes, l'ovaire et les vitellogènes morphologiquement fonctionnels, mais aucun spécimen n'est encore ovigère. Les hôtes collectés étaient à peine au début de leur période de reproduction; les femelles, pleines de petits œufs, n'avaient pas encore pondu. Il est vraisemblable que la ponte du parasite débute un peu plus tardivement dans l'année, coïncidant avec la reproduction de l'hôte, qui a lieu, selon COMBES et LAURENT, en novembre-décembre. C'est sans doute aussi le cas pour la région du Paraguay que nous avons prospectée, qui se trouve sensiblement à la même latitude que la province argentine de Salta, mais à environ 1000 km plus à l'est.

Nous n'avons jamais observé *P. venulosa* au moment de la ponte elle-même et, en particulier, des chants émis par les mâles descendus à l'eau, comme le décrit DUELLMAN (1970). Les seuls cris entendus provenaient d'individus perchés dans la végétation.

Remarquons enfin que le parasitisme de cette Rainette, répandue du Mexique au nord de l'Argentine, n'a été constaté jusqu'ici que dans la partie méridionale de son aire de répartition.




Fig. 3, 4. Hamuli disséqués de *Polystoma lopezromani* Combes et Laurent, 1979, provenant de deux parasites différents (MHNG 982.1154). Echelle 100 μ m.

Fig. 5. *Polystoma lopezromani* Combes et Laurent, 1979. Hapteur d'un individu après la dissection des hamuli. Le spécimen reste utilisable pour les mensurations et l'étude de la morphologie générale de l'espèce. Echelle 500 μ m.




Fig. 6. *Polystoma lopezromani* Combes et Laurent, 1979. Hamuli de divers individus: a, b: MHNG 979.502; c, d: 982.1154; e, f: idem, autre individu; g, h: 982.1153. Echelle: 100 μ m.

Remerciements

Nos recherches sur le terrain ont bénéficié de l'appui de la Coopération technique suisse (COSUDE), ainsi que du Ministère de l'agriculture et des élevages du Paraguay, institutions auxquelles nous adressons nos vifs remerciements pour leur efficace collaboration. Nous remercions également les participants aux deux missions de leur aide dans la capture et la dissection des Amphibiens: F. Baud, V. Mahnert, J.-L. Perret, P. Vaucher (Genève), M.-C. Durette-Desset (Paris) et C. Dlouhy (Asuncion).

Résumé

L'auteur apporte quelques informations sur la variabilité de *P. lopezromani* Combes et Laurent, 1979 et commente une méthode inédite de dissection des hamuli, qui permet une observation idéale de ces éléments d'importance fondamentale dans l'identification des Polystomatidae.

Zusammenfassung

Die Kenntnis über die Merkmalsvariabilität von *P. lopezromani* Combes et Laurent, 1979 wird durch zusätzliche Angaben erweitert; eine neue Methode der Hamulus-Präparation wird diskutiert, die eine einwandfreie Beobachtung dieser für die Bestimmung der Polystomatidae unerlässlichen Merkmale erlaubt.

Summary

The author gives some informations on the variability of the species *P. lopezromani* Combes et Laurent, 1979. A method of hamulus dissection is commented enabling an ideal observations of these structures which are of fundamental importance for identification of Polystomatidae.

BIBLIOGRAPHIE

COMBES, C. et LAURENT, R. F. — (1979). Les Monogènes Polystomatidae de République argentine: description de deux nouvelles espèces et essai de synthèse. *Revta ibér. Parasit.* 79: 545-557, 4 fig.

DUELLMAN, W. E. — 1970. The Hylid Frogs of Middle America. *Monogr. Mus. nat. Hist. Univ. Kans.* 1: XI + 753 pp.

Adresse de l'auteur: Muséum d'histoire naturelle, case postale 434, CH-1211 Genève 6.