

Zeitschrift: Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles
Herausgeber: Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles
Band: 110 (1987)

Artikel: Le diagnostic parasitaire dans le canton de Neuchâtel : rapport d'activité 1986

Autor: Brossard, M. / Kindler, A. / Jeanneret, J.-P.

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-89280>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 10.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

LE DIAGNOSTIC PARASITAIRE DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL RAPPORT D'ACTIVITÉ 1986

par

M. BROSSARD¹, A. KINDLER¹, J.-P. JEANNERET¹ ET H. MODDE²

AVEC 3 TABLEAUX

INTRODUCTION

Le présent rapport décrit l'activité en 1986 du Laboratoire de diagnostic parasitaire de l'Institut de zoologie à Neuchâtel (diagnostic direct: 650 patients et indirecte: 3354 patients) et de l'Institut neuchâtelois de microbiologie à La Chaux-de-Fonds (diagnostic direct: 425 patients).

Les risques d'infection par des parasites sont élevés, surtout lors de séjours dans les pays du Tiers Monde. Les résultats des examens coprologiques de 95 demandeurs d'asile démontrent à ce propos l'intensité des contacts entre hôtes et parasites dans ces régions. Bien que moins répandues, les parasitoses existent aussi en Europe. Dans nos régions, les affections transmises par les tiques (rickettsiose à *Rickettsia conori* et spirochètose à *Borrelia burgdorferi*) ont été très souvent diagnostiquées.

RÉSULTATS ET COMMENTAIRES

En 1986, 185 parasitoses simples ou multiples ont été détectées par voie directe (coprologie ou hématologie) parmi 1075 patients examinés (17,2%, tabl. I).

Sept espèces parasitaires ont été contractées en Suisse ou dans le reste de l'Europe. Quatre d'entre elles peuvent déterminer des troubles cliniques (*Ascaris lumbricoïdes*, *Trichuris trichiura*, *Taenia* sp. et *Hymenolepis nana*).

Seize espèces parasitaient des voyageurs ou des demandeurs d'asile provenant de régions du Tiers Monde (Asie et Afrique surtout). Relevons les parasitoses pouvant déterminer des troubles cliniques parfois graves:

¹ Institut de zoologie, Neuchâtel.

² Institut neuchâtelois de microbiologie, La Chaux-de-Fonds.

Tableau I

	Suisse	Reste de l'Europe	Afrique	Amerique Centrale	Amerique du sud	Asie	Inconnu	Total
<i>Plasmodium falciparum</i>			1			1	1	3
<i>Plasmodium vivax</i>						1		1
<i>Entamoeba histolytica</i>						1	2	3
<i>Entamoeba coli</i>	4	4	15			33	18	74
<i>Entamoeba hartmanni</i>						1	2	3
<i>Endolimax nana</i>	2	1	7			3	6	19
<i>Giardia intestinalis</i>			6	2	2	7	14	31
<i>Blastocystis hominis</i>	2		9		1	21	5	38
<i>Ancylostoma sp.</i>			2		1	6	1	10
<i>Strongyloides stercoralis</i>			1			1	2	4
<i>Ascaris lumbricoides</i>		1	1			4	6	12
<i>Trichiuris trichiura</i>	1	2	7		1	30	6	47
<i>Taenia saginata</i>							3	3
<i>Taenia sp.</i>	2		2			3		7
<i>Hymenolepis nana</i>	1	1			1	1	1	5
<i>Dicrocoelium dendriticum</i>						1		1
<i>Schistosoma mansoni</i>			4					4
Total	12	9	55	2	6	114	67	265

Nombre de patients: 1075

Patients parasités: 185 (17,2%)

Tableau II

	Turquie	Pakistan	Sri Lanka	Ethiopie	Tchad	Zaïre	Angola	Inconnu	Total
<i>Entamoeba histolytica</i>	1								1
<i>Entamoeba coli</i>	27	1		1		1	2	7	39
<i>Entamoeba hartmanni</i>	1								1
<i>Endolimax nana</i>	3							1	4
<i>Giardia intestinalis</i>	4					2		1	7
<i>Blastocystis hominis</i>	14		1	1				5	21
<i>Ancylostoma sp.</i>		2	1				1	2	6
<i>Ascaris lumbricoides</i>	5					1		3	9
<i>Trichuris trichiura</i>	23				1	3	1	2	30
<i>Taenia sp.</i>	3			1					4
<i>Hymenolepis nana</i>								1	1
<i>Schistosoma mansoni</i>							2		2
Nb de parasités/Total	41/53	2/3	1/1	2/9	1/1	5/7	4/4	10/17	66/95

Patients parasités : 69,5%

malaria (*Plasmodium falciparum* et *P. vivax*), amibiase (*Entamoeba histolytica*), lambliaose (*Giardia intestinalis*), bilharziose intestinale (*Schistosoma mansoni*) et d'autres helminthiases dues à *Ancylostoma* sp., *Strongyloïdes stercoralis*, *A. lumbricoïdes*, *T. trichiura*, *Taenia* sp. et *H. nana*).

Quelle que soit leur provenance, les 95 demandeurs d'asile testés à Neuchâtel étaient fréquemment parasités (tabl. II). Une ou plusieurs espèces de parasites ont été décelées chez 69,5% d'entre eux. Parmi celles-ci 8 sont potentiellement pathogènes (*E. histolytica*, *G. intestinalis*, *Ancylostoma* sp., *A. lumbricoïdes*, *T. trichiura*, *Taenia* sp., *H. nana* et *S. mansoni*). Des conditions épidémiologiques optimales pour la réussite des cycles parasitaires sont ainsi souvent réalisées dans les pays en voie de développement.

A Neuchâtel, nous avons examiné par immunofluorescence indirecte (IFAT), hémagglutination indirecte ou ELISA, le sérum et/ou le liquide céphalo-rachidien (LCR) de 3354 patients. Les examens les plus nombreux ont été réalisés pour déceler des maladies transmises par les tiques.

La recherche d'anticorps anti-*B. burgdorferi* dans le sérum a été effectuée par IFAT chez 3115 patients (tabl. III). Des titres élevés (IgM > 1/32 et IgG > 1/128), preuves quasi certaines d'un contact avec la borrélie, ont été mesurés chez 624 patients (20,0%). Les autres résultats étaient négatifs (1470 avec IgM < 1/32 ou IgG < 1/64) ou considérés comme douteux (1021). En effet, la présence de titres faibles (IgM: 1/32;

Tableau III : Sérologie de *B.burgdorferi*

A. SERUM			
	Positifs	Douteux	Négatifs
IgM seules	36	116	
IgG seules	468	792	
IgM + IgG *	120	113	
Total	624 (20,0%)	1021 (32,8%)	1470 (47,2%)
Total des patients	3115 (100%)		
B. LCR			
IgM seules	4		
IgG seules	73		
IgM + IgG	5		
Total	82 (14,7%)		475 (85,3%)
Total des patients	** 557 (100%)		

* Les patients présentant simultanément des IgM et IgG sériques ont été classés selon leur titre en IgG.

**Pour 409 d'entre eux, le sérum a aussi été testé; ils sont également compris dans la partie A. du tableau.

IgG: 1/64 à 1/128) peut indiquer une borréliose évolutive ou ancienne mais parfois aussi des réactions croisées avec d'autres agents. Des anticorps spécifiques ont également été recherchés dans le LCR de 557 patients, souffrant de troubles neurologiques. La spécificité du test IFAT est dans ce cas meilleure (seuil fixé à 1/4 pour les IgM et les IgG). Des anticorps anti-*B. burgdorferi* ont été décelés dans 82 LCR.

Nous avons aussi diagnostiqué 10 rickettsioses du groupe boutonneux pourpré (*R. conori*). Cette infection, transmise par les tiques *Rhipicephalus sanguineus*, est installée en Suisse. Elle y a été importée par les chiens infestés de vacanciers revenant de régions méditerranéennes (PETER et al. 1984).

D'autres infections ont été diagnostiquées par sérologie, soit 3 malaria et 1 filariose.

D'un point de vue anecdotique, nous avons déterminé 2 ectoparasites durant l'année 1986, soit 1 larve d'*I. ricinus* et 1 morpion (*Phytirus pubis*).

CONCLUSION

Au cours de l'année 1986, le diagnostic parasitaire s'est encore intensifié dans le canton de Neuchâtel (voir le précédent rapport: BROSSARD et al. 1986). Au total 4431 patients ont été testés (2003 en 1985), soit 1077 par voie directe et 3354 par sérologie.

Ce rapport montre les risques d'infections parasitaires sous nos latitudes mais particulièrement dans les pays du Tiers Monde. Il souligne aussi l'importance des maladies transmises par les tiques dans nos régions (fièvre boutonneuse et complexe de l'*Erythema chronicum migrans*).

BIBLIOGRAPHIE

- BROSSARD, M., KINDLER, A. et MODDE, H. — (1986). Le diagnostic parasitaire dans le canton de Neuchâtel. Rapport d'activité 1985. *Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.* 109: 179-184.
- PETER, O., BURGDORFER, W., AESCHLIMANN, A. et CHATELANAT, P. — (1984). *Rickettsia conorii* isolated from *Rhipicephalus sanguineus* introduced into Switzerland on a pet dog. *Z. Parasitenkd.* 70: 265-270.
-