Zeitschrift: Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Herausgeber: Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Band: 10 (1868-1870)

Heft: 60

Artikel: Faune des vertébrés du district d'Orbe. Part 2, Poissons

Autor: Du Plessis, G. / Combe, J.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-256535

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 25.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

FAUNE

DES VERTÉBRÉS DU DISTRICT D'ORBE

PAR

G. du Plessis Dr et J. Combe.

2me PARTIE. — POISSONS.

NB. Nous avons collecté les poissons dans le même rayon que le reste de la faune; notre district ne comprend que l'Orbe et ses affluents. Je citerai M. J. Combe pour toutes les espèces dont je lui dois la connaissance. Nous n'avons pas cru devoir subdiviser notre petit nombre d'espèces dans les groupes génériques récemment admis. Il y aurait eu à peine une espèce par genre et qui sait? peut-être moins encore, puisqu'on a quelquefois en zoologie mis le mâle dans un genre et la femelle dans un autre. Comme pour les reptiles, nous prendrons la notion de famille à la place de celle de genre, nous contentant de mettre en parenthèses les genres admis actuellement.

G. du P.

a) Poissons osseux.

1re section, Acanthoptérygiens. — 1er groupe, Thoraciques.

I. PERCHES.

1. Perche fluviatile. Perca fluviatilis, Lin. — Commune dans toutes nos eaux courantes. Les petits ruisseaux qui se jettent

dans le marais et les fossés aboutissant à l'Orbe fourmillent au printemps de jeunes perchettes, qu'on nomme alors vives et qui cette année ont été décimées par une épidémie particulière.

2^{me} groupe, Jugulaires.

II. CHABOTS ou CHASSOTS.

2. Chabot goujon. Cottus gobio, Lin. (Cuv.) — Commun sous les pierres du lit de l'Orbe et des ruisseaux clairs qui s'y jettent, Mugeon, Nozon, etc. Les pêcheurs l'appellent chassot ou chasson et s'en servent pour amorcer.

2^{me} section, Malacoptérygiens. — 1^{er} groupe, Abdominaux.

III. SAUMONS ou SALMONES.

- 3. La Truite. Salmo fario, Lin. (Trutta fario, Heckl. Kn.)—Commune dans le cours supérieur de l'Orbe et dans ses affluents du Jura dont l'eau, limpide et froide, coule dans des lits de sable et de cailloux. Les pêcheurs connaissent deux variétés. La longue et la courte. La première fraie toujours d'abord; elle est d'une couleur plus claire. La seconde plus foncée appartient peut-être à la variété nommée Trutta silvatica, Schr. La chair devient rouge dans les eaux les plus froides, lesquelles augmentent aussi le nombre des taches rouges de la peau.
- 4. Ombre commun. Salmo thymallus, Lin. (Thymallus vexillifer, Ag.) On le pêche encore assez souvent dans l'Orbe, où il est fort estimé.

IV. BROCHETS ou ESOCES.

8. Brochet commun. Esox lucius, Lin. — Commun dans tous les fossés et tourbières, ainsi que dans les eaux de l'Orbe et de ses affluents un peu considérables. La coloration varie énormément selon l'âge, le sexe, les localités.

V. CYPRINS.

6. Carpe ordinaire. Cyprinus carpio, Lin. — On la prend dans les fossés du marais, où il est rare d'en voir de grandes.

- Très commun dans l'Orbe et le Talent.
- S. La Tanche. Cyprinus tinca, Lin. (Tinca vulgaris, Cuv.) Un des poissons les plus communs du marais et qu'on trouve partout dans les fonds vaseux.
- La Brême. Cyprinus Brama, Lin. (Abramis Brama, Cuv.)

 Se trouve dans le canal d'Entreroches. (J. Combe.)
- 10. Le Nase. Cyprinus nasus, Lin. (Chondrostoma nasus, Ag. Habite l'Orbe où il est devenu rare. (J. Combe.)
- 11. Le Meunier ou Chevenne. Cyprinus cephalus, Lin. (Squalius cephalus, s. dobula, Heckl.) Très commun surtout dans les eaux de l'Orbe et du marais.
- 12. La Vandoise. Cyprinus leuciscus, Lin. (Squalius leuciscus, Heckl.) Commune dans l'Orbe, où elle est nommée ronzon. (J. Combe.)
- 13. La Rosse. Cyprinus rutilus, Lin. (Leuciscus rutilus, Heckl.) Canal d'Entreroches. (J. Combe.)
- 14. L'Ablette. Cyprinus alburnus, Lin. (Alburnus lucidus, Heckl.) Très-commune dans l'Orbe et ses affluents. Les pêcheurs d'ici l'appellent Vengeron, mais il y a encore une autre espèce qui porte ce nom.
- 18. Le Spirlin. Cyprinus bipunctatus, Lin. (Alburnus bipunctatus, Heckl. Kn.) Se trouve dans le Talent. (J. Combe.)
- 16. Le Vengeron. Cyprinus prasinus, Lin. (Leuciscus prasinus, Ag.) Fraie en mai et remonte en troupes jusque dans le marais de Suscévaz. (J. Combe.)
- 17. Le Véron. Cyprinus varius, Lin. (Phoxinus varius, s. lævis, Ag.) Dans tous les petits ruisseaux clairs et les tourbières qui en reçoivent, Mugeon, Ruz des Ouates, tourbières de Valleyres, etc.

VI. LOCHES.

18. Loche franche. Cobitis barbatula, Lin. — Habite les fossés tourbeux du marais d'Orny. (J. Combe.) 1

^{&#}x27;Une autre loche, le Cobitis tænia, habite les ruisseaux qui tombent dans le lac Léman entre Cully et Vevey.

2^{me} groupe, Subbranchiens.

VII. LOTTES ou GADES.

19. Lotte commune. Lota vulgaris, Cuv. — Dans toutes les eaux, tant de l'Orbe que du marais.

3me groupe, Apodes.

VIII. ANGUILLES.

20. Anguille commune. Muræna anguilla, Lin. (Anguilla vulgaris, Flem.) — Se trouve dans l'Orbe, le Talent et le canal d'Entreroches, où elle devient de plus en plus rare.

b) Poissons cartilagineux.

X. LAMPROIES.

21. Lamproie de Planer. Petromyzon Planeri, Blch. (Appelée souvent sucet et perce-pierres.) — Se trouve avec sa forme de larve (Ammocœtus branchialis, Cuv.) à l'abreuvoir, dans un bras qui se détache de l'Orbe.

