Zeitschrift: Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Herausgeber: Société Vaudoise des Sciences Naturelles

**Band:** 11 (1871-1873)

Heft: 66

**Artikel:** Recherches sur la température de congélation des dissolutions salines

leur sursaturation et leur constitution chimique, et sur la solubilité de quelques sels à des températures inférieures à 0° C [suite et fin]

Autor: Coppet, L.-C. de

**Kapitel:** XI: Abaissement du point de congélation de dissolutions contenant un

mélange de deux sels neutres

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-257295

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 26.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

## XI

Abaissement du point de congélation de dissolutions contenant un mélange de deux sels neutres.

Blagden a fait plusieurs expériences sur la température de congélation de dissolutions saturées d'un sel, auxquelles il ajoutait un autre sel en proportions variables. Il a trouvé que le point de congélation de la dissolution du mélange est inférieur au point de congélation de la dissolution saturée de chaque sel séparément; il en a conclu que, pour les mélanges réfrigérants, il y a avantage à employer deux sels à la fois, et il a confirmé cette conclusion par des expériences directes.

Blagden a recherché aussi l'abaissement du point de congélation produit par des mélanges de chlorures de sodium et d'ammonium dans des dissolutions non saturées. Voici ses résultats, comparés aux sommes des abaissements produits par chaque sel séparément, calculées d'après les tableaux X et XV.

1er mélange.

Chlorure d'ammonium M = 10; E (observé, tab. XV) = 6°,65 Chlorure de sodium . . . M = 6,67; E (calculé, tab. X) = 3 ,9 Somme 10 ,55 Mélange; E (observé, par Blagden) $^{87} = 10^{\circ}$ ,7

2<sup>nd</sup> mélange.

Chlorure d'ammonium M=10; E (observé, tab. XV) = 6, 65 Chlorure de sodium . . . M=10; E (observé, tab. X) = 6, 1 Somme  $12^{\circ},75$ 

Mélange; E (observé, par Blagden) $^{88} = 12^{\circ},65$ 

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Température de congélation  $+ 12^{\circ 3}/_{4}$  F  $= -10^{\circ}$ ,7C.

<sup>\*\*</sup> Température de congélation  $+90^{\circ}$ /4 F =  $-12^{\circ}$ ,65C.

On voit que l'abaissement du point de congélation de la dissolution du mélange est sensiblement égal à la somme des abaissements produits par chaque sel isolément.

J'ai obtenu des résultats analogues avec d'autres mélanges. Je ne cite que l'expérience suivante, dans laquelle la dissolution de chaque sel a été préparée séparément, et son point de congélation observé directement avant de mélanger les dissolutions :

Chlorure d'ammonium 
$$M = \frac{20,00}{2}$$
; E (calculé, tab. XV) = 60,65  
Azotate de soude....  $M = \frac{31,78}{2}$ ; E (calculé, tab.XLIV) = 5,5  
Somme  $12^{\circ},15$   
Chlorure d'ammonium  $M = 20,00$ ; E (observé).... =  $13^{\circ},65$   
Azotate de soude....  $M = 31,78$ ; E (observé).... =  $10^{\circ},2$   
Moyenne  $11^{\circ},925$   
Mélange; E (observé) =  $11^{\circ},75$ 

L'abaissement du mélange est inférieur à l'abaissement calculé; il est aussi un peu inférieur à la moyenne des abaissements observés pour les dissolutions séparées.

J'ai préparé deux dissolutions contenant, l'une un mélange de chlorure de potassium et de carbonate de soude, l'autre un mélange de chlorure de sodium et de carbonate de potasse — en quantités proportionnelles aux équivalents de ces sels. L'abaissement du point de congélation de chacune de ces dissolutions a été observé directement, puis comparé à la somme des abaissements qu'auraient produits, d'après le calcul, chacun des sels isoléments.

# 1er mélange.

Chlorure de potassium M = 
$$10,19$$
; E (calculé, tab. III) =  $4^{\circ},64$  Carbonate de soude . . M =  $7,25$ ; E (calculé, tab. XLVII) =  $2,85$  Somme  $17,44$  Somme  $7^{\circ},22$  Mélange M =  $17,44$ ; E (observé) =  $7^{\circ},5$ 

# 2<sup>nd</sup> mélange.

Chlorure de sodium M = 8,00; E (calculé, tab. X) =  $4^{\circ},8^{\circ}$ Carbonate de potasse M = 9,44; E (calculé, tab. XXVI) = 3,02Somme 17,44 Somme  $7^{\circ},84$ 

Mélange 
$$M = 17,44$$
; E (observé) =  $7^{\circ},6$ 

Moyenne des abaissements *calculés*, pour les deux mélanges: 7°,53 Moyenne des abaissements *observés*, pour les deux mélanges: 7°,55

Les abaisements observés diffèrent peu de la somme des abaissements calculés pour chacun des sels isolément. L'abaissement observé est un peu plus grand que l'abaissement calculé pour le premier mélange, et un peu plus petit que l'abaissement calculé pour le second mélange. Les moyennes des abaissements observés et calculés sont sensiblement égales.

Cette expérience indique que les deux dissolutions préparées, l'une avec du chlorure de potassium et du carbonate de soude, l'autre avec du chlorure de sodium et du carbonate de potasse, en proportions équivalentes, ont la même constitution chimique; mais elle ne donne aucun renseignement précis sur le mode de groupement des divers éléments dans la dissolution.

M. Rüdorff a mesuré l'abaissement du point de congélation de la dissolution d'un sel double, le chlorure de cuivre et d'ammonium 2NH<sup>4</sup>Cl,CuCl<sup>2</sup>,2H<sup>2</sup>O. Les résultats de ces observations sont dans le tableau LX. La première et la deuxième colonne contiennent les proportions de NH<sup>4</sup>Cl et de CuCl<sup>2</sup> pour 100 d'eau; la troisième colonne contient la proportion de sel double (anhydre) 2NH<sup>4</sup>Cl,CuCl<sup>2</sup>;<sup>89</sup> dans la quatrième et la cinquième colonne sont les abaissements du point de congélation que produiraient séparément les sels NH<sup>4</sup>Cl et CuCl<sup>2</sup>, calculés d'après les tableaux XIV et I<sup>er</sup>; dans la sixième colonne sont les abaissements calculés pour un mélange des deux sels;— ce sont les sommes des abaissements de la quatrième et de la cinquième colonne; dans la septième colonne sont les abaissements produits par le sel double, tels qu'ils ont été observés par M. Rüdorff.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Les chiffres de la troisième colonne sont les sommes de ceux des deux premières.

Chlorure de cuivre et d'ammonium. TABLEAU LX (Rüdorff). -

1		7	闰	E	H	闰
TAT	TAT C	TAT	NH <sup>4</sup> Cl	CuCl <sup>2</sup>	2NH4CI,CuCl <sup>2</sup>	,CuCl <sup>2</sup>
IN#*U	בחמוק.	ZNH*CI,CUCI*	(tabl. XIV)	(tabl. I)	calculé	observé
9,40	3°,63	5,42	1.56	1,09	2,65	2)° 65
2,65	3,34	5,99	1,72	1,21	2,93	. 9. e, 9
3,17	3,99	7,16	2,06	1,45	3,51	3,5
6,32	7,94	14,26	4,11	3,48	7,29	7,3
9,90	12,43	22,33	6,44	5,31	11,75	11,55
10,67	13.41	24,08	6,94	5,82	12,76	12,6

blement les mêmes que les abaissements calculés. On ne peut donc savoir, d'après les expériences sur la congélation, si, dans la dissolution de chlorure double de cuivre et d'ammonium, les chlorures de cuivre et d'ammonium sont combinés ou simplement mélangés. La comparaison de la sixième et de la septième colonne fait voir que les abaissements observés sont sensiDans la plupart des exemples que nous venons de citer, on ne peut douter que les sels mélangés dans les dissolutions n'agissent chimiquement l'un sur l'autre; néanmoins, chaque sel abaisse le point de congélation à peu près comme s'il était seul dans la dissolution. Il paraît certain que si les substances mélangées n'excerçaient aucune action chimique réciproque, l'abaissement du point de congélation de la dissolution du mélange serait rigoureusement la somme des abaissements produits par chaque substance isolément. — Ceci justifie l'hypothèse que nous avons faite au §VI, à savoir que, lorsqu'une dissolution contient un mélange de deux hydrates d'un même sel, chaque hydrate abaisse le point de congélation de la même quantité qu'il l'abaisserait s'il se trouvait seul dans la dissolution.

### XII

Constitution chimique de quelques dissolutions salines, d'après les expériences sur la tension de leur vapeur.

Les expériences de M. Wüllner sur la diminution de la force élastique de la vapeur d'eau émise par les dissolutions salines 90 ont été faites à des températures comprises eutre 20° et 100° environ. Les résultats qui nous intéressent plus particulièrement sont les suivants.

En désignant par V la diminution de la force élastique de la vapeur, et par M la proportion de sel anhydre pour 100 d'eau, il résulte des expériences de M. Wüllner que, pour chaque tempé-

rature, le rapport  $\frac{\mathbf{V}}{\mathbf{M}}$  a une valeur sensiblement constante pour certaines substances, croissante pour d'autres. M. Wüllner en a conclu que les premières préexistent dans les dissolutions à l'état anhydre, les dernières à l'état hydraté. Pour celles-ci, il a calculé le nombre r d'atomes d'eau d'hydratation qu'il faut supposer

<sup>90</sup> Poggend. Ann., t. 103, p. 529; t. 105, p. 85; t. 110, p. 387.