Zeitschrift: Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Herausgeber: Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Band: 16 (1879-1880)

Heft: 83

Artikel: Calcul abrégé de la hauteur du soleil

Autor: D'Apples, C.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-259063

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 17.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

CALCUL ABRÉGÉ DE LA HAUTEUR DU SOLEIL

PAR

C. D'APPLES

Dans certains cas il est nécessaire de connaître la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon, ou la distance zénithale qui en est le complément. Cette hauteur se trouve immédiatement pour l'heure de midi, si on connaît la déclinaison du soleil à la date voulue et la latitude λ du lieu que l'on occupe; H hauteur du soleil à midi sera en effet égal à

90° — (
$$\lambda \pm$$
 déclinaison).

Pour une autre heure de la journée, on a ordinairement recours à la formule

$$\cos z = \sin \lambda \sin d + \cos \lambda \cos d \cos y$$
,

dans laquelle z représente la distance zénithale cherchée, λ la latitude du lieu, d la déclinaison du soleil à midi, et y l'angle horaire du soleil au moment donné. Cette formule donne lieu à un calcul un peu long et à un emploi de temps assez considérable lorsqu'on a à le répéter un grand nombre de fois avec des données différentes, et les résultats sont d'une précision qu'il n'est pas toujours nécessaire d'obtenir.

Lorsqu'il suffit d'une certaine approximation, il est assez commode d'exprimer la hauteur cherchée h, en fonction de la valeur connue H, pour le jour d'une observation, par exemple.

Pendant que le soleil est au-dessus de l'horizon, il parcourt successivement tous les angles d'un arc de 180°; il les parcourt pendant un temps qui varie suivant les saisons, et qui est plus court en hiver qu'en été. Si on divise le nombre de degrés parcourus pendant la journée par le nombre d'heures qu'a duré le jour, depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, on aura le nombre de degrés parcourus en apparence par le soleil pendant une heure, et si on multiplie ce quotient par le temps qui sépare le moment du passage du soleil au méridien du moment donné, avant ou après midi, on aura le nombre de degrés que le soleil a parcourus dans cet intervalle.

Pour avoir l'angle h, il suffit de multiplier l'angle H par le cosinus de l'angle déterminé comme il vient d'être dit; la formule revient donc à ceci:

$$h = H \cos\left(\frac{180^{\circ}}{l}t\right)$$

dans laquelle h est la hauteur du soleil en degrés, à l'heure donnée, H sa hauteur à midi, l la longueur du jour, à sa date, en heures et fractions décimales d'heures; t le temps en nombre décimal d'heures qui sépare le moment donné de midi vrai.

La valeur de $\frac{180^{\circ}}{l}$ peut se calculer d'avance pour tous les jours de l'année, en sorte qu'il ne reste plus qu'à faire une multiplication par t pour trouver l'angle dont on doit chercher le cosinus. Il faut remarquer que cet angle est obtenu en degrés et fractions décimales de degrés et que pour en trouver le cosinus dans les tables, il faut transformer les fractions de degrés en minutes.

L'angle H est donné en degrés et centièmes de degrés, de façon à pouvoir être considéré comme un nombre ordinaire dont on cherche le logarithme pour l'ajouter au logarithme du cosinus de l'angle $\left(\frac{180^{\circ}}{l}t\right)$.

Pour abréger les calculs, chaque observateur se fera d'avance une table de H et une table des valeurs de $\frac{180^{\circ}}{l}$

diverses latitudes; il en déduira les valeurs de l dont il

Lausanne, le 3 mars 1880.

aura besoin.

