

Zeitschrift: Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Herausgeber: Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Band: 25 (1889-1890)
Heft: 100

Artikel: Note sur la floraison d'un certain nombre de plantes
Autor: Favrat, L.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-262154>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 15.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

NOTE

sur la floraison d'un certain nombre de plantes,
en décembre 1888 et janvier 1889.

L'hiver 1888-89 est certainement un des plus remarquables qu'il y ait eu depuis assez longtemps, au point de vue des phénomènes de végétation qui s'y sont produits en décembre et janvier.

Sans doute, toutes les fois que l'automne est beau et que l'arrière-saison se prolonge, une foule de plantes continuent de végéter, tandis que d'autres ont une seconde floraison, ou, trompées par la température, devancent l'époque où elles fleurissent ordinairement. C'est surtout chez les plantes herbacées et vivaces que ces phénomènes se produisent. Parmi les végétaux ligneux, le cas est beaucoup plus rare : le lilas et le pommier, entre autres, refleurissent quelquefois ; mais c'est rarement toute la plante et seulement une branche ou deux, du moins d'après mes observations.

Les plantes dont suit l'énumération, et qui sont au nombre de 140 environ, ont été pour la plupart recueillies ou constatées aux environs de Lausanne, entre le 15 décembre et le milieu de janvier. M. Tonduz, ancien préparateur de botanique, en a recueilli le plus grand nombre. M. Jaccard, préparateur actuel, et M. Favrat ont observé ou récolté les autres. Quelques-unes proviennent du Pèlerin et du Jura.

Le *Primula elatior* a été envoyé en motte au bureau de la *Revue* ; il provenait des pentes des Diablerets (1800 m.), où il avait été trouvé entre le 15 et le 20 janvier.

Je n'ai pu tenir compte d'une note parue dans la *Gazette du Valais* et la *Gazette de Lausanne*, note signalant un remarquable phénomène de végétation au Val-d'Anniviers, à la même époque et à une altitude de 2000 m. ; les noms des plantes n'étaient pas donnés.

Plantes sauvages.

Renonculacées.

Ranunculus acris, *Ran. bulbosus*, *Ran. repens*, *Anemone nemorosa*.

Papavéracées.

Papaver Rhoeas (le coquelicot).

Fumariacées.

Fumaria officinalis (la fumeterre).

Crucifères.

Cardamine hirsuta (cresson des vignes), Erucastrum Pollichii, Arabis albida, Raphanus Raphanistrum, Sinapis arvensis (moutarde des champs), Capsella bursa pastoris (la bourse à pasteur).

Cistinées, Violariées.

Helianthemum vulgare (Hélianthème commun), Viola tricolor (pensée des champs, deux variétés).

Résédacées, Polygalées.

Reseda lutea, Polygala vulgaris.

Alsinées.

Alsine leptoclados (sabline à petits fruits), Cerastium vulgatum, Silene inflata, Stellaria media (mouron des oiseaux).

Hypéricinées, Malvacées, Géraniacées.

Hypericum perforatum (le millepertuis), Malva silvestris (la mauve sauvage), Geranium pyrenaicum, Ger. Robertianum, Ger. dissectum.

Papilionacées.

Anthyllis vulneraria (vulgo patte de chat), Melilotus alba, Trifolium pratense (le trèfle cultivé), Trif. repens (vulgo le triolet), Genista tinctoria (le genêt des teinturiers), Hippocrepis comosa, Melilotus arvensis, Medicago Lupulina (la lupuline).

Rosacées.

Potentilla reptans, Pot. Fragariastrum, Pot. micrantha, Pot. verna, Fragaria vesca (le fraisier commun, avec fleurs et fruits mûrs), Rubus... (indéterminé).

Ombellifères.

Anthriscus silvestris, Aethusa Cynapium, Pastinaca sativa (le panais, le type sauvage), Bupleurum falcatum, Pimpinella Saxifraga.

Araliacées, Cornées, Stellatées.

Hedera Helix (le lierre, qui fleurit normalement en septembre), Cornus sanguinea (le cornouiller sanguin), Galium silvestre.

Dipsacées.

Succisa pratensis (mors du diable, herbe de saint Joseph), *Scabiosa Columbaria*.

Composées.

Centaurea Scabiosa, *Cent. Jacea*, *Bellis perennis* (la pâquerette ou petite marguerite), *Erigeron canadensis* (vergerette du Canada), *Erig. acris* (vergerette âcre), *Achillea Millefolium* (le millefeuille), *Chrysanthemum Leucanthemum* (la grande marguerite), *Senecio vulgaris* (le seneçon commun), *Picris hieracioides*, *Taraxacum officinale* (le pissenlit), *Sonchus oleraceus* et *asper* (les deux laitrons des lieux cultivés), *Hieracium murorum* (éperrière des murs), *Lampsana communis*.

Gentianées.

Gentiana verna (gentiane printanière), *Gent. excisa* (sous-espèce de la gentiane à tige courte).

Scrophularinées.

Antirrhinum majus (gueule-de-loup), *Linaria minor*, *Lin. cymbalaria* (vulgo ruine de Rome), *Veronica polita*, *Veron. persica*.

Labiées.

Ballota fœtida (la ballote fétide), *Ajuga genevensis* (la bugle de Genève), *Stachys recta* (l'épiaire dressée), *Teucrium Scordonia*, *Origanum vulgare* (origan commun), *Salvia pratensis* (la sauge des prés), *Galeopsis angustifolia*, *Lamium purpureum* (le lamier pourpre), *Lam. maculatum* (le lamier taché), *Teucrium Botrys*, *Thymus Chamædrys* (le serpolet).

Verbenacées.

Verbena officinalis (la verveine).

Primulacées.

Primula vulgaris (la primevère commune ou à grandes fleurs), *Primula elatior* (la primevère élevée), *Anagallis arvensis* (le mouron rouge).

Chénopodées, Polygonées, Euphorbiacées.

Chenopodium murale, *Rumex obtusifolius*, *Euphorbia Peplus* *Mercurialis annua* et *perennis*.

Graminées.

Dactylis glomerata (le dactyle pelotonné ou aggloméré), *Poa annua* (le paturin annuel), *Bromus erectus* (le brome dressé), *Lolium italicum* (raygrass d'Italie).

En fleurs dans les jardins, en décembre 1888 et au commencement de janvier 1889.

Nardosmia fragrans (Héliotrope d'hiver, Tussilage odorant). Il a fleuri à Lausanne vers le 15 décembre; à Castagnola près Lugano, en 1886, les fleurs n'ont paru qu'en février; à Lausanne, en 1887, au commencement de mars; dans le Midi, il fleurit année moyenne en novembre.

Outre ce beau tussilage, on pouvait voir dans les jardins des environs de Lausanne: les giroflées, les soucis, les capucines, le laurier-tin (*Viburnum tinus*), plusieurs *Pelargonium*, des violettes et des pensées, des pieds-d'alouette, plusieurs *Aster*, plusieurs *Rosa*, le *Nigella damascena* (la Nigelle de Damas), le Réséda odorant, le cerfeuil (vulgo les herbettes, la saveur) et nombre d'autres dont il n'a pas été pris note.

Le nombre des plantes sauvages et des plantes d'ornement eût été sans doute beaucoup plus considérable, si l'exploration de nos environs s'était faite systématiquement.

Lausanne, février 1889.

L. FAVRAT.

