

Zeitschrift:	Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Herausgeber:	Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Band:	39 (1903)
Heft:	146
Artikel:	Les sépultures et les populations préhistoriques de Chamblanches. Part II, caractères ethniques
Autor:	Schenk, Alexandre
Kapitel:	Corps no 9
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-267019

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 13.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Taille.

Humérus gauche, longueur	308 mm.	+	2	=	1 m. 610	Taille cadavre.	
	1 m. 610	—	20	=	1 m. 590	» vivant.	
» droit, longueur	302 mm.	+	2	=	1 m. 581	» cadavre.	
	1 m. 581	—	20	=	1 m. 561	» vivant.	
Cubitus droit,	»	255 mm.	+	2	=	1 m. 654	» cadavre.
	1 m. 654	—	20	=	1 m. 634	» vivant.	
Radius gauche,	»	237 mm.	+	2	=	1 m. 654	» cadavre.
	1 m. 654	—	20	=	1 m. 634	» vivant.	
Fémur gauche,	»	429 mm.	+	2	=	1 m. 639	» cadavre.
	1 m. 639	—	20	=	1 m. 619	» vivant.	
Tibia gauche,	»	354 mm.	+	2	=	1 m. 642	» cadavre.
	1 m. 642	—	20	=	1 m. 622	» vivant.	
Péroné droit,	»	350 mm.	+	2	=	1 m. 640	» cadavre.
	1 m. 640	—	20	=	1 m. 620	» vivant.	

Taille moyenne sur le vivant = 1^m613.

CORPS N^o 9. ♀.

Fouilles de 1901.

Le crâne.

Crâne mal conservé provenant d'une femme jeune encore car toutes les sutures sont profondément ouvertes. Les temporaux et le squelette de la face font complètement défaut. Le crâne est fortement dolichocéphale : indice céphalique de 72,28.

Les bosses frontales sont bien développées ; la glabelle est plane, les arcades sourcilières correspondent au N^o 0 de la nomenclature de Broca. L'écaille de l'occipital est projetée et par tous ses caractères ce crâne paraît se rapprocher du crâne de Chevroux, N^o 15845 du Musée d'Anthropologie et d'Archéologie préhistoriques¹.

Le squelette du tronc n'est représenté que par quelques débris en trop mauvais état pour être étudiés.

Les humérus sont intacts ; ils ne présentent pas de perforation olécranienne.

¹ A. Schenk. *Description des restes humains, etc.*

Les *cubitus* existent également, mais le *cubitus* gauche n'est pas complet :

	Gauche	Droit
Longueur totale.	—	235
Distance du bec de l'olécrane au plan horizontal.	30	35
Distance du sommet de l'apophyse coronoïde au plan horizontal.	38	42
Distance de la cavité sigmoïde au plan horizontal.	24	29

Le *radius* gauche mesure 215 mm. Le *radius* droit fait défaut. Les deux *fémurs* sont entiers ; le *fémur* gauche est plus long que le *fémur* droit ; la fosse hypotrochantérienne existe sur les deux *fémurs*, mais elle est peu développée. Le troisième trochanter fait défaut au *fémur* droit, mais il est représenté par une légère protubérance sur le *fémur* gauche. L'indice de *platymétrie* atteint respectivement 73,33 et 78,57 ; l'indice *pilastrique* assez élevé est de 104,17 pour les deux *fémurs*.

Les *tibias* ne sont pas *platycnémiques*, l'indice de *platycnémie* étant de 73,33 pour le *tibia* gauche et de 71,88 pour le *tibia* droit.

Le *péroné* droit existe seul ; il mesure 318 mm.

Taille.

Humérus gauche, longueur 279 mm. + 2 = 1 m. 494	Taille cadavre.
1 m. 494 — 20 = 1 m. 474	» vivant.
» droit, longueur 282 mm. + 2 = 1 m. 508	» cadavre.
1 m. 508 — 20 = 1 m. 488	» vivant.
Radius gauche, » 215 mm. + 2 = 1 m. 565	» cadavre.
1 m. 565 — 20 = 1 m. 545	» vivant.
Cubitus droit, » 235 mm. + 2 = 1 m. 576	» cadavre.
1 m. 576 — 20 = 1 m. 556	» vivant.
Fémur gauche, » 397 mm. + 2 = 1 m. 516	» cadavre.
1 m. 516 — 20 = 1 m. 496	» vivant.
» droit, » 390 mm. + 2 = 1 m. 495	» cadavre.
1 m. 495 — 20 = 1 m. 475	» vivant.

Tibia gauche, longueur	334 mm. + 2 = 1 m. 560	Taille cadavre.
	1 m. 560 — 20 = 1 m. 540	» vivant.
» droit, »	339 mm. + 2 = 1 m. 570	» cadavre.
	1 m. 570 — 20 = 1 m. 550	» vivant.
Péroné droit, »	318 mm. + 2 = 1 m. 528	» cadavre.
	1 m. 528 — 20 = 1 m. 508	» vivant.

Taille moyenne sur le vivant = 1^m515.

CORPS N^o 10.

Fouilles de 1901.

Squelette de jeune enfant en très mauvais état.

CORPS N^o 11. ♂.

Fouilles de 1901.

Le crâne.

Crâne masculin en parfait état. Les contours du crâne sont réguliers, sans accentuation marquée des crêtes d'insertion musculaires. La face est fortement prognathe. Les sutures crâniennes ne sont pas oblitérées, mais la suture coronale, relativement simple, est plus synostosée que les sutures sagittale et lambdoïde. Le crâne est sous-dolicho-céphale avec un indice céphalique de 78,41.

Norma facialis (fig. 28). — Le front est bien développé; les arcades sourcilières sont nulles ou à peu près; la glabellle légèrement saillante est plane; les bosses frontales sont bien marquées et il existe une certaine élévation médiane du frontal au niveau de la partie moyenne de la suture métopique. La courbe du crâne est régulière, très nettement arrondie. La face est leptoprosope, l'indice facial II étant de 54,40. Les os malaires sont plutôt petits. Les orbites rectangulaires, faiblement mésosèmes, ont un indice de 83,33. Le nez est platyrhinien bien que la face soit leptoprose; son indice est de 54,55. Le plancher des fosses nasales offre, en avant, un bord légèrement mousse