Zeitschrift: Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Herausgeber: Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Band: 45 (1909)

Heft: 165

Artikel: De l'influence de l'insolation sur la température des deux versants d'une

vallée

Autor: Buhrer, C.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-268637

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

DE L'INFLUENCE DE L'INSOLATION

sur la température des deux versants d'une vallée.

par C. BUHRER

Tout le monde connaît l'influence de l'insolation sur la vie organique de la terre. Aussi voyons-nous dans les vallées le côté tourné au soleil occupé par l'homme et ses cultures, tandis que le versant opposé est généralement délaissé. Dans l'Engadine, sur une population de 12 000 âmes, il n'y a que 2000 habitants sur la rive droite de l'Inn. En Valais, la proportion n'est pas la même; il y a dans la vallée du Rhône, de Brigue à Martigny, 14 000 habitants sur la rive gauche, ou le côté ombre, et 26 000 sur la rive droite, le côté ensoleillé. Dans l'Engadine, le 17 °/0 de la population vit à l'ombre, dans la vallée du Rhône nous trouvons le 54 °/0.

La rive gauche du Rhône recevant beaucoup moins de soleil, les rayons y arrivant en outre en un angle beaucoup plus oblique, il m'a paru intéressant de rechercher l'influence de cet amoindrissement de l'insolation sur la température. Nous avons en Valais une station sur la rive gauche du Rhône, l'Ecole d'agriculture d'Ecône, près Riddes, dont les observations météorologiques nous permettent une étude comparative.

Ecône est situé entre Riddes et Saxon, sur le cône d'alluvions du petit torrent d'Icône, au pied même de la montagne. Il reçoit, en hiver, très peu de soleil, puisque celui-ci s'y lève, au commencement de janvier, à 2 ¼ h. et se couche déjà à 3 h. L'insolation, en heures, est pour les années 1901 à 1903 à:

	¥8	Hiver.	Printemps.	Eté.	Automne.
Econe.	•	121	399	642	285
Sierre 1	٠	310	488	696	464
Clarens 2	•	207	423	567	291
Lausanne	3	203	477	680	292

Le déficit d'Ecône se manifeste surtout en hiver et au printemps.

Il est de toute évidence que la température doit se ressentir de cet état de chose. Nous constatons déjà une différence sensible entre la température de Martigny (rive gauche du Rhône) et Sion (rive droite), localités distantes d'environ 20 kilomètres.

	Hiver.	Printemps.	Eté.	Automne.	Année.
Martigny 4 .	-0.3	10.0	18.5	9.6	9.3
Sion 4	0.3	10.2	18.7	$9 \cdot 7$	9.7
Déficit de la					
rive gauche	0.6	0.2	0.2	0.1	0.4

Les différences sont plus saisissantes entre Ecône et Sion:

Ici, en effet, la différence est encore plus grande, quoique la distance entre les deux localités ne soit que de quelques kilomètres; elle est de 0.5 en hiver, de 0.9 au printemps, de 0.7 en été et de 1.4 en automne.

Quand on réfléchit au rôle considérable que joue la durée de l'insolation sur le physique et le moral de l'homme, on est frappé du grand nombre d'habitants de vallées alpes-

¹ Rive droite du Rhône.

² Station adossée à la montagne.

³ Station de plaine.

⁴ Moyennes de 30 ans, 1864-1893.

⁵ Moyennes de 7 ans, 1901-1907.

tres qui en sont privés. C'est à l'approche de l'hiver surtout, quand le soleil baisse à l'horizon, que nous commençons à en apprécier la valeur. Pour beaucoup de localités, le soleil ne fait qu'une courte apparition, pour d'autres il disparaît même complètement pour un temps plus ou moins long. En voici une liste, avec l'heure approximative du lever et du coucher du soleil :

Lever et coucher du soleil 1 à la fin de décembre :

	over co couch	CI V		SO I			i ia iiii ac a	cociniste.
nes /	Oberwald	•	•	٠	٠	•	2.30 h.	3.— h.
Vallée de Conches	Obergestele	n	•	15. 9 2			I I. —	3.3 o
	Betten et R	ied	٠			٠	10.—	4.—
ge \	Mörel, haut							4.—
lée								4.—
Val	Binn	•	•	•	ě	•	11.30	2.—
- 1	Simplon vill							11.30
es /	Stalden .							3.—
Viè	St-Nicolas							2.—
و م	Randa .							2.30
	Zermatt .							2.3 0
,	Brigue .							12.—
	Grône							3.15
	Bramois, ce	ntre	e di	ı vi	llag	çe	10.15	2.15
	Nax	•	•	•		•	10.45	4.15
	Evolène .		٠	•	•	•	10.30	2.30
	Isérable .							3.15
60	Ecône							3.—
	Saxon .							4.—
	St-Maurice						658	1.30
	Savatan .						T	3.15
	Dailly							4.10
	Champéry							3.25
	Port-Valais		•	٠	•	•	9.20	2.—

¹ Observations directes faites par des habitants des localités.

Bouveret	•		•		•		9.30	1.30
St-Gingol								12.30
Tollon		•		•	•	•	9.5o	1.30
Montana	•				8.00	•	8.45	4.30
Leysin								4.30
Clarens	٠		•	•		•	9.31	4.04
Corseaux	(b)	ord	l di	ı la	(\mathbf{c})	٠	9.—	4.40
Lausanne)					1.6	8.25	4.40

La comparaison entre la première et la seconde série nous montre bien la différence de l'insolation: d'un côté, nous avons des localités qui, au solstice d'hiver, n'ont qu'une demi à une heure de soleil, de l'autre côté nous voyons des endroits qui jouissent, à la même époque, de plus de huit heures d'insolation. A Montana et à Leysin l'horizon est abaissé par l'altitude de ces endroits. Clarens, situé au pied de la montagne orientée du N.-E. au S.-W. reçoit le soleil environ une heure plus tard que Lausanne et le voit disparaître une demi-heure plus tôt, parce que la chaîne des Alpes savoisiennes fait écran. Corseaux, situé entre les deux localités, ne subit l'influence de la montagne que le matin.

Dans quelques endroits, le soleil disparaît pendant une partie de la journée. L'exemple le plus frappant est Rougemont où, du 26 novembre au 17 janvier, le disque solaire est caché au milieu du jour par le sommet du Rubly. Vers le 20 décembre, l'absence du soleil due à cette circonstance est d'environ 1 h. 30. Brigue se trouve dans une situation analogue. A la fin de décembre, la ville est éclairée de soleil pendant trois quarts d'heure. Le Glishorn intercepte les rayons dès le 5 novembre, mais le soleil réapparaît encore de l'autre côté de ce sommet jusqu'au 25 novembre. Dès cette date au 17 janvier, la réapparition cesse. A partir du 7 février le soleil passe au-dessus de la montagne et la durée de l'insolation augmente rapi-

dement. Sur le littoral du Léman, de Vevey à Clarens, nous constatons le même phénomène, pendant quelques jours autour de Noël: le soleil disparaît derrière le coin des rochers de Mémise et réapparaît pour quelques instants avant de se coucher. Aux Haudères, au fond de la vallée d'Hérens, le phénomène est encore plus bizarre. Au mois de février et d'octobre, le lever et le coucher du soleil y ont lieu quatre fois par jour. L'astre du jour semble jouer à cache-cache derrière les cimes neigeuses qu'il dore de ses rayons.

Si beaucoup de localités ont le soleil parcimonieusement mesuré en hiver, il en existe une quantité d'autres où il disparaît complètement pour un temps plus ou moins long. En voici quelques-unes, avec les dates de la disparition et de la réapparition.

Disparition,	Réapparition	Nombre de
du soleil.	du soleil	jours sans
		soleil.
Grengiols Comm. de déc.	fin janvier	60 j. env.
Gliss 25 novembre	22 janvier	59 jours.
Imfeld (Binn) . Comm. de déc.	fin janvier	60 j. env.
Gondo 15 décembre	rer janvier	15 jours.
Tourtemagne		
(partie mérid.) 25 novembre	2 février	70 jours.
Agaren Comm. de déc.	fin janvier	60 j.env.
Bramois (partie	8	
méridionale) . 15 novembre	15 janvier	60 jours.
Martigny-Bourg Comm. de déc.	fin janvier	60 j. env.
Champsec Comm. de nov.	fin janvier	90 j. env.
Gd. St-Bernard . 4 décembre	6 janvier	33 jours.
Novel II novembre	29 janvier	76 jours.
L'Etivaz (hameau		
de Vers-chez-		
les-Isoz) 28 novembre	16 janvier	50 »
Les Plans (rive		
droite) 1er décembre	10 »	41 »

Frenières . . . 1^{er} décembre 6 janvier 37 jours La Tine . . . 8 novembre 20 » 73 »

Quelques fois la disparition du soleil ne s'observe que dans une partie d'un village, c'est le cas à Bramois, à Tourtemagne. Aux Plans, la rive gauche, est beaucoup plus longtemps à l'ombre que la rive droite; à Frenières, l'extrémité nord du village, tournée contre Gryon, a le soleil toute l'année, tandis qu'il manque à la maison d'école pendant 37 jours; à la fin de janvier il disparaît derrière une montagne au milieu du jour; vers la scierie du Pont, on ne le voit plus pendant deux mois. Un fait curieux se passe au Grand St-Bernard. Là, les chambres du vieil hospice sont privées de soleil du 4 décembre au 6 janvier, tandis qu'il éclaire toute l'année la façade du nouveau bâtiment situé de l'autre côté de la route, ainsi que le toit de l'ancien bâtiment. Il aurait suffit de construire celui-ci de quelques mètres plus à l'ouest pour qu'il jouisse de 33 jours par an de soleil de plus.

La réapparition du soleil est un événement dans plusieurs localités. Un curé de Gliss, M. Brindlen, a fêté ce retour dans une charmante poésie qui a même été mise en musique par un professeur du collège de Brigue.