Zeitschrift: Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Herausgeber: Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Band: 45 (1909)

Heft: 167

Artikel: Micromycètes nouveaux : récoltés en Valais du 19 au 22 juillet 1909

Autor: Cruchet, Denis

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-268650

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 17.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

MICROMYCÈTES NOUVEAUX

récoltés en Valais du 19 au 22 juillet 1909

PAR

Denis CRUCHET

Le mardi 7 septembre 1909, devant la Société botanique suisse réunie à Lausanne, il a été fait mention de quelques champignons nouveaux récoltés en Valais pendant la course annuelle de la Société Murithienne. Le moment est venu de rappeler cette communication, en l'accompagnant des développements indispensables.

Il s'agit d'abord d'une Urédinée nouvelle

Puccinia Bessei, nov. spec.

sur Lloydia serotina Rchb., au « Hohlstein », près du glacier de Tourtemagne, sur la rive droite du torrent.

Les amas ne paraissent renfermer que des téleutospores. On les aperçoit sur la tige, mais surtout sur les feuilles vertes, caulinaires et radicales. Au début, ils se présentent sous la forme d'une légère boursouflure qui éclate bientôt. Alors apparaissent des masses arrondies ou oblongues, mesurant un tiers à deux tiers de diamètre, entourées par l'épiderme déchiré, parfois confluentes, compactes, d'un brun clair sur le support frais, mais passant au brun foncé sur la plante desséchée.

Téleutospores ovales, légèrement atténuées, ou arrondies, ou même tronquées au sommet, souvent très polymorphes, à membrane mince (1μ) , l'épaisseur augmentant vers le sommet (2μ) .


L'épispore montre une structure en bâtonnets, qui se présentent, vus de face, comme fine ponctuation de la membrane. Les téleutospores, d'un beau brun, sont plus ou moins resserrées à la cloison, et atténuées ou même tronquées inférieurement. Leur longueur est de 28 à 38 μ ; leur largeur de 15 à 25 μ . Dans la cellule supérieure le pore germinatif est près du sommet, tandis que celui de la cellule inférieure se rapproche plus ou moins du pédicelle. Ce dernier, assez épais au sommet (5-6 μ), fixé obliquement, est hyalin, fragile, court, parfois à peine visible.

Par la structure de l'épispore, par la position des pores germinatifs et enfin par l'absence d'aæidies et d'urédospores, cette espèce se distingue nettement des autres Urédinées vivant sur les Liliacées.

Elle est dédiée à M. le chanoine M. Besse, le savant et dévoué président de la Société Murithienne.

Puccinia Bessei, nov. spec.

Soris teleutosporiferis amphigenis, primum minimis punctiformibus, deinde rotundatis vel oblongis, epidermide



Téleustopores de Puccinia Bissei nov. spc.

fissa circumdatis, 1/3-2/3 mm. longis, interdum confluentibus, compactis, obscure brunneis.

Teleutosporis ovoideis, apice leniter attenuatis vel rotundatis vel truncatis, saepe valde multiformibus, parum incrassatis (1 μ), apice crassioribus (2 μ), medio plus minusve constrictis, deorsum multum attenuatis, saepe paene truncatis, propter membranam baculis minimis parallelis

instructam punctulatis, laete brunneis, $28-38 \times 15-25 \mu$. Pedicello apice sat crasso (5-6 μ), hyalino, deciduo, brevi saepe vix conspicuo. Poro germinationis subapicali in cellula superiore, prope pedicellum in cellula inferiore.

Hab. in foliis vivis, rarius in caule *Lloydiae serotinae* Rchb., ad rupem herbosam « Hohlstein » dictam, in parte superiore Vallis Tortemagny (germanice Turtmann, gallice Tourtemagne), in Alpibus Valesiacis Helvetiae.


Haec species, nuper (XX^o die mensis Julii) inventa, Rev. Can. M. Besse, Murithianae Valesiacae Societatis benevolo claroque praesidi dedicata est.

A cette Puccinie il faut en ajouter une seconde, découverte dans la même station par MM. E. Mayor, D^r méd. à Neuchâtel, et D^r P. Cruchet, à Payerne.

Voici la description qu'ils présentent de cette nouvelle espèce :

Puccinia Fischeri, Cruchet-Mayor, nov. spec.

Amas de teleutospores arrondis, n'atteignant pas 1 mm. de diamètre, isolés ou groupés à la face supérieure des feuilles, recouverts par l'épiderme, puis nus, brun clair.



Téleustoporcs de Puccinia Fischieri nov. spec.

Teleutospores elliptiques, arrondies aux deux extrémités, distinctement étranglées en leur milieu; longueur 30-43 μ , largeur 17-23 μ caduques; les deux cellules sont sensiblement égales comme forme et comme dimensions. La membrane, d'un brun clair, présente la même épaisseur partout, et sa surface paraît chez quelques spores légèrement

chagrinée. Le pore germinatif de la cellule supérieure est apical; celui de la cellule inférieure est situé dans le voisinage du pédicelle; tous deux sont recouverts d'une papille incolore et peu proéminente.

Micropuccinia.

Vit sur Saxifraga biflora All. Moraine du glacier de Tourtemagne, Alpes valaisannes, 20 juillet 1909.

L'ensemble de ces caractères, et surtout la situation basale du pore germinatif, écarte cette Puccinie de ses congénères vivant sur les Saxifrages, mème de Puccinia Pazschkei Dietel, dont elle se rapproche le plus. En la nommant Puccinia Fischeri, nous la dédions à M. le professeur D^r Ed. Fischer, heureux que nous sommes de lui présenter ce témoignage de notre reconnaissance.

Puccinia Fischeri Cruchet et Mayor, nov. spec.

Soris teleutosporiferis rotundatis, vix 1 mm. diam., discretis vel aggregatis, epiphyllis, epidermide tectis, deinde nudis, pulverulentis, brunneis.

Teleutosporis oval.-ellipt., utrinque rotundatis, medio distincte constrictis, deciduis, $30-43 \times 17-23 \mu$. Cellulis eadem forma et dimensione. Membrana laete brunnea, ubique aeque crassa, minutissime punctulata. Poro germinationis cellulae superioris apicali, cellulae inferioris ad basim; poris papilla hyalina et parum proeminente tectis. Pedicello hyalino, deciduo.

Hab. ad folia viva Saxifragae biflorae All. Ad rupes basin glacierum Tourtemagne in Alpibus Valesiacis.

Revenons à Lloydia serotina Rehb., car cette Liliacée nourrit encore un et même deux autres champignons parasites:


Asteroma Lloydiae, nov. spec.

Taches s'étendant sur la tige et les feuilles, au début brun-clair, puis brun foncé, enfin noires. Fibrilles très minces, peu rameuses, à lignes presque parallèles. Conceptacles disséminés, rarement groupés, très petits, presque noirs. Spores cylindriques, unicellulaires, obtuses aux deux extrémités, bacilliformes, $3-4 \times 0.5 \mu$, hyalines, rares.

Sur la tige et sur les deux faces des feuilles flétries de Lloydia serotina Rchb. Valais. Pentes gazonnées près du glacier de Tourtemagne, sur la rive droite du torrent. 20 juillet 1909.

Mycosphaerella Burnati, n. sp.

Périthèces sur les deux faces des feuilles, dans les régions occupées précédemment par les fibrilles et les con-



Mycosghaerella Burnati nov. spec.

ceptacles de l'Asteroma, recouverts par l'épiderme décoloré et d'aspect grisâtre, densément groupés, globuleux, s'ouvrant par un ostiolum conique assez proéminent; 200 μ et plus de diamètre.

Asques oblongs, plus larges inférieurement, un peu atténués et obtus au sommet, assez brusquement rétrécis inférieurement en un pédicelle court, 65 à 80 μ de longueur, 22 à 24 μ de largeur.

Paraphyses nulles.

Spores 8, bisériées ou assez irrégulièrement groupées

dans l'asque, oblongues, arrondies aux deux extrémités, uniseptées, faiblement étranglées à la cloison, hyalines, avec quelques petites guttules dans chaque cellule, la supérieure étant généralement un peu plus courte et plus large que l'inférieure. Longueur de la spore entière : 27 à 33μ ; largeur : 8 à 10 μ .

Sur feuilles flétries, décolorées ou presque putrescentes de *Lloydia serotina* Valais. Près du glacier de Tourtemagne. 20 juillet 1909.

Les dimensions considérables des spores suffisent amplement à séparer cette espèce des deux autres vivant sur les Liliacées : Mycosphaerella allicina (Fries): sp. $16 \times 4-5 \mu$; et M. Schoenoprasi (Rbh.), sp. $17-21 \times 5-6 \mu$.

Cette sphaerellée est dédiée à M. le D^r E. Burnat, l'éminent botaniste de Vevey.

Il est difficile de quitter le Valais sans faire une halte à Sion, pour visiter les collines de Valère et de Tourbillon. Un coup d'œil rapide sur les plantes de cette région si remarquable, a révélé la présence de trois champignons qui ne paraissent pas avoir été décrits jusqu'à ce jour :

Ascochyta Cyani nov. spec.

Taches nulles ou peu apparentes. Conceptacles punctiformes, petits (80 à 100 μ), globuleux, puis déprimés, perforés au sommet, disposés irrégulièrement sur les feuilles, d'abord enfoncés dans le tissu, puis presque émergents.

Spores elliptiques-oblongues, arrondies aux deux extrémités, uniseptées, avec deux guttules dans chaque cellule, faiblement étranglées à la cloison, légèrement verdâtres, $15 \times 4-5 \mu$.

Sur feuilles sèches, presque putrescentes, de Contaurea Cyanus L.

Valais : Valère (Sion). 22 juillet 1909.

Ascochyta Tragi nov. spec.

Taches nulles. Conceptacles punctiformes, petits, à peine un dixième de millimètre de diamètre, perforés au sommet, immerses, puis presque émergents. Spores uniseptées, finement guttulées, 4 à 5 guttules dans chaque cellule, sans étranglement, ovales-oblongues, arrondies à chaque extrémité, hyalines, 17-18 $\mu \times 4$ -5 μ .

Sur feuilles radicales sèches de *Tragus racemosus* Desf. Valais : Colline de Valère (Sion). 22 juillet 1909.

Hendersonia Ephedrae nov. spec.

Conceptacles immerses, puis rompant l'épiderme qui se dessèche et se décolore, disposés en séries, denses, brun noir, s'ouvrant largement au sommet, petits (80-120 μ), souvent confluents.

Spores cylindriques, un peu atténuées aux deux extrémités, 6-8 septées, avec une guttule dans chaque cloison, $25 \times 4 \mu$, brunes.

Sur rameaux secs de Ephedra Helvetica C. A Mey.

Valais : Colline de Tourbillon (Sion). 22 juillet 1909.

Les tiges sèches nourrissent encore le Camarosporium Ephedrae Cooke et Mass., qu'il est impossible de confondre avec le précédent. •

E ...