Zeitschrift: Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Herausgeber: Société Vaudoise des Sciences Naturelles

**Band:** 54 (1921-1922)

**Heft:** 204

**Artikel:** Un Uromyces nouveau récolté dans le Jura vaudois

Autor: Mayor, E.

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-270915

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 29.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Un Uromyces nouveau récolté dans le Jura vaudois

PAR

## EUG. MAYOR, Dr-Méd.


Au cours d'une excursion aux Aiguilles de Baulmes, dans le courant de l'été dernier, j'ai eu l'occasion de récolter une Urédinée fort intéressante sur *Arenaria grandiflora* L <sup>i</sup>. Une étude ultérieure m'a montré qu'il s'agissait d'un *Uromyces* et d'une espèce différente de celles signalées jusqu'ici sur les Caryophyllacées, à laquelle je donnerai le nom de **Uromyces Arenariae-grandiflorae** spec. nov. et dont la description détaillée est la suivante.

Amas de téleutospores sur les feuilles, les tiges et les tiges florifères. Sur les feuilles, les amas sont à la face inférieure, parfois aussi à la face supérieure, soit isolés, ovales dans le sens de la longueur des feuilles, étroits, mesurant de 1 - 2 mm. de longueur sur  $\frac{1}{2} - \frac{2}{3}$  mm. de largeur, soit le plus souvent confluents et pouvant alors s'étendre sur tout ou partie de la longueur des feuilles, étroits et mesurant 1/2 - 2/3 mm. de largeur. Sur les tiges et tiges florifères, les amas sont soit isolés, ovales et étroits, mesurant 1 - 2 mm. de longueur sur 1/2 - 2/3 mm. de largeur, soit plutôt confluents et pouvant atteindre jusqu'à 3 - 4 mm. de longueur sur  $\frac{1}{2}$  -  $\frac{2}{3}$  mm. de largeur. Les amas se rencontrent surtout sur les feuilles des tiges stériles qui prennent un aspect languissant et sont plus ou moins jaunes et desséchées; seules les feuilles supérieures restent assez vigoureuses pour devenir jaunâtres et se dessécher à leur tour au fur et à mesure des progrès de l'infection. Les amas sont assez longtemps recouverts par l'épiderme gris-noirâtre qui se soulève de plus en plus puis se fend et les spores apparaissent entre les lèvres plus ou moins irrégulières; par la suite l'épiderme disparaît le plus souvent sur les feuilles languissantes et desséchées en laissant à nu les amas noirs et un peu compacts.

Téleutospores globuleuses ou subglobuleuses, 21 - 24  $\mu$  de diamètre, ovoïdes ou ovalaires ou plus rarement elliptiques, 21 - 33  $\times$  16 - 21  $\mu$ , d'un brun plus ou moins foncé suivant que les spores sont plus ou moins à complète maturité, arrondies aux deux extré-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je dois à l'obligeance du Prof. Schinz, de Zurich, la confirmation de cette détermination phanérogamique.

mités, parfois plus ou moins terminées en pointe à leur extrémité antérieure ; pore germinatif apical, non surmonté d'une papille ; membrane lisse,  $2 \mu$  d'épaisseur, d'un brun plus foncé que la spore, renflée à l'extrémité antérieure où elle peut atteindre jusqu'à  $9 \mu$  et colorée en brun foncé ou brun-noir ; pédicelle persistant, jusqu'à  $82 \mu$  de longueur sur 6 -  $7 \mu$  de largeur, d'un brun pâle dans sa



Uromyces Arenariae-grandiflorae spec. nov. sur Arenaria grandiflora L..
Téleutospores et téleutospores anormales.
Grossissement 500.

moitié supérieure, coloration qui devient de plus en plus pâle à mesure qu'on se rapproche de la base.

Dans les préparations on trouve assez souvent des spores anormales de forme, soit très allongées et étroites, jusqu'à  $47 \mu$  de longueur sur 11 -  $13 \mu$  de largeur, soit renflées à leur base et terminées en sorte de bec, soit plus ou moins arquées ou présentant une tendance au cloisonnement transversal, soit même bifides à leur extré-

mité antérieure ; ces spores ne présentent pas de renflement appréciable de la membrane qui mesure partout 2  $\mu$  d'épaisseur.

Le développement biologique de cette Urédinée semble être celui d'un *Micro-Uromyces*, car je n'ai pas vu de téleutospores en voie de germination ou ayant déjà germé.

Téleutospores sur feuilles, tiges et tiges florifères de *Arenaria* grandiflora L. Sur les rochers de l'arête des Aiguilles de Baulmes, près du Signal, Jura vaudois, altitude 1520 m., 27 août 1921.

Sur les espèces du genre Arenaria, on ne signale qu'un Uromyces, Ur. Arenariae Tranzschel récolté en Russie sur Arenaria capillaris. Les dimensions des spores sont très sensiblement les mêmes et la membrane est également lisse. Par contre, notre espèce du Jura n'a pas de papille hyaline surmontant le pore germinatif, alors que l'espèce russe en possède une très manifeste de 2 - 3 µ de hauteur et a en plus une membrane sensiblement plus épaisse. Enfin, Ur. Arenariae a un pédicelle court, hyalin et caduc, alors que Ur. Arenariae-grandiflorae possède un pédicelle atteignant jusqu'à 82 µ de longueur, persistant et coloré en brun ou brunâtre suivant qu'on s'éloigne plus ou moins de l'insertion à la spore.

L'Uromyces Alsines Tranzschel signalé également en Russie sur Alsine setacea, diffère de notre espèce par la présence d'une petite papille hyaline surmontant le pore germinatif, par une verrucosité dense de la membrane et par un pédicelle court, caduc et hyalin; enfin on signale la présence d'urédospores qui manquent dans notre espèce du Jura.

Les divers autres *Uromyces* signalés sur les Caryophyllacées se distinguent aisément de *Ur. Arenariae-grandiflorae* et de multiples caractères morphologiques permettent de les distinguer facilement. L'espèce la plus voisine est certainement *Ur. Arenariae* Tranzschel; cependant nous venons de voir qu'elle se distingue de l'*Uromyces* de *Arenaria grandiflora* par un certain nombre de caractères morphologiques importants qui font que ces deux espèces ne sauraient être confondues ni réunies.

Je donne ci-dessous la description latine de *Uromyces Arena*riae-grandiflorae spec. nov.

Soris teleutosporiferis foliicolis vel caulicolis; foliicolis hypophyllis, interdum epiphyllis, sparsis, ovatis, minutis (1-2 mm. longis et  $^1/_2$  -  $^2/_3$  mm. latis), vel plerumque confluentibus, plus minusve elongatis et interdum per totam longitudinem foliorum,  $^1/_2$  -  $^2/_3$  mm. latis; caulicolis sparsis, ovatis, minutis (1 - 2 mm. longis et  $^1/_2$  -

 $^2/_3$  mm. latis), vel plerumque confluentibus (3 - 4 mm. longis ct  $^1/_2$  -  $^2/_3$  mm. latis); soris primum diutule epidermide tectis, subinde ea plus minusve irregulariter fissa cinctis, demum nudis, atris, compactiusculis.

Teleutosporis globosis vel subglobosis (21 - 24  $\mu$  diam.), ovoideis, ovatis vel raro ellipsoideis, 21 - 33  $\times$  16 - 21  $\mu$ , brunneis vel obscure brunneis, utrinque rotundatis, interdum apice subclavatis; poro germinativo apicali, sine papilla; membrana levi, 2  $\mu$  crassa, apice incrassata (usque 9  $\mu$ ) et obscuriore vel atro brunnea; pedicello persistenti, usque 82  $\mu$  longo et 6 - 7  $\mu$  lato, pallide brunneo in parte superiore, deorsum brunneolo.

Hab. in foliis caulibusque Arenariae grandiflorae L.

Perreux sur Boudry, le 20 décembre 1921.