

Zeitschrift: Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Herausgeber: Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Band: 56 (1925-1929)
Heft: 219

Artikel: Sur le dessin des polyèdres et réseaux cristallins en perspective parallèle
Autor: Déverin, L.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-271623>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

L. Déverin. — Sur le dessin des polyèdres et réseaux cristallins en perspective parallèle.

Les polyèdres et réseaux cristallins sont ordinairement représentés par leurs projections clinographiques sur un plan qui, par définition, est oblique aux droites projetantes parallèles entre elles. Le dessin s'exécute de façon telle que, les rapports des axes du cristal à leurs projections étant conventionnellement fixés, il soit possible de rétablir, à l'aide d'un calcul simple, les dimensions réelles du polyèdre projeté. Les principes qui gouvernent l'exécution du dessin ont été exposés par divers auteurs, notamment par Penfield (*Americ Journ. of Sci.* (4), XIX, 1905); ils peuvent se résumer comme suit:

Soient a_0, b_0, c_0 3 vecteurs-unités portés respectivement par 3 axes rectangulaires OXYZ formant un trièdre à droite. Sur le plan de projection, parallèle au plan YOZ, et que nous pouvons noter (100), traçons une droite de repère LL' parallèle à OY. L'œil est placé à l'infini sur OX.

Si le système d'axes tourne d'un angle θ autour de OZ, les longueurs a_0 et b_0 seront réduites à des longueurs apparentes $a_0 \sin \theta$ et $b_0 \cos \theta$. Si l'œil s'élève ensuite d'un angle φ au-dessus du plan horizontal, les projections obliques sur le plan du dessin des longueurs a_0 et b_0 deviennent:

$$1) \quad a = a_0 \sqrt{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta \operatorname{tg}^2 \varphi}$$

$$2) \quad b = b_0 \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta \operatorname{tg}^2 \varphi}$$

tandis que c_0 se projette en grandeur vraie.

a et b font avec la droite de repère LL' des angles notés respectivement ξ et η et définis par les relations

$$3) \quad \operatorname{tg} \xi = \frac{\operatorname{tg} \varphi}{\operatorname{tg} \theta} \quad \text{et} \quad 4) \quad \operatorname{tg} \eta = \operatorname{tg} \theta \operatorname{tg} \varphi$$

Si l'on pose $p = \frac{a}{a_0}$ et $q = \frac{b}{b_0}$
on tire des relations 1) et 2)

$$\operatorname{tg}^2 \theta = \frac{1 - q^2}{1 - p^2} \quad \text{et} \quad \operatorname{tg}^2 \varphi = p^2 + q^2 - 1$$

On déduit de là les formules suivantes, qui permettent de tracer les axes vus en perspective dès que l'on a choisi les valeurs de réduction p et q :

$$\operatorname{tg}^2 \xi = (p^2 + q^2 - 1) \frac{1 - p^2}{1 - a^2} \quad \text{et} \quad \operatorname{tg}^2 \eta = (p^2 + q^2 - 1) \frac{1 - q^2}{1 - p^2}$$