

Zeitschrift: Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Herausgeber: Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Band: 59 (1936-1937)
Heft: 244

Artikel: Un nouveau champ de substance grise dans le cerveau humain
Autor: Landau, E.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-272495>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 28.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

**E. Landau. — Un nouveau champ de substance grise
dans le cerveau humain.**

(Communication préliminaire.)

(*Séance du 7 juillet 1937.*)

J'ai pu prouver que la rotation du néo-pallium est toujours inséparable de la formation d'une nouvelle courbure de tout le télencéphale, le rhinencéphale y compris. Comme conséquence de cette nouvelle courbure, on constate sur le cerveau des primates et de l'homme, d'une part, la formation de l'Insula, et, d'autre part, le déplacement du gyrus piriforme vers le pôle antérieur du lobe temporal, tandis que chez les carnassiers il se trouve encore dans la partie postérieure du rhinencéphale.

Si la fissure Sylvienne du cerveau humain s'est formée par une inflexion de la partie postérieure du gyrus piriforme, sous l'influence de la poussée du néo-pallium, il faut supposer à priori que dans cette inflexion seront projetés chez les primates, dans la partie antérieure du lobe temporal, tous les noyaux placés chez les carnassiers justement dans la partie postérieure du gyrus piriforme.

Et, s'il est juste de concevoir l'avant-mur comme un noyau indépendant de l'écorce insulaire, la partie postéro-inférieure de ce noyau, qui se trouve liée au noyau amygdalien et à la substance perforée antérieure, devrait être projetée avec ce dernier en avant.

Les recherches faites sur des cerveaux du chat, et de l'ours, des singes et de l'homme adulte, ainsi que de fœtus humain, ont confirmé ce point de vue.

L'étude de la formation de l'Insula et de l'avant-mur m'ont amené aux conclusions suivantes :

1° Même dans la nature, existe le principe d'incompatibilité : les deux idées d'une grande Insula et d'autre part, d'un grand rhinencéphale s'excluent.

2° L'Insula se forme au détriment du rhinencéphale. Voilà pourquoi les animaux sans Insula sont macrosmates, les êtres avec une Insula sont microsmates.

3° L'Insula se forme par une rotation progressive du néo-pallium de derrière en bas et en avant, par une inflexion du rhinencéphale.

4° L'Insula est une formation passive; elle est formée par l'operculisatation autour d'elle.

5° Par la courbure du rhinencéphale, le noyau amygdalien ainsi que la partie postéro-inférieure de l'avant-mur sont projetés chez les primates, en avant.

6° La partie principale et la plus compliquée du claustrum, se trouve placée justement dans le pôle antérieur de l'opercule temporal de la fissure Sylvienne. On trouve ici un champ de substance grise ignoré jusqu'à maintenant et nommé par moi le *claustrum parvum*; on trouve ici la liaison du claustrum avec le rhinencéphale, avec le noyau amygdalien et *last not least* avec la substance perforée antérieure, qui me semble être la souche fondamentale de toutes les formations mentionnées.

7° Déjà chez un fœtus humain de trois mois et demi, le *fasciculus uncinatus*, ainsi que la partie inférieure de la commissure antérieure et du claustrum, sont presque formés, tandis que les limites de la future Insula sont encore à peine marquées.

Le claustrum occupe presque toute la profondeur de la partie antérieure du lobe temporal et est bien éloigné de l'écorce de l'Insula future.

8° Plus le fœtus est petit, plus la distance entre l'écorce insulaire et la partie inférieure du claustrum est grande.

9° L'écorce de l'Insula ne diffère en rien en principe, de toute l'écorce du néo-pallium.




FIG. 1. — Homme adulte, hémisphère gauche, coupe frontale. 2×1 .

Le pôle du lobe temporal est encore séparé de la substance perforée ant., on voit dans la partie supérieure du lobe temp. une chaînette de substance grise — notre *claustrum parvum*.




FIG. 2. — Homme, fœtus de 6 mois; hémisphère droit, coupe frontale. 3×1 .

La chaînette du *claustrum parvum* touche le bord inférieur du *claustrum* et se dirige obliquement en haut, sans cependant atteindre l'angle inférieur de l'insula (côté gauche de la photo).

