

Zeitschrift: Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Herausgeber: Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Band: 64 (1948-1950)
Heft: 272

Artikel: La température de l'air à Lausanne Champ de l'Air (553m)
Autor: Mercanton, P.-L.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-273964>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 16.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

La température de l'air à Lausanne Champ de l'Air (553 m)

PAR

P.-L. MERCANTON

(Séance du 5 mai 1948)

**X. Moyennes journalières, mensuelles, saisonnières et annuelles
de 1887 à 1946 (60 ans).**

XI. Maxima et Minima mensuels moyens.

XII. Nombres moyens de jours froids et très froids.

Annexes :

**A. Durées d'insolation mensuelles et annuelle moyennes
de 1909 à 1946 (38 ans)**

B. Hauteurs de précipitation moyennes de 1887 à 1946 (60 ans)

X. Températures.

La décennie 1937-1946 vient d'ajouter, complète et homogène, une série d'observations à celle des cinquante premières années de fonctionnement de l'observatoire du Champ de l'Air. Faites avec le même thermomètre, sous le même abri, et avec les mêmes alentours que les précédentes, les notations peuvent s'incorporer directement aux précédentes en de précieuses moyennes, maintenant sexagénaires. On trouvera ici, outre les données numériques mensuelles et annuelle sur la récente décennie les moyennes de température de l'air calculées jour par jour selon le schéma horaire $(7\frac{1}{2} + 13\frac{1}{2} + 2 \times 21\frac{1}{2}) / 4$, usuel, pour l'ensemble des soixante années 1887-1946. On confrontera utilement ces nouvelles valeurs avec celles que contiennent les notices de l'auteur sur les périodes 1887-1916, 1887-1926 et 1887-1936, publiées par la Société vaudoise des Sciences naturelles dans ses *Bulletins* Nos 192 (1918), 221 (1928) et 245 (1937). On y trouvera déjà des appréciations et comparaisons éclairant les changements survenus dans le climat thermique de Lausanne, accompagnées de quelques graphiques instructifs. Cela nous dispense donc de longs commentaires ici.

Le tableau I présente l'ensemble des températures moyennes globales journalières, mensuelles, saisonnières et annuelle de la période 1887 à 1946.

TABLEAU I.

Comme auparavant ces moyennes sont données au demi-dixième de degré (marqué par un petit 5 surbaissé). Des sondages pratiqués dans les données des diverses saisons ont en effet confirmé les valeurs trouvées antérieurement pour les écarts « médians », qu'une température individuelle quelconque, journalière, mensuelle, saisonnière ou annuelle, a, *en valeur absolue, autant de chances de ne pas atteindre que d'outrepasser*. Ces écarts sont pour la journée $\pm 0,4^\circ$, pour le mois $\pm 0,15^\circ$, pour la saison $\pm 0,1^\circ$ et pour l'année $\pm 0,05^\circ$.

L'incorporation de la récente décennie aux cinq précédentes n'entraîne pas des modifications suffisant à justifier les frais de reproduction d'un diagramme journalier de la température sexagénaire; on peut sans hésiter se reporter, quant à son allure générale, au diagramme de notre notice sur la période cinquanteaire. On pourra également confronter les résultats de l'analyse harmonique de la période sexagénaire, que M. Uttinger, climatologue à la Station centrale suisse de Météorologie, a bien voulu calculer, avec ceux des périodes antérieures. Voici cette expression dernière, basée toujours sur les moyennes thermiques de mois uniformément ramenés à 30,44 jours :

$$t_x = 9,15^\circ + 9,17 \sin (x+268)^\circ + 0,36 \sin (2x+4)^\circ \\ + 0,08 \sin (3x+172)^\circ + 0,10 \sin (4x+264)^\circ \\ + 0,06 \sin (5x+164)^\circ + 0,07 \sin (6x+90)^\circ.$$

On voit que dans la nouvelle série les appoints de phase en x et $6x$ n'ont pas changé.

Voici maintenant la comparaison des moyennes mensuelles de la dernière décennie avec, d'une part, celles de la précédente et d'autre part, celles de la période sexagénaire; on a mis pour cela en regard les moyennes mensuelles de la dite décennie et leurs écarts avec celles des périodes 1937/46 et 1887/46.

Mois	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Moy. 37/46	-0,35	1,55	5,45	9,65	12,9	17,0	18,6	18,3	14,85	9,85	4,85	0,3
Ecarts 27/36	-1,0	+1,0	+0,55	+1,2	-0,2	+0,05	+0,15	+0,4	-0,15	+0,65	-0,45	-1,05
Avec 37/46	-0,35	+0,4	+0,85	+1,1	-0,2	+0,55	+0,35	+0,6	+0,45	+0,55	+0,25	-0,85

TABLEAU I.

Observatoire de Lausanne - Champ de l'Air (553 m).
Températures moyennes de l'air de 1887 à 1946 (60 ans).

J	MOIS											
	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	2.6 ₅	0.3	0.8 ₅	2.6 ₅	7.1 ₅	10.0	16.0 ₅	17.9	18.6	16.1	11.8 ₅	7.0 ₅
2	2.7 ₅	0.4	0.6	2.7	7.3	10.6 ₅	15.8 ₅	17.6 ₅	18.5 ₅	16.4	11.8 ₅	6.6
3	2.7	-0.1 ₅	0.2 ₅	2.8	7.5	11.0	15.9	17.9	18.2	16.4	11.4	6.8
4	2.3 ₅	0.3 ₅	0.2 ₅	3.2	7.2 ₅	11.4	16.2	18.0 ₅	18.1 ₅	16.2 ₅	11.8 ₅	7.1
5	2.4 ₅	-0.2	0.0	3.0	7.4	11.5	16.2	18.1	17.9 ₅	15.9	11.3 ₅	6.8 ₅
6	2.3	-0.0 ₅	0.4 ₅	2.9 ₅	7.7 ₅	11.6	16.0 ₅	17.9 ₅	17.8	16.3	10.9 ₅	6.7 ₅
7	2.2 ₅	0.4	0.6	3.1	8.0	11.2 ₅	16.3 ₅	17.7 ₅	18.0	16.2	11.0	6.5 ₅
8	1.6	0.2	0.3 ₅	3.1 ₅	7.4	11.0	16.7	17.6 ₅	18.4	16.0	10.3 ₅	6.0 ₅
9	1.5 ₅	0.1 ₅	0.2 ₅	3.4	7.6	11.5 ₅	17.1 ₅	17.8 ₅	18.2 ₅	15.8 ₅	10.2 ₅	5.7 ₅
10	1.8	0.1 ₅	0.4 ₅	3.7	8.1 ₅	12.0	16.2	18.0 ₅	18.6	15.2 ₅	10.4	5.1
11	1.4	0.0	0.8	4.1	8.6	12.3 ₅	16.0	18.0	18.3 ₅	14.9	9.8	4.7
12	1.3 ₅	-0.1	0.8 ₅	3.3	8.6 ₅	13.1	15.9	18.4 ₅	18.0	14.6	10.0	5.0
13	1.1	-0.0 ₅	0.6 ₅	3.8	8.3	13.2	15.5 ₅	18.4 ₅	17.7 ₅	14.5	10.1	4.8
14	1.0 ₅	-0.3	0.5	4.0 ₅	8.8	13.7	15.4 ₅	18.6	18.1	14.2 ₅	9.5	4.5 ₅
15	1.1 ₅	-0.2 ₅	1.0 ₅	4.6 ₅	9.1 ₅	13.5	15.2	18.2 ₅	18.1 ₅	14.1 ₅	8.9 ₅	4.7
16	0.5 ₅	-0.5	1.0	4.3	8.2	13.1	15.4	18.1	17.5	14.1	9.2	4.4 ₅
17	0.2 ₅	-0.5	1.1 ₅	4.9 ₅	7.8 ₅	12.9 ₅	16.1	18.8 ₅	17.6 ₅	14.4	8.9	4.1 ₅
18	0.1 ₅	-0.2	1.4	5.0 ₅	7.9 ₅	13.2	16.2	18.7 ₅	18.1 ₅	14.7	9.0	3.8 ₅
19	0.4	-0.1 ₅	1.4	4.9 ₅	8.1 ₅	13.5	16.5	18.7 ₅	18.3 ₅	14.2 ₅	8.9	3.7
20	0.3	-0.0 ₅	1.3	5.0 ₅	9.0	13.9	16.4	18.3 ₅	17.3 ₅	13.8 ₅	8.7	3.8 ₅
21	-0.1	0.2	1.3 ₅	5.5	9.1	13.7 ₅	16.9 ₅	18.7	17.4	13.4	8.3	3.8
22	-0.1	0.0 ₅	1.7 ₅	5.9 ₅	9.5	13.8 ₅	16.7 ₅	18.7	16.6 ₅	13.3 ₅	8.2 ₅	3.3 ₅
23	0.4 ₅	-0.1 ₅	1.9	5.8	9.5 ₅	14.4	17.4	18.4 ₅	16.9 ₅	13.5	8.3 ₅	3.1 ₅
24	0.4	0.2	1.9 ₅	5.9 ₅	9.5	14.2 ₅	17.4	18.2 ₅	16.5 ₅	13.0	7.8	2.8 ₅
25	0.4	0.2 ₅	2.3 ₅	6.2	9.6	14.8	16.9	18.8	16.7	12.7	7.6	3.2
26	0.4	0.2 ₅	2.8 ₅	6.1 ₅	9.7 ₅	14.6	16.7	18.9	16.7 ₅	12.6	7.2 ₅	2.6 ₅
27	0.7 ₅	0.0 ₅	3.0 ₅	6.2	9.4	14.8	17.0	18.4	16.9	12.8 ₅	7.1 ₅	2.4 ₅
28	1.0	-0.1	3.0	6.4 ₅	9.9 ₅	14.7 ₅	17.7 ₅	18.1	16.9 ₅	12.6	7.1	2.5
29	1.1	-0.0 ₅	2.7	6.1 ₅	10.0 ₅	14.8 ₅	17.7 ₅	17.8	17.1	12.0	7.1 ₅	2.5
30	0.8	-0.5	—	6.9 ₅	10.2	15.5 ₅	17.9 ₅	18.0	18.2	12.0	7.3 ₅	2.9
31	0.7 ₅	0.4	—	6.7 ₅	—	15.9	—	18.3	16.2	—	7.0	—
MOIS	1.1 ₅	0.0	28 j. 29 j. 1.1 ₅ (1.2)	4.6	8.5 ₅	13.1	16.4 ₅	18.2 ₅	17.7	14.4	9.3	4.6
SAISON	0.7 ₅		8.7 ₅			17.4 ₅			9.4			

Année : 9.1₅ ± 0.0₅

Min. absolu 16 - 17 I par -0.5° } t moy.
Max. » 26 VII par 18.9° } journalière

Pour les saisons et 1 année les mêmes rubriques fournissent :

Hiver (XII-I-II)	Printemps (III-IV-V)	Eté (VI-VII-VIII)	Automne (IX-X-XI)	Année
0.5	9.3	18.0	9.85	9.4
-0.35	+0.5	+0.15	0.0	+0.05
-0.25	+0.55	+0.55	+0.45	+0.25

On constate ainsi que durant la dernière décennie l'hiver a été notablement plus froid, mais que printemps comme été ont été plus chauds, le printemps surtout, que durant la précédente. Par rapport à 1887-1946 le refroidissement hivernal apparaît un peu moindre, mais durant le restant de l'année le réchauffement est notablement supérieur et la moyenne annuelle est d'un quart de degré plus forte. Notons enfin que depuis 1942 tous les mois d'avril de la décennie 1937/46 ont été trop chauds et aussi beaucoup moins changeants que de tradition.

Le passage de la série de 50 ans à la série de 60 n'a pas amené de changements sensibles à la distribution des irrégularités de températures sur le cours de l'année. Notons cependant que son minimum absolu tombe toujours sur la mi-janvier; le maximum, qui se produisait antérieurement le 16 juillet, se place maintenant à la date, inattendue, du 26. « Rebuses » et « étés » s'y marquent sensiblement de la même façon et aux mêmes époques qu'avant sur le graphique détaillé.

XI. Maxima et Minima moyens.

Aux chapitres IV et V de nos mémoires successifs sur la température de l'air à Lausanne (*Bull. SVSN.*, N° 226 (1931)) M. André Renaud a donné, pour la période 1887-1926, les valeurs moyennes mensuelles des températures extrêmes absolues du mois. Il convenait de reprendre ces chiffres pour leur incorporer les observations postérieures. Voici donc les nouvelles valeurs sexagénaires :

Mois	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Minimum	-8,8	-7,5	-4,6	-1,0	2,5	7,1	9,0	8,6	5,3	1,0	2,8	7,0
Maximum	9,6	11,8	17,6	22,1	27,0	29,8	31,4	30,3	26,7	21,2	14,8	10,2

Quant aux deux extrêmes absolus de la période 1887-1946 entière, ils demeurent ceux que nous connaissions déjà : — 21,9° le 13 février 1929 et 37,5° le 12 juillet 1904.

XII. Nombres moyens de jours froids et très froids.

Pour terminer, voici la statistique des « jours froids » F (jours de gel avec dégel) et des jours « très froids » tF (jours sans dégel) :

Mois	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Année
F.	20	17	10	2	—	—	—	—	—	1	6	16	72
tF.	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	15

Dans mon commentaire de la période cinquantenaire (*Bull. SVSN.*, N° 245), j'avais donné un tableau classant les saisons lausannoises, quant à leur température, sous cinq rubriques : très froide, modérément froide, normale, modérément chaude et très chaude, selon que l'écart de la température de la saison considérée avec la moyenne pluriannuelle excédait ou non l'écart moyen saisonnier en valeur absolue en plus ou en moins ou enfin ne dépassait pas 0,1 à 0,2°; dans ce dernier cas la saison était regardée comme « normale ». Voici la répartition trouvée : 1887-1946 :

	Nombre de saisons				
	Très froides	Modérément froides	Normales	Modérément chaudes	Très chaudes
Hiver	13	10	11	12	14
Printemps	14	10	9	12	15
Été	12	12	7	12	17
Automne	8	17	5	14	16

Annexes :

A. Durée d'insolation.

Dès sa création l'observatoire du Champ de l'Air a été pourvu d'un héliographe Campbell-Stokes et ce sont les moyennes mensuelles d'heures de soleil marquées par cet instrument de 1887 à 1900 qu'à données le « Climat de la Suisse » de MAURER, BILLWILLER et HESS. Combinées avec celles de la période 1901-1914 ces premières observations ont fourni les normes utilisées par notre Service jusqu'à présent pour les comparaisons courantes. Pourtant, ces valeurs souffraient à la fois d'hétérogénéité et d'indigence car, d'une part l'héliographe initial était du type primitif à petite boule et, d'autre part, il était au début non sur la tour du Champ de l'Air, comme l'actuel, mais sur le toit de la maison (aujourd'hui démolie) « Clos-Lilas », à la Caroline, quartier dont les édifices étaient, cependant il y a un demi-siècle, moins hauts et moins gênants qu'aujourd'hui.

En 1909, le vieil instrument a été remplacé, au Champ de l'Air même, par le modèle à sphère de 103 mm, aujourd'hui « normal ».

La Station centrale suisse de météorologie, à Zurich, qui s'occupe depuis une dizaine d'années de mettre à profit les innombrables observations climatologiques recueillies dans notre pays depuis 1900, terme final des séries du « Climat de la Suisse », vient de calculer les moyennes de l'insolation lausannoise de 1909 à 1940, en les rapportant aussi aux durées de l'insolation possible telles qu'elles ressortent des enregistrements par jours sereins. J'ai complété la série jusqu'en 1946. Voici les normes nouvelles ainsi obtenues :

Mois	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Année
Insolation réelle	72	112	155	182	226	253	269	255	194	128	75	61	1976
Insolation possible	249	269	349	386	436	440	448	417	359	322	253	240	4168
% d'insolation	29	42	44	47	52	57	60	61	54	40	30	25	47

B. Hauteurs de précipitation.

La dernière décennie a ajouté à la série cinquantenaire des mesures de la précipitation au Champ de l'Air un ensemble cohérent de notations obtenues au même endroit et au même pluviomètre qu'auparavant. Renonçant à la réduction sur Genève, j'ai calculé les hauteurs moyennes mensuelles et annuelle de l'eau météorique pour la même période sexagénaire 1887-1946. Voici les chiffres, qui d'ores et déjà servent de normes pour la pratique du Service météorologique vaudois.

Mois	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Année
mm d'eau	62	61	76	75	88	103	101	114	103	102	84	79	1048

*Service météorologique cantonal vaudois.
Champ de l'Air, 1947.*