Zeitschrift: Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Herausgeber: Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Band: 67 (1958-1961)

Heft: 302

Artikel: Apidés de Suisse romande (HYM.)

Autor: Beaumont, Jacques de

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-275106

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 26.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Apidés de Suisse romande (HYM.)

PAR

JACQUES DE BEAUMONT Musée zoologique, Lausanne

La base de nos connaissances sur les Apidés de la Suisse est l'ouvrage de Frey-Gessner (1899-1912), excellent à l'époque où il a été publié, mais maintenant dépassé. Des corrections et des adjonctions ont déjà été apportées pour deux genres difficiles, Halictus et Colletes, par Blüthgen (1921, 1930). J'ai publié moi-même une liste des Apidés des environs de Neuchâtel (1955) et une liste de ceux qui se trouvent dans notre Parc national suisse (1958), avec des considérations générales sur la faune alpine des Hyménoptères. Quelques espèces nouvelles pour notre pays ont été signalées dans divers travaux. Cependant, la faune apidologique suisse reste mal connue et il y aurait bien du travail à faire dans ce domaine.

C'est une contribution à cette étude que j'apporte aujourd'hui en publiant une partie des documents que j'ai accumulés en une trentaine d'années de récoltes entomologiques en Suisse romande. Laissant de côté les espèces les plus connues, je ne citerai que celles qui sont moins connues et dont plusieurs n'avaient pas encore été signalées dans notre pays. Tous les insectes cités font partie des collections du Musée zoologique de Lausanne.

Abréviations utilisées dans la liste. F. G. = FREY-GESSNER; GE = canton de Genève : NE = canton de Neuchâtel : VD = canton de Vaud ; VS = canton du Valais.

Colletes LATR.

- C. floralis Ev. Espèce rare. VS: Gueroz et Grimentz, 1 of 1 Q.
- C. similis Schck. Connue du Tessin et des environs de Neuchâtel. GE: Cologny; VD: Lausanne; VS: Martigny, Sierre, Finges.
- C. gallicus Rad. Sous le nom d'elongatus Tourn., F.G. ne connaît cette espèce que des environs de Genève; elle existe aussi sur les rives du Léman, VD: Nyon, Promenthoux, St-Sulpice.

Prosopis Jun.

- P. rinki Gorski. Citée seulement des Grisons: Scuol. VD: Belmont, Bussigny, La Sauge.
- P. pfankuchi Alfk. Signalée seulement des environs de Neuchâtel. VD: Vidy près Lausanne, Boussens, La Sauge; VS: Saxon.

- P. difformis Ev. Peu répandue. VS: Euseigne, Evolène.
- P. pectoralis Först. F.G. ne signale cette espèce que de la région entre Villeneuve et Le Bouveret; des galles de Lipara, récoltées près de Villeneuve me l'ont fournie en nombre; on la capture aussi sur les Ombellifère; VD: Boussens, La Sauge.
- P. nivalis Moraw. Espèce alpine. VS: Verbier, La Fouly, Hospice du Gd St-Bernard, Grimentz.
- P. alpina Moraw. Espèce alpine, qui se trouve aussi dans le Jura. VD: St-Cergue, Pont-de-Nant; VS: Verbier, La Fouly, Mayens de Sion, Grimentz.
- P. styriaca Först. F.G. avait tout d'abord décrit cette espèce sous le nom de tristis, la citant de Genève et Sierre; je puis ajouter VD: Belmont, Boussens.

Andrena F.

- A. limata Sm. Pas citée par F.G.; 4 Q des environs de Genève appartiennent probablement à cette espèce.
- A. suerinensis Friese. Pas citée par F.G.; j'ai capturé 2 Q à Martigny et reçu 1 of d'Excenevez, sur la rive française du Léman.
- A. ruficrus Nyl. Espèce boréo-alpine au sens large, rare. VD: Pont-de-Nant, 1 Q; VS: Bramois, 1 O (P. Bovey).
- A. fulvata Stoeckh. Espèce que F. G. n'a pas pu connaître, commune en Suisse romande: GE, VD, NE, en avril-mai.
- A. symphyti Schmied. Pas signalée par F.G. VD: Vidy, près Lausanne, et St-Sulpice, butinant sur Symphytum.
- A. helvola L. F. G. N'a pas distingué cette espèce de varians K.; toutes deux existent en Suisse romande (GE, VD, NE), helvola étant la plus commune.
- A. synadelpha Perk. J'ai récolté 3 Q qui correspondent bien à la description de cette espèce, nouvelle pour la faune suisse. GE: Petite Grave; VD: St-Sulpice; juin.
- A. mitis Pér. J'ai déjà signalé des environs de Neuchâtel cette espèce que F. G. ne connaissait que d'Aarau et de Bâle; je puis ajouter les environs de Genève: Chambésy et alluvion de l'Arve.
- Groupe de minutula. Dans ce groupe, où l'on reconnaît actuellement de nombreuses espèces, F. G. ne cite, à côté de nana K, floricola F., nanula Nyl. et niveata Friese, que « parvula K. »; j'ai récolté en Suisse romande les 9 espèces suivantes, confondues par F. G.
- A. minutula K. Très commune dans les régions basses.
- A. minutuloides Perk. Très commune aussi; se rencontre également dans les montagnes.
- A. saundersella Perk. Seulement dans le Jura et les Alpes, en été.
- A. alfkenella Perk. Assez commune dans les régions basses; je ne l'ai récoltée qu'en juillet-août.

- A. strohmella Stoeckh. Assez commune dans les régions basses; avril.
- A. subopaca Nyl. Très commune dans les régions basses; aussi dans les montagnes; avril à juin.
- A. falsifica Perk. Assez commune dans les régions basses ou d'altitude moyenne; butine en avril-mai sur Potentilla.
- A. pusilla Pér. J'ai récolté 5 individus qui se rattachent probablement à cette espèce ; GE : Cologny ; VD : Belmont, Lutry ; avril et juillet.
- A. rugulosa Stoeckh. Une Q capturée à Auvernier (NE) le 2 avril 1959 correspond très bien à la description de cette espèce.
- A. potentillae Panz. VD: Moremont, en avril sur Potentilla.
- A. viridescens Vier. GE: Cologny; VD: Belmont, St-Sulpice, Bremblens.
- A. trimmerana K. Les individus cités sous ce nom par F. G. sont probablement pour la plus grande part des jacobi Perk., espèce commune en Suisse romande. Le vrai trimmerana est plus rare; j'ai récolté 4 of 1 Q dans les environs de Genève, en avril.
- A. bucephala Steph. Très rare d'après F.G. J'ai cependant récolté une trentaine d'individus; GE: Cologny, Aïre; VD: Lausanne, Belmont, Lutry, Aigle, Aubonne; avril-mai.
- A. ferox Sm. Très rare en Suisse. Martigny 2 juin, 1 Q (P. Bovey).
- A. nuptialis Pér. J'ai capturé à Martigny (Follaterres), en avril et juin-août, 25 of et 1 of qui me paraissaient se rattacher à cette espèce, non citée de Suisse.
- A. fulvicornis Schck. F.G. n'a pas distingué cette espèce de nitidiuscula Schck.; toutes deux se trouvent en Suisse romande.
- A. pallitarsis Pér. J'ai un of de Cologny (GE) et quelques Q de Sciez, sur la côte française du Léman, qui correspondent bien à la description de cette espèce, non citée de Suisse.
- A. distinguenda Schck. Douteux pour la Suisse, d'après F.G.; en avril 1946 et 1947, j'ai trouvé fréquemment l'espèce à Cologny (GE) butinant sur le Colza.

Panurginus Nyl.

P. tyrolensis Richds. J'ai signalé que cette espèce se rencontrait dans les Alpes vaudoises et valaisannes; les localités de capture sont VD: Les Pléiades, Pont-de-Nant; VS: Verbier, La Fouly.

Halictus LATR.

- H. eurygnathus Bl. et simplex Bl. Confondues par F.G. sous le nom de tetrazonius Kl., ces deux espèces sont communes en Suisse romande.
- H. major Nyl. GE: Cologny, Chambésy; VD: Gingins, Villeneuve; VS: Martigny, Finges.
- H. lativentris Schck. Cette espèce, confondue par F.G. avec qua-

- drinotatus K. (que je n'ai jamais rencontrée), est assez commune en Suisse romande.
- H. euboeensis Strd. Signalée de Sierre par Blüthgen, VD: St-Sulpice, 1 of (P. Bovey).
- H. linearis Schck. Citée des environs de Genève par Blüthgen, cette espèce est répandue, mais pas très commune, en Suisse romande.
- H. tricinctus Schck. Même remarque que pour l'espèce précédente.
- H. marginellus Schck. Citée de GE: Bois des Frères, par Blüthgen; j'ai une ♀ de même provenance; de plus: GE: Peney, 1♀; VD: Bremblens, 1♀.
- H. glabriusculus Moraw. Pas connue avec certitude de Suisse, d'après Blüthgen; je rattache à cette espèce 3 Q de GE: Peney, Bois des Frères, Rouelbeau.
- H. griscolus Moraw. Citée des environs de Genève par Blüthgen ; VD : St-Sulpice, 1 Q
- H. semilucens Alfk. Blüthgen la cite de Haute-Savoie et de Locarno; j'ai 4 Q, déterminées par Blüthgen; VD: Belmont; NE: Auvernier; VS: Martigny.
- H. intermedius Schck. Citée de Suisse, sans précision ; 2 Q déterminées par Blüthgen ; GE : Peney ; VD : Belmont.
- H. tarsatus Schck. Blüthgen la cite de Sierre; il a déterminé une Q que j'ai capturée à Veyrier, près Genève.
- H. sexstrigatus Schck. Signalée par Blüthgen de Veyrier et Locarno; j'ai 2 ♂ 1 ♀ de Martigny (Blüthgen det.).
- H. angusticeps Perk. Pas citée de Suisse; j'ai récolté quelques individus, en partie déterminés par Blüthgen; GE: Bernex, Bois des Frères; VD: Romanel; VS: Mayens de Sion.
- H. minutulus Schek. Je l'ai signalée des environs de Neuchâtel; VS: Saxon, Grimentz 2 o 1 Q.
- H. rufitarsis ZETT. J'ai récolté assez fréquemment cette espèce dans les cantons de VD et de VS.
- H. perkinsi Bl. Je connais cette espèce de l'alluvion de l'Arve, près Genève et du VS: Martigny, Susten.
- H. lissonotus Nosk. J'ai signalé cette espèce des environs de Neuchâtel; je la connais aussi de Martigny.

Sphecodes LATR.

- S. spinulosus Hag. Rare. GE: Petite Grave, 1 Q; VS: Martigny, 1 J.
- S. scabricollis Wsm. Rare. GE: Cologny, 1 💍; VD: St-Sulpice, 1 Q.
- S. cristatus Hag. Pas citée de Suisse. VS: Sierre, 2 of 1 Q.
- S. alternatus Sm. Pas citée de Suisse. VS: Sierre, 1 Q (JACOB).
- S. niger Sich. GE: Peney, Cologny, Allondon; VD: Belmont, Lutry, Ecublens; VS: Euseigne.
- S. croaticus Mey. Je l'ai citée des environs de Neuchâtel. GE: Peney; VD: Buchillon; 1 7 1 Q (Blüthgen det.).

S. pseudofasciatus Bl. Déjà citée des environs de Neuchâtel; j'ai aussi quelques individus, en partie déterminés par Blüthgen, de GE: Cologny, Bois des Frères; VD: Ecublens, Lutry.

Rhophites Spin.

R. trispinosus Pér. Une partie, tout au moins, des spécimens signalés par F.G. sous le nom de quinquespinosus Spin., appartiennent à trispinosus que je connais de Buchillon (VD) et des environs de Sierre (VS).

Melitta K.

M. nigricans Alfk. Espèce inconnue de F.G., que j'ai signalée des environs de Neuchâtel. VD: St-Sulpice; VS: Sierre.

Macropis KL.

M. fulvipes F. Pas citée de Suisse jusqu'à présent. VD: Belmont, Jorat, Villeneuve; 3 on, en juillet.

Stelis PANZ.

S. minima Schck. J'ai capturé à Euseigne (VS) 4 Q de cette espèce que F.G. ne distinguait pas de minuta Lep.

Chelostoma LATR.

Ch. emarginata Nyl. Rare. Aubonne (VD) 22 avril, 1 .

Osmia PANZ.

- O. pilicornis Sm. F.G. ne cite cette espèce que du Jura, au-dessus de La Neuveville; elle est commune aux environs de Lausanne en avril et mai, butinant de préférence sur *Pulmonaria*.
- O. acuticornis Duf. et Perr. A la Q unique, citée de Genève par F. G., je puis ajouter 1 of de Martigny, 13 mai.
- O. papaveris LATR. Très rare en Suisse. En mai et juin 1936, j'ai observé une assez grande colonie près de St-Sulpice (VD); malheureusement, la région a été modifiée par des constructions et l'espèce a disparu.
- O. tergestensis Ducke. Les individus cités du Simplon par F.G. sont des parietina Curt. (Mus. Genève); je n'ai pas vu le spécimen de Chandolin; j'ai récolté 3 of et 3 Q dans les Alpes valaisannes: Grimentz et Zeneggen.
- O. anceyi Pér. Au Musée de Lausanne se trouvent 2 Q capturées par Jacob, à Sierre, le 13 juillet 1896, dont l'une porte une étiquette de la main de F.G.: «Osmia anceyi Pérez Q, rare à Sierre en juin et juillet »; ces spécimens correspondent bien à la description, ayant le clypéus largement échancré et la brosse fauve. F.G. ne signale pas cette espèce, mais la forme voisine bidentata Mor.

O. loti Moraw. et ravouri Pér. L'espèce que F.G. nomme morawitzi est = loti, celle qu'il appelle loti est = ravouri; la première se trouve dans les Alpes et le Jura, la 2^e surtout dans les régions basses du pays.

Megachile LATR.

- M. versicolor Sm. Je l'ai déjà citée des environs de Neuchâtel. VD : Eclépens, Jorat, La Sauge ; VS : Martigny.
- M. alpicola Alfk. Il est probable que les individus des Alpes, cités par F.G. sous le nom de lapponica Thoms. sont des alpicola; lapponica n'est pas connue de Suisse avec certitude.
- M. ligniseca K. Rare. VD: Belmont, Bussigny; VS: Martigny 2012.
- M. nigriventris Schck. Espèce alpine, mais que l'on rencontre aussi dans les régions basses; VD: Lausanne, Jorat.
- M. pilidens Alfk. Cette espèce, que n'a pas connue F. G., se trouve à côté d'argentata F. dans les cantons de GE, VD et VS.

Coelioxys LATR.

- C. lanceolata Nyl. Rare. VD: Lausanne; VS: Grimentz; 3 Q.
- C. elongata Lep., inermis K. et mandibularis Nyl. Une certaine confusion règne au sujet de ces espèces. M. Erlandsson, qui a publié un travail sur le genre, a bien voulu revoir mes spécimens, et je puis ainsi citer:

elongata. Env. de Neuchâtel : La Neuveville 2 \circlearrowleft 1 \circlearrowleft ; VD : Lausanne 1 \circlearrowleft

inermis. La Neuveville : 7 of 2 \(\text{?} \) ; VD : Lausanne, Rolle ; VS : Grimentz.

mandibularis. VD: Lutry, 1 or; VS: Grimentz, 5 Q.

Nomada Scop.

- N. lepeletieri Pér. Je l'ai citée des environs de Neuchâtel. GE: Cologny, Chambésy; VD: Lausanne, Lonay, Bremblens, Aclens, Moremont.
- N. marshamella K. Rare. VD: Belmont, St-Sulpice, Lutry.
- N. melathoracica Imm. Rare. GE: Peney; VD: Ecublens, Buchillon; VS: Châteauneuf (P. Bovey).
- N. errans LEP. Rare. GE: Cologny, 8 3 5 Q.
- N. villosa THMS. Rare. VD: Belmont, 3 Q.
- N. braunsiana Schmdk. Rare. VS: Grimentz, 1 🦪 1 Q.
- N. guttulata Schck. Rare. VD: Belmont, Bremblens, 3 🦪.
- N. obscura Zett. Parmi les spécimens que signale F.G., seuls ceux de Berne sont d'authentiques obscura; j'ai capturé 2 Q dans les Alpes vaudoises: Pont-de-Nant.
- N. hirtipes Pér. Pas citée de Suisse. GE: Cologny; VD: Belmont, Bremblens, Lutry, 9 7 7 Q, avril-mai.

- N. opaca Alfk. Pas citée de Suisse. VD: St-Sulpice, 1 Q, mai.
- N. moeschleri Alfk. Pas citée de Suisse. J'ai capturé en juin dans les Alpes vaudoises : Pont-de-Nant, une Q qui se rattache probablement à cette espèce.
- N. conjungens H.S. Rare. VD: Belmont, Lutry; VS: Grimentz; mai-juin.
- N. xanthosticta K. Rare. VD: Bussigny; VS: Bramois (P. Bovey), 3 Q, mars-avril.
- N. sheppardana K. Espèce confondue par F. G. avec furva Panz. GE: Genthod, Bernex, Bois des Frères, 1 3 4 Q.
- N. kohli Schmdk. Pas signalée de Suisse. VS: Martigny, 1 Q, juin.
- N. atroscutellaris STRD. Pas signalée de Suisse. GE: Cologny, 5 Q, avril-mai.
- N. armata H. S. Rare. GE: Versoix, La Plaine; VS: Sion, Verbier, 1 3 Q.
- N. mutabilis Moraw. Rare. VS: Martigny, 1 7 1 Q.
- N. cinnabarina Moraw. Rare. VD: Belmont, St-Sulpice, 1 of 2 Q.

Biastes PANZ.

- F.G. ne connaissait, pour la faune de notre pays, aucun représentant de ce genre. Friese (1926) signale *B. brevicornis* Panz., de Sierre; comme pour d'autres citations de cet auteur, on peut avoir un certain doute.
- B. emarginatus Schck. Espèce découverte en 1958 par le Dr Enslin aux environs de Sierre, en compagnie de Rhophites trispinosus Pér.; je l'ai retrouvée l'année suivante.

Epeolus LATR.

- E. cruciger Panz. Une partie des spécimens cités par F.G. sous le nom de variegatus L. sont sans doute des cruciger, espèce que je connais de Peney (GE) et de Sierre.
- E. glacialis Alerk. C'est à cette espèce qu'appartiennent les individus alpins cités par F. G. sous le nom de variegatus.

Epeoloides GIR.

E. coecutiens F. J. F. Aubert (1954) a cité cette espèce de La Sauge (VD); je l'ai retrouvée au même endroit.

Tetralonia Spin.

T. malvae Rossi. F. G. ne connaissait cette espèce que des environs de Locarno. Je l'ai capturée, butinant sur Malva, à Bussigny (VD) et à Sciez, sur la côte française du Léman.

Bombus LATR.

B. distinguendus Moraw. Inconnue de F.G., cette espèce est rare dans notre pays; en 30 ans de récolte, j'ai capturé 1 7, 1 ç et une ouvrière; VD: St-Sulpice, St-Cergue; NE: Auvernier.

- B. confusus Schck. J'ai assez souvent récolté des Q au printemps, aux environs de Lausanne; par contre, toutes les ouvrières et tous les of que je possède proviennent du Salève, près de Genève, et du Valais; existerait-il une migration printanière des Q? Je n'ai trouvé que 2 exemplaires de la forme tricolore.
- B. equestris F. F. G. n'a pas reconnu cette espèce, qui est assez commune en Suisse romande.
- B. muscorum L. Cette espèce n'a pas non plus été reconnue par F. G. J'en possède un certain nombre d'exemplaires de VD: Buchillon, St-Sulpice, Cheseaux et de Sion.

Psithyrus LEP.

P. bohemicus Seidl. F. G. n'a pas distingué cette espèce de vestalis Fource. toutes deux sont communes en Suisse romande.

TRAVAUX CITÉS.

- Aubert J. F. 1954. Découverte d'une nouvelle colonie d'Epeoloides coecutiens F. (Hym. Apidae). Bull. Soc. ent. France *59*, p. 76-78.
- DE BEAUMONT J. 1955. Hyménoptères des environs de Neuchâtel. Deuxième partie. Bull. Soc. Neuchât. Sc. nat. 78, p. 17-30.
- 1958. Les Hyménoptères aculéates du Parc national suisse et des régions limitrophes. Résult. rech. scient. Parc nat. suisse 6 (N. F.) 7, 145-236.

 Blüthgen P. 1921. — Die schweizerischen Halictus-Arten der Frey-Gessner'schen Sammlung (Hym. Apidae). Mitt. schweiz. ent.
- Ges. 13, p. 122-143.
 - 1930. Revision der schweizerischen Colletes-Arten (Hym. Apidae). Ibid. 14, p. 193-198.
- FREY-GESSNER E. 1899-1912. Hymenoptera. Apidae. Fauna insectorum Helvetiae, 2 vol., Schaffhausen.
 FRIESE H. 1926. Die Bienen, Wespen, Grab- und Goldwespen. Die
- Insekten Mitteleuropas insbesondere Deutschlands, Bd. 1, Stuttgart, 192 pp.

enaŭvro i filirej en lua i la li

Manuscrit reçu le 15 mars 1950.