

<b>Zeitschrift:</b>	Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles
<b>Herausgeber:</b>	Société Vaudoise des Sciences Naturelles
<b>Band:</b>	76 (1982-1983)
<b>Heft:</b>	364
<b>Artikel:</b>	Diplopodes et Chilipodes d'une pelouse alpine au Parc national suisse
<b>Autor:</b>	Dethier, Michel / Pedroli-Christen, Ariane
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-278161">https://doi.org/10.5169/seals-278161</a>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 11.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Diplopodes et Chilopodes d'une pelouse alpine au Parc national suisse

PAR

MICHEL DETHIER<sup>1,2</sup> ET ARIANE PEDROLI-CHRISTEN<sup>3</sup>

**Résumé.** – De 1977 à 1980, dans plusieurs pelouses alpines situées sur les flancs du Munt La Schera (Parc national suisse, Grisons), nous avons recueilli 12 espèces de Diplopodes. Leur microdistribution, en particulier de celles vivant dans le *Caricetum firmae* du sommet, a été précisée. A l'exception de la sous-association *caricetosum mucronatae*, remarquablement riche en Diplopodes, les autres milieux étudiés se sont révélés pauvres, tant en espèces qu'en individus.

**Zusammenfassung.** – Zwischen 1977–1980 wurde am Munt La Schera (Schweizerischer Nationalpark, 2540 m ü.M.) die Diplopodenfauna verschiedener alpiner Rasengesellschaften insbesondere des *Caricetum firmae* der Gipfelregion qualitativ und quantitativ untersucht. Zwölf Arten wurden gefunden. Alle untersuchten Pflanzengesellschaften beziehungsweise Fazies sind arten- und individuenarm, mit Ausnahme der Unter-Assoziation *Caricerum firmae caricetosum mucronatae*, die außergewöhnlich reichhaltig ist.

### INTRODUCTION

La présente note s'insère dans le cadre d'une étude multidisciplinaire d'une pelouse alpine du Parc national suisse (Grisons) soutenue par le Fonds national suisse de la Recherche scientifique (requête N° 3.628-0.75) et dirigée par le professeur W. MATTHEY (Neuchâtel). De 1977 à 1980, nous avons étudié un *Caricetum firmae* (KERNER) BR.-BL. ou «*Firmetum*» situé sur le plateau sommital du Munt La Schera (2540 m).

Les Myriapodes ont fait l'objet de plusieurs travaux faunistiques en zone alpine. BIGLER (1928), en particulier, a étudié les Diplopodes du Parc national suisse. Cependant, des études écologiques telles que celle-ci, basées sur une longue série de prélèvements, demeurent assez rares; citons les travaux, en Autriche, de THALER *et al.* (1978) et de MEYER (1979, 1980).

<sup>1</sup>Muséum d'Histoire naturelle, CH-1211 Genève 6 et Service d'Hydrobiologie, CH-1211 Genève 4.

<sup>2</sup>Ce travail fait partie d'une thèse de doctorat.

<sup>3</sup>Institut de Zoologie, Université de Neuchâtel, CH-2000 Neuchâtel.

## DESCRIPTION DES MILIEUX ÉTUDIÉS

Le microclimat, la structure du sol et de la végétation du plateau sommital de La Schera ont déjà fait l'objet de plusieurs travaux détaillés: DETHIER *et al.* (1979), MATTHEY *et al.* (1981) et surtout GALLAND (1979, 1982). Nous nous limiterons à rappeler ici que le *Firmetum* a été divisé en deux sous-associations (GALLAND, 1979): - *mucronatae* (Muc), sur une pente orientée SE et à 2400 m d'altitude (sol très filtrant et microclimat très sec); - *typicum* sur le plateau sommital, à un peu plus de 2500 m d'altitude.

Cette dernière a été à son tour subdivisée en faciès (GALLAND, 1982) dont les principaux sont le faciès à *Dryas octopetala* (Doc<sub>1</sub>), le faciès à *Carex firma* (Cfa), le faciès typique (Typ) et le faciès à *Sesleria coerulea* (Sco). Grossièrement, l'épaisseur du sol et la complexité de la végétation augmentent




Fig. 1. Coupe schématique N-S du sommet du Munt La Schera et emplacement des terrains d'étude.

N = <i>Nardetum</i>	Co = combes à neige
C = <i>Curvuletum</i>	Ely = groupements
S = <i>Seslerietum</i>	à <i>Elyna myosuroides</i>
Muc = <i>mucronatae</i>	F = <i>Firmetum typicum</i>

de Cfa à Sco, Doc<sub>1</sub> constituant un milieu quelque peu particulier (LIENHARD *et al.*, 1981; COTTY et DETHIER, 1981; DETHIER *et al.*, 1983).

En mosaïque avec les faciès du *Firmetum*, on trouve deux autres formations végétales au sommet de La Schera: groupements à *Elyna myosuroides* (Ely) et combes à neige, grandes et petites (Cog, Cop). Ce sont des pelouses plus neutrophiles se développant sur sol plus épais (GALLAND, 1982). Nous en avons tenu compte dans l'étude des Arthropodes de la strate herbacée.

Dès 1979, nous avons également effectué des récoltes systématiques dans trois autres pelouses situées à plus basse altitude sur le Munt La Schera: il s'agit d'un *Seslerio-Caricetum sempervirentis* (2350 m, S), d'un *Caricetum curvulae* ou «*Curvuletum*» (2300 m, C) et d'un *Nardetum alpigenum* (2100 m, N) (CAMPELL et TREPP, 1968; DETHIER, 1980; GALLAND, 1982). Seuls les Diplopodes récoltés dans ces trois dernières stations ont été étudiés jusqu'à l'espèce. La figure 1 représente une coupe schématique du sommet de La Schera et situe nos terrains d'étude.

### TECHNIQUES DE RÉCOLTES

Leur description a déjà été donnée ailleurs (MATTHEY *et al.*, 1981). Les Myriapodes ont été capturés pour l'essentiel (95%) dans des pièges-trappes (ou Barbers). Chaque piège consistait en un gobelet de plastique (diamètre 6,5 cm, profondeur 8,5 cm) contenant une solution d'acide picrique et protégé par un petit toit d'aluminium. De 1977 à 1979, nous avons disposé 10 pièges par milieu étudié et nous les avons relevés toutes les semaines en moyenne pendant la période de végétation (de fin juin à fin septembre environ). Les 5% restants proviennent de pièges appâtés avec de la viande ou du crottin de Cerf.

Il est intéressant de relever que les centaines de prélèvements de sol (carottes de 5 cm de diamètre) effectués dans les divers faciès du *Firmetum typicum* pour l'étude des Microarthropodes édaphiques (BIERI *et al.*, 1978 a et b, LIENHARD, 1980) n'ont mis aucun Myriapode en évidence.

### RÉSULTATS

Parmi les Myriapodes, seuls les Diplopodes (12 espèces, 226 individus) et les Chilopodes (1 espèce, 153 individus) ont été trouvés dans nos stations. Par rapport à l'ensemble des Macroarthropodes recueillis dans les pièges-trappes (environ 12 000 en trois ans), ils ne représentent qu'un faible pourcentage de la faune étudiée (de 1 à 4% selon les milieux). Le *mucronatae* fait cependant exception puisque les Diplopodes à eux seuls constituent environ 30% des Macroarthropodes de cette station.

Le tableau 1 donne la liste des Diplopodes récoltés et leur répartition entre les associations et sous-associations étudiées tandis que la figure 2 expose la microdistribution des espèces rencontrées dans les divers faciès et milieux du sommet. On constate d'emblée que le *mucronatae* est de loin la station la plus riche, tant du point de vue qualitatif que quantitatif; *Glomeris helvetica* y domine largement. Relevons en outre que, sur les 6 espèces recensées, 5 n'ont été trouvées qu'ici. A l'opposé, le *Curvuletum* s'est révélé extrêmement pauvre en Diplopodes: nous n'y avons trouvé qu'un représentant, malheureusement indéterminable, de *Leptoiulus sp.*

*Orotrechosoma alticolum dormeyeri* n'a été capturée que sur le plateau sommital, où elle domine surtout dans les différents faciès du *Firmetum typicum* (elle est particulièrement abondante en Sco). Dans les combes et les groupements à *Elyna myosuroides*, *Ophiulus nigrofucus*, déjà présent dans le faciès à *Sesleria coerulea*, devient plus abondant. *Leptoiulus riparius* est présent partout (sauf en Cfa) en petites quantités sauf en Ely où il devient prépondérant. *Leptoiulus alemannicus* n'a été trouvé qu'en très petit nombre dans les combes.

La seule espèce de Chilopodes recensée au sommet de La Schera est *Li-thobius lucifugus* KOCH. La figure 3 illustre sa microdistribution sur le plateau sommital. Elle est assez semblable à celle de l'ensemble des Diplopodes (fig. 2), surtout dans les faciès du *Firmetum typicum*. Il est quasiment absent dans la grande combe (Cog) et dans le *mucronatae* (Muc), son abon-

Tableau 1 : Répartition des Diplopodes  
entre les principaux milieux étudiés

Spèces	N	C	S	Muc	F	Co + Ely
<i>Cylindroiulus tirolensis</i> VERH.	●					
<i>Leptoiulus simplex glacialis</i> VERH.	X					
<i>Leptoiulus alemannicus</i> VERH.	X		X			X
<i>Ophiulus nigrofucus</i> VERH.	X		○		X	○
<i>Triacontazona caroli</i> ROTH.			X			
<i>Glomeris helvetica</i> VERH.				●		
<i>Glomeris transalpina</i> KOCH				●		
<i>Atractosoma cf. meridionale</i> FANZAGO				X		
<i>Trimerophoron grypischium</i> ROTH.				○		
<i>Prionosoma canestrinii</i> (FEDRIZZI)				●		
<i>Leptoiulus riparius riparius</i> VERH.				●	○	●
<i>Orotrechosoma alticolum dormeyeri</i> VERH.				●		●
<i>Leptoiulus</i> sp.		X			X	X
Nombre d'espèces	4	1	3	6	3	4

Explications du tableau 1

N = *Nardetum*

C = *Curvuletum*

S = *Seslerietum*

Muc = *mucronatae*

F = *Firmetum typicum*


Co + Ely = combes et groupements à *Elyna myosuroides*

X = rare (1 à 3 individus par station)

○ = présent (moins de 12 individus par station)

● = abondant (plus d'une douzaine d'individus par station)

## Diplopodes

	Divers
	<i>P. canestrinii</i>
	<i>L. riparius</i>
	<i>G. transalpina</i>
	<i>G. helvetica</i>
	<i>O. nigrofuscus</i>
	<i>O. alticolum dormeyeri</i>




Fig. 2. Répartition des principales espèces de Diplopodes entre les milieux étudiés au sommet de La Schera (en pour-cent du total des captures dans ce groupe, moyenne pondérée de 1977 à 1980 pour 10 pièges-trappes par milieu; N = 226).

dance n'a rien de très remarquable, contrairement à ce que l'on peut observer chez les Diplopodes.

## DISCUSSION

Les 12 espèces de Diplopodes signalées dans le présent travail avaient toutes été déjà signalées par BIGLER (1928) dans son étude approfondie des Diplopodes du Parc national et des régions limitrophes. Relevons que cet auteur a capturé, sur le versant sud de La Schera et un peu en dessous du sommet, une femelle de *Polydesmus monticolus genuinus* ATTEMS et VERHOEFF.




Fig. 3. Répartition de *Lithobius lucifugus* entre les milieux étudiés au sommet de La Schera (mêmes conventions que pour la fig. 2; N = 153).

Dans des stations subalpines des environs de Badgastein et situées à environ 1850 m d'altitude, THALER *et al.* (1978) ont recensé 10 espèces de Diplopodes dont une seule, *Triacontazona caroli*, figure dans nos relevés (*Seslerietum*, v. tableau 1). Dans les milieux étudiés par les chercheurs autrichiens, cette espèce était la plus abondante, alors que nous n'en avons nous-mêmes récolté que quelques individus. Globalement néanmoins, les observations de THALER et de ses collaborateurs recoupent assez bien les nôtres, et cela malgré la différence d'altitude: les Diplopodes sont peu variés et surtout ne représentent le plus souvent qu'un faible pourcentage des Arthropodes des milieux alpins et subalpins.

Relevons toutefois le cas du *mucronatae* qui renferme à la fois un nombre élevé d'individus et d'espèces dont plusieurs sont d'origine essentiellement méridionale. Selon ATTEMS (1948-49), *Prionosoma canestrinii*, *Glomeris transalpina*, *Trimerophoron grypischium* et *Leptoiulus riparius riparius* sont des espèces endémiques des Alpes calcaires méridionales occidentales mais qui se rencontrent sporadiquement dans les milieux xéothermiques des Alpes septentrionales et centrales où elles ont été qualifiées de «Wärmerelikte». Rappelons que le caractère particulier, méridional, de la faune du *mucronatae* a déjà été mis en évidence pour d'autres groupes d'Arthropodes: Coléoptères (DETHIER, 1981), Orthoptères (DETHIER, 1982) et Araignées (DETHIER, 1983). GALLAND (1982) a également noté cette caractéristique du *mucronatae* pour la flore.

## REMERCIEMENTS

Outre le Fonds national suisse pour la Recherche scientifique et le professeur W. MATTHEY, nous tenons à remercier le Dr M. WÜRMLI (Tutzing) qui a déterminé nos Chilopodes et M.G. ROTH qui a exécuté les figures illustrant cet article.

## BIBLIOGRAPHIE

- ATTEMS, C. 1948-49. – Die Myriapodenfauna der Ostalpen. *Sitz der Österr. Akad. d. Wiss.*, 157-158.
- BIERI, M., DELUCCHI, V. & LIENHARD, C. 1978a. – Ein abgeänderter Macfadyen-Apparat für die dynamische Extraktion von Bodenarthropoden. *Bull. Soc. Entomol. Suisse* 51, 119-132.
- , —, —, 1978b. – Beschreibung von zwei Sonden zur standardisierten Entnahme von Bodenproben für Untersuchungen an Mikroarthropoden. *Bull. Soc. Entomol. Suisse* 51, 327-330.
- BIGLER, W. 1928. – Die Diplopodenfauna der SNP. *Ergeb. wiss. Unters. Schweiz. Nationalpark* 5, I-VII et 1-87.
- CAMPELL, E. & TREPP, W. 1968. – Vegetationkarte des schweizerischen Nationalparks und Beschreibung der Pflanzengesellschaften. *Ergeb. wiss. Unters. Schweiz. Nationalpark XI* (58) 19-42 et 1 carte.
- COTTY, A. & DETHIER, M. 1981. – Les Lépidoptères d'une pelouse alpine au Parc national suisse. *Nota Lepid.* 4, 129-150.
- DETHIER, M. 1980. – Les Hémiptères des pelouses alpines au Parc national suisse. *Revue suisse Zool.* 87, 975-990.
- 1981. – Note préliminaire sur les Coléoptères d'une pelouse alpine. *Mitt. dtsch. Ges. allg. angew. Ent.* 3, 56-59.
- 1982. – Les Orthoptères des pelouses alpines du Munt La Schera (Parc national suisse, GR). *Bull. Murithienne* 99, 9-19.
- 1983. – Araignées et Opiliens d'une pelouse alpine au Parc national suisse. *Ber. nat.-med. Ver. Innsbruck* 70, 67-91.
- , GALLAND, P., LIENHARD, C., MATTHEY, W., ROHRER, N. & SCHIESS, Th. 1979. – Note préliminaire sur l'étude de la pédofaune dans une pelouse alpine au Parc national suisse. *Bull. Soc. Suisse Pédol.* 3, 27-37.
- , HAENNI, J.P. & MATTHEY, W. 1983. – Recherches sur les Diptères du *Caricetum firmae* au Parc national suisse. *Bull. Soc. Neuch. Sci. Nat.* 106, 29-54.
- GALLAND, P. 1979. – Note sur le *Caricetum firmae* du Parc national suisse. *Documents phytosociol. N.S.* 4, 279-287.
- 1982. – Etude de la végétation des pelouses alpines au Parc national suisse. *Thèse Univ. Neuchâtel*, XI + 177 pp.
- LIENHARD, C. 1980. – Zur Kenntnis der Collembolen eines alpinen *Caricetum firmae* im Schweizerischen Nationalpark. *Pedobiologia* 20/6, 369-386.
- , DETHIER, M. & SCHIESS, Th. 1981. – Collemboles et Acariens épigés d'une pelouse alpine. *Rev. Ecol. Biol. Sol.* 18/4, 579-601.
- MATTHEY, W., DETHIER, M., GALLAND, P., LIENHARD, C., ROHRER, N. & SCHIESS, Th. 1981. – Etude écologique et biocénotique d'une pelouse alpine au Parc national suisse. *Bull. Ecol.* 12/4, 339-354.
- MEYER, E. 1979. – Life-cycle and Ecology of High Alpine Nematophora. *Myriapod Biology*, Acad. Press, London: 295-306.
- 1980. – Ökologische Untersuchungen an Wirbellosen des zentralalpinen Hochgebirges (Obergurgl, Tirol) IV. Aktivitätsdichte, Abundanz und Biomasse der Makrofauna. *Veröff. Univ. Innsbruck* 125. *Alpin-Biologische Studien XIII*, 53 pp.
- THALER, K., DE ZORDO, I., MEYER, E., SCHATZ, H. & TROGER, H. 1978. – Arthropoden auf Almflächen in Raum von Badgastein (Zentralalpen, Salzburg). *Österr. Ma B-Hochgebirgsprogramm Hohe Tauern*. 2, 195-233.

*Manuscrit reçu le 14 juillet 1983.*