Zeitschrift: Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Herausgeber: Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Band: 77 (1984-1985)

Heft: 365

Artikel: Présence d'Eucricetodon (Rodentia) dans la Molasse marine du

synclinal de Tavannes (Jura bernois)

Autor: Beaumont, Gérard de / Chambrier, Alain de / Weidmann, Marc

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-278503

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

BULLETIN Nº 273 des Laboratoires de Géologie, Minéralogie, Géophysique et du Musée géologique de l'Université de Lausanne

Présence d'*Eucricetodon (Rodentia)* dans la Molasse marine du synclinal de Tavannes (Jura bernois)¹

PAR

GÉRARD DE BEAUMONT², ALAIN DE CHAMBRIER² ET MARC WEIDMANN³

Abstract.—The base of the Upper Marine Molasse at Tavannes is dated as NM 3 (Burdigalian) by two molars of *Eucricetodon* cf. *infralactorensis*. The rich fauna of selacian teeth (found in the shelly sandstones) is illustrated.

Introduction

La Molasse marine supérieure (OMM) du Jura septentrional est jusqu'ici fort mal datée et, si on l'attribue classiquement au «Burdigalien» et, pro parte, à l'«Helvétien», c'est uniquement en se basant sur des comparaisons de faciès et sur quelques fossiles marins peu caractéristiques.

Antenen (1973) donne un excellent résumé des connaissances actuelles sur la Molasse des environs de Bienne et sur celle des synclinaux de Péry et de Tavannes: voir son tableau p. 79 notamment.

Dans le synclinal de Tavannes, qui nous intéresse ici, l'OMM mesure environ 115 m d'épaisseur et sa partie inférieure est caractérisée par trois niveaux de grès coquillers:

¹Travail subventionné par le F.N.R.S., requête 2415-0.82 (M.W.)

² Museum d'Histoire naturelle, Malagnou, 1211 Genève

³ Musée géologique, Palais de Rumine, 1005 Lausanne

ОММ	Oberer Muschelsandstein	grès coquiller fin avec niveaux marneux et sableux gris
(«Burdig.»)	Obere Graue Molasse	sables fins gris et marnes brunes
	Mittlerer Muschelsdst.	grès coquiller grossier, glauconieux
	Untere Graue Molasse	marnes silteuses et sables
	Unterer Muschelsdst.	grès coquiller grossier conglomératique
USM («Aquit.»)	Calcaires de Delémont	calcaires d'eau douce et marnes

Cette succession est partiellement visible le long de la route menant de Tavannes vers Bellelay, entre les pts 787 et 803 (nouveau R.P.N.), coord. 581'17/231'22. ROTHPLETZ (1933, p. 87) en donne un croquis précis qui permet de repérer exactement l'affleurement du *Mittlerer Muschelsandstein* (n° 3) qui nous a livré des dents de Rongeurs.

C'est l'un de nous (A. de C.) qui, en cherchant des dents de Requins, a repéré une première molaire de Rongeur. Cette découverte importante motiva une recherche plus approfondie et le prélèvement d'environ 60 kg de grès qui furent lavés et ensuite triés sous la loupe. La chance nous a permis d'y trouver une deuxième molaire et quelques autres fragments de Rongeurs (incisives), en plus d'une abondante faune de Poissons.

Les deux autres niveaux de grès coquiller, ainsi que les marnes brunes de la Untere Graue Molasse, n'ont livré que les habituels fragments de Mollusques et de Bryozoaires, plus quelques dents et os roulés de Poissons.

DESCRIPTION DE L'AFFLEUREMENT

Ce sont des grès grossiers, très glauconieux, à stratification oblique plane peu nette, visibles sur environ 9 m d'épaisseur. L'affleurement est divisé en plusieurs parties par des niveaux de 5-10 cm de grès un peu plus grossier, moins bien cimenté et formant une vire, particulièrement riche en glauconie, en galets mous silteux et en dents de Requins. Le niveau supérieur est intensément exploité par les amateurs de dents de Requins; ils y ont creusé une large plate-forme au sommet de l'affleurement et c'est de ce point que proviennent nos Rongeurs.

Ce niveau supérieur glauconieux contient en outre de rares petits galets alpins et jurassiens (diamètre 1-2 cm) et de nombreux fragments de coquilles d'Huîtres et de Pectinidés. Les moules internes de Lamellibranches sont peu fréquents. Les autres fossiles sont: rares fragments de bois, Bryozoaires abondants, Serpules rares, fragments de Crustacés et d'Oursins (scutelles), rares Foraminifères (*Elphidium* sp.), Poissons abondants, Mammifères rarissimes.

Tous les fossiles sont plus ou moins roulés et usés et on y observe les divers stades de glauconitisation récemment décrits par Odin & Matter


(1981). Quelques gros os et les galets calcaires sont parfois perforés. Divers fragments sont nettement remaniés: Crinoïdes et Mollusques (Jurassique?), Gastéropodes phosphatés et Orbitolines (Aptien, voir Rollier 1912, p. 16), quartz bipyramidés à inclusions (Purbeckien, Trias sup.?).

VERTÉBRÉS

La liste des poissons déterminés par H. Cappetta et J. Jost s'établit de la manière suivante (coll. P. Gassmann, Chez le Bart, et Musée géologique, Lausanne):

Notorhyncus primigenius
Odontaspis cuspidata
Odontaspis acutissima
Isurus sp. ou jeune Parotodus benedeni
Alopias aff. superciliosus
Squatina sp.
Galeocerdo aduncus
Hemipristis serra
Carcharhinus aff. priscus
Lamna cattica
Scyliorhinus sp.

Galeorhinus cf. latus
Scapanorhyncus lineatus
Isistius triangulus
Scoliodon sp.?
Centrophorus sp.
Dasyatis sp. (probablement
D. rugosa et D. cavernosa)
Sparus sp.
Diplodus sp.
Aetobatis arcuatus
Rhinoptera sp.






Figure 1. – Eucricetodon cf. infralactorensis (Viret, 1930), (MN 3) Mittlerer Muschelsandstein, OMM, «Burdigalien». Synclinal de Tavannes, coord. 581'17/231'22. × 15.

 $a = M_2 \sin$; 2.28 × 1.92 mm; dent peu usée; Muséum Hist. nat. Genève.

 $b = M_2 \sin$; 2.20 × 1.82 mm; dent assez usée; Mus. géol. Lausanne, n^o 42153.

Dessins de B. ENGESSER, Bâle.

Cet assemblage correspond à un âge burdigalien inférieur ou moyen.

Les mammifères sont représentés par deux fragments de dents de Dauphins et par les deux molaires de Rongeurs (fig. 1), qui ont été déterminées comme *Eucricetodon* cf. *infralactorensis*. En effet, leurs dimensions étant plus grandes que celles des pièces de la population-type d'Estrepouy (fig. 2), il subsiste pour le moment un doute quant à leur attribution spécifique. Ces dents permettent cependant de dater le Mittlerer Muschelsandstein avec certitude du niveau MN 3, et très probablement de sa partie supérieure.

Conclusion

La présence de Mammifères marins dans l'OMM est courante: le seul qui fut trouvé jusqu'ici dans le Jura septentrional est un Sirénien provenant de Saicourt (Stehlin 1914, p. 189). Si les Mammifères terrestres sont plus rares, ils ne sont pourtant pas exceptionnels, du moins dans l'OMM du Plateau suisse. Mais on n'y a identifié que d'assez grandes formes (Rhinocéros, Suidés, Cervidés, Castors, etc.) qui ne fournissent pas toujours des indications biostratigraphiques précises. Leur présence dans des dépôts




Figure 2. – Diagramme longueur/largeur des M₂ d'*Eucricetodon infralactorensis* d'Estrepouy (matériel du Musée de Bâle) et de *E.* cf. *infralactorensis* de Tavannes. Diagramme de B. ENGESSER, Bâle.




PLANCHE I

Dents de Sélaciens

Tavannes; Molasse marine supérieure, Burdigalien (MN 3).

- 1 Notorhynchus primigenius, dent antérieure
- 2 Notorhynchus primigenius, dent latérale
- 3 Odontaspis cuspidata, dent antérieure
- 4 Odontaspis cuspidata, dent latérale; a: vue labiale, b: vue linguale
- 5 Isurus sp.
- 6 Alopias aff. superciliosus
- 7 Galeocerdo aduncus
- 8 Hemipristis serra, dent antérieure; a: vue latérale, b: vue linguale

Collection P. Gassmann, photos G. Dajoz. Toutes les figures \times 2.

marins peut s'expliquer facilement, soit par des cadavres flottés en mer, soit par le transport des os et dents isolés par les courants de marée. Il se pourrait aussi, et les recherches récentes semblent le démontrer (Allen, Homewood & Matter, travaux en cours), que d'importants secteurs du bassin de l'OMM étaient temporairement émergés et pouvaient être parcourus par des Mammifères terrestres et notamment des petits Rongeurs.

La présence d'*Eucricetodon* cf. *infralactorensis* dans l'OMM de Tavannes confirme donc indiscutablement l'âge burgalien (niveau MN 3) de ces couches, de même qu'elle permet d'espérer d'autres découvertes dans d'autres niveaux de grès coquiller, dans le Jura ou sur le Plateau.

REMERCIEMENTS

Les déterminations ont été effectuées par B. ENGESSER (Bâle) et P. MEIN (Lyon) pour les Rongeurs, ainsi que par H. CAPPETTA (Montpellier) et J. JOST (Zofingen) pour les Poissons. P. GASSMANN (Chez le Bart/NE) a aimablement mis sa collection à notre disposition. B. ENGESSER et A. MATTER (Berne) ont bien voulu revoir notre manuscrit.

A tous vont nos vifs remerciements.

BIBLIOGRAPHIE

- ANTENEN, M. 1973. Geologie der Montoz-Kette unter besonderer Berücksichtigung des Tertiärs in den angrenzenden Mulden von Péry und Tavannes (Berner Jura). Inaug. Diss. Univ. Bern, 1-167.
- ODIN, G. & A. MATTER. 1981. De glauconiarum origine. Sedimentology 28, 611-641.
- ROLLIER, L. 1912. Nouvelles études sur les terrains tertiaires et quaternaires du Haut-Jura. *Actes Soc. jurass. Emulation 1910-1911*, Porrentruy, 1-46.
- ROTHPLETZ, W. 1933. Geologische Beschreibung der Umgebung von Tavannes im Berner Jura. Verh. naturforsch. Ges. Basel 43, 1-150.
- STEHLIN, H.G. 1914. Übersicht über die Säugetiere der schweizerischen Molasseformation, ihre Fundorte und ihre stratigraphische Verbreitung. Verh. naturforsch. Ges. Basel 25, 179-202.

Manuscrit reçu le 24 janvier 1984