Zeitschrift: Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Herausgeber: Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Band: 79 (1988-1989)

Heft: 1

Artikel: La faune des pelouses steppiques valaisannes et ses relations avec le

tapis végétal. Part 3, les Hétéroptères

Autor: Delarze, Raymond / Dethier, Michel

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-279223

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

La faune des pelouses steppiques valaisannes et ses relations avec le tapis végétal. III. Les Hétéroptères¹

PAR

RAYMOND DELARZE² et MICHEL DETHIER ³

Résumé.—DELARZE R., DETHIER M., 1988. La faune des pelouses steppiques valaisannes et ses relations avec le tapis végétal. III. Les Hétéroptères. Bull. Soc. vaud. Sc. nat. 79.1: 49–59.

L'étude des Hétéroptères de 10 pelouses steppiques de la vallée du Rhône suisse, entre Aigle et Leuk, a livré quelque 4200 insectes appartenant à 109 espèces. Le caractère xérotherme accusé de la faune de ces milieux se marque par la présence d'espèces subméditerranéennes inconnues des milieux secs du reste de la Suisse et d'Allemagne. Les variations locales de la composition faunistique sont nettement liées à la continentalité. Toutefois des paramètres biotiques, tels que la présence de certaines plantes-hôtes, semblent jouer un rôle très important.

Abstract.—DELARZE R., DETHIER M., 1988. The fauna of steppic grasslands in the swiss Rhône Valley and its relations with the vegetation. III. Heteroptera. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 79.1: 49–59.

During a survey of the Heteroptera of 10 steppic grasslands in the swiss Rhône valley, between Aigle and Leuk, 4200 insects belonging to 109 species were collected. The marqued xerotherm status of this fauna is enhanced by the presence of submediterranean elements missing in other dry regions of Switzerland and Germany.

The local variations of the faunistic composition are clearly linked to the continentality. However biotic parameters, as host plants, seem to play a very important role.

¹Ce travail a été réalisé dans le cadre d'un travail de thèse à l'Université de Lausanne (DELARZE 1986a).

²Institut de botanique systématique et de géobotanique, Université de Lausanne, Bâtiment de biologie, CH-1015 Lausanne.

³Institut d'Hygiène, case postale 109, CH-1211 Genève 4

1. INTRODUCTION

Cette note s'inscrit dans une série d'articles consacrés à l'étude faunistique de pelouses sèches de la vallée du Rhône (DELARZE 1986b, 1987). Nous nous proposons ici de décrire

-les caractéristiques générales des peuplements d'Hétéroptères de ces milieux, par comparaison avec les pelouses sèches d'autres régions de l'Europe moyenne,

-les variations locales de ces peuplements en regard de celles de la végétation, par le biais d'analyses factorielles des correspondances (AFC).

2. MÉTHODES

L'échantillonnage porte sur 10 stations réparties d'Aigle à Leuk, entre 550 et 800 m d'altitude, la plupart en position d'adret.

CHA1 et CHA2: Crête de Maladeyres près Châteauneuf, steppe rocheuse à *Ephedra helvetica* et *Artemisia vallesiaca*.

BAT: La Bâtiaz près Martigny, steppe calcicole à *Stipa eriocaulis* et *Koeleria vallesiana*.

FO1: Follatères-1, près Branson, 600 m, pelouse steppique à *Stipa* capillata sur loess.

FO2: Follatères-2, près Branson, 550 m, idem, plus chaud.

GRA: Colline morainique près de Granges, steppe calcicole à *Bromus* erectus et Koeleria vallesiana.

MAZ: Mazembroz près de Fully, steppe rocheuse à Stipa capillata.

PLA: Plantour près d'Aigle (VD), pelouse xérophile à *Bromus erectus* et *Stipa eriocaulis*.

SAI1 et SAI2: Saillon, coteau à l'Ouest du village, steppe calcicole rocheuse à *Ephedra* et *Artemisia vallesiaca*.

SAX: Saxon, le Dailley, steppe mésophile d'ubac, à *Bromus erectus* et *Adonis vernalis*.

LEK: Leuk, coteau de Bergji-Platten, steppe calcicole à *Stipa eriocaulis* et *S. capillata*.

Pour Saillon et Châteauneuf, les numéros 1 et 2 correspondent à deux saisons successives de piégeages. Mise à part la station périphérique de Plantour, rattachée au *Xerobromion*, ces pelouses se classent dans le *Stipo-Poion carniolicae*, alliance phytosociologique caractérisée par la présence de plantes des steppes de l'Est européen (*Festucetalia valesiacae*).

L'analyse de végétation de ces pelouses nous permet de les classer en fonction de deux facteurs écologiques dominants: la xérothermie et la continentalité (tableau 1).

L'échantillonnage à été réalisé de manière uniforme dans chaque station, à

l'aide de pièges-trappes (pièges "Barbers") et de récoltes périodiques au filet-fauchoir pendant la saison de végétation, en 1979 et/ou 1980.

Les déterminations ont été faites à l'aide des ouvrages suivants: STICHEL (1955), WAGNER (1966,1967), WAGNER et WEBER (1964) et PÉRICART (1983, 1987). Deux éminents spécialistes (L. HOBERLANDT, Prague, et J. PÉRICART, Montereau) nous ont apporté leur aide pour certaines déterminations délicates.

Les effectifs de l'échantillonnage ont été réduits à 9 classes sur une échelle logarithmique, puis traités par analyse factorielle des correspondances (AFC).

Pour chaque pelouse on a calculé les spectres biologique et chorologique du peuplement.

STATIONS	mésophiles	intermédiaires	xérothermes
subatlantique		Plantour	
intermédiaires	Follatères-1 Follatères-2	Mazembroz Bâtiaz	
continentales	Saxon	Granges	Saillon Châteauneuf

Tableau 1.-Microclimat des pelouses étudiées

3. RÉSULTATS

Phénologie

Les récoltes par fauchage, très faibles en mai, augmentent de plus en plus rapidement pour atteindre un pic très net en août (1979) ou septembre (1980). La diminution des effectifs est rapide en automne, mais en octobre les captures sont encore plus abondantes qu'en mai.

Les récoltes dans les pièges Barbers fluctuent dans des limites assez étroites au cours de la saison, sans présenter de pic net.

Caractères généraux de la faune des Hétéroptères

Les Hétéroptères comptent quelque 700 espèces en Suisse. Présents dans pratiquement tous les milieux, ils sont néanmoins surtout abondants et diversifiés dans les endroits chauds. Prédateurs ou phytophages, vivant sur la végétation, sur le sol ou dans l'eau, les Hétéroptères peuvent occuper des niches très diverses et il n'est donc pas surprenant d'en rencontrer un nombre élevé d'espèces dans les pelouses étudiées.

109 espèces ont été identifiées dans le matériel récolté (tableau 2, en annexe). Quelques Miridés endommagés et une partie des larves n'ont pas été

déterminés au niveau de l'espèce, et n'ont pas été pris en compte dans les analyses. Les fauchages ont livré en moyenne cinq fois plus d'individus que les pièges-trappes. Les Hétéroptères étaient près de deux fois plus abondants en 1979 qu'en 1980, ce qui paraît lié aux conditions climatiques plus clémentes de la première année (voir aussi phénologie).

Les phytophages plus ou moins spécialisés (liés à une ou quelques planteshôtes) sont nettement plus abondants (souvent dominants) dans les fauchages que dans les pièges Barbers. Dans ces derniers, les phytophages généralistes dominent le plus souvent. Il semble que ces polyphages soient surtout bien représentés dans les stations intermédiaires (voir tableau 1), tandis que les espèces liées à une plante précise sont plus nombreuses dans les stations xérothermes et/ou continentales.

Cette faune est dans l'ensemble très xérophile: seules 28 espèces n'ont pas leur centre de gravité dans des milieux secs ouverts –d'après les indications autoécologiques de HEDICKE (1935). Toutes les espèces dominantes (Chorosoma schillingi, Deraeocoris serenus, Ischnocoris punctulatus, Lygaeosoma reticulatum, Macroplax fasciata, Ortholomus punctipennis, Rhyparochromus immaculatus, Staria lunata et Tingis maculata) sont exclusives des pelouses xérophiles. Seules deux d'entre elles figurent (avec une fréquence inférieure à 1%) dans les Mesobromion étudiés au pied du Jura neuchâtelois par GONSETH et SCHLAEPPY (1985). La prospection de nos pelouses a par ailleurs livré quatre espèces sub-méditerranéennes nouvelles pour la Suisse: Neottiglossa lineolata, Catoplatus carthusianus, Charagochilus weberi, Deraeocoris serenus —voir DETHIER et DELARZE (1984).

Ces données peuvent être comparées à celles provenant du Nord des Alpes. Outre l'inventaire neuchâtelois précité, nous avons consulté des travaux allemands et autrichiens, qui concernent le *Mesobromion*, le *Xerobromion* (SCHWOERBEL 1957, MUELLER *et al.*. 1978, HEUBLEIN 1980), le *Calluno-Genistion* (RABELER 1947), les *Festucetalia valesiacae* (FRANZ 1936, KAISER 1950, GAUCKLER 1957), les *Festuco-Sedetalia* (PENTH 1952), et les *Corynephoretalia* (SCHUMACHER 1912, MARCHAND 1953).

Près de la moitié des espèces des stations allemandes et jurassiennes ne se retrouvent pas dans nos piégeages: ce sont en majorité des mésophiles (p. ex.: *Capsus ater*), et les espèces considérées comme pontiques par les auteurs allemands (*Coriomeris scabrinodis*, *Brachycoleus scriptus*, *Plagiognathus albipennis*, etc.).

Les espèces en commun sont d'une part des espèces répandues dans la plupart des groupements herbacés (Acalypta parvula, Notostira erratica, adelphocoris lineolatus, Carpocoris pudicus, Eurygaster maura, Nabis mirmicoides, etc.) et d'autre part des espèces plus localisées dans les pelouses xérophiles (Berytinus signoreti, Chorosoma schillingi, Copium clavicorne (=cornutum), Graphosoma italicum, Coptosoma scutellatum, Coriomeris denticulatus, Emblethis verbasci, Ortholomus punctipennis, Staria lunata, Phymata crassipes, Prostemma guttula, Sciocoris microphtalmus, Syromastes rhombeus, Rhinocoris iracundus, Tingis maculata, etc.).

Par contre, plusieurs espèces abondantes dans nos récoltes valaisannes (présentes dans plus de 4 stations et plus de 20 individus au total) sont rares ou manquent dans les groupements du Nord des Alpes: Charagochilus weberi, Deraeocoris serenus, Dicranocephalus albipes, Holcostethus sphacelatus, Ischnocoris punctulatus, Lygaeosoma reticulatum, Macroplax fasciata, Odontotarsus purpureolineatus, Rhinocoris erythropus, Rhyparochromus immaculatus. Ces distinctives sont toutes des espèces présentes dans la région méditerranéenne occidentale (VILLIERS 1977).

De nombreuses autres espèces méridionales figurent dans notre inventaire, avec une fréquence moindre: Bathrostethus annulipes, Camptopus lateralis, Carpocoris purpureipennis, Copium teucrii, Coreus marginatus, Coriomeris hirticornis, Heterogaster affinis, Liorhyssus hyalinus, Loxocnemis dentator, Macroplax preyssleri, Melanocoryphus albomaculatus, Perytrechus gracilicornis, Polymerus brevicornis, Rhyparochromus confusus, Stagonomus pusillus.

Les peuplements d'Hérétoptères des pelouses étudiées ont donc un caractère nettement plus xérotherme, par leur composition d'ensemble comme par les dominantes, que ceux des *Festuco-Brometea* du Nord des Alpes.

Variations locales

Sur cette toile de fond xérotherme, les variations d'une station à l'autre sont influencées, à l'échelon régional, par la continentalité et la présence de certaines plantes-hôtes.

Une comparaison des spectres biologiques calculés à partir des effectifs des 20 espèces les plus abondantes (78% du total) nous montre que les stations de Châteauneuf, de Saillon et de Granges possèdent la plus grande proportion de méditerranéennes.

Le premier axe de l'AFC des Hétéroptères (fig.1) correspond à un gradient de continentalité (K), comme le montre l'ordre des stations sur cet axe:

Plantour-Mazembroz-Follat-Bâtiaz-Saillon-Châteauneuf-Granges-Saxon (Chablais) (Valais inférieur) (Valais central)

La station de Leuk ne figure pas dans cette analyse, un incendie ayant empêché d'y achever l'échantillonnage.

Les distinctives du pôle subatlantique (Plantour-Follatères) sont Aelia rostrata, Deraeocoris ruber, Eurydema oleraceum, Eurygaster maura, Heterogaster affinis, Holcostethus vernalis, Lygaeus saxatilis, Nysius senecionis, Rhyparochromus phoeniceus, Tingis maculata et Odontoscelis dorsalis. Cette dernière espèce est considérée comme caractéristique des dunes maritimes en France par VILLIERS (1977), mais comme élément pontique par GAUCKLER (1957)!

On peut distinguer au sein de cette tendance

-une variante mésotherme (Plantour), avec *Dolycoris baccarum*, *Graphosoma italicum*, *Nabis ferus*, *Palomena viridissima* et *Pyrrhocoris apterus*.




Figure 1.-Premier plan de l'analyse factorielle des correspondances des peuplements d'hétéroptères.

Premier axe de l'analyse horizontal.

K: pôle continental

(Symboles des stations voir dans le texte, p. 50).

-une variante plus thermophile (Follatères, Mazembroz), avec *Camptotus lateralis*, *Charagochilus weberi*, *Chlamydatus pullus* et *Rhyparochromus confusus*.

Les espèces du pôle continental (K: Châteauneuf-Saxon) sont en partie des espèces plutôt xérophiles mais très tolérantes et répandues: Adelphocoris lineolatus, Chorosoma schillingi, Coptosoma scutellatum, Exolygus pratensis, Megalonotus chiragra, Neides tipularius, Piezodorus lituratus. Mais ses espèces distinctives les plus significatives sont des méridionales xérothermophiles: Carpocoris purpureipennis, Catoplatus carthusianus, Cydnus aterrimus, Deraeocoris serenus, Dicranocephalus albipes, Holcostethus sphacelatus, Loxocnemis dentator, Rhinocoris erytropus. Aucune de ces espèces ne figure dans les pelouses du Jura étudiées par GONSETH et SCHLAEPPY (1985).

Le deuxième axe oppose les adrets calcaires riches en squelette aux pelouses moins calciphiles, ou sur sol plus profond (Saxon, Follatères, Mazembroz). On ne reconnaît que partiellement le gradient xérothermique, qui jouait un rôle essentiel dans le cas de la végétation. Il semble que la présence de certaines plantes-hôtes joue ici un rôle non négligeable. Les phytophages spécialisés sont plus abondants dans les pelouses calcaires. Ils apparaissent en général dans les fauchages (Plantour, Granges et la Bâtiaz), mais parfois aussi dans les pièges-trappes (Châteauneuf). Parmi les distinctives de ce pôle calciphile on trouve Corizus hyosciami sur Ononis, Eurydema ornatum sur Erucastrum, Cydnus aterrimus, Dicranocephalus albipes et Alydus calcaratus sur Euphorbia.

Les distinctives du pôle opposé sont associées aux deux milieux les plus denses et mésophiles: Saxon et Follatères. Il s'agit aussi bien de prédateurs - Capsodes gothicus, Phymata crassipes- que de phytophages plus ou moins spécialisés -Copium teucrii, Peritrechus gracilicornis, Eurygaster maura, Macroplax preyssleri, Odontotarsus purpureolineatus, Ortholomus punctipennis, Phytocoris varipes, Polymerus brevicornis.

En comparant le spectre des régimes alimentaires, on constate que les fauchages livrent beaucoup de phytophages spécialisés, alors que les généralistes se rencontrent surtout dans les pièges-trappes. Cela n'a rien d'étonnant si on songe que les premiers se cantonnent sur une seule plante, alors que les seconds vont d'un plante à l'autre en se déplaçant sur le sol. Une exception concerne cependant les spécialistes liés aux racines de certaines plantes-hôtes (*Coryzus*, Châteauneuf)

4. CONCLUSION

Bien que les Hétéroptères des pelouses steppiques soient pour la plupart des xérothermes, les variations de la faune d'une station à l'autre montrent que ce groupe, comme les Aranéides et les Diplopodes (DELARZE 1987), n'est pas

sensible de la même manière que la végétation aux différents paramètres du climat.

D'autre part, les plantes-hôtes jouent un rôle déterminant dans la distribution de certaines punaises phytophages spécialisées.

Cette double dépendance, trophique et climatique, rend difficile l'interprétation des analyses factorielles

REMERCIEMENTS

Nous remercions ici Mesdames Claire BAGI et Ayako DETHIER, qui ont trié et monté le matériel, ainsi que Messieurs L. HOBERLANDT et J. PÉRICART, qui ont bien voulu revoir certaines déterminations.

BIBLIOGRAPHIE

- DELARZE R., 1986a. Approche biocénotique des pelouses steppiques valaisannes. Thèse, Université de Lausanne, 175 p. + annexes..
- DELARZE R., 1986b. La faune des pelouses steppiques valaisannes et ses relations avec le tapis végétal. I: Coléoptères (Coleoptera) et Fourmis (Hymenoptera Formicidae). *Bull. romand Ent.* 4:125-154
- DELARZE R., 1987. La faune des pelouses steppiques valaisannes et ses relations avec le tapis végétal. II: Araignées (Araneida) et Mille-pattes (Myriapoda Diplopoda) *Bull. romand Ent.* 5: 1-14.
- DETHIER M. et DELARZE R., 1984. Hétéroptères nouveaux ou intéressants pour la faune suisse. *Bull. Soc. entomol. suisse* 57: 123-128.
- FRANZ H., 1936. Die thermophilen Elemente der Mitteleuropäischen Fauna und ihre Beeinflussung durch die Klimaschwankung der Quartärzeit. Zoogeographica(Berlin) 3: 159-320.
- GAUCKLER K., 1957. Die Gipshügel in Franken, ihr Pflanzenkleid und ihre Tierwelt. Denkschr. 50jähr. Bestehen des Naturschutzgebietes. Naturhist. Ges. Nürnberg, 92 p.
- GONSETH Y. et SCHLAEPPY S., 1985. Etude floristique et faunistique de trois prairies sèches du pied du Jura. Ecoinformation (Bull. gr. trav. enseignement de l'écologie, Neuchâtel) 11/12: 1-90.
- HEUBLEIN D., 1980. Die Frage der kleinräumige Kongruenz von Zootaxozönosen und Vegetationszonierungen. *Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem. N.F.* 22: 145-167.
- HEDICKE H., 1935. Heteroptera. *in* BROHMER P., EHRMANN P., et ULMER G.: *Tierwelt Mitteleuropas* 4(3):15-113, Quelle & Meyer, Leipzig.
- KAISER E., 1950. Die Steppenheiden des mainfränkischen Wellenkalkes zwischen Würzburg und dem Spessart. Ber. Bayer. Bot. Ges. 28: 69-177.
- MARCHAND H., 1953. Die Bedeutung der Heuschrecken und Schnabelkerfe als Indikatoren verschiedener Grasslandtypen. *Beitr. Entom. (Berlin) 3*: 116-162.
- MUELLER H.J., BAEHRMANN R., HEINRICH W., MARSTALLER R., SCHAELLER G. et WITSACK W., 1978. Zur Strukturanalyse des epigäischen Arthropodenfauna einer Rasen-Katena durch Kescherfänge. Zool. Jb. Syst. 105:131-184.
- PENTH M., 1952. Zur Œkologie der Heteropteren des Mainzer Sandes. Zool. Jb. Syst. 81: 91-121.
- PÉRICART J., 1983. Hémiptères Tingidae euro-méditerranéens. *in* Faune de France, vol 69. Féd. franç. Soc. Sci. nat., Paris, 620 p.

- PÉRICART J., 1987. Hémiptères Nabidae d'Europe occidentale et du Maghreb. *in* Faune de France, vol 71. Féd. franç. Soc. Sci. nat., Paris, 185 p.
- RABELER W., 1947. Die Tiergesellschaften der trockenen Callunaheiden in Nordwestdeutschland. *Jahresber. Naturhist. Ges. Hannover 94-101*:357-375.
- SCHUMACHER F., 1912. Über die Zusammensetzung der Hemipterenfauna einiger deutscher Heideformationen, insbesondere der Binnendünen, Sandfelder und trockenen Kieferwälder. Sitz. Ber. Ges. naturf. Freunde (Berlin) 1: 439-463.
- SCHWOERBEL W., 1957. Die Wanzen und Zikaden des Spitzberges bei Tübingen, eine faunistisch-Œkologische Untersuchung. Z. Morph. Oekol. Tiere 45: 462-560.
- STICHEL, W., 1955. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. II. Europa. Berlin-Hermdorf, 4 vol.
- VILLIERS A., 1977. Atlas des Hémiptères de France. Boubée, Paris.
- WAGNER, E., 1966. Wanzen oder Heteropteren. I. Pentatomorpha. *in* die Tierwelt Deutschlands, vol. 54, G. Fischer Verlag, Iena, 235 p.
- WAGNER E., 1967. Wanzen oder Heteropteren. II. Cimicomorpha. *in* die Tierwelt Deutschlands, vol. 55, G. Fischer Verlag, Iena, 179 p.
- WAGNER E. et WEBER H.H., 1964. Hétéroptères Miridae. *in* Faune de France, vol 67, Librairie de la faculté des Sciences, Paris, 589 p.

Manuscrit reçu le 17 mars 1988

ANNEXE: Tableau 2.—Catalogue de Hétéroptères (voir pages suivantes).

Tableau 2.—Catalogue des Hétéroptères

```
1=1 exemplaire capturé (cumul sur l'année,
2=2-3 ex.capturés 4=7-10 ex. barbers et fauchages
9 classes d'abondance : 1=1 exemplaire capturé
                                                    6=17-29 ex. confondus)
                            5=11-16 ex. 6=17-29 ex. 7=30-79 ex. 8=80-149 ex.
                            9=>150 ex. capturés.
ordre des stations: Plantour, Bâtiaz, Follatères-1, Follatères-2, Mazembroz,
                        Saillon-1, Saillon-2, Châteauneuf-1, Châteauneuf-2,
                        Granges, Leuk, Saxon.
A = nombre de stations ou l'espèce à été observée.
B = nombre d'exemplaires au total.
+ = espèce rare et intéressante.
* = espèce nouvelle pour la Suisse (DETHIER & DELARZE 1984)
                                         Pl Ba F1 F2 Ma S1 S2 C1 C2 Gr Lk Sx / A
  Acalypta parvula (FALLERI) 1 . 1 . 3 3 1 1 2 2 2 1 Adelphocoris lineatus (GOEZE) 2 3 3 4 5 . . . 2 3 . 4
                                                                                     10 (26)
                                                                       2 . 7 4 4
2 3 . 4 8
                                                                                           (54)
                                                                                           (46)
  Aelia rostrata BOHEMAN
                                         3 . . . 1
                                                                                           (14)
                                                        5.
  Aethus nigritus (FAB)
                                                                                            (14)
                                                                                        1
 Alydus calcaratus (L.)

Alydus calcaratus (L.)

Bathrostethus annulipes (COSTA)

*Beosus maritimus (SCOP)

Berytinus signoreti (FIEB)

Brachycoleus decolor REUTER

Calocoris alpestris MEY.

Camptotus lateralis GERMAR

Canthophorus dubius (SCOP.)

Capsodes gothicus (L.)

Carpocoris pudicus (PODA)

Carpocoris purrurreipennis (DEG.)
                                                                             4 .
                                                                                           (11)
 *Beosus maritimus (SCOP)
                                                                                        1
                                                                                            (1)
                                                                                             (4)
                                                                                             (1)
                                                                                     1
                                                                                           (12)
                                                                                     1
                                                                                           (26)
                                                            3
                                                                                       4
                                                                                           (24)
                                                            2 1
                                                                    5 4 1 3 3
 (9)
                                                                   . . . . 1 2
                                                                                           (26)
  -Chlamydatus pullus (REUTER) 1 . 2 . 3 . Chorosoma schillingi (SCHILLING) . 2 3 2 1 .
 +Chlamydatus pullus (REUTER)
                                                                2 3 6 5 6 5 10 (108)
. 4 2 . 6 1 8 . . . . 2 1 4
                                                                                           (56)
                                                                       . . 2 1 4 (19)
. 1 . 4 5 (15)
                                                                . 1 . . 3 .
                                                                              3 .
                                                                                           (12)
                                                                                            (6)
                                                                                            (7)
                                                                   4 6
                                                                              2 .
                                                                                       3
                                                                                           (39)
                                                                                             (1)
                                                                                        2 (104)
                                                                . . . . . 1
                                                                                            (4)
                                                                                            (1)
  Dicranocephalus albipes (FALL.)
  Dictyonota tricornis (SCHRANK) 1 . . . . . Dolycoris baccarum (L.) 6 1 . . .
  Dolycoris baccarum (L.)
                                                                       . . 3 .
                                                                                        4 (30)
                                      Drymus silvaticus (FAB.)
                                                                                       1
                                                                                             (1)
  Dyctina pusilla THORRELL
  Emblethis verbasci (FAB.)
                                                         5
                                                           4 1 6 3 2 4 2 11 (88)
  Enoplops scapha (FAB.)
                                                         1
  Eurydema oleraceum (L.)
                                                                                            (5)
  Eurydema ornatum (L.)
                                          . 1 . . . . . . . . 3 2 2 3
                                                                                            (9)
  Eurygaster maura (L.)
                                                                                           (20)
  Exolygus pratensis (L.)

Graphosoma italicum (L.)

Horvathiolus superbus F.

Heterogaster affinis HERR.-SCH. 3 . 1 2

Holcostethus sphacelatus (FABR.) 3 . 1 1 .
                                                                              . 4
                                                                                     2 (11)
                                                                                     4 (51)
                                                                                        1
                                                                                             (1)
                                                                                             (8)
                                                                                        6 (29)
  Ischnocoris hemipterus (SCHILL.) . . 1 1 1 . . . Ischnocoris punctulatus (SCHILL.)
                                                                                        3
                                                                                             (4)
                                                                                             (1)
  Ischnocoris punctulatus (FIEBER) 3 3 4 1 7 3 2 4 1 . 5 . 10 (107)
  Jalla dumosa (L.)
                                                                                     1
                                                                   . 1 . . .
                                                                                             (1)
  Legnotus limbosus (GEOFFROY)
                                                             1
                                                                                             (1)
  Liorhysus hyalinus (FAB.)
```

(2)

Tableau 2 (suite).-Catalogue des Hétéroptères

P	1	Ва	F1	F2	Ma	S1	S2	C1	C2	Gr	Lk	Sx	/	Α	(B)
Loxocnemis dentator (FAB.)		1					8	3						2	(6)
Lygaeus saxatilis (SCOP.)			7		5									2	(54)
Lygeosoma reticulatum (HERRSCH.)	2	7	4	180	8	4	3	7	7	1	7	100		10	(530)
Macroplax fasciata (HERRSCH.)		7	1	4	3	6	4	2	2	6	6			10	(129)
Macroplax preyssleri (FIEB.)		1	3		3				*		4	3		5	(21)
Megalocoera recticornis (GEOFFR.)												4		1	(7)
Megalonotus chiragra (FAB.)								1				1		2	(1)
Melanocoryphus albomaculatus (GF)			1											1	(2)
Nabis apterus (FAB.)					3									1	(4)
Nabis ferus (L.)	5							1						2	(15)
Nabis mirmicoides (COSTA)	4	3	6	3	3			4	5		4			8	(69)
Nabis rugosus (L.)	2				3			5		1		1		5	(21)
Neides tipularius (L.)						1		1			3			3	(8)
*Neottiglossa lineolata (MULSANT)												2		1	(2)
+Notostira erratica (L.)	*		1						*		4			2	(7)
Nysius senecionis (SCHILLING)	1	1	1											3	(4)
Nysius thymi (SCHILLING)	٠				•			•	2		•	•		1	(2)
Odontoscelis dorsalis (FAB.)	7		1	1	2	2		1		2	6			9	(79)
Odontotarsus purpureolineatus L.	٠	1	2		1	4	1	•		2	3	1			(542)
Ortholomus punctipennis (H.S.)	*	6	6	6	9		•	•	2	1				6	(26)
Pachytomella parallela (MD.)	٠	•		2		•	•	•	•	•		•		1	(3)
Palomena prasina (L.)	*	•					•		*	•		5		1	(16)
Palomena viridissima (PODA)	4	•	2	0.00				1	*	•	5	12.		4	(25)
Peritrechus geniculatus (HAHN)	٠	•	3	•	٠	•		•	*	•		•		1	(4)
Peritrechus gracilicornis (PUTO)	*	٠	2		*	•		•				1		2	(4)
Phymata crassipes (FAB.)	•	1	3	2		٠	1		•		4	1		6	(19)
Phytocoris varipes BOHEMAN	•	5	5	6	•	•	1	•	•	1	3	3		7	(68)
Piezodorus lituratus (FAB.)		1	*	•	2	•	•	2		•	•	1		4	(7)
Pionosomus varius (WOLFF.)	•	•	•		4	2		•	•	1	2	•		5	(17)
Plinthisus brevipennis (LATR.)	*				14			1	•		3	*		3	(11)
Polymerus brevicornis REUTER	**		1	*		*	1	*1		*	2	*		3	(4)
Polymerus unifasciatus (FAB.)	٠		1	•	•	•	•	•	•	•	5	*		2	(17)
Prostemma guttula (FAB.)	•	1		1	1	*		2	1	1	•			6	(8)
Pyrrhocoris apterus (L.) Pyrrhocoris marginatus (KOLENAT)	2	•	٠	•	1	•	٠	2	•	٠	2	•		3	(6)
	•	1	٠	٠	٠	4	2			1				6	(6)
Rhinocoris erythropus (L.) Rhinocoris iracundus (PODA)	3	2	3	2	3	-			3		-	Τ		9	(16) (52)
Rhopalus conspersus (FIEB.)	2				3	2		1		•	3573	*		7	(14)
Rhopalus parumpunctatus (SCHILL.)	-						1		2	2				3	(6)
Rhopalus subrufus (GMELIN)	2	٠	4	•	1	•	•					1		4	(12)
Rhyparochromus immaculatus ROY	3	3		3		4	7	2	3	4					(105)
Rhyparochromus alboacuminatus L	2													2	(12)
Rhyparochromus confusus (REUTER			1			•	•	•	•	*	-	•		2	(2)
Rhyparochromus phoeniceus ROSSI									:			·		3	(3)
Rhyparochromus pineti (HERRSCH.)							•	•						1	(4)
Sciocoris cursitans (FAB.)		2	2	-	5	3		2	3	•	3	1		8	(41)
Stagonomus pusillus (HERRSCH.)		1			3		1	_			3	1		3	(7)
Staria lunata (HAHN)	9	7		5				7	7	3	6	•		10	(446)
Stenodema sp.							1			_		•		1	(1)
Stictopleurus abutilon (ROSSI)	1				•									1	(1)
Stictopleurus punctatinervosus F.			1	2	1			1	•					4	(7)
Stygnocoris sabulosus SCHILL.					1		1							2	(2)
Syromastes rhombeus (L.)	3	1			4				2	1	2			9	(35)
Thyraeocoris scarabaeoides (L.)	2			i						-				1	(2)
Tingis maculata (HERRSCH.)	6	-35									8			7	(472)
Tropezonotus arenarius (L.)											5			1	(16)
Tropistethus holosericeus (SCHA.)			2											1	(2)