

Zeitschrift: Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany
Herausgeber: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Band: 3 (1926-1929)

Artikel: Un nouveau Knautia helvétique
Autor: Wilczek, E.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-879114>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 29.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

UN NOUVEAU KNAUTIA HELVÉTIQUE

par

E. WILCZEK

Knautia silvatica Dub. var. *Briquetiana* Wilcz., var. nov. — Caulis ad 50 cm. altus, superne (vel nonnunquam jam inferne) divaricatum ramosus, internodiis inferioribus brevibus pilis setaceis retrorsis longis dense obsitis, caeteris elongatis pilis brevibus densis cinerascentibus et practerea pilis setaceis rarioribus praeditis. Folia evoluta in caulis parte inferiore subsessilia vel breviter lateque petiolata, congesta, elliptico-lanceolata, serrata vel inciso-serrata, apice integre acuminata, duriuscula, supra pilis setaceis sparsis praedita, subtus pilis setaceis in nervis crebris aliorsum sparsis praeter pilos minimos in parenchymate densiusculos praedita; folia superiora brevia, angustiora, sessilia, integra vel subintegra. Pedunculi elongati, crassiusculi, praeter pilos setaceos et pilos breves glandulis stipitatis crebris ornati. Capitula mediocria, sub anthesi diam. circ. 2,5 cm. lata. Bractee involucales exteriores late lanceolatae, interiores angustiores, omnes indumento eodem ac pedunculi praeditae, quam flores exteriores breviores. Calix limbo distincte pedicellato, demum patelliformi, dentibus basi triangulari-lanceolatis, subito ac longe aristatis, parte inferiore barbato-villosis, 2,5-3 mm. altis. Corolla intense violacea, parce puberula. Fructus ellipsoideus, sect. long. circ. 4,5×1,5 mm., pilis mollibus mediocribus adscendentibus obtectus.

Suisse. Vaud : alpes de Morcles, pelouses alpines sur Riondaz, alt. 2200 m., leg. E. Wilczek.

Race remarquable par la présence du court indument mou et cendré des entrenœuds caulinaires allongés et de la page inférieure des feuilles, indument qui rappelle celui des *Knautia* du groupe *Subcanescentes*, mais inséparable du *K. silvatica* par l'ensemble de ses caractères — opinion qui est partagée par notre ami M. Briquet.