

Zeitschrift: Candollea : journal international de botanique systématique =
international journal of systematic botany
Herausgeber: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Band: 4 (1929-1931)

Artikel: Hypericum tauricum
Autor: Keller, Robert
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-879083>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 21.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

HYPERICUM TAURICUM

describit

Robert KELLER

Hypericum tauricum R. Kell. — Caulis arcuato-erectus, \pm 10-16 cm. altus, glaber, teres vel tantum infra folia breviter bilineatus ; folia usque 15 mm. longa et 2 mm. lata, (\pm 7-plo longiora quam lata), margine revoluta, carinata, versus apicem crebro, ceterum sparse glandulis pellucidis obsita, costa sicut nervi secundarii pauci, erecto-patentes pellucida, interdum \pm decurrentes ; in foliorum angulis folia fasciculata, $1\frac{1}{3}$ - $1\frac{1}{2}$ foliorum longitudine. Inflorescentia racemosa ; sepala \pm 3 mm. longa, \pm 3-plo longiora quam edunculi, oblongo-ovata, obtusa, in parte superiori, certe ad apicem ciliis glanduliferis brevibus (usque \pm 12) obsita, pellucido-striata et punctata ; petala \pm 3-plo longiora quam sepala, flava, interdum versus apicem et secundum marginem abunde ciliis glanduliferis obsita \pm violaceo-rufescens ; ovarium ovatum, sepalis paulo longius ; styli ovario subduplo longiores, staminibus breviores, capsula matura subglobosa.

Candollea IV, Février 1931.

Tauria : in lapidosis montium Karabi-Jaila supra pagum Molbai (A. Callier. Iter tauricum tertium anni 1900 cur. I. Dörfler n. 565 in herb. Delessert).

Species sect. *Euhypericum* subsect. *Homotaenii* R. Kell. ser. a *Seminibus papillosum*, *H. hyssopifolium* Vill. valde approximata, olim l. c. absque diagn. nominata et distributa, nunc descriptione suppleta.
