**Zeitschrift:** Candollea: journal international de botanique systématique =

international journal of systematic botany

**Herausgeber:** Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève

**Band:** 9 (1942-1943)

Artikel: Festucae Graeciae : énumération des Festuca récoltés par C. de Regel

en Grèce

**Autor:** Litardière, R. de

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-880453

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 29.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# FESTUCAE GRAECIAE ÉNUMÉRATION DES FESTUCA RÉCOLTÉS PAR C. DE REGEL EN GRÈCE

PAR

## R. de LITARDIÈRE

Notre excellent collègue, M. le Dr C. de Regel, ancien professeur à l'Université de Kaunas (Lithuanie), conservateur de l'Herbier Boissier, a bien voulu nous confier l'étude des *Festuca* qu'il a récoltés au cours de ses nombreux voyages en Grèce, ce dont nous le remercions vivement. Nous donnons ci-après l'énumération des plantes qu'il nous a été possible d'identifier d'une façon précise, un certain nombre d'échantillons récoltés trop tard n'étant pas exactement déterminables. Cette énumération apportera une contribution intéressante à la connaissance encore assez imparfaite des *Festuca* de la flore grecque.

\* \* \*

**F. ovina** L. subsp. e u - o v i n a Hack. var. supina (Schur) Hack. subvar. eu-supina St-Y.

Epirus: Prope Konitsa, in declivis siccis; 4-VII-1935.

Race nouvelle pour la flore grecque, qui, dans la péninsule balkanique, n'était connue qu'en Bulgarie et en Yougo-Slavie.

**F. ovina** subsp. eu-ovina var. duriuscula (L.) Koch subvar. genuina (Godr.) Hack.

Epirus: M. Smolika, in regione alpina; II-VIII-1935. — M. Peristeri, in calcareis regionis alpinae; 3-VIII-1936. — Pindus, in m. Avgo, in regione alpina; 19-VIII-1934.

Candollea IX. Octobre 1942.

A notre connaissance, le var. *duriuscula* subvar. *genuina* n'avait pas été signalé jusqu'ici en Grèce.

**F. ovina** subsp. eu-ovina var. duriuscula subvar. crassifolia (Gaud.) Hack.

Phthiotis: M. Oeta, in calcareis cacuminis, 1900 m.; 10-VII-1936. Mentionné seulement jusqu'ici dans les îles Ioniennes.

F. ovina subsp. e u - o v i n a var. glauca (Lamk) Hack. subvar. eu-glauca St.Y.

Epirus: Pindus, in m. Avgo, in regione alpina, 1900 m.; 19-VIII-1934. Aetolia: M. Tymphrestus (Veluchi), in calcareis cacuminis; 23-VII-1935.

F. ovina subsp. eu-ovina var. glauca subvar. macrophylla St-Y.

Epirus: M. Smolika, in rupestribus regionis alpinae, 2500 m.; 6-VIII-1935.

Laconia: Taygetos, in m. Hagios Elias, in cacumine, 2400 m.; 4-VIII-1934.

Ces deux sous-variétés sont nouvelles pour la flore grecque, où ne paraissait exister que le subvar. pallens (Host) Hack.

**F. ovina** subsp. s u l c a t a Hack. var. valesiaca (Schleich.) Hack. subvar. eu-valesiaca (Asch. et Graebn.) St-Y.

Macedonia: M. Chortiatis, prope Thessaloniki, in prato regionis alpinae, 900 m.; 8-VII-1939. — M. Vermion, in pascuis regionis alpinae; 6-VII-1936.

Thessalia: Inter Metsevo et Caliki, in pascuis, 1700 m.; 2-VIII-1936.

F. ovina subsp. laevis Hack. var. gallica (Hack.) St-Y. forma inter subvar. Hervieri St-Y. et subvar. Costei St-Y. ambig.

Aetolia: M. Tymphrestus (Veluchi), in regione alpina; 22-VII-1935. Cette localité comble la lacune qui semblait exister dans l'aire du var. *gallica*, entre le N. de l'Italie (Alpes Bergamasques) et le Caucase, où il est abondant. <sup>1</sup>

La plante du Veluchi diffère du subvar. Hervieri, dont elle présente

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Saint-Yves in Candollea V: 114-15.

les feuilles assez minces (0,7-0,8 mm. diam.) et les épillets courts (7 mm. de long), par sa structure foliaire qui est celle du subvar. *Costei*, avec faisceaux de sclérenchyme épais, les marginaux longuement décurrents jusqu'au niveau de la nervure latérale primaire. Cette forme de transition est fréquente dans toute l'aire de la race.

**F. ovina** subsp. laevis var. laevis Hack. subvar. typica Hack. Thessalia: M. Pelion, in calcareis cacuminis, 1600 m.; 2-VIII-1938. Phthiotis: M. Oeta, in regione silvatica; 10-VII-1934.

**F. ovina** subsp. la evis var. laevis subvar. campana (Terr.) Hack Epirus: Prope Konitsa, in silva; 3-VIII-1935.

Laconia: M. Parnon (Malevo), in calcareis, 1900 m.; 14-VII-1935. — Taygetos, Langada, in rupestribus regionis alpinae; 3-VII-1934.

**F. ovina** subsp. laevis var. stricta (Host) Hack. subvar. polita (Hack.) St-Y.

Phthiotis: M. Oeta, in calcareis cacuminis; 10-VII-1936.

Les plantes des localités suivantes se rapportent au forma *cerifera* R. Lit., *nov. forma*. — A typo (forma *epurinosa* R. Lit., *nov. nom.*) foliis culmisque pruinosis recedit.

Epirus: M. Peristeri, in pratis alpinis; 3-VIII-1935.

Laconia: M. Parnon (Malevo), in cacumine; 14-VII-1935. — Taygetos, in m. Hagios Elias, in rupibus calcareis; 4-VIII-1934.

**F. ovina** subsp. la evis var. Jeanpertii St-Y. in *Bull. soc. bot. Fr.* LXXI, 42 (1934) [= F. Jeanpertii Markg. in Hayek *Prodr. fl. penins. balc.* III, 276 (1933)].

Thessalia: M. Ossa, in calcareis regionis alpinae, 1800 m.; 9-VIII-1938.

Race signalée uniquement en Attique (m. Pateras et Pentélique), ainsi que dans l'île de Céphalonie. Les échantillons provenant du mont Ossa sont pruineux.

**F. rubra** L. subsp. eu-rubra Hack. var. genuina (Godr.) Hack. subvar. vulgaris (Gaud.) Hack.

Thessalia: Prope Chaliki, 1200 m.; 2-VIII-1936.

Epirus: Pindus, in m. Avgo, in calcareis, 2000 m.; 19-VIII-1934.

**F. rubra** subsp. **e u - r u b r a** var. **genuina** subvar. **juncea** Hack. Aetolia: M. Tymphrestus (Veluchi), in regione alpina, 2400 m.; 22-VII-1935.

Cette sous-variété n'avait pas encore été signalée dans le domaine de la flore grecque.

**F. varia** Haenke subsp. eu-varia Hack. var. cyllenica (Boiss. et Heldr.) Hack. subvar. eu-cyllenica St-Y.

Macedonia: Ins. Thasos: M. Hagios Elias, in calcareis, 900 m.; 24-VIII-1938. - M. Vermion, prope Naoussa, in pratis regionis alpinae; 7-VII-1936 (forma culmis infra paniculam scabriusculis).

Epirus: M. Smolika, in prato alpino; 6-VIII-1935. — M. Peristeri, in calcareis cacumimis; 3-VIII-1936 (forma culmis infra paniculam, scabriusculis).

Thessalia: M. Ossa, in regione alpina; 9-VIII-1938. — M. Chelmos in regione alpina; 16-VIII-1931.

Ins. Euboea: M. Delphi (Diphrys), in declivibus calcareis regionis alpinae; 25-VII-1938.

Laconia: M. Parnon (Malevo), in calcareis regionis alpinae; 14-VII-1935. — Taygetos, in m. Hagios Elias, in calcareis declivis regionis alpinae; 11-VII-1935.

Ainsi que l'a justement fait remarquer notre très regretté ami A. Saint-Yves (in *Candollea* III, 442), la forme de la panicule est assez variable dans le subvar. *eu-cyllenica*: tantôt très appauvrie, avec rameau inférieur très court ne portant que 2-3 épillets, tantôt plus riche, à rameau inférieur plus long et portant un plus grand nombre d'épillets; ainsi toutes les transitions existent entre le subvar. *eu-cyllenica* et le subvar. *calva* (Hack.) St-Y.

**F.** varia subsp. eu-varia forma inter var. graecam (Hack.) St-Y. et var. cyllenicam ambig.

Epirus : Pindus, in m. Avgo, in calcareis regionis alpinae, 1900 m.; 19-VIII-1934. [Echantillons à feuilles assez minces (0,62-0,65 mm. diam.), dépourvues de sclérenchyme au sommet des côtes et à glumelles lisses].

Aetolia: M. Tymphrestus (Veluchi), in cacumine; 23-VII-1935. [Echantillons à feuilles plus minces (0,65 mm. diam.) que chez le var. *cyllenica*, mais pourvues de sclérenchyme au sommet des côtes et à glumelles lisses].