

Zeitschrift: Candollea : journal international de botanique systématique =
international journal of systematic botany
Herausgeber: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Band: 14 (1952-1953)

Artikel: A new species of Scrophulariaceae from South Africa
Autor: Young, R. G. N.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-880458>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 08.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

A New Species of Scrophulariaceae from South Africa

by

R. G. N. YOUNG, B.A., M.Sc.

The following species was discovered during the study of the flora of an isolated patch of marsh on the slopes of the hills in the neighbourhood of Pretoria, South Africa. I am very grateful to the Director and staff of the Herbier Delessert, Geneva, for all the facilities granted me for the preparation of this paper.

Lindernia minima R.G.N. Young, sp. nov.

L. tenui S. Moore affinis, sed altitudine multo minore, floribus dimidio minoribus et manifeste pedicellatis, corollarum labiis subaequalibus, bracteis et calycis laciniis longioribus, differt.

Herba annua pusilla foliosa erecta ad 5 cm. alta, caule simplici vel 2-4-ramoso; *Caulibus* (et ramis) viridibus, 0,5-1 mm. lat., subquadrangularibus, in medio caulum 4-6-costatis, et (sicut folia) glabris sed minute scrofulaceis; *Foliis* oppositis, plerumque internodia excedentibus, leviter decurrentibus, subcarnosulis, obscure 1-3-nerviis, integris vel remote paudentatis — inferioribus oblongis, obtusis, 2-5 mm. long. et 0,5-1,5 mm. lat. — intermediis (dum adsunt) late ellipticis, apice et base acutatis, 8-10 mm. long. et 2-4 mm. lat. — superioribus minoribus, integris, lanceolatis; *Inflorescentiis* terminalibus, racemosis, 2-5-floris, ad 2,5 cm. longis; bracteis per paria inaequalibus, foliaceis, linear-lanceolatis, acutis, pedicellos excedentibus; pedunculis pedicellisque pilis glandulosis minutis fere ornatis — floribus per par bractearum singularibus; *Calycibus* parum angustis, 5-costatis et ad costas crebro minute glanduloso-pubescentibus, usque ad medium in 5 lobos linear-lanceolatos, acuminatos, scabrido-ciliolatos, divisus; *Corollis* partim purpureis, partim luteis, 4 mm. longis, apud faucem 1,5 mm. lat., tantum pilis papillatis intus sparsim ornatis; labiis posticis late ovatis, summo strictim bilobatis, 1,5 mm. long et lat.; anticis rotundatis, 1,5 mm. long. et 3,5 mm. lat., profunde trifidis, lobis deinde reflexis, lobo medio quam lateralibus multo latiore; *Staminum* — antheris minimis, late ovatis,

apice confluentibus — posticorum filamentis 1 mm. long. — anticorum filamentis valde arcuatis, per paria approximatis, 1,5 mm. long., saepissime prope basem appendice oblonga vel subglobosa instructis ; *Ovariis* ellipticis, prope 0,75 mm. long., superne minute papillaceis — stylis 3 mm. long., tenuissimis et minute liguliformibus, superne in stigmata prope 0,3 mm. lat. bilammellata (lamellis semi-orbicularibus) ampliatis ; *Capsulis* fuscis lucidis oblongis subacutis, 3 mm. long. et 1,25 mm. lat., in calycibus persistentibus inclusis ; *Seminibus* globosis fuscis, 0,25 mm. lat., 2-gibbosis, testa minute reticulata.

TYPUS : "About 14 miles east of Pretoria on Tygerpoort road, on hillside" ; R.G.N. Young 3091 in Hb. Del., Geneva, Switzerland.

The following notes on the coloration of the *corolla* were made from living specimens : "Upper lip purple without, sordid-yellow within ; 3 lower lobes ± sordid-yellow on both surfaces, but darker and with some purple without ; throat purple-striped without, greenish yellow within ; but just above insertion of stamens there is a bright yellow patch, surrounded by purple".

I have observed much variation as to the presence or degree of development of the appendages on the filaments, even in neighbouring specimens.