

Zeitschrift: Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany
Herausgeber: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Band: 14 (1952-1953)

Artikel: De Hepaticis IV : an unpublished section of volume 6 of Stephani's Species Hepaticarum : the genus Marsupella
Autor: Bonner, C. E. B.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-880470>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 11.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

De Hepaticis IV

An unpublished section of volume 6 of Stephani's Species Hepaticarum : the genus Marsupella

by

C. E. B. BONNER

The reasons for publishing this portion of STEPHANI'S manuscript are essentially the same as those indicated in "*De Hepaticis II*" (*Candollea* **14**: 101. 1953) for the genus *Marchantia*, and will therefore not be repeated. All specimens cited are present in hb. G. unless otherwise specified.

Marsupella Dum.

(Cf. Stephani, *Species Hepaticarum* **2**: 12-31)

1. **M. aequiloba** Steph. ms.

Sterilis, fusco-brunnea, subnigra, profunde pulvinato-caespitosa. *Caulis* ad 3 cm. longus, parum longaeque ramosus. *Folia caulina* conferta, conduplicato-concava, in plano subquadrata (1,17 mm. longa, supra basin 1 mm. lata) fere ad medium usque inciso-biloba, sinu angusto, lobis porrectis, ovato-triangularis (0,4 mm. longis, 0,58 mm. latis) apice obtusis. *Cellulae* superae 18/18 μ trigonis majusculis acutis, basales 18/36 μ trigonis nullis.

TYPE: JAPAN, Echigo in Mte Ninoji, undated, *Okamura* 278 (Ex hb. Paris).

2. **M. africana** Steph. ms.

Sterilis, pusilla fusco-brunnea, dense pulvinata. *Caulis* ad 15 mm. longus simplex, basi flagelliferus, flagellis longis ramosis. *Folia caulina* conferta, oblique patula, conduplicato-concava, in plano subrotunda, marginibus arcte angusteque recurvis (1,33 mm. longa et lata) basi

cordatim ampliata, apice ad $1/5$ inciso-biloba, sinu recto, lobis late triangulatis obtusis. *Cellulae* sup. $12/12$ trigonis majusculis, bas. $14/28$ μ trigonis nullis, parietibus ubique validis. Reliqua desunt.

TYPE : KILIMANDJARO, 24 Oct. 1901, Uhlig 15 p.p.

Other specimen : Kilimandjaro, 300 m., 1901, Uhlig s.n.

3. **M. arctica** (Berggr.) Bryhn & Kaal. *Rep. 2nd Norwegian Arctic Exp. Fram 1898-1902*, 11 : 26. 1906 = *Sarcoscyphus emarginatus* var. *arcticus* Berggr. *Kungl. Svenska Vet.-Akad. Handl.* 13 : 96. 1875 = *Marsupella emarginata* var. *arctica* (Berggr.) Fry & Clark, *Hepaticae N. America*, Univ. Washington Publ. Biol. 6 : 232. 1943.

Sterilis, magna, gracillima, rigida, purpurea, in paludibus crasse pulvinata. *Caulis* ad 7 cm. longus, simplex, flagellis basalibus numerosis. *Folia caulina* remotiuscula, oblique patula, cucullato-inflexa, in plano subrotunda (2,25 mm. longa, medio 2,5 mm. lata) apice ad $1/4$ inciso-biloba, sinu recto, lobis late triangulatis acutis aequalibus. *Cellulae* sup. $18/18$ μ bas. $27/36$ μ trigonis majusculis. Reliqua desunt.

N. AMERICA, Ellesmere Land, circa 78° , 1899, Simmons s.n.

4. **M. chilensis** Steph. ms.

Sterilis, majuscula, gracillima, rigida, fusco-brunnea, subnigra, crasse pulvinato-caespitosa. *Caulis* ad 3 cm. longus, longe pinnatus et bipinnatus, ramis subapicalibus subfasciculatis. *Folia caulina* approximata, oblique patula, conduplicato-concava, in plano late obovato-obconica (1,25 mm. longa, medio 0,83 mm. lata) ad $1/3$ inciso-biloba, lobis aequalibus late triangulatis obtusis. *Cellulae* sup. $14/14$ μ trigonis parvis nodulosis, bas. $14/18$ μ parietibus validis, trigonis nullis.

TYPE : CHILE, s.d., Gay s.n., ex hb. Bescherelle.

5. **M. fosteri** Steph. ms.

Sterilis, parva, gracillima, rigida, flavo-rufescens, dense pulvinata. *Caulis* ad 35 mm. longus, simplex vel ramo longe pinnato praeditus, flagellis posticis brevibus sparsis. *Folia caulina* conferta, squarrose patula, in plano late reniformia (1,17 mm. longa, medio 1,58 mm. lata), basi cordato-ampliata, apice ad $1/5$ inciso-biloba, sinu latissimo, lobis late triangulatis obtusis. *Cellulae* marginales $14/18$ μ limbum distinctum formantes, subapicales $18/18$ μ trigonis magnis nodulosis, bas. $18/36$ μ parietibus validissimis. Reliqua desunt.

TYPE : U.S.A., Washington, Hamilton, Falls in Skagit River, Oct. 1904, A.S. Foster s.n.

6. **M. integrifolia** Steph. ms.

Dioica, pusilla, rigida, fusco-brunnea, pulvinato-caespitosa. *Caulis* ad 12 mm. longus, parum longeque ramosus, flagellis numerosis. *Folia*

caulina confertissima, conduplicato-concava, cauli appressa vel parum patula, in plano late ovata (0,67 mm. longa, medio 0,58 mm. lata) apice obtusa, integerrima. *Cellulae* sup. $14 \times 18 \mu$, bas. $18 \times 18 \mu$ parietibus validissimis. *Folia floralia* caulinis multo majora, late ovata (1,5 mm. longa, medio 1,33 mm. lata) apice breviter inciso-biloba, lobis rotundatis. *Perianthia* levia, magna, ovata (1,17 mm. longa, 0,75 mm. lata), foliis breviter coalitis, apice angustis, truncatis, minute denseque crenulatis.

TYPE : JAPAN, Obaya, 1200 m., 1904, *Faurie 1416*.

7. **M. japonica** Steph. ms.

Dioica, pusilla, gracillima, rigida, flavo-rufescens, dense pulvinata. *Caulis* ad 2 cm. longus, capillaceus, parum longeque ramosus, ramis simplicibus vel minute pinnulatis, flagellis posticis numerosis. *Folia caulina* remota, conduplicato-concava, squarrose patula, in plano subrotunda (0,67 mm. longa et lata) apice ad $1/6$ inciso-biloba, sinu lato, laciniis late triangulatis subacutis. *Cellulae* sup. $18/18 \mu$ trigonis nullis, bas. $18/27 \mu$ trigonis parvis, parietibus ubique tenuibus. *Inflorescentiae femineae* numerosae, omnes mutilatae.

TYPE : JAPAN, Daisen, 26 May 1899, *Faurie 411*.

8. **M. joergensenii** Schiffn. *Hep. eur. exs. No. 48*. 1901.

Dioica, minor, graciles, rigidula, pulvinato-caespitosa. *Caulis* ad 2 cm. longus sparsim irregulariterque ramosus. *Folia caulina* approximata, canaliculato-concava, superne squarrosa, recurva, in plano subrotundata (1,25 mm. longa et lata) apice ad $1/3$ inciso-biloba, lobis ovato-triangulatis obtusis. *Cellulae* sup. $18/18 \mu$, bas. $18/36 \mu$ parietibus validis, cuticula minute papillata. *Perianthia* (sterilia) ovato-oblonga, occulta, cum foliis floralibus usque ad medium connata, ore parvo truncato minute crenulato. *Folia floralia* caulinis similia, eis duplo longiora, apice ad $1/4$ inciso-biloba, lobis obtusis vel rotundatis.

TYPE : NORWAY, Hardanger, Raedal, 1000 m., July 1889, *Bryhn s.n.*, (Duplicate in hb Steph.-G.).

Other specimens : Drontheim, s.d., *Hagen s.n.*; Meraker ad rupes montis Fondjeld, 800 m., 1 Aug. 1892, *Bryhn s.n.*; Medolen, vallis Valdars, 1000 m., 9 Aug. 1894, *Bryhn s.n.*

9. **M. mikawana** Steph. ms.

Sterilis, minor, flaccida, brunnea, pulvinato-caespitosa, terricola. *Caulis* ad 15 mm. longus, simplex vel furcatus. *Folia caulina* conferta oblique patula, conduplicato-concava, in plano reniformia (1,33 mm. longa, 1,5 mm. lata), apice ad $1/5$ inciso-biloba, sinu recto, lobis late triangulatis aequalibus, apice obtusis. *Cellulae* sup. $18/18 \mu$, bas. $18/27 \mu$ trigonis magnis, acutis.

TYPE : JAPAN, Okazaki, Mikawa, 18 Jan. 1913, *Okamura 420*.

10. **M. rikuchuna** Steph. ms.

Sterilis, mediocris, rigidula, rufo-brunnea, terricola, dense depresso-caespitosa. *Caulis* ad 25 mm. longus, simplex vel parum longeque ramosus. *Folia caulina* remota, oblique patula, conduplicato-concava, in plano subrotunda (1,33 mm. longa, medio 1,25 mm. lata) basi inserta, apice ad 1/3 biloba, sinu recto obtuso, lobis inaequalibus, postico subduplo validiore et parum longiore. *Cellulae* 27/27 μ , bas. 36/45 μ trigonis majusc. acutis, parietibus tenuibus.

TYPE : JAPAN, Rikuchû, Mt. Sukawagadake, 16 Aug. 1912, *Okamura* 424.