

Zeitschrift: Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany
Herausgeber: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Band: 16 (1957-1958)

Artikel: Résultats des expéditions scientifiques genevoises au Népal en 1952 et 1954 (partie botanique) : 11. Caprifoliaceae
Autor: Weibel, Raymond
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-880421>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 29.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

RÉSULTATS DES EXPÉDITIONS SCIENTIFIQUES GENEVOISES AU NÉPAL
EN 1952 ET 1954 (PARTIE BOTANIQUE)

11. — Caprifoliaceae¹

par

Raymond WEIBEL

Leycesteria formosa Wall. in Roxb. *Fl. ind.*, ed. Carey, 2 : 182. 1824; Wall. *Pl. as. rar.* 2 : 21, t. 120. 1830.

DISTR. : Assam (Khasia), Himalaya, du Bhutan au Kumaon.

NÉPAL : Entre Benkar (27°46', 86°43') et Ghât (27°43', 86°43'), rive g. de la Bhote Kosi, exposition W., arbuste à branches retombantes haut de 1,50-2,50 m., fl. blanc-rosé, alt. 2620 m., 10 juin 1952, *Zimmermann* 743.

Lonicera angustifolia Wall. ex DC. *Prodr.* 4 : 337. 1830 = *Caprifolium angustifolium* O. Ktze, *Rev. Gen. Pl.* 1 : 274. 1891.

DISTR. : Himalaya, du Sikkim au Cachemire.

NÉPAL : Rive g. de la Kyāngshar Khola (environs de Monjo, 27°47', 86°44'), arbuste de 1,50 m. de haut, fl. blanc-crème, alt. 2860 m., 7 mai 1952, *Zimmermann* 429.

Lonicera litangensis Batalin in *Acta Hort. petrop.* 14 : 173. 1895.

DISTR. : Se-Tchouan, Tibet.

NÉPAL : En face des derniers chalets de Pheriche (27°54', 86°49'), exposition S.-W., pl. de 0,50-1 m., fl. jaune-verdâtre, alt. 4230 m., 16 mai 1952, *Zimmermann* 520 (det. Ch. Baehni).

¹ Cf., pour l'itinéraire suivi, l'article de A. ZIMMERMANN in *Candollea* 15 : 127. 1956. Toutes les plantes citées sont conservées dans les herbiers de Genève. On a fait suivre d'un indicatif les numéros pour lesquels un double a été déposé ailleurs.

Lonicera obovata Royle ex Hook. f. & Thoms. in *Journ. Proceed. linn. Soc.*, London, Bot. **2**: 169. 1858 = *L. parvifolia* Edgew. in *Trans. linn. Soc.*, London, **20**: 60. 1846, not Hayne, 1822 = *Caprifolium obovatum* O. Ktze, *Rev. Gen. Pl.* **1**: 274. 1891.

DISTR.: Himalaya, du Sikkim au Cachemire, Afghanistan.

NÉPAL : Au-dessous de Pheriche (27°54', 86°49'), rive dr. de l'Imja Khola et partout jusqu'à Namche Bazar, pl. haute de 30-80 cm., fl. blanc-rosé à l'extérieur, alt. 4100 m., 3 juin 1952, *Zimmermann 614* (det. Ch. Baehni).

Lonicera rupicola Hook. f. & Thoms. in *Journ. Proceed. linn. Soc.*, London, Bot. **2**: 168. 1858 = *Caprifolium rupicolum* O. Ktze, *Rev. Gen. Pl.* **1**: 274. 1891.

DISTR.: Tibet, Kumaon.

TIBET : Au pied du Menlungtse (28°01', 86°26'), en direction du Gaurisankar, dans les rochers, exposition S., arbuste de 0,5-1 m., fruits rouges, alt. 4620 m., 1 oct. 1954, *Zimmermann 1530*.

Sambucus adnata Wall. ex DC. *Prodr.* **4**: 322. 1830.

DISTR.: Se-Tchouan, Yunnan, Tibet, Sikkim, Népal.

NÉPAL : Près de Dorchpout, situé entre Salleri (27°29', 86°36') et Gârma (27°26', 86°35'), très répandu, pl. hautes de 0,20-1,50 m., fl. blanches, alt. 2365 m., 15 juin 1954, *Zimmermann 843* (det. S. Vautier et R. Weibel).

Triosteum hirsutum Wall. ex Roxb. *Fl. ind.*, ed. Carey, **2**: 180. 1824 ; C. B. Clarke ex Hook. f. *Fl. brit. Ind.* **3**: 8. 1880 = *T. himalayana* Wall., *l.c.*

DISTR.: Himalaya, du Sikkim au Kumaon.

NÉPAL : Tesinga (27°50', 86°44'), bord d'un ruisseau à l'ombre, fl. vertes striées de rouge surtout à l'intérieur, alt. 3420 m., 5 juin 1952, *Zimmermann 679*.

Viburnum cordifolium Wall. ex DC. *Prodr.* **4**: 327. 1830; Hook. f. *Fl. brit. Ind.* **3**: 6. 1880.

DISTR.: Se-Tchouan, Himalaya, du Bhutan au Kumaon.

NÉPAL : Col entre la Lumding Khola et Tanga (27°39', 86°37'), exposition E., arbre de 3-5 m., fl. blanches, alt. 3580 m., 13 juin 1952, *Zimmermann 795* (det. S. Vautier).

Viburnum cylindricum Buch.-Ham. ex Don, *Prodr. Fl. nepal.* : 142. 1825 = *V. coriaceum* Bl. *Bijdr. Fl. ned. Ind.* : 656. 1825 = *V. capitellatum* Wight & Arn. *Prodr.* : 388. 1834.

DISTR. : Java, Siam, Annam, Tonkin, Hou-pe, Se-Tchouan, Yunnan, Birmanie, Khasia, Himalaya, du Bhutan au Kumaon, Ceylan, Nilghirries.

NÉPAL : Entre Mānebhanjyāng ($27^{\circ}13'$, $86^{\circ}27'$) et la Sun Kosi, talus, exposition W., sous-bois, arbuste haut de 1,50 m. et plus, alt. 1500 m., 5 nov. 1954, *Zimmermann 2061*.

Viburnum erubescens Wall. ex DC. *Prodr.* 4 : 329. 1830; Wall. *Pl. as. rar.* 2 : 29, t. 134. 1831 = *V. wightianum* Wall. *Pl. as. rar.* 2 : 29. 1831 = *V. pubigerum* Wight & Arn. *Prodr.* : 389. 1834 = *V. prattii* Gräbner in *Engl. bot. Jahrb.* 29 : 584. 1901 = *Solenotinus erubescens* Oersted in *Vidensk. Medd. nat. For. Kjöbenh.* 12 : 295. 1860.

DISTR. : Hou-Pé, Chen-Si, Se-Tchouan; Himalaya, du Bhutan au Kumaon; Ceylan, Nilghirries.

NÉPAL : Au-dessous de Ghāt ($27^{\circ}43'$, $86^{\circ}43'$), rive dr. de la Bhothe Kosi, exposition E., fl. pendantes, blanc-crème, boutons légèrement rosés, alt. 2680 m., 10 juin 1952, *Zimmermann 734*; entre Chyāngma ($27^{\circ}34'$, $86^{\circ}22'$) et Setha ($27^{\circ}35'$, $86^{\circ}29'$), exposition S., arbuste de 1,50-3 m., fl. blanches, *Zimmermann 195*.

Viburnum mullaha Buch.-Ham. ex Don, *Prodr. Fl. nepal.* : 141, 1825 = *V. stellulatum* Wall. ex DC. *Prodr.* 4 : 327. 1830; Wall. *Pl. as. rar.* 2 : 54, t. 169. 1831 = *V. involucreatum* Wall. ex DC. *Prodr.* 4 : 327. 1830.

DISTR. : Se-Tchouan, Tonkin; Himalaya, du Sikkim au Cachemire.

NÉPAL : Entre Phuleli ($27^{\circ}34'$, $86^{\circ}39'$) et Tāksindu ($27^{\circ}35'$, $86^{\circ}38'$), exposition N.-E., arbuste de 2,50 m., fruits rouges, alt. 1700 m., 29 oct. 1954, *Zimmermann 1942*.

Viburnum nervosum Don, *Prodr. Fl. nepal.* : 141. 1825 = *V. grandiflorum* Wall. ex DC. *Prodr.* 4 : 329. 1830 = *Solenotinus nervosus* Oersted in *Vidensk. Medd. nat. For. Kjöbenh.* 12 : 295. 1860.

DISTR. : Se-Tchouan; Himalaya, du Sikkim au Cachemire.

NÉPAL : Entre Namche Bazar ($27^{\circ}49'$, $86^{\circ}43'$) et Thammu ($27^{\circ}49'$, $86^{\circ}41'$), exposition S., arbrisseau de 1,50 m., fl. blanches à calice rose, alt. 3400 m., 3 mai 1952, *Zimmermann 405*.

