Zeitschrift: Candollea: journal international de botanique systématique =

international journal of systematic botany

Herausgeber: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève

Band: 17 (1959-1961)

Artikel: Gentiana bavarica var. nov. toepfferi Leiris & Moreau nouvelle variété

violette de Gentiana bavarica L.

Autor: Moreau, Richard

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-880408

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 22.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Gentiana bavarica var. nov. toepfferi Leiris & Moreau nouvelle variété violette de Gentiana bavarica L.

par

Richard Moreau

(Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie, Besançon, France)

Au cours de nos herborisations d'août 1957, dans les montagnes de Samoëns (Haute-Savoie), en compagnie de M. H. DE LEIRIS, nous avons trouvé sur quelques dizaines de mètres carrés, une abondante floraison de *Gentiana bavarica* L. à fleurs violettes. Ces exemplaires étaient disséminés parmi d'autres pieds dont les pétales étaient normalement bleu foncé. Cette station se trouve sur une crête qui s'élève dans la région du Col d'Anterne, parmi des gazons dominant un petit escarpement calcaire. Cette station a été retrouvée dans le même état en août 1958 et en juillet 1959 par H. DE LEIRIS.

Cette découverte n'est pas sans importance car les variations de couleur sont très rares dans ce groupe de Gentianes. Seul BEAUVERD avait décrit, en 1911 (in *Bull. Soc. bot. Genève* ser. 2, 3: 305), un *G. bavarica* L. var. *discolor* Beauv., découvert au Rawyl, dans le Valais, entre 2200 et 2400 m. d'altitude. Cette variété diffère du type (corolle bleu foncé, feuilles caulinaires relativement allongées, calice à divisions atteignant presque le haut du tube de la corolle) par ses petites feuilles presque rondes, le calice à divisions plus courtes, atteignant à peine le milieu du tube, sa corolle d'un blanc pur à l'intérieur et d'une nuance mauve lilas sur la marge extérieure des lobes.

La variété *toepfferi* ¹ Leiris & Moreau présente une corolle d'un beau violet. Les sinus entre les lobes des pétales sont tachés de blanc. Le calice, dont les divisions atteignent les deux tiers du tube de la corolle, est également violacé. Les feuilles sont petites, arrondies à ovales.

Quelques pieds de *Gentiana bavarica* var. *toepfferi* ont été cultivés en 1957 et 1958 au Jardin Botanique de la Jaysinia, à Samoëns, Haute-Savoie (altitude 740 m. environ). Ils ont parfaitement proliféré et présentaient en 1958, de nombreuses pousses assez courtes, à feuilles petites, obovales; ils n'ont pas fleuri. Malheureusement, les pieds ont disparu en 1959.

¹ Nous dédions cette variété à l'écrivain suisse R. Toepffer, dont l'alerte récit publié au siècle dernier dans les *Nouvelles Genevoises*, contribua tant à faire connaître le Col d'Anterne.

Comme le signalait BEAUVERD à propos de sa variété discolor, la variété toepfferi est également très saillante par ses individus qui se rencontrent par touffes en compagnie du type à fleurs bleues.

DIAGNOSE:

Gentiana bavarica L. var. nov. toepfferi Leiris & Moreau, foliis caulinis calyceque brévioribus, corolla violacea a typo differt.

Hab. Gallia: haec nova varia invenitur in prato alpium, situm in regione loci qui vocatur « Col d'Anterne » et proximus est vico cui vulgo nomen est « Servoz ». Leg. ipse die 6 mensis Augustii 1957 et 2 mensis Augustii 1958.