

Zeitschrift: Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany
Herausgeber: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Band: 20 (1965)

Seite

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 07.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

seinem Garten in Valleyres. Da die kultivierten Exemplare stärke verzweigt und reichblütiger waren — alle übrigen Merkmale blieben jedoch unverändert! — und so äusserlich dem SIEBERSchen *D. aciphyllus* ähnlicher wurden, reduzierte BOISSIER den letzteren zur Varietät und taufte ihn 1867 *D. juniperinus* var. *sieberi*. 1964 schliesslich erfolgte die vorderhand letzte Bereicherung unserer Gruppe: die Entdeckung einer hier erstmals beschriebenen weiteren Art durch SNOGERUP und seine Begleiter am Südfuss des Berges Kédros.

1. Flores in eâdem plantâ aetate omnes subaequales (anthesi fere simultaneâ); calyces 10-13 mm longi

***Dianthus juniperinus* Sm.**, Trans. Lin. Soc. London (Bot.) Ser. 1, 2 : 303. 1794.

≡ *Caryophyllus creticus*, *arboreus*, *Juniperi folio* Tournefort, Corollarium Institutionum rei herbariae: 23. 1703.

« *D. arboreus* » L., p.p., non s. str.

2. Calyces 10-11 mm longi; petala pallide rosea non punctata

Dianthus juniperinus* Sm. ssp. *juniperinus

Frutex humilis; *folia* surculorum aciformia, dense conferta, plerumque 2-3 cm longa, parum glaucescentia; *caules* floriferi valde robusti, 8-20 cm longi, ad nodos saepe geniculati, simplices vel supra parum ramulosi; flores in apice caulium 2-3ni, ramulorum 1-2ni aggregati: *squamae* calycinae, mucrone gracili 1-2 mm longo excluso, dimidium calycis parvi, 10-11 mm longi aequantes; *petalorum* lamina obovato-cuneata, 3-4 mm lata, pallide rosea, saepe fere alba, impunctata, breviter dentata.

HABITAT: in rupestribus calcareis montium circa fauces Samariâ in parte occidentali provinciae Sfakiâ cretae ad altitudinem 1400-1750 m.

SPECIMINA VISA. CRETA: *Gundelsheimer et Tournefort*, typus (LINN, holo-, ex photographia IDC); prov. Sfakiâ: montes ad orientem faucium Samariâ, 1700 m, *Zaffran* 3-16 (Gr); inter jugum Xilóskala et fontem Elinoséli, 1400-1500 m, *Greuter* 4635 (Gr, Z); prope fontem Elinoséli, *Baldacci* 54 (FI, G, G-Bu, W-Hal); derupta orientalia montis Strifomádi, 1750 m, *Greuter* 4781 (Gr).

- 2* Calyces 12-13 mm longi; petala laete rosea, purpureo-punctata

***Dianthus juniperinus* Sm. ssp. *heldreichii* W.Gr., ssp. nov.** ¹

« *D. juniperinus* » auct. non Sm.: Raulin, Act. Soc. Linn. Bordeaux 74 : 412 p.p., et al.

Frutex humilis; *folia* surculorum aciformia, dense conferta, plerumque 1½-2 cm longa, juvenilia glauca; *caules* floriferi graciles, recti, 6-10 cm longi, simplices (in plantis cultis elatiores ramosi), in apice 1-2- flori; *squamae* calycinae, mucrone gracili 1-3 mm longo incluso, dimidium calycis parvi 12-13 mm longi aequantes; *petalorum* lamina obovato-cuneata, 5-6 mm lata, laete rosea, sparse purpureo-punctata, breviter dentata vel crenata.

¹ Clarissimo detectori, de exploratione florum creticae optime merito, dedicatus.