Zeitschrift: Candollea : journal international de botanique systématique =

international journal of systematic botany

Herausgeber: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève

Band: 37 (1982)

Heft: 2

Artikel: Herborisations en Corse durant le mois de mai 1980

Autor: Gamisans, Jacques / Thiébaud, Marc-André

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-880040

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 21.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Herborisations en Corse durant le mois de mai 1980

JACQUES GAMISANS & MARC-ANDRÉ THIÉBAUD

RÉSUMÉ

GAMISANS, J. & M.-A. THIÉBAUD (1982). Herborisations en Corse durant le mois de mai 1980. *Candollea* 37: 525-533. En français, résumé anglais.

Les auteurs citent et localisent quelques taxons intéressants ou peu abondants en Corse. La plupart des localités sont nouvelles. *Herniaria glabra* et *Trifolium resupinatum* var. *majus* sont signalés pour la première fois sur l'île. Quelques remarques d'ordre floristique, morphologique ou phytogéographique sont faites.

ASTRACT

GAMISANS, J. & M.-A. THIÉBAUD (1982). Herborizations in Corsica during the month of May 1980. *Candollea* 37: 525-533. In French, English abstract.

The authors cite localities of some interesting or rare plants of Corsica, most of them are new stations. *Herniaria glabra* and *Trifolium resupinatum* var. *majus* have not yet been known from the island. Some floristic, morphological and phytogeographical remarks are given.

Par cette petite note, les auteurs mettent en évidence quelques observations floristiques faites du 7 au 13 mai 1980 dans la partie ouest de la Corse et plus précisément entre la baie de Crovani au nord, et le cap de Muro au sud. Les herborisations entreprises dans cette région leurs ont permis de dénombrer plusieurs localités nouvelles pour des taxons intéressants ou peu abondants en Corse, ainsi qu'une espèce et une variété nouvelles pour la flore de l'île; leur nom sera précédé d'une étoile (*) dans le texte.

CODEN: CNDLAR ISSN: 0373-2967 37(2) 525 (1982) Toutes les roches-mères des secteurs visités sont granitiques.

L'état des plantes au moment de leur récolte a été noté par des abréviations (fl. = florens; fr. = fructifer; ster. = sterilis).

La localisation et les particularités des taxons cités ont été notées suivant les principes déjà adoptés par l'un des auteurs dans ses "Contributions à l'étude de la flore de la Corse" (GAMISANS 1970, 1971, 1972a, 1972b, 1973, 1974, 1977, 1981). Lorsqu'ils présentaient un intérêt pour certains taxons, seuls les synonymes les plus courants ont été donnés, sans précision particulière; ils sont alors précédés de l'abréviation "Syn.".

Les exsiccata de tous les taxons cités figurent dans les herbiers respectifs des auteurs, soit à la Faculté des sciences de Saint-Jérôme, Marseille, ainsi qu'au Conservatoire botanique de Genève.

Gymnospermae

Cupressaceae

Juniperus oxycedrus L., Sp. Pl.: 1038. 1753.

- Fangu, Perticatu, au bord du sentier sur le versant N. de Bocca di Melza, 700 m, 12.5.1980, Gamisans & Thiébaud, G. 8516, Th. 01453, (fr.).

Les fruits très gros de ce spécimen sont proches de ceux du subsp. *macrocarpa* (Sibth. & Sm.) Ball; toutefois l'écololgie de ce spécimen le rapproche du subsp. *oxycedrus*; il en va de même pour ses feuilles qui, bien qu'intermédiaires entre celles des deux sous-espèces, sont plus proches de celles appartenant au subsp. *oxycedrus*.

Angiospermae-Monocotyledones

Alismataceae

Baldellia ranunculoides (L.) Parl., Nuovi Gen. Sp. Monocot.: 58. 1854. Syn.: *Alisma ranunculoides* L.

- Au N.E. de Galeria, marais sur la rive gauche du Fangu, 2 m, 11.5.1980, Gamisans & Thiébaud, G. 8495, Th. 01408, (fl. et fr.).

Liliaceae

Allium acutiflorum Loisel. in Desv., Jour. Bot. Rédigé 2: 279. 1809.

- Galeria, place du village, rochers maritimes au N.W. de la plage, au terminus de la route, rhyolites, 11.5.1980, *Gamisans & Thiébaud*, G. 8479, Th. 01397, (fl. et fr.).

Cette espèce a été citée pour la première fois en Corse par GREUTER (1974) au N. de Porto sur des rochers maritimes à environ 150 m d'altitude.

Asparagus albus L., Sp. Pl.: 314. 1753.

- Au S. du golfe d'Ajaccio, Capo di Muro, maquis près de la crête, 160 m, 7.5.1980, Gamisans & Thiébaud, G. 8335, Th. 01204, (ster.).

Amaryllidaceae

Leucojum longifolium (Gay ex M. J. Roemer) Gren. in Gren. & Godron, Fl. Fr. 3: 252. 1855.

- Filosorma, ruisseau de Candela, rive gauche, maquis ouvert, 190 m, rhyolites, 10.5.1980, *Gamisans & Thiébaud*, G. 8469, Th. 01350, (fl.).
- Filosorma, ruisseau de Bocca Bianca, rive gauche, rocailles, 320 m, rhyolites, 10.5.1980, *Gamisans & Thiébaud*, G. 8466, Th. 01353, (fl.).

Orchidaceae

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 3. 1962, subsp. insularis (Sommier) Soó, loc. cit. (1962).

Syn.: Orchis sambucina L.

A l'E. de Bastelicaccia, au bord dela route D 203, 1300 m à l'E. du Ponte di a Petra, 200 m, 8.5.1980, Gamisans & Thiébaud, G. 8382, (fl.).

BRIQUET (1910: 371) attribue ce taxon aux étages montagnard et subalpin, plus rarement à l'étage inférieur. Le spécimen cité ici correspond donc à une station de très basse altitude; il a par ailleurs une grande stature puisqu'il atteint 35 cm.

- Orchis provincialis Balbis, Mém. Acad. Sci. (Turin) 1805-1808: 20. 1806, subsp. pauciflora (Ten.) Camus, Monogr. Orchid. Europ.: 160. 1908.
- Filosorma, ruisseau de Bocca Bianca, rive gauche, maquis élevé, 285 m, rhyolites, 10.5.1980, *Gamisans & Thiébaud, G. 8471*, (fl.).

Ce spécimen possède un éperon particulièrement court, bien plus court que l'ovaire.

Cyperaceae

Eleocharis uniglumis (Link) Schultes in Schultes & Schultes fil., Mantissa 2: 88. 1824.

Syn.: Scirpus uniglumis Link

- Au N.E. de Galeria, marais sur la rive gauche du Fangu, 2 m, 11.5.1980, Gamisans & Thiébaud, G. 8499, Th. 01412, (fl.).

Cette espèce, qui n'avait jamais été citée en Corse, a toutefois déjà été récoltée sur l'île par R. Deschatres en 1972 (c.o.).

Angiospermae-Dicotyledones

Rafflesiaceae

Cytinus hypocistis (L.) L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 602. 1767, subsp. hypocistis

- A l'E. de Bastelicaccia, 500 m en amont du Ponte di a Petra, talus frais au bord de la route D 203, 100 m, 8.5.1980, Gamisans & Thiébaud, G. 8373, Th. 01263, (fl.), sur Cistus salvifolius
- Au S. du golfe d'Ajaccio, Capo di Muro, sentier près de la crête, cistaie, 180 m, 7.5.1980, Gamisans & Thiébaud, G. 8345, Th. 01202, (fl.), sur Cistus monspeliensis.

Cytinus ruber (Fourr.) Komarov, Fl. URSS 5: 442. 1936.

Syn.: Cytinus hypocistis subsp. kermesinus Guss.

 A l'E. de Bastelicaccia, 1300 m en amont du Ponte di a Petra, limite du maquis au bord de la route D 203, 200 m, 8.5.1980, Gamisans & Thiébaud, G. 8376, Th. 01270, (fl.), sur Cistus creticus - Au S. du golfe d'Ajaccio, Capo di Muro, sentier sur la crête, cistaie, 180 m, 7.5.1980, Gamisans & Thiébaud, G. 8344, Th. 01201, (fl.), sur Cistus creticus.

Caryophyllaceae

*Herniaria glabra L., Sp. Pl.: 218. 1753.

- Plage de Porticcio (golfe d'Ajaccio), sables en arrière de la plage, 8.5.1980, *Gamisans & Thiébaud, G. 8399, Th. 01309*, (fl. et fr.).

Ce taxon, relativement fréquent sur le pourtour de la Méditerranée n'avait jamais été rencontré en Corse, il représente donc une espèce nouvelle pour la flore de l'île.

Saxifragaceae

Saxifraga corsica (Duby) Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 642. 1849, subsp. corsica

Syn.: S. russii auct. non J. & C. Presl

- Fangu/Perticatu, Bocca di Melza, versant N., tout près du col, rocailles, 760 m, 12.5.1980, *Gamisans & Thiébaud, G. 8530, Th. 01438*, (fl.).

Leguminosae

Lathyrus articulatus L. Sp. Pl.: 731. 1753.

- Marine de Bussaglia, rochers maritimes, 5 m, 9.5.1980, Gamisans & Thiébaud, G. 8427, Th. 01345, (fl. et fr.).

Les fleurs de ce spécimen sont relativement petites (10-12 mm); les pédoncules de l'inflorescence sont courts (1-2 cm seulement). Par ces caractères, ce spécimen se distingue notablement du type.

Trifolium resupinatum L. Sp. Pl.: 771. 1753, var. resupinatum

- Au S. du golfe d'Ajaccio, port de Coti-Chiavari, sables maritimes à l'embouchure du Zirione, 7.5.1980, *Gamisans & Thiébaud*, *G.* 8331, *Th.* 01232, (fl. et fr.).

★Trifolium resupinatum L. Sp. Pl.: 771. 1753, var. majus Boiss.

Syn.: T. suaveolens Willd.

- Au N.E. de Galeria, marais sur la rive gauche du Fangu, 2 m, 11.5.1980, Gamisans & Thiébaud, G. 8503, Th. 01419, (fl.).

Ce var. majus ne semble pas avoir déjà été signalé en Corse, il s'agit donc vraisemblablement d'un taxon nouveau pour la flore de l'île.

Ulex europaeus L. Sp. Pl.: 741. 1753, subsp. europaeus

 Au S. du golfe d'Ajaccio, port de Coti-Chiavari, au bord du Zirione, 100 m en arrière de la plage, sables, 7.5.1980, Gamisans & Thiébaud, G. 8325, Th. 01250, (fl.).

Cette espèce n'était pas signalée au S. de Sagone.

Thymelaeaceae

Thymelaea tartonraira (L.) All., Fl. Pedem. 1: 133. 1785, subsp. tartonraira

- Au S. du golfe d'Ajaccio, embouchure du Zirione, près du port de Chiavari, rochers maritimes, 7.5.1980, *Gamisans & Thiébaud, G. 8317, Th. 01229,* (fl.).

Tamaricaceae

Tamarix africana Poiret, Voy. Barb. 2: 139. 1789.

Syn.: T. hispanica Boiss.

- Secteur de Galeria, galets en bordure de l'étang de Crovani, 11.5.1980, Gamisans & Thiébaud, G. 8506, Th. 01421, (fl. et fr.).

Plumbaginaceae

Armeria leucocephala Salzm. ex Koch, Flora (Regensb.) 6: 712. 1823.

- Fangu, Perticatu, Bocca di melza, versant N., rochers près du ruisseau de Parma, 100 m en amont du pont, 735 m, 12.5.1980, *Gamisans & Thiébaud*, G. 8535, Th. 01431, (fl.).

Station d'altitude relativement basse pour cette espèce en Corse.

Rubiaceae

Cruciata laevipes Opiz, Seznam: 34. 1852.

Syn.: Galium cruciata (L.) Scop.

- A l'E. de Bastelicaccia, 1300 m en amont du Ponte di a Petra, limite du maquis au bord de la route D 203, 200 m, 8.5.1980, Gamisans & Thiébaud, G. 8367, Th. 01271, (fl.).

Galium palustre L., Sp. Pl.: 105. 1753.

- Au N.E. de Galeria, marais sur la rive gauche du Fangu, 2 m, 11.5.1980, Gamisans & Thiébaud, G. 8497, Th. 01410, (ster.).

Galium scabrum L., Sp. Pl.: 108. 1753.

Syn.: G. ellipticum Willd. ex Hornem.

- A l'E. de Bastelicaccia, 500 m en amont du Ponte di a Petra, maquis au bord de la route D 203, 100 m, 8.5.1980, Gamisans & Thiébaud, G. 8389, Th. 01256, (ster.).
- Filosorma, gorges de la Taïta, maquis en bordure du torrent, 595 m, 10.5.1980, Gamisans & Thiébaud, G. 8460, Th. 01367, (ster.).

Galium spurium L., Sp. Pl.: 106. 1753.

Syn.: G. vaillantii DC.

- Filosorma, gorges de la Taïta, au niveau d'anciennes bergeries, pelouse sur dalles, rhyolites, 595 m, 10.5.1980, *Gamisans & Thiébaud*, G. 8450, (fl. et fr.).
- Golfe d'Ajaccio, plage de Porticcio, sables maritimes en arrière de la plage, 8.5.1980, *Gamisans & Thiébaud, G. 8351, Th. 01301*, (fl. et fr.).

Compositae

Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass., Dict. Sci. Nat. 48: 426. 1827, subsp. bulbosa Syn.: Crepis bulbosa (L.) Tausch

- Au S. du golfe d'Ajaccio, port de Coti-Chiavari, sables sur la plage près de l'embouchure du Zirione, 7.5.1980, *Gamisans & Thiébaud*, G. 8338, Th. 01246, (fl. et fr.).

Carduus cephalanthus Viv., Fl. Cors.: 14. 1824.

- Secteur de Galeria, baie de Crovani, sables en arrière de la plage, 11.5.1980, Gamisans & Thiébaud, Th. 01426, (fl. et fr.).
- Secteur de Galeria, baie de Crovani, galets entre la plage et l'étang de Crovani, 11.5.1980, Gamisans & Thiébaud, G. 8508, (fl. et fr.).

Evax pygmaea (L.) Brot., Fl. Lusit. 1: 363. 1804.

- Golfe de Girolata, plage de la Cala di Tuara, pelouse entre la plage et les rochers, 13.5.1980, Gamisans & Thiébaud, Th. 01459, (fl.).
- Au S. du golfe d'Ajaccio, port de Coti-Chiavari, sables maritimes, 7.5.1980, Gamisans & Thiébaud, G. 8324, Th. 01237, (fl.).

Hypochoeris robertia Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital., nov. ser. 17: 655. 1910. Syn.: *Robertia taraxacoides* (Loisel.) DC.

- Perticatu, chemin de Bocca di Melza, maquis, 450 m, 12.5.1980, Gamisans & Thiébaud, Th. 01435, (fl. et fr.).
- Perticatu, fruticées basses au bord du sentier de Bocca di Melza, 700 m, 12.5.1980, Gamisans & Thiébaud, G. 8534, (fl.).

Urospermum picroides (L.) Scop. ex F. W. Schmidt, Samml. Phys. Aufs. Naturk.: 275. 1795.

- Golfe de Sagone, plage du Liamone, sables maritimes, 9.5.1980, Gamisans & Thiébaud, G. 8435, Th. 01326, (fl. et fr.).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

BRIQUET, J. (1910). Prodrome de la flore corse. 1. Genève & Bâle.

GAMISANS, J. (1970). Contribution à l'étude de la flore de la Corse. Candollea 25: 105-141.

- (1971). Contribution à l'étude de la flore de la Corse. II. Candollea 26: 309-358.
- (1972a). Contribution à l'étude de la flore de la Corse. III. Candollea 27: 47-63.
- (1972b). Contribution à l'étude de la flore de la Corse. IV. Leucanthemum corsicum (Less.) DC.: une espèce mal connue. *Candollea* 27: 189-209.
- (1973). Contribution à l'étude de la flore de la Corse. V. Candollea 28: 39-82.
- (1974). Contribution à l'étude de la flore de la Corse. VI. Candollea 29: 39-55.
- (1977). Contribution à l'étude de la flore de la Corse. VII. Candollea 32: 51-72.

GAMISANS, J. (1981). Contribution à l'étude de la flore de la Corse. VIII. *Candollea* 36: 1-17. GREUTER, W. (1974). Note sur deux espèces nouvelles pour la Corse. *Bull. Soc. Bot. France* 121: 145-148.

Adresses des auteurs: J. G.: Laboratoire de botanique et écologie méditerranéenne, Faculté des sciences de Saint-Jérôme, rue H.-Poincaré, F-13 397 Marseille Cédex 4.

M.-A. T.: Conservatoire botanique de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy/GE.