

Zeitschrift: Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany
Herausgeber: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Band: 38 (1983)
Heft: 1

Artikel: Contribution à l'étude de la flore de la Corse : IX
Autor: Gamisans, Jacques
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-879860>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 18.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Contribution à l'étude de la flore de la Corse. IX

JACQUES GAMISANS

RÉSUMÉ

GAMISANS, J. (1983). Contribution à l'étude de la flore de la Corse. IX. *Candollea* 38: 217-235. En français, résumé anglais.

L'auteur cite de nouvelles localités pour des plantes rares ou disséminées dans l'île. *Scirpus hudsonianus* est signalé pour la première fois en Corse. Quelques remarques d'ordre taxonomique ou nomenclatural sont faites à propos de certains taxons (genres *Ranunculus*, *Colutea*, *Euphrasia*).

ABSTRACT

GAMISANS, J. (1983). Contribution to study of flora from Corsica. IX. *Candollea* 38: 217-235. In French, English abstract.

The author gives new localities of plants which are rare or scattered on the island. *Scirpus hudsonianus* is reported for the first time on Corsica. Some taxa are commented from a taxonomic or nomenclatural point of view (*Ranunculus*, *Colutea*, *Euphrasia*).

Cette neuvième contribution concerne essentiellement des récoltes effectuées en Corse en 1980 et 1981. Les citations sont faites suivant les mêmes principes que pour la "Contribution VIII" (GAMISANS, 1981). L'ordre de présentation des taxons a toutefois été modifié. Les grands groupes (*Pteridophyta*, *Gymnospermae*, *Angiospermae-Monocotyledones*, *Angiospermae-Dicotyledones*) sont présentés dans l'ordre du "Prodrome de la flore corse" (Briquet, 1910). A l'intérieur de ces groupes, les familles sont citées dans l'ordre de "Flora europaea" (TUTIN & al., 1964-1980). Dans les familles, les genres et espèces sont classés par ordre alphabétique.

Je tiens à remercier la direction et les conservateurs du Conservatoire botanique de Genève pour leur accueil et leur aide lors de mes travaux dans les herbiers.

Pteridophyta

Lycopodiaceae

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., Hort. Monac.: 3. 1829, subsp. **selago**.

- Massif du Cintu, Capu Stranciacone, versant N.E., *Huperzio-Caricetum*, 1800 m 26.7.1980, *Gamisans 9135* (fr.); Val d'Ascu, vallon de Corbica, *Alnetum suaveolentis* en bordure du torrent, 1650 m, 10.7.1982, *Gamisans 10 083* (fr.).

Aspleniaceae

Asplenium viride Hudson, Fl. Angl.: 385. 1762.

- Massif du Cintu, Monte Cintu, crête entre la "Pointe des éboulis" et le sommet, rochers, 2600 m, 30.7.1980, *Gamisans 9151* (fr.).

Athyriaceae

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman, Phytologist 4: 371. 1851.

- Massif du Cintu, Val d'Ascu, vallon de Corbica, *Alnetum suaveolentis*, 1650 m, 10.7.1982, *Gamisans 10 082* (ster.).

Angiospermae-Monocotyledones

Liliaceae

Allium pendulinum Ten., Fl. Nap. 1: 168, tab. 31. 1811.

- Massif du San Petrone, Valle di Moriani, crête entre le Monte Nappuccio et Bocca Sambuche, versant N.E., bois d'*Alnus cordata*, 800 m, 27.5.1981, *Gamisans 9252* (fl.); Valle d'Alesani, entre Pietricaggiu et Piobetta, près du torrent de Compoli, ravin frais à *Alnus cordata*, 700 m, 29.5.1981, *Gamisans 9295* (fl.).
- Massif du Renosu, vallée du Taravu, 500 m au S. de Palneca, chênaie caducifoliée, 800 m, 21.6.1980, *Gamisans 8952* (fr.).

Allium ursinum L., Sp. Pl.: 300. 1753, subsp. **ursinum**.

- Massif du San Petrone, Valle di Moriani, crête entre le Monte Nappuccio et Bocca Sambuche, versant N.E., bois d'*Alnus cordata*, 800 m, 27.5.1981, *Gamisans 9250* (fl. et fr.); San Giovanni di Moriani, au N.W. de Sant'Emilianu, bord de ruisseau, 680 m, 31.5.1981, *Gamisans 9327* (fl.); vallée de la Casaluna, 1 km au S. de Carticasi, bois mixte frais, 800 m, 28.5.1981, *Gamisans 9268* (fl. et fr.).

Allium vineale L., Sp. Pl.: 299. 1753.

- Massif du Cintu, vallée du Fangu, vallon de Perticatu, replat sur dalles rocheuses, 650 m, 19.7.1980, *Gamisans 9111* (ster.).

Les spécimens récoltés appartiennent au var. *compactum* (Thuill.) Cosson & Germain.

Gagea fistulosa (Ramond) Ker-Gawler, J. Sci. Arts (London) 1: 180. 1816.

- Massif de l'Incudine, entre Bocca di Verde et Punta di Pratu, rive droite du torrent d'Orziolu, pelouse (*Sagino-Caricetum*) sur la crête, 1700 m, 24.6.1980, *Gamisans 9033* (fl.).

Lilium bulbiferum L., Sp. Pl.: 302. 1753, subsp. **croceum** (Chaix) Baker, J. Linn. Soc. London (Bot.) 14: 238. 1874.

- Massif du Cintu, Haut Filosorma, torrent de Maghine, rive gauche, vire herbeuse, 1150 m, 20.7.1980, *Gamisans 9115* (fl.); Haut Fangu, sous le Capu Tafonatu, replat herbeux en bordure du torrent, 820 m, 16.7.1980, *Gamisans 9050* (fl.).

Ornithogalum pyrenaicum L., Sp. Pl.: 306. 1753.

- Massif du San Petrone, Castagniccia, entre San Gavinu d'Ampugnani et la source minérale de Caldane, ostryaie, 150 m, 30.5.1981, *Gamisans 9317* (fl.); Valle d'Alesani, entre Pietricaggiu et Piobetta, près du pont sur le Compoli, châtaigneraie claire, 29.5.1981, *Gamisans 9298* (fl.).
- Massif du Rotondu, 1 km au S. de Venacu, en bordure de la route nationale, chênaie pubescente, 480 m, 22.7.1980, *Gamisans 9128* (fr.).

Paris quadrifolia L., Sp. Pl.: 367. 1753.

- Massif de l'Incudine, Pianu di Cuscione, source du ruisseau de Cruce, *Alnetum suaveolentis*, 1600 m, 6.8.1980, *Gamisans 9181* (fr.).

En Corse, cette espèce n'était connue que de trois localités (forêts d'Aitone, Vizzavona et Marmanu (BRIQUET, 1910: 322). Elle n'était pas signalée dans le massif de l'Incudine.

Juncaceae

Luzula luzulina (Vill.) Dalla-Torre & Sarnth., Fl. Tirol. 6(1): 426. 1906.

- Massif du Cintu, Val d'Ascu, vallon de Ghierosa, *Alnetum suaveolentis*, 1620 m, 7.7.1982, *Gamisans 10 073* (fl. et fr.).

Luzula nivea (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Fr. ed. 3, 3: 158. 1805.

- Massif du Renosu, vallée du Taravu, *Pyrolo-Fagetum* en bordure du torrent, 1080 m, 2.8.1980, *Gamisans 9169* (fl. et fr.).

Gramineae

Anthoxanthum aristatum Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 638. 1842, subsp. **aristatum**.

- Massif de l'Incudine, vallée du Taravu, à l'ouest de Petretu, en bordure de la route D 757, près du pont de Copala, cistaie, 40 m, 19.6.1980, *Gamisans 8842* (fl.); même route, au S.W. de Petretu, près du pont sur le ruisseau de Penta, pelouse, 255 m, 19.6.1980, *Gamisans 8870* (fl.); même route, 1.5 km au S.W. de Moca, pelouse, 430 m, 19.6.1980, *Gamisans 8891* (fl.).

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C. Presl, Fl. Čechica: 17. 1819, subsp. **sardoum** (E. Schmid) *Gamisans*, *Candollea* 29: 46. 1974.

- Massif de l'Incudine, Pianu di Cuscione, "a Pianella", non loin du Tintoraju, *Berberido-Genistetum*, 1200 m, 21.6.1980, *Gamisans 8946* (fl.).

Bromus benekenii (Lange) Trimen, Jour. Bot. (London) 10: 333. 1872.

- Massif du Cintu, secteur du Monte Traunatu, vallée de la Terrigota, au pied des aiguilles de Rundinaia, couloirs herbeux, 1370 m, 22.8.1976, *Gamisans 6290* (fr.).
- Massif de l'Incudine, Haut Taravu, chemin Virion, à 1 km de Bocca di Verde, 1250 m, 21.8.1975, *Gamisans 5161* (fr.); vallée du Taravu, bord du torrent vers 1080 m, 2.8.1980, *Gamisans 9166* (fl.).

Ce taxon a déjà été observé plusieurs fois en Corse par R. Deschatres (c.o.). Il n'était préalablement pas signalé dans l'île où il a été probablement négligé car confondu avec *B. ramosus*.

Bromus ramosus Hudson, Fl. Angl. ed. 1: 40. 1762.

- Massif du San Petrone, Castagniccia, entre San Gavinu d'Ampugnani et la source minérale de Caldane, ostryaie, 150 m, 30.5.1981, *Gamisans 9316* (fl.).

Elymus caninus (L.) L., Fl. Suec. ed. 2: 39. 1755; syn.: *Agropyrum caninum* (L.) Beauv., *Agrost.*: 146. 1812.

- Massif du Renosu, vallée du Taravu, bord du torrent, *Pyrolo-Fagetum*, 1080 m, 2.8.1980, *Gamisans 9161bis* (fl.).

Cette espèce n'était signalée que dans la forêt de Marmanu et près de Ghisoni (BRIQUET, 1910: 185).

Festuca gigantea (L.) Vill., Hist. Pl. Dauph. 2: 110. 1787.

- Massif du Renosu, vallée du Taravu, bord du torrent dans la hêtraie, 1080 m, 2.8.1980, *Gamisans 9164* (fl.).

Cette espèce, très rare en Corse, n'était signalée que dans la forêt de Marmanu (BRIQUET, 1910: 155).

Holcus mollis L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1305. 1759, subsp. **mollis**.

- Massif du Renosu, vallée du Taravu, bord du torrent vers 1080 m, 2.8.1980, *Gamisans 9168* (fl. et fr.).

Hordelymus europaeus (L.) C. O. Harz, Samenk.: 114. 1885; syn.: *Elymus europaeus* L., Mantissa: 35. 1767.

- Massif du Renosu, vallée du Taravu, bord du torrent dans la hêtraie, 1080 m, 2.8.1980, *Gamisans 9161* (fl.).

Milium effusum L., Sp. Pl.: 61. 1753.

- Massif de l'Incudine, vallée du Taravu, forêt de Piattono, en bordure de la route D 69, 1030 m, forêt de Laricio, 23.6.1980, *Gamisans 8999* (fl. et fr.).

Poa pratensis L., Sp. Pl.: 67. 1753, subsp. **pratensis**.

- Massif du San Petrone, route D 15, 1 km au S. de Carticasi, bois mixte ouvert sur la rive droite de la Casaluna, 800 m, 28.5.1981, *Gamisans 9271* (fl.).
- Massif de l'Incudine, vallée du Taravu, 1 km à l'E. de Corranu, jeune futaie de *Quercus ilex*, 500 m, 20.6.1980, *Gamisans 8980* (fl.).

Poa trivialis L., Sp. Pl.: 67. 1753, subsp. **sylvicola** (Guss.) H. Lindb. fil., Öfvers. Finska Vet. Soc. Förhandl. 48(13): 9. 1906.

- Massif de l'Incudine, Pianu di Cuscione, ruisseau de Cruce, bord du ruisseau sous la Funtana di Vallecionca, 1460 m, 4.8.1980, *Gamisans 9177* (fl.).

Cyperaceae

Carex olbiensis Jordan, Obs. Pl. Crit. 3: 241. 1846.

- Massif du Rotondu, Venacais, 1 km au S. de Venacu, "Acqua Fredda", chânaie pubescente, 480 m, 22.7.1980, *Gamisans 9127* (fr.).
- Massif du Renosu, vallée du Taravu, 1 km au S.E. de Giovicacce près de la route D 228, "Bavara" versant N., fûtaie claire de *Quercus pubescens*, 590 m, 20.6.1980, *Gamisans 8893* (fr.).

Dans l'île, cette espèce était essentiellement signalée dans le Cap Corse (BRIQUET, 1910: 215).

Carex sylvatica Hudson, Fl. Angl.: 353. 1762, subsp. **sylvatica**.

- Massif du San Petrone, Castagniccia, entre San Gavinu d'Ampugnani et la source minérale de Caldane, châtaigneraie à *Ostrya*, 200 m, 30.5.1981, *Gamisans 9320* (fl. et fr.); Valle di Moriani, au-dessus de San Nicolau, jeune châtaigneraie, 500 m, 27.5.1981, *Gamisans 9236* (fl. et fr.); Valle di Moriani, San Giovanni, Cruce di Zuccheru, versant N., vallon à *Alnus cor-*

data et *Buxus*, 650 m, 31.5.1981, *Gamisans* 9326 (fl. et fr.); Valle di Casaluna, 1 km au S. de Carticasi, bois mixte, 800 m, 28.5.1981, *Gamisans* 9263 (fl. et fr.).

- Massif du Cintu, Val d'Ascu, vallon de Corbica, cascade de Rotella, hautes herbes dans la forêt de laricio près du torrent, 1019 m, 10.7.1982, *Gamisans* 10 088 (fr.).

★ **Scirpus hudsonianus** (Michx) Fernald, *Rhodora* 8: 161. 1906; syn.: *Trichoporum alpinum* (L.) Pers., *Syn. Pl.* 1: 70. 1805; *Eriophorum alpinum* L. *Sp. Pl.*: 77. 1753.

- Massif du Cintu, Bocca Culaghia, versant E., 1750 m, *Pinguiculo-Trichophoretum*, 25.7.1980, *Gamisans* 9137 (fl. et fr.).

Cette espèce n'était préalablement pas connue en Corse.

Scirpus maritimus L., *Sp. Pl.*: 51. 1753, subsp. **maritimus**.

- Galeria, marais, rive gauche du Fangu, 11.5.1980, *Gamisans & Thiébaud*, *G.* 8501 (fl.).

Orchidaceae

Cephalanthera rubra (L.) L. C. M. Richard, *Orchid. Eur. Annot.*: 38. 1817.

- Massif du San Petrone, Castagniccia, Parata, torrent de Verbicina, rive droite, 600 m, 29.5.1981, *Gamisans* s.n. (fl.).

Epipactis helleborine (L.) Crantz, *Stirp. Austr. ed. 2*, 2: 467. 1769; syn.: *Helleborine latifolia* (L.) Moench.

- Venacais, 1.5 km au N. de Vivariu, chênaie pubescente en bordure de la route nationale, 500 m, 22.7.1980, *Gamisans* 9129 (fl.).

Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz, *Kunigl. Svenska Vet.-Akad. Handl. nov. ser.* 21: 232. 1800.

- Massif du San Petrone, Castagniccia, à l'E. de Stazzona, sous le hameau, châtaigneraie envahie par *Alnus cordata* et *Ostrya*, 470 m, schistes, 29.5.1981 (fl.).

Orchis coriophora L., *Sp. Pl.*: 940. 1753, subsp. **fragans** (Pollini) Sudre, *Fl. Toulous.*: 187. 1907.

- Massif du Cap Corse, Monte San Colombanu, versant N. 850 m, pelouse, 22.6.1971, *Gamisans* 194 (fl.); crête entre Campu Bernardu et Monte San Leonardu, 900 m, schistes, pelouse, 22.6.1971, *Gamisans* 182 (fl.).
- Massif du Renosu, vallée du Taravu, route D 757, 1 km au S. des bains de Guitera, entre Bocca d'Isoli et Pont de Piconca, maquis, 450 m, 20.6.1980, *Gamisans* 8928 (fl.).

Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard, *Orchid. Eur. Annot.*: 36. 1817.

- Massif du Cintu, vallée du Fangu, vallon de Perticatu, pelouse en bordure du torrent, 190 m, 14.7.1980, *Gamisans* 9041 (fl.).

Angiospermae-Dicotyledones

Chenopodiaceae

Chenopodium botrys L., *Sp. Pl.*: 219. 1753.

- Massif du San Petrone, Castagniccia, Verdesse, pont en aval de San Pancraziu, 400 m, bord de chemin, 13.7.1982, *Gamisans* 10 101 (fl. et fr.).

Cette espèce est rare en Corse. La seule indication récente la concernant est due à M. CONRAD (1973: 6) qui l'a signalée près de l'étang de Biguglia.

Polygonaceae

Rumex obtusifolius L., *Sp. Pl.*: 335. 1753, subsp. **obtusifolius**.

- Massif de l'Incudine, vallée du Taravu, 1.5 km au S.E. de Moca, en bordure de la route départementale 757, pelouse, 430 m, 19.6.1980, *Gamisans* 8891 (fl. et fr.).

Caryophyllaceae

Dianthus armeria L., *Sp. Pl.*: 410. 1753, subsp. **armeria**.

- Massif du San Petrone, Castagniccia, route D 205, en aval de La Porta, près des maisons de Razzola, pelouse, 284 m, 13.7.1982, *Gamisans* 10 094 (fl. et fr.); Verdesse, en aval de San Pancraziu, pelouse, 400 m, 13.7.1982, *Gamisans* 10 100 (fl. et fr.).
- Massif du Rotondu, Venacais, 1.5 km au N. de Vivariu, pelouse dans une clairière de la chênaie pubescente, 500 m, 22.7.1980, *Gamisans* 9124 (fl. et fr.).

Lychnis flos-cuculi L., *Sp. Pl.*: 436. 1753, subsp. **flos-cuculi**.

- Massif du San Petrone, Castagniccia, vallée du Fiumaltu, au-dessous de Stazzona, châtaigneraie, 350 m, 29.5.1981, *Gamisans* 9290 (fl.).

Silene nicaeensis All., *Mélang. Philos. Math. Soc. Roy. Turin (Misc. Taur.)* 5: 88. 1774.

- Côte orientale, plage de San Pellegrinu, au S. d'Anghione, 31.5.1981, *Gamisans* 9340 (fl. et fr.); au S. de Moriani plage, "a Merendella", plage sableuse, 28.5.1981, *Gamisans* 9283 (fl.).

Silene paradoxa L., Sp. Pl. ed. 2: 1673. 1763.

- Massif du Cintu, Val d'Ascu, Funtana d'Ossu di Pinu, fruticée basse (*Helichryso-Genistetum*), 760 m, 8.7.1982, *Gamisans 10 078* (fl. et fr.).

Silene viridiflora L., Sp. Pl. ed. 2: 597. 1763.

- Massif du San Petrone, au N. de Bustanicu, Punta Chiosella, versant N.E., rive droite du torrent, bois mixte ouvert, 920 m, 28.5.1981, *Gamisans 9273* (fl.).
- Massif du Renosu, au N. de Bastelica, en bordure de la route D 27, chênaie pubescente, 800 m, 19.7.1982, *Gamisans 10 135* (fr.).

Cette espèce n'était préalablement connue en Corse que de Solenzara et de Zicavu (BRIQUET, 1910: 561).

Ranunculaceae

Ranunculus auricomus L., Sp. Pl.: 551. 1753.

- Massif de l'Incudine, Pianu di Cuscione, ruisseau de Veracolngu, en amont du pont-gué, formations à *Juniperus nana* installées sur pozzines, 1480 m, 17.7.1982, *Gamisans 10 112* (fr.).

Cette espèce n'était connue en Corse que d'une localité située légèrement en aval de celle-ci (GAMISANS, 1970: 124). Les populations corses diffèrent notablement de celles des Alpes et des Pyrénées. Le nombre de feuilles basales varie de 1 à 2(-3), alors qu'il est généralement égal ou supérieur à 5 dans les populations pyrénéennes ou alpiennes. De même, le limbe de ces feuilles basales est en Corse entier ou peu profondément échancré (et non pas toujours plus ou moins profondément échancré). Seule une étude plus approfondie de ces populations corses permettra de préciser si elles peuvent constituer un taxon particulier.

Ranunculus nemorosus DC., Reg. Veg. Syst. Nat. 1: 280. 1817.

- Massif de l'Incudine, Pianu di Cuscione, ruisseau de Veracolngu, en amont du pont-gué, formations à *Juniperus nana* installées sur pozzines, 1480 m, 17.7.1982, *Gamisans 10 114* (fl. et fr.).

La découverte de cette nouvelle population confirme bien les caractères morphologiques déjà précisés pour les *R. nemorosus* de Corse (GAMISANS, 1977: 59).

Fumariaceae

Corydalis pumila (Host) Reichenb., Fl. Germ. Excurs.: 698. 1832.

- Massif de l'Incudine, entre Bocca di Verde et Punta di Pratu, rive droite du ruisseau d'Orziolu, pelouse, 1700 m, 24.6.1980, *Gamisans 9032* (fl. et fr.).

Dans le massif de l'Incudine, cette espèce n'était signalée qu'au Pianu di Cuscione (BRIQUET, 1910: 13).

Cruciferae

Cardamine impatiens L., Sp. Pl.: 655. 1753.

- Massif du San Petrone, Valle di Moriani, crête entre Napuccio et Bocca Sambuche, versant N.E., bois d'*Alnus cordata*, 800 m, 27.5.1981, *Gamisans* 9249 (fl. et fr.).

Lepidium hirtum (L.) Sm., Comp. Fl. Brit., ed. 3: 98. 1818, subsp. **nebrodense** (Rafin) Thell., Viert. Naturf. Ges. Zürich 51: 154. 1906.

- Massif de l'Incudine, Pianu di Cuscione, Punta di l'Erta, versant S., 1200 m, formations à *Cytisus scoparius*, 21.6.1980, *Gamisans* 8942 (fl. et fr.).

Le subsp. *nebrodense* est bien présent en Corse, contrairement à l'avis de BRIQUET (1910: 102).

Crassulaceae

Sedum annuum L., Sp. Pl.: 432. 1753.

- Massif de l'Incudine, vallée du Taravu, ravin de Fornacce, rive droite, rochers dans la forêt claire de Laricio, 1080 m, 22.6.1980, *Gamisans* 8985 (fl. et fr.).

Sedum monregalense Balbis, Mém. Acad. Sci. Turin 7: 339. 1804.

- Massif du Cintu, Filosorma, rive gauche du ruisseau de Maghine, rochers, 1150 m, 20.7.1980, *Gamisans* 9113 (fl. et fr.).

Leguminosae

Colutea arborescens L., Sp. Pl.: 723. 1753.

- Massif du San Petrone, Valle d'Alesani, en bordure de la route D 17, à 4 km au S.E. de Chiatra, maquis, 140 m, 28.5.1981, *Gamisans* 9274 (fl. et fr.).

Les spécimens récoltés ont des ovaires velus seulement sur la suture ventrale ou à ses abords immédiats. Ils apparaissent ainsi intermédiaires entre le subsp. *arborescens* et le subsp. *gallica* Browicz, Monogr. Bot. (Warszawa) 14: 128. 1963.

Lathyrus niger (L.) Bernh., Syst. Verz. Erfürt: 248. 1800, subsp. **jordani** (Ten.) Arcangeli, Comp. Fl. Ital.: 198. 1882.

- Massif du San Petrone, au N. de Bustanicu, Punta Chiosella, au N.E., rive droite du torrent, bois mixte ouvert, 920 m, 28.5.1981, *Gamisans* 9272 (fl.).

Ononis variegata L., Sp. Pl.: 717. 1753.

- Côte orientale, plage de San Pellegrinu, au S. d'Anghione, 31.5.1981, *Gamisans 9344* (fl. et fr.).

Oxalidaceae

Oxalis acetosella L., Sp. Pl.: 433. 1753.

- Massif du San Petrone, Valle d'Alesani, entre Pietricaggiu et Piobetta, près du pont sur le Compoli, ravin à *Alnus cordata*, 700 m, 29.5.1981, *Gamisans 9296* (fr.).

Auparavant, cette espèce n'était connue que des environs d'Orezza et de la haute vallée du Ruddy dans le massif du Cintu (GAMISANS, 1977: 62).

Euphorbiaceae

Euphorbia dulcis L., Sp. Pl.: 457. 1753.

- Massif du San Petrone, Castagniccia, entre San Gavinu d'Ampugnani et la source minérale de Caldane, taillis de *Castanea* et *Ostrya*, 200 m, 30.5.1981, *Gamisans 9318* (fr.); San Gavinu d'Ampugnani, au-dessus de Nepita, bois mixte, à l'ubac, 450 m, 30.5.1981, *Gamisans 9314* (fr.); Orezza, route D 46 sous Granajola, châtaigneraie fraîche, 480 m, 30.5.1981, *Gamisans 9322* (fr.); Valle di Casaluna, au N. de Bustanicu, Punta di Merza, versant E., hêtraie au bord du torrent, 980 m, 28.5.1981, *Gamisans 9259* (fl. et fr.).
- Massif de l'Incudine, Pianu di Cuscione, ruisseau de Cruce, légèrement en aval de la source, formations à *Juniperus nana*, 1490 m, 4.8.1980, *Gamisans 9175* (fr.).

Cette espèce est peu répandue en Corse; dans le massif du San Petrone, elle n'était préalablement connue que d'Orezza (LITARDIÈRE in BRIQUET, 1936: 78).

Euphorbia pterococca Brot., Fl. Lusit. 2: 312. 1804.

- Massif du Cintu, groupe du Traunatu, Pratu di Giovellina, maquis ouvert, 700 m, 25.8.1976, *Gamisans 6319* (fr.).

Dans la moitié nord de la Corse, cette espèce n'était signalée que près du Bevincu (LITARDIÈRE in BRIQUET, 1936: 82).

Aceraceae

Acer obtusatum Waldst. & Kit. ex Willd., Sp. Pl. 4(2): 984. 1806.

- Massif de l'Incudine, sentier de Marmanu à Bocca Taoria, forêt de Lario, 1300 m, 8.8.1980, *Gamisans 9185* (ster.).

Cette espèce est très localisée en Corse et pour les massifs du Renosu et de l'Incudine elle était seulement connue du versant S. de bocca di Verde (GAMISANS, 1981: 11).

Acer platanoides L., Sp. Pl.: 1055. 1753.

- Massif du San Petrone, Castagniccia, Orezza, route D 46 au-dessous de Granajola, chataigneraie fraîche, 480 m, 30.5.1981, *Gamisans 9323* (ster.).

Cette espèce a également été observée dans le parc d'une propriété privée à Granajola. Il n'est pas exclu que les spécimens cités ci-dessus aient pour origine le porte-graine noté dans la propriété en question, distante d'environ 1 km. Cet érable a également été noté dans le secteur du col de Capronale (massif du Cintu, voir ALLIER & LACOSTE, 1979: 77). L'*Acer platanoides* n'était préalablement pas signalé en Corse.

Acer pseudoplatanus L., Sp. Pl.: 1054. 1753.

- Massif du San Petrone, Valle di Moriani, Nappucciu, versant E., bord de ruisseau, 600 m, 27.5.1981, *Gamisans 9246* (ster.).

Hypericaceae

Hypericum androsaemum L., Sp. Pl.: 784. 1753.

- Massif du San Pedrone, Castagniccia, entre San Gavinu d'Ampugnani et la source minérale de Caldane, taillis mixte de *Castanea* et *Ostrya*, 200 m, 30.5.1981, *Gamisans 9321* (ster. et fr.).

Cette espèce, très rare en Corse, n'était connue dans le massif du San Petrone que près d'Orezza (LITARDIÈRE *in* BRIQUET, 1936: 143).

Hypericum montanum L., Fl. Suec. ed. 2: 266. 1755.

- Massif du Cintu, Filosorma, rive gauche du ruisseau de Maghine, forêt de Laricio, 1150 m, 20.7.1980, *Gamisans 9112* (fl.).

Cistaceae

Cistus laurifolius L., Sp. Pl.: 523. 1753.

- Massif de l'Incudine, sentier de Marmanu à Bocca Taoria, en bordure du sentier, dans une forêt claire de *Pinus pinaster*, 1200 m, 8.8.1980, *Gamisans 9186* (fr. et ster.).

Cette localité, déjà connue par M. Conrad, est très proche du ravin de l'Ariola, "locus classicus" de cette espèce en Corse. Les spécimens récoltés se rapportent incontestablement au var. *atlanticus* Pitard, ainsi que l'a fort bien noté R. Deschatres (M. Conrad, c.o.). Les populations corses sont très peu denses et ne semblent guère à l'aise dans ce biotope, quoiqu'elles s'y maintiennent depuis au moins 1899. L'introduction accidentelle en Corse avec des semences

ou des plants de cèdres venant d'Afrique du Nord et apportés à Marmanu, est probable, ainsi que l'a suggéré R. Deschatres (M. Conrad, c.o.).

Umbelliferae

Myrrhoides nodosa (L.) Cannon, Feddes Repert. 79: 65. 1968; syn.: *Physocaulos nodosus* (L.) Koch, Syn. ed. 2: 348. 1843.

- Massif du Renosu, bassin du Taravu, vallée du Fiumicellu, route D 26, 500 m au S. de Forciolu, "Castanicia", chênaie mixte anthropisée, 400 m, 19.6.1980, *Gamisans* 8882 (fr.).

Cette espèce n'était préalablement connue que des environs de Calenzana (massif du Cintu) et de Pietralba (massif de Tenda, voir LITARDIÈRE in BRIQUET, 1938: 47).

Oenanthe silaifolia Bieb., Fl. Taur.-Cauc. 3: 232. 1819.

- Massif de l'Incudine, vallée du Taravu, route D 757 au N.E. de Bicchisanu, Punta di Campitelli, versant N., maquis ouvert, 420 m, 19.6.1980, *Gamisans* 8874 (fl. et fr.).

Seseli djianeae Gamisans, Candollea 27: 49. 1972.

- Massif du Cintu, Haut Fangu, en amont du couvent de Sainte-Marie, rochers rhyolitiques en bordure du torrent, 380 m, 16.7.1980, *Gamisans* 9051 (fl.). Cette espèce est plus fréquente en amont (au-dessus de 700 m, Gamisans obs.).

Cet endémique corse très localisé n'était préalablement connu que du Val de Giarghia Minuta (Gamisans, l.c.).

Sison amomum L., Sp. Pl.: 252. 1753.

- Massif du San Petrone, Castagniccia, vallée du Fium'Altu, fond de la vallée près de Casette, bois mixte en bordure d'un ruisseau, 220 m, 13.7.1982, *Gamisans* 10 096 (fl.).

Pyrolaceae

Pyrola minor L., Sp. Pl.: 396. 1753.

- Massif du Renosu, vallée du Taravu, *Pyrolo-Fagetum* au bord du torrent, 1080 m, 2.8.1980, *Gamisans* 9167 (fr.).

Primulaceae

Lysimachia vulgaris L., Sp. Pl.: 146. 1753.

- Côte orientale, Castellare di Casinca, plage d'Anghione, *Alnetum* en arrière de la plage, 28.7.1980, *Gamisans* 9142 (fl. et fr.).

Boraginaceae

Lithospermum officinale L., Sp. Pl.: 132. 1753.

- Massif du San Petrone, Valle di Moriani, Nappucciu, versant E., buxaie ouverte, 750 m, 27.5.1981, *Gamisans* 9243 (fl.).

Myosotis congesta R. J. Shuttlew. ex Albert & Reyn., Coup d'Œil Fl. Toulon Hyères: 16. 1891.

- Massif de l'Incudine, vallée du Taravu, forêt de Saint-Antoine, cote 1147 au S. de la source des trois ministres, clairière, 1120 m, 23.6.1980, *Gamisans* 8994 (fr.).

Cette espèce semble rare en Corse ou peut-être a-t-elle été souvent négligée ou confondue avec *M. ramosissima* Rochel. Elle est indiquée dans l'île par Grau & Merxmüller (in TUTIN & al., 1972: 113).

Labiatae

Calamintha grandiflora (L.) Moench, Meth.: 408. 1794.

- Massif du Renosu, vallée du Taravu, *Pyrolo-Fagetum* sur la rive droite du torrent, 1080 m, 23.6.1980, *Gamisans* 9005 (ster.); ibid., 2.8.1980, *Gamisans* 9160 (fl.).
- Massif de l'Incudine, sentier de Marmanu à Bocca Taoria, rive droite de l'Ariola, bord de source, 1280 m, 8.8.1980, *Gamisans* 9187 (fl.).

Cette espèce n'était préalablement connue en Corse que de deux localités (GAMISANS, 1977: 66).

Lamium corsicum Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 679. 1853.

- Massif du Cintu, Bassin d'Ascu, vallon de Ghierosa (affluent du Manica), *Berberido-Genistetum*, 1600 m, 7.7.1982, *Gamisans* 10 070 (fl.).

Scrophulariaceae

Cymbalaria hepaticifolia (Poiret) Wettst. in Engler & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. 4(3b): 58. 1891.

- Massif du San Petrone, Castagniccia, Pruno d'Ampugnani, 600 m, au S.S.-W. du village, maquis très frais, 430 m, 30.5.1981, *Gamisans* s.n. (fl.).

Cette localité correspond à une altitude exceptionnellement basse pour cette espèce en Corse.

Euphrasia salisburgensis Funck, Bot. Taschenb. 1794: 190. 1794, subsp. *corsica* Towns. ex Chabert, Bull. Herb. Boiss. ser. 2, 2(6): 513. 1902.

- Massif du Cintu, crête de Maghine, près de la Mufrella, *Geo-Phleetum*, 1950 m, 26.7.1980, *Gamisans* 9132 (fl.).

Au sein d'*Euphrasia salisburgensis*, les populations corses se singularisent par un certain nombre de caractères qui permettent de les considérer comme un taxon particulier. Le choix du nom retenu pour ce taxon est basé sur les considérations suivantes:

- avant 1902, deux “nomina nuda” existent pour désigner ce taxon corse: *Euphrasia corsica* Towns., Jour. Bot. 22: 166 et *E. salisburgensis* var. *pumila* Cosson in Kralik, Pl. Cors. Exsic. n° 710a.;
- CHABERT (1902b: 513) cite *Euphrasia salisburgensis Corsica* Towns. et donne comme synonyme *E. salisburgensis* var. *pumila* Cosson. Il décrit de manière détaillée ce taxon, validant par là le “nomen nudum” de Townsend. ROUY (1909: 154) indique *E. nemorosa* Race *E. nana* Rouy dont il donne une description et cite comme synonyme *E. corsica* Towns. et *E. salisburgensis* var. *pumila* Cosson;
- la description de Chabert ne permet pas de valider le nom d'*E. salisburgensis* var. *pumila* puisqu'il n'est cité qu'en tant que synonyme. Ainsi les seuls noms validement publiés sont: a) *E. salisburgensis Corsica* Towns. ex Chabert (1902). Chabert ne précise pas le rang infraspécifique, il parle de “micromorphes” ou “sous-espèces” ou “races” (CHABERT, 1902a: 130, 131); b) *E. nemorosa* Race *nana* Rouy (1909). Le rang de race chez Rouy est un rang supplémentaire s'intercalant entre subsp. et var.

En considérant le rang imprécis de Chabert comme une sous-espèce, le nom valide le plus ancien est donc celui qui a été retenu.

Le lectotypus de ce nom est à rechercher dans le matériel de Townsend ou, à défaut, dans l'exsiccata de Kralik n° 710a, également cité par Chabert.

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, Hist. Pl. Palat. 2: 177. 1777; syn.: *R. major* L., nom. ambig.

- Massif du Renosu, vallée du Taravu, route D 128, 400 m au S. de Tassu, forêt mixte anthropisée, 800 m, 20.6.1980, *Gamisans 8930* (fl. et fr.).

Cette espèce a été introduite avec des semences de foin dans les prairies de fauche de la vallée du Taravu.

Scrophularia nodosa L., Sp. Pl.: 619. 1753.

- Massif du San Petrone, Castagniccia, entre Valle d'Orezza et Parata, bord du ruisseau de Verbicina, bois mixte, 470 m, 29.5.1981, *Gamisans s.n.* (fl.).

Cette espèce est rare en Corse (GAMISANS, 1971: 345).

Scrophularia peregrina L., Sp. Pl.: 621. 1753.

- Massif du Cap Corse, crête entre Serra di Pignu et Monte San Colombanu, rochers ombragés, 800 m, 21.6.1971, *Gamisans 132* (fr.).

- Massif du San Petrone, Castagniccia, Piazzole, vieux mur, 500 m, 29.5.1981, *Gamisans 9287* (fl. et fr.); Valle d'Alesani, entre Pietricaggiu et Piobetta, près du pont sur le Compoli, clairière, 700 m, 29.5.1981 (fl.).

Scrophularia trifoliata L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1114. 1759.

- Massif du Cap Corse, crête entre Serra di Pignu et Monte San Colombanu, rochers ombragés, 850 m, 21.6.1971, *Gamisans 157* (fl.).
- Massif du San Pedrone, Valle di Moriani, San Nicolau, bord de source, 300 m, 27.5.1981, *Gamisans 9239* (fl.); Santa Reparata di Moriani, 1 km au S.E. du hameau de Forci, bord de sentier, 650 m, 27.5.1981, *Gamisans 9254* (fl.).

Verbascum rotundifolium Ten., Fl. Nap. 1, Prodr.: 66. 1811, subsp. **conocarpum** (Moris) I. K. Ferguson, Bot. Jour. Linn. Soc. 65: 269. 1972.

- Massif du Cintu, val d'Ascu, vallon de Ghieriosa (affluent du Manica) *Berberido-Genistetum*, 1300 m, 7.7.1982, *Gamisans 10 062* (fr.).
- Massif du Rotondu, Monte Rotondu, versant S., Val de Manganelu, *Berberido-Genistetum*, 1700 m, 21.7.1982, *Gamisans 10 115* (fr.).

Veronica anagallis-aquatica L., Sp. Pl.: 12. 1753.

- Massif du San Petrone, Valle di Moriani, Santa Reparata, hameau de Forci, bord de ruisseau, 620 m, 27.5.1981, *Gamisans 9253* (fl. et fr.).

Veronica montana L., Cent. Pl. 1: 3. 1755.

- Massif du San Petrone, Castagniccia, entre San Gavinu d'Ampugnani et la source minérale de Caldane, bois mixte (*Castanea, Ostrya*), 200 m, 30.5.1981, *Gamisans 9319* (fl. et fr.); San Gavinu d'Ampugnani, au-dessus de Nepita, à l'ubac, bois mixte (*Castanea, Alnus cordata*), 450 m, 30.5.1981, *Gamisans 9315* (fl. et fr.); Valle di Moriani, crête entre Napuciu et Bocca Sambuche, versant N.E., bois d'*Alnus cordata*, 800 m, 27.5.1981, *Gamisans 9248* (fl. et fr.); Valle d'Alesani, entre Pietricaggiu et Piobetta, près du pont de Compoli, ravin à *Alnus cordata*, 700 m, 29.5.1981, *Gamisans 9297* (fl.).
- Massif du Renosu, vallée du Taravu, hêtraie en bordure du torrent, 1100 m, 23.6.1980, *Gamisans 9004* (fl. et fr.).

Veronica serpyllifolia L., Sp. Pl.: 12. 1753, subsp. **serpyllifolia**.

- Massif du San Petrone, au N. de Bustanicu, Punta di Merza, versant W.S.W., hêtraie en bordure du torrent, 980 m, 28.5.1981, *Gamisans 9261* (fl. et fr.).

Rubiaceae

Asperula laevigata L., Mantissa: 38. 1767.

- Massif du Renosu, vallée du Taravu, route D 128, 1 km au N.W. de Giovi-cacce, sarrothamnaie, 700 m, 20.6.1980, *Gamisans 8910* (fl.).
- Massif de l'Incudine, vallée du Taravu, route D 757, au pont de Copala, à l'W. de Petretu, cistaie, 40 m, 19.6.1980, *Gamisans 8844* (fr.).

Crucianella maritima L., Sp. Pl.: 109. 1753.

- Côte orientale, plage d'Anghione, dunes fixées en arrière de la plage, 2 m, 28.7.1980, *Gamisans 9144* (fl.); plage de San Pellegrinu, au S. d'Anghione, sables, 31.5.1981, *Gamisans 9338* (fl.).

Galium bernardii Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 23. 1850.

- Massif du Rotondu, vallon de Taola, crête de Punta Corbaia, *Paronychio-Armerietum genistetosum*, 1830 m, 10.7.1979, *Gamisans s.n.* (fl.).

Ehrendorfer & Krendl (*in* TUTIN & al., 1976: 25) situent cette espèce près de *G. lucidum*. En fait, les nervures sont de type *G. corrudaefolium* (bien qu'il n'y ait pas de papilles sur la tige et que les feuilles soient plus larges). C'est un bon taxon autonome dans ce groupe. Ses fleurs sont rouges (80% des cas) mais parfois blanches.

Galium divaricatum Pourret ex Lam., Encycl. Méth. Bot. 2: 580. 1788.

- Massif du Renosu, vallée du Taravu, en bordure de la route D 83, 1 km à l'E. de Corranu, 500 m, fruticée basse, 20.6.1980, *Gamisans s.n.*
- Massif de l'Incudine, vallée du Taravu, Pont de Saint-Antoine, fruticée basse en bordure de la route D 69, 846 m, 23.6.1980, *Gamisans 9016* (fl. et fr.).

Galium odoratum (L.) Scop., Fl. Carn. ed. 2, 1: 105. 1771.

- Massif du San Petrone, 1 km au S. de Carticasi, près du pont sur la Casaluna, bois mixte, 800 m, 28.5.1981, *Gamisans 9265* (fl. et fr.); au N. de Bustanicu, Punta di Merza, versant W.S.W., hêtraie en bordure de torrent, 980 m, 28.5.1981, *Gamisans 9257* (fl.).
- Massif du Renosu, vallée du Taravu, près du pont de la Dispensa, 1.2 km au S. de Palneca, chênaie mixte, 750 m, 21.6.1980, *Gamisans 8975* (fl.).

Galium parisiense L., Sp. Pl.: 108. 1753.

- Massif du Renosu, en bordure de la route D 83, 1 km à l'E. de Corranu, cistaie, 500 m, 20.6.1980, *Gamisans 8919* (fr.).
- Massif de l'Incudine, vallée du Taravu, en bordure de la route D 757 à l'W. de Petretu, près du pont sur le ruisseau de Penta, pelouse, 255 m, 19.6.1980, *Gamisans 8861bis* (fr.).

Galium rotundifolium L., Sp. Pl.: 108. 1753.

- Massif du Cintu, Filosorma, entre Taitia et Cavicchia, vallon de Bocca Bianca, 530 m, 18.7.1980, *Gamisans 9057* (fr.).

C'est une des localités de plus basse altitude notée pour cette espèce en Corse.

Galium spurium L., Sp. Pl.: 106. 1753.

- Massif du San Petrone, Valle d'Alesani, entre Pietricaggiu et Piobetta, au niveau du pont sur le ruisseau de Compoli, vieille châtaigneraie anthropisée, 700 m, 29.5.1981, *Gamisans 9294* (fl. et fr.).

*Dipsacaceae***Knautia integrifolia** (L.) Bertol., Fl. Ital. 2: 32. 1835.

- Massif du Cintu, Haut Fangu, en amont du couvent de Sainte Marie, rocailles rhyolitiques, 400 m, 16.7.1980, *Gamisans 9045* (fl. et fr.).
- Côte occidentale, vallée du Taravu, près de l'étang de Tanchiccia, au N.E. de Porto-Pollu, 50 m, maquis, 18.6.1980, *Gamisans 8836* (fl.).

*Compositae***Anthemis maritima** L., Sp. Pl.: 893. 1753.

- Côte orientale, Castellare di Casinca, plage d'Anghione, dunes fixées, 28.7.1980, *Gamisans 9147* (fl.); plage de San Pellegrinu, au S. d'Anghione, sables, 31.5.1981, *Gamisans 9341* (fl. et fr.).

Centaurea sphaerocephala L., Sp. Pl.: 916. 1753, subsp. **sphaerocephala** (incl. subsp. **corsica** (Gad.) Nyman).

- Côte orientale, au S. de Moriani-plage, "a Merendella", plage sableuse, 28.5.1981, *Gamisans 9278* (fl. et fr.).

Chamaemelum mixtum (L.) All., Fl. Pedem. 1: 185. 1785.

- Côte orientale, au S. de Moriani-plage, "a Merendella", plage sableuse, 28.5.1981, *Gamisans 9280* (fl. et fr.).

Crepis bellidifolia Loisel., Fl. Gall.: 527. 1807.

- Massif de l'Incudine, vallée de Taravu, près du pont de Saint-Antoine, *Helichryso-Genistetum*, 846 m, 23.6.1980, *Gamisans 9019* (fl.); Pianu di Cuscione, Ossu Longu, *Berberido-Genistetum*, 1210 m, 22.6.1980, *Gamisans 9009* (fl.); Punta di l'Erta, versant S., formations à *Cytisus scoparius*, 1200 m, 21.6.1980, *Gamisans 8939* (fl.).

Doronicum grandiflorum Lam., Encycl. Méth. Bot. 2: 313. 1786.

- Massif du Cintu, Val d'Ascu, vallon de Corbica, bord du torrent, cailloutis, 1650 m, 10.7.1982, *Gamisans 10 085* (fl.).

Erigeron paolii Gamisans, Candollea 32: 66. 1977.

- Massif du Cintu, Monte Cintu, versant N. à l'W. du lac d'Argentu, *Geophleetum*, 2400 m, 30.7.1980, *Gamisans 9152* (fl. et fr.).

Galactites tomentosa Moench, Meth.: 558. 1794, var. **integrifolia** Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 355. 1841.

- Massif du Cintu, Filosorma, vallon de Taitia, rive droite du torrent, rocailles rhyolitiques, 750 m, 18.7.1980, *Gamisans 8060* (fl. et fr.); Haut Fangu, rocailles, 400 m, 16.7.1980, *Gamisans 9047* (fl.).

Leucanthemum vulgare Lam., Fl. Fr. 2: 137. 1779.

- Massif du Renosu, vallée du Taravu, 400 m au S. de Tassu, forêt mixte anthropisée, 800 m, 20.6.1980, *Gamisans 8932* (fl. et fr.).

Dans la vallée du Taravu, cette espèce a été introduite au niveau des prairies de fauche et se répand, très localement, dans d'autres groupements.

Logfia arvensis (L.) J. Holub, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 33: 432. 1975.

- Massif de l'Incudine, Pianu di Cuscione, légèrement en amont du Ponte di Valpine, *Berberido-Genistetum*, 1250 m, 22.6.1980, *Gamisans 8982* (fl.).

Petasites albus (L.) Gaertner, Fruct. Sem. Pl. 2: 406. 1791.

- Massif du San Petrone, vallée de la Casaluna, 1 km au S. de Carticasi, suintement au bord de la route, 800 m, 28.5.1981, *Gamisans 9269* (fr.); Castagniccia, bord du torrent de Polverosu, 380 m, 30.5.1981, *Gamisans 9324* (ster.); Valle di Moriani, San Giovanni, versant N.W. de Sant'Emilianu, bord de ruisseau, 650 m, 31.5.1981, *Gamisans 9328* (ster.).
- Massif du Renosu, vallée du Taravu, en bordure du torrent, *Pyrolo-Fagetum*, 1100 m, 23.6.1980, *Gamisans 9006* (ster.).

Cette espèce n'était préalablement signalée en Corse que dans le massif du San Petrone, essentiellement en Castagniccia, (LITARDIÈRE, 1948: 221).

Prenanthes purpurea L., Sp. Pl.: 797. 1753.

- Massif du Cintu, Filosorma, vallon de Taitia, bord du torrent, maquis frais, 750 m, 18.7.1980, *Gamisans 9059* (fl.).
- Massif du Renosu, vallée du Taravu, en bordure du torrent, *Pyrolo-Fagetum*, 1100 m, 2.8.1980, *Gamisans 9165* (fl.).

Santolina chamaecyparissus L., Sp. Pl.: 842. 1753, subsp. **insularis** (Genn. ex Fiori) Yeo, Bot. Jour. Linn. Soc. 70: 18. 1975.

- Massif du San Petrone, au N. de Bustanicu, sommet de Chiosella, fruticée basse en bordure d'une buxaie, 1000 m, schistes, 28.5.1981, *Gamisans 9256* (ster. et fl.).

Les lobes de certaines feuilles atteignent 4 mm de long.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ALLIER, C. & A. LACOSTE (1979). Maquis et groupements végétaux de la série du chêne-vert dans le bassin du Fango (Corse). *Ecol. Mediterranea* 5: 70-80.
- BRIQUET, J. (1910). *Prodrome de la flore corse*. Vol. 1. Genève & Bâle.
- CHABERT, A. (1902a). Les Euphrasia de la France. *Bull. Herb. Boissier sér. 2*, 2(2): 121-152.
- (1902b). Les Euphrasia de la France. Suite. *Bull. Herb. Boissier sér. 2*, 2(6): 497-520.
- CONRAD, M. (1973). Contribution à l'étude de la flore de la Corse. *Monde Pl.* 377: 6.
- GAMISANS, J. (1970). Contribution à l'étude de la flore de la Corse. *Candollea* 25: 105-141.
- (1971). Contribution à l'étude de la flore de la Corse. II. *Candollea* 26: 309-358.
- (1972). Contribution à l'étude de la flore de la Corse. III. *Candollea* 27: 47-63.
- (1977). Contribution à l'étude de la flore de la Corse. VII. *Candollea* 32: 51-72.
- (1981). Contribution à l'étude de la flore de la Corse. VIII. *Candollea* 36: 1-17.
- LITARDIÈRE, R. de (1936, 1938). In: BRIQUET, J., *Prodrome de la flore corse*. Vol. 2(2), 3(1). Paris.
- (1948). Nouvelles contributions à l'étude de la flore de la Corse (fasc. 7). *Candollea* 11: 175-227.
- ROUY, G. (1909). *Flore de France*. Vol. 11. Paris.
- TUTIN, T. G. & al. (éds.) (1964, 1968, 1972, 1976, 1980). *Flora europaea*. Vol. 1-5. Cambridge.

