

Zeitschrift: Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany
Herausgeber: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Band: 42 (1987)
Heft: 1

Artikel: Notes et contributions à la flore de Corse, II
Autor: Jeanmonod, D. / Burdet, H. M.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-879934>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 19.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Notes et contributions à la flore de Corse, II

D. JEANMONOD & H. M. BURDET (éds.)

RÉSUMÉ

JEANMONOD, D. & H. M. BURDET (éds.) (1987). Notes et contributions à la flore de Corse, II. *Candollea* 42: 25-95. En français, résumé anglais.

Dans cette seconde parution de la série, 15 nouveaux taxons pour la flore de l'île sont signalés dont 12 espèces et une famille, celle des *Balanophoraceae*. Par ailleurs de nombreuses stations originales sont mentionnées pour des taxons rares ou peu signalés en Corse. Dans la seconde partie, R. Deschatres et G. Dutartre apportent une importante contribution dans un genre dont la chorologie est mal connue en Corse, le genre *Hieracium*. Une sous-espèce nouvelle pour la flore de Corse, le *Hieracium sabaudum* subsp. *virescens* (Sonder) Zahn, est signalée.

ABSTRACT

JEANMONOD, D. & H. M. BURDET (eds.) (1987). Notes and contributions on Corsican flora, II. *Candollea* 42: 25-95. In French, English abstract.

The second publication of this series reports 15 new taxa for the flora of the island: 12 new species and one new family, the *Balanophoraceae*. Moreover numerous original findings are mentioned for rare or overlooked taxa. In the second part of the article R. Deschatres et G. Dutartre give an account on *Hieracium*, up till now a genus with badly known chorology in Corsica. A subspecies new to Corsica, *Hieracium sabaudum* subsp. *virescens* (Sonder) Zahn, is reported.

La série des "Notes et contributions à la flore de Corse" qui paraît régulièrement dans *Candollea* est mise à disposition des collaborateurs réguliers ou occasionnels du projet "Flore corse" pour la publication de nouveautés taxonomiques, nomenclaturales, floristiques, chorologiques ou bibliographiques (voir D. JEANMONOD & al., *Candollea* 41: 1-61, 1986). Comme son titre l'indique, elle est ouverte à deux types de sujets.

- a) Des notes floristiques ou nomenclaturales. Les notes envoyées par les divers auteurs sont rassemblées par le Comité de Rédaction selon la séquence *Pteridophyta*, *Pinophyta* (*Gymnospermae*), *Liliopsida* (*Monocotyledones*) et *Magnoliopsida* (*Dicotyledones*). À l'intérieur de ces divisions sera appliqué l'ordre alphabétique des familles, des genres puis des espèces. Leur contenu reste toutefois sous la responsabilité scientifique de leur(s) auteur(s).

Des échantillons d'herbier témoins ou d'autres documents comparables (photos ou diapositives pour les *Orchidaceae* par exemple) doivent en principe correspondre à toute donnée floristique publiée dans cette série; leur localisation sera soigneusement précisée. Pour un taxon donné, les diverses localités seront citées selon l'ordre géographique ouest-est et nord-sud. Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'il pourra être fait référence à de simples observations.

- b) Des contributions. Elles comprennent des mises au point, des révisions partielles, des notes bibliographiques ou toute autre note qui n'entre pas dans le cadre précédent et qui est trop courte pour être considérée comme article indépendant. Ces contributions portent un en-tête avec une numérotation, un titre et le nom du ou des auteurs. Elles peuvent donc être citées dans une référence bibliographique directement sous le nom de leur(s)

auteur(s). Elles apparaissent d'ailleurs de cette façon dans la table des matières de *Candollea*.

Ces notes et contributions pourront parfois être précédées de communications de la part du Comité Scientifique du projet "Flore Corse", des éditeurs ou plus généralement du secrétaire général (annonces, problèmes généraux, avancement du projet, etc.).

Pour autant que les projets de notes ou de contributions parviennent aux éditeurs avant fin novembre, elles paraîtront l'année suivante dans le numéro de juin de la revue *Candollea*.

COMMUNICATIONS

Dans la présentation du projet "Flore corse", nous avons annoncé le projet de faire paraître des "Compléments au Prodrome de la flore corse", sous forme de fascicules (JEANMONOD & al., op. cit). Nous avons le plaisir d'annoncer aujourd'hui la parution des deux premiers fascicules:

- D. JEANMONOD & J. GAMISANS (1987). *Compléments au Prodrome de la flore corse. Annexe 1: Introduction*. Ed. des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Genève, 28 pp., 10 cartes transparentes (13.— FS).
- GAMISANS, J. & D. JEANMONOD (1987). *Compléments au Prodrome de la flore corse — Campanulaceae*. Ed. des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Genève, 43 pp. (9.— FS).

Ces deux fascicules sont désormais disponibles au secrétariat du projet "Flore Corse" (Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy/GE).

Les traitements des *Dipsacaceae*, *Globulariaceae*, *Lentibulariaceae* et *Plantaginaceae* sont actuellement en préparation.

A — NOTES

Aspidiaceae

***Dryopteris carthusiana* (Vill.) H. P. Fuchs**

- Moltifao, près de Capanacce, aulnaie rive droite de la rivière d'Asco en aval du pont de Tesa, localement abondant, 260 m, 6.6.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Espèce certainement rare en Corse, parfois confondue avec *Dryopteris expansa* (voir J. GAMISANS, *Cat. Pl. Vasc. Corse*: 41, 1985) ou avec *D. dilatata*. Toutefois les localités citées autrefois surtout à altitude modérée (J. BRIQUET, *Prodr. Fl. Corse* 1: 13, 1910) seraient à revoir.

R. DESCHATRES

***Dryopteris* × *sardoa* Fraser-Jenkins & Reichst. (= *D. oreades* Fomin × *D. tyrrhena* Fraser-Jenkins & Reichst.)**

- Bonifatto, rive gauche de la Ficarella, surplombs rocheux à droite du chemin à 1 km en amont de la Maison forestière, 580 m, 8.7.1975, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Albertacce, rochers rive droite du Viru, un peu en amont de son confluent avec le Golo, un pied très vigoureux, 840 m, 9.7.1975, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Albertacce, rive droite du Golo, en amont du Ponte-Altu, plusieurs pieds, distingués seulement du *D. tyrrhena* à l'examen des spores, qui sont abortives, 830 m, 21.7.1974, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Cet hybride récemment décrit (C. R. FRASER-JENKINS & T. REICHSTEIN, *Fern Gaz.* 11: 193, 1975) est fort rare dans l'île: en plus de ces localités, dont celle d'Albertacce est nouvelle, il n'était connu que de Bonifacio à la Trinité (voir F. BADRÉ & R. DESCHATRES, *Candollea* 34: 410, 1979). Nos échantillons ont été revus par T. Reichstein. Il est à noter que si les deux parents existent à proximité de l'hybride à Albertacce, seule la présence du *D. tyrrhena* a été constatée à Bonifatto comme à Bonifacio.

R. DESCHATRES

Dryopteris tyrrhena Fraser-Jenkins & Reichst.

- Cap Corse: Sisco, au pied de rocailles, au-dessus et au Nord du Col St Jean, 1100 m, 3.6.1986, *Bosc, G. & Deschatres, R. s.n.* (Hb. privés).

G. BOSC & R. DESCHATRES

*Aspleniaceae***Asplenium obovatum** Viv.

- Secteur Cintu, côte W, Punta di Ciuttone, au N de Galeria, rochers rhyolitiques, 100 m, 28.4.1984, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.10864* (Hb. privé GAMISANS), fr.; entre le col de la Croix et l'anse de Tuara, 5.5.1977, *Dutartre, G. 13281* (Hb. privé); secteur Rotondu, rochers maritimes à la Parata, près d'Ajaccio, 27.4.1976, *Dutartre, G. 13282-13287* (Hb. privé); secteur Incudine Bavella, côte E, rochers maritimes au pont de Tarco, 1.4.1978, *Dutartre, G. 13284-13289* (Hb. privé); secteur Ospedale-Cagna, côte W, au S de Campomoro, Cala d'Algula, rive S, rochers granitiques, 15 m, 5.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12310* (Hb. privé GAMISANS), fr.; secteur Ospedale-Cagna, côte W, au S de Campomoro, Cala di Conca, rive S, rochers granitiques, 20 m, 6.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12315* (Hb. privé GAMISANS); Sotta, 26.7.1977, *Dutartre, G. 13292* (Hb. privé); rochers à l'W de la plage de Rocapina, 5.4.1978, *Dutartre, G. 13285* (Hb. privé); golfe de Ventilègne, rochers près des réservoirs à eau à l'intérieur des terres cultivées, 3.4.1978, *Dutartre, G. 13283-13290* (Hb. privé); golfe de Santa Manza, rochers près de l'étang de Balistra, 4.4.1978, *Dutartre, G. 13286-13288* (Hb. privé).

G. DUTARTRE, J. GAMISANS & M. MURACCIOLE

*Sinopteridaceae***Cheilanthes acrostica** (Balb.) Tod. (= *C. pteridioides* auct. non (Reichard) C. Chr.)

- Secteur Cap Corse, Patrimonio, quartier Frecaccia, mur d'une maison en ruines, 8.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12458* (Hb. privé GAMISANS), fr.; région d'Olmi Capella, à la Cima Corbaiola, fentes de rochers calcaires, abondant, 640 m, 27.9.1984, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Stations à ajouter à celles énumérées et cartographiées par F. BADRÉ, A. FABER TRYON & R. DESCHATRES, *Webbia* 36: 11-12, 1982.

J. GAMISANS, M. MURACCIOLE & R. DESCHATRES

*Amaryllidaceae***Leucojum longifolium** (Gay ex M. J. Roemer) Gren.

- Gorges de la Lonca, 400-560 m, avril 1986, *Conrad, M.* observation.

M. CONRAD

*Cyperaceae***Carex depauperata** Curtis ex With.

- Cap Corse, châtaigneraie en allant de Mandriale à la chapelle Saint-Jean, 31.5.1964, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé); Savella, couloir rocheux frais à l'ouest du col, sous la croix Leccia, adénostylaie, 1350 m, 12.7.1961, *Loiseau, J.-E. s.n.* (Hb. privé DESCHATRES).

J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse* 1: 215, 1910) cite seulement cette espèce des environs de Corte et de Venaco. Elle a aussi été signalée au Monte Tre Pieve (J. GAMISANS, *Candollea* 28: 48, 1973) et dans le Cap Corse (P. LE BRUN, *Monde Pl.* 103: 12, 1930).

J.-E. LOISEAU, G. BOSC & R. DESCHATRES

Carex digitata L.

- Saint-André de Bozio, près de Poggio, talus frais bordant la route D 15, vu deux pieds seulement, 780 m, 26.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé). R. DESCHATRES

Carex divisa Hudson

- Agriates, en arrière de la plage de Saleccia, pelouse sableuse, 5 m, 10.5.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Saint-Florent, près de la cathédrale du Nebbio, pelouse, 10 m, 6.5.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); environs de St-Florent, pelouse à gauche de la route d'Oletta D 238, au-delà du bosquet de pins d'Alep, 15 m, 22.4.1973, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); côte orientale, près de l'étang de Biguglia, pelouse sableuse à *Lupinus luteus*, 5 m, 24.4.1973, *Conrad, M. & Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Ponte-Leccia, route de Bastia à env. 2 km de Ponte-Leccia, talus du fossé à droite, 180 m, 24.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); au nord de Francardo route de Bastia, talus à gauche 500 m environ après le pont de San Lorenzo, 235 m, 30.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Corte, route de Bastia, entre Bistuglio et le col de San Quilico, pelouse sèche bordant à droite la N 193, 540 m, 27.5.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); vallée du Tavignano, rive droite à 12 km en aval de Corte, pelouse entre la route N 200 et la rivière, 235 m, 30.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Ajaccio, bords de la route de la Parata, en plusieurs points, notamment pelouse humide à gauche au niveau de Vignola, 10 m, 3.4.1963, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur Ospedale-Cagna, côte W, au S de Campomoro, Canosellu, pelouse sur replat, 100 m en arrière de la mer, 2 m, sol assez épais, 4.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12202* (Hb. privé GAMISANS), fl.; massif de Cagna, à Bitalza, prairies humide au-dessous des bergeries, abondant, 1020 m, 13.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Porto-Vecchio, anciennes salines, 1 m, 19.5.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); côte W, Senetosa, dépression humide, 300 m au NW du phare, pelouse sur sol limoneux-organique, 8 m, 6.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12336* (Hb. privé GAMISANS), fl. et fr.; Suartone, à l'ouest des Tre Padule, bords de la mare dite Padule Maggiore, 100 m, 12.6.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Tonnara-plage, suintements en arrière de la plage, abondant parmi les touffes de *Schoenus nigricans*, 5 m, 16.5.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bonifacio, à la Trinité, pelouse près de l'Ermitage, 120 m, 21.5.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bonifacio, prairie marécageuse à droite de la route de Sartène, lieu-dit Padulu, 80 m, 21.5.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bonifacio, au-dessus de Santa-Manza, petites dépressions humides en haut de la corniche calcaire, avec *Ambrosinia*, 65 m, 25.3.1976, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bonifacio, fossé bordant la route D 60 à 1 km de son embranchement sur la D 58, 65 m, 25.3.1976, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Ile Lavezzo, pelouse sableuse près de la Cala di u Grecu, 5 m, 19.4.1984, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Ce *Carex*, disséminé en Corse, n'était pas signalé dans le secteur Ospedale-Cagna.

R. DESCHATRES, M. CONRAD, J. GAMISANS & M. MURACCIOLE

Carex elata All.

- Ostriconi, rive sud-est de l'étang de Cannuta, 5 m, 5.5.1986, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Galeria, rive gauche du Fango près de son embouchure, où il forme de gros touradons, 1 m, 5.6.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Solenzara, bord de la rivière en amont de l'ancien pont du chemin de fer, 5 m, 8.4.1984, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Cette espèce, découverte par P. Aellen à l'embouchure de la Solenzara en 1935, n'a été publiée que vingt ans plus tard (voir R. DE LITARDIÈRE, *Candollea* 15: 18, 1955).

R. DESCHATRES

Carex grioletii Roemer

- Cap Corse, Luri, bords ombreux du ruisseau de Fundali, rive gauche, entre le pont de la route D 180 et la cascade, un seul pied, en compagnie de *Carex pendula*, *C. olbiensis*, *Polystichum setiferum*, *Phyllitis scolopendrium*, *Adiantum capillus-veneris*, 275 m, 10.5.1986, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Sisco, à environ 200 m en aval du pont de Balba, r. g. du ruisseau de Porcili, endroit humide mais pas spécialement obscur, une dizaine de pieds au moins, en bon état de floraison et de fructification, noté au voisinage: *Carex pendula*, *C. sylvatica*, *C. remota*, *Woodwardia radicans*, *Polystichum setiferum*, *Phyllitis scolopendrium*, *Adiantum capillus-veneris*, etc., 150 m, 14.5.86, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur Rotondu, route D 43, 6 km en amont du gué d'Antisanti, maquis dense, silice, 13.5.1973, *Hébrard, J.-P. s.n.* (Hb. privé), fr.

Cette espèce est nouvelle pour la Corse. Elle a été découverte près de Nice, vallon obscur du Donareou, le 27.5.1901 par G. VIALON (voir MALINVAUD, E. & HÉRIBAUD, J., *Bull. Soc. Bot. France* 48: 3-14, 1912). Il s'agit d'une plante répandue en Asie occidentale, jusque dans les régions caspiennes et caucasiennes. A. O. CHATER (*Fl. Europaea* 5: 313, 1980) l'indique en Yougoslavie (Jt?), Sicile, Italie, Espagne orientale et France où sa spontanéité serait douteuse, partout très localisée. En Italie (voir S. PIGNATTI, *Fl. d'Italia* 3: 660, 1982) elle est rare et disséminée: Sicile, Campanie, Lazio, Marche, Toscane (y compris l'îlot de Giglio dans l'archipel toscan) et Ligurie. Les stations françaises des Alpes-Maritimes et de Corse nous paraissent s'intégrer très bien dans ce schéma et nous n'avons pas de doute sur la spontanéité du *Carex grioletii*. S. PIGNATTI (op. cit.) qualifie le *Carex grioletii* d'espèce sténoméditerranéenne nord-orientale et cite un travail de G. MONTELUCCI (*Nuovo Giorn. Bot. It., n. s.* 59: 482-485, 1952) où cet auteur considère que l'espèce a probablement chez nous la signification d'une relique préglaciaire. Ajoutons qu'elle figure sur la liste des espèces françaises protégées au plan national.

R. DESCHATRES & J.-P. HÉBRARD

Carex olbiensis Jordan

- Cap Corse, Luri, bord du ruisseau de Fundali, entre le pont sur la route D 180 et la cascade, 275 m, 10.5.1986, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Luri, bord du petit bois à gauche de la route conduisant au hameau de Tufo (ou Tuffu), 60 m, 1.6.1986, *Conrad, M. & Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé DESCHATRES); Patrimonio, rive droite du Fium Albino en aval du pont de la route de Farinole D 333, localement abondant, 140 m, 19.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); les Eaux d'Orezza, rive gauche du Fium Alto en aval de la source d'Orezza, 380 m, 5.6.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Santa-Lucia-di-Mercurio, à Piedivaldo, bord d'un ruisseau en amont du petit pont, 680 m, 26.5.1981; *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Saint-André de Bozio près de Poggio, talus frais près d'un petit pont, station à *Rosa arvensis*, 780 m, 15.7.1975, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Saint-André de Bozio, route de Mazzola, talus frais, 26.5.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Saint-André de Bozio, sous Arbitro, fossé bordant la route de Corte D 15 à 3 km d'Arbitro, 540 m, 25.5.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Pietroso, talus à droite de la route de Saparelle, 580 m, 10.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

D'après J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse* 1: 215, 1910), cette espèce n'était connue que du Cap Corse. Mais elle a été signalée depuis près de Venacu et dans la vallée du Taravu (J. GAMISANS, *Candollea* 38: 221, 1983).

M. CONRAD & R. DESCHATRES

Carex pilulifera L.

- Près du lac de Nino, pelouse sèche, rive droite du Tavignano, un peu en aval du lac, 1740 m, 26.7.1970, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); massif du Rotondu, petite pelouse au bord du lac Capitello, 1930 m, août 1962, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

R. DESCHATRES

Cyperus eragrostis Lam. (= *C. vegetus* Willd.)

- Porto, embouchure du ruisseau de Porto, gravillons au bord du ruisseau, 12.6.1979, *Lambinon, J. 79/435* (G, LG); base militaire dite de Solenzara au nord de l'embouchure du Travo, endroit argileux humides mais asséché en été, le long de la piste d'aviation, avec *Juncus tenageia* L. fil., 3.6.1986, *Lambinon, J. 86/164* (BR, G, LG).

Au sujet de cette espèce en Corse, voir J. GAMISANS, (*Candollea* 40: 113, 1985) ainsi que R. DESCHATRES (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, n.s. 17: 7, 1986).

J. LAMBINON

Cyperus esculentus L. (= *C. aureus* Ten., non Georgi)

- Calvi, baie de Calvi entre la N 197 et la mer, terrain vague remblayé dans la dépression humide arrière-dunale, 21.9.1984, *Lambinon, J. 84/689* (LG); quelques pieds, paraissant disparu l'année suivante, *Lambinon, J.* observation; Lucciana-Casamozza, rive droite du Golo en aval du pont routier, sables humides, peu abondant, 15 m, 17.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Espèce naguère confinée, en France, aux trois départements les plus "méditerranéens" (Var, Alpes-Maritimes et Corse), où elle demeure rare, alors qu'elle a envahi assez récemment les vallées des grands fleuves, notamment celles de la Garonne et de la Loire.

R. DESCHATRES & J. LAMBINON

Cyperus serotinus Rottb.

- Environs de Sagone, bords humides du Liamone à son embouchure, près du pont routier, 12.10.1963, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé); Ajaccio à l'embouchure du Prunelli, 30.8.1978, *Dutartre, G. s.n.* (Hb. privé); Solenzara, au nord de la plage de Solaro, bord d'une lagune au sud de l'embouchure du Travo, 29.9.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Porto-Pollo, à l'embouchure du Taravo, 9.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé, LG).

G. BOSCH, R. DESCHATRES & G. DUTARTRE

Eleocharis acicularis (L.) Roemer & Schultes

- Calacuccia, bord du lac de barrage près de Sidossi, sur les grèves exondées, en plusieurs points, 800 m, 12.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); marine de Solaro, petit marais (actuellement détruit) en arrière de la plage, 2 m, 11.6.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Suartone aux tre Padule, bord de la grande mare occidentale Padule Maggiore, 105 m, 12.6.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Cette espèce est rare en Corse et n'avait pas été trouvée à basse altitude. J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse* 1: 228, 1910) la cite uniquement des pozzines du lac de Nino, 1743 m, d'après Requien; R. DE LITARDIÈRE & G. MALCUIT, *Contr. Et. Phytosoc. Corse Massif Renoso*: 131, 1926) l'ont trouvée sur le plateau des Pozzi du Renoso et le plateau de Sampiero, 1800 m.

R. DESCHATRES

Fuirena pubescens (Poiret) Kunth

- Ajaccio, depuis la route N 193 en direction de Peri, après le passage à niveau dans les fossés bordant la route D 229, 18.10.1986, *Dutartre, G. 16464* (Hb. privé); Ajaccio, à l'W du col de Mercujo, à gauche de la route D 3 en montant au col depuis Ocana, sur un talus humide et dans le fossé bordant la route sur une cinquantaine de mètres, 600 m, 17.10.1986, *Dutartre, G. 16465-16466* (Hb. privé); Ajaccio, à 1 km à l'ouest d'Ocana à gauche de la route D 3 en montant depuis Ajaccio, près d'une source et dans le fossé, 17.10.1986, *Dutartre, G. 16467* (Hb. privé); côte orientale, Ste Lucie de Porto Vecchio, rive droite du Cavo en amont de Taglio Rosso, non loin du barrage dans l'aire de détente "Bruscajo", 13.10.1986, *Dutartre, G. 16468-16469* (Hb. privé).

G. DUTARTRE

Scirpus litoralis Schrader (= *Schoenoplectus litoralis* (Schrader) Palla)

- Barcaggio, étang littoral en voie d'assèchement à l'est du village, en arrière de la plage, abondant, 23.7.1975, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Agriates près de Saleccia, bord de l'étang de Pardinella, abondant, 23.7.1975, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); marine de Solaro, forme une bande continue au bord de la lagune, du côté de la terre, 5.8.1975, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Solenzara, marais de Peri, 5.8.1975, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Pinarello, étang faiblement saumâtre le long du chemin vers le Capu di Fora, peuplement d'hélophytes, par env. 40 cm de profondeur d'eau, 30.5.1986, *Lambinon, J. 86/114* (LG); Cala di Roccapina, lagune en arrière de la plage, 20.9.1984, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Suartone, à la Rondinara, lagune en arrière de la plage, 21.5.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bonifacio, à Sant'Amanza, en arrière de la plage de Maora, petit marais à *Kosteletzkya pentacarpos*, 7.8.1975, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bonifacio, étang de Canettu, rive gauche, 23.9.1984, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Au début du siècle, la plante n'était connue qu'aux environs de Bonifacio (voir J. BRIQUET, *Prodr. Fl. Corse* 1: 230, 1910). J. VIVANT (*Bull. Soc. Bot. France* 121, 95^e Sess. extr., Corse: 35, 1975) ajoute deux localités: marais de "Chiova" (pour Chiola?) au nord de Solenzara (peut-être la même que celle du Marais de Peri) et marais de San Giovanni à Pianottoli-Caldarello. Il est clair que la plante est beaucoup plus répandue et souvent abondante dans ses stations.

Un point reste à éclaircir. BRIQUET (l.c.) rappelle que Revelière a indiqué à Rogliano le *Scirpus duvalii* Hoppe, considéré comme hybride *S. lacustris* L. × *S. triqueter* L. Or cette dernière espèce manque en Corse et l'auteur estime qu'on pourrait croire plus facilement à un croisement de formule *S. lacustris* × *litoralis*. La présence de *S. litoralis* dans le marais de Barcaggio (commune de Rogliano), où croît également *S. lacustris*, rend cette hypothèse tout à fait vraisemblable.

R. DESCHATRES & J. LAMBINON

*Juncaceae***Juncus bufonius** L. var. **parvulus** Hartm. (= *J. minutulus* Krecz. & Gontsch.)

- Entre la baie de Crovani et le Cap Cavallo, lieu-dit Torra Mozza, pelouse ouverte rase, temporairement humide, au contact du maquis, env. 40 m, 3.5.1979, *Lambinon, J. 79/199* & *Rousselle, J.* (LG et Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Bass. Médit. Bull. 18, n° 9902).

J. GAMISANS (*Candollea* 40: 111, 1985) a signalé "*J. minutulus* Albert & Jahandiez" à la presque île de Scandola, comme nouveau pour la Corse. En fait, nous avons commenté la récolte citée ci-dessus (J. LAMBINON, *Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Bass. Médit. Bull.* 18: 65-66, 1981) mais sous le nom simplement de "*J. bufonius* L. (s.str.)". Nous soulignons la variabilité morphologique exceptionnelle de la population échantillonnée, observations qui appuient le point de vue de T. A. COPE & C. A. STACE (*Watsonia* 12: 113-128, 1978) qui n'accordent guère de valeur systématique au "*J. minutulus*".

Nous y indiquons aussi que le nom "*J. minutulus* Albert & Jahandiez" est absolument incorrect sur le plan nomenclatural. Nous adoptons ici finalement le nom proposé par M. KERGUÉLEN (*Lejeunia, n.s.* 120: 113, 1987), sans être pour autant convaincu qu'il convient de traiter cette plante comme un taxon bien défini.

J. LAMBINON

Juncus tenageia L. fil.

- Au sud de Calvi, 7.4.1980, *Bosc, G.* observation; Galéria, petit vallon granitique près de la mer, à l'ouest du village, *Isoetion*, près du ruisselet, 3.6.1981, *Lambinon, J. 81/C0100* & *Rousselle, J.* (Hb. DESCHATRES); région de Calacuccia, Sidossi, rives sableuses asséchées du lac de barrage, localement abondant mais de taille réduite (atteignant 5 cm), 790 m, 12.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur Plaine orientale, entre Ghisonaccia et la Tour de Vignale, à gauche de la route D 144, dans une dépression humide, 8.7.1977, *Dutartre, G. 7313* (Hb. privé); côte orientale, Vix, petit marais à *Eryn-*

gium barrelieri bordant la route N 200, abondant, 10 m, 17.7.1974, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); base militaire dite de Solenzara, au nord de l'embouchure du Travo, endroit argileux humide mais asséché en été le long de la piste d'aviation, avec *Cyperus eragrostis* Lam., 3.6.1986, *Lambinon, J. 86/163* (BR, G, LG); secteur Incudine-Bavella, marine de Solaro, en arrière de la plage, petit marais à *Eleocharis multicaulis*, 2 m, 11.6.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); côte E, entre Favone et Sainte Lucie de Portu-Vecchiu, Bocca di a Parata, versant S, mares, 8.6.1981, *Dutartre, G. 7314* (Hb. privé); massif de Cagna, prairie humide sous les bergeries de Bitalza, 1020 m, 23.7.1977, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur Ospedale-Cagna, côte W, Senetosa, dépression humide, 300 m au NW du phare, pelouse sur sol limoneux-organique, 8 m, 6.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12346* (Hb. privé), fl. et fr.; Tre Padule de Suartone, 9.6.1981, *Dutartre, G. 7315* (Hb. privé); golfe de Ventilègne, dépression près des réservoirs à eau pour la culture, 20.7.1977, *Dutartre, G. 7316* (Hb. privé).

Cette espèce n'est finalement pas aussi rare qu'on le pensait sur le littoral (voir J. BRIQUET, *Prodr. Fl. Corse* 1: 252-253, 1910; R. DE LITARDIÈRE, *Candollea* 15: 19, 1955; J. LAMBINON, *Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Bass. Médit. Bull.* 19: 108, 1984). Dans le secteur Ospedale-Cagna, elle n'était signalée qu'à Portu-Vecchiu (C. DE MARSILLY, *Catalogue*: 154, 1872).

J. GAMISANS, M. MURACCIOLE, G. DUTARTRE,
R. DESCHATRES, G. BOSC & J. LAMBINON

Liliaceae

Allium acutiflorum Loisel.

- Sud de Galeria, falaise sous le fort de Girolata, un pied fleuri, 30 m, 4.6.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

L'espèce est en définitive assez largement distribuée sur la côte occidentale de l'île entre Porto et Calvi: voir notamment J. GAMISANS & M.-A. THIÉBAUD, *Candollea* 37: 527, 1982; J. LAMBINON, *Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Bass. Médit. Bull.* 19: 108, 1984; J. LAMBINON & F. PIRONET, *Webbia* 38: 744, 1984; J. GAMISANS, *Candollea* 40: 111, 1985.

R. DESCHATRES

Allium chamaemoly L.

- Cap Corse, versant NW du Monte di u Poggio, sur des replats rocheux, siliceux, à 6.5 km de Macinaggio, 8.10.1986, *Dutartre, G.* observation; Miomo, près du cimetière, en fleurs, 10 m, 22.12.1984, *Conrad, M.* observation; région de Novella, entre la D 12 et l'Ostriconi, très répandu, particulièrement aux environs du moulin de Chiaraginca, mars 1986, *Conrad, M.* observation.

Cette espèce est plus abondante qu'on ne le suppose.

M. CONRAD & G. DUTARTRE

Allium sphaerocephalon L. subsp. **sphaerocephalon**

- Côte orientale, plages entre Anghione et Sorbu, très abondant, en fruits, 2 m, 7.10.1979, *Conrad, M. & Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Moriani-Plage, 17.7.1975, *Deschatres, R.* observation; entre Sainte-Lucie de Moriani et Moriani-plage, sur les sables maritimes, 1 m, 6.7.1976, *Dutartre, G. 12201* (Hb. privé); secteur de Corte, Erbajolo, 740 m, en bordure de la D 14, 19.7.1977, *Dutartre, G. 16504* (Hb. privé); défilé de l'Inzecca, 350 m, 29.8.1983, *Dutartre, G. 12190* (Hb. privé), fr.; plage de Favone, 1 m, 17.7.1975, *Dutartre, G. s.n.* (Hb. privé); Favone, rochers maritimes à la sortie sud du village, 10 m, 13.7.1977, *Deschatres, Renée s.n.* (Hb. privé DESCHATRES).

M. CONRAD, R. DESCHATRES & G. DUTARTRE

Merendera filifolia Cambess.

- Cap Corse, versant NW du Monte di u Poggio, sur des replats graveleux, une centaine de pieds fleuris plus ou moins dispersés à 6.6 km de Macinaggio, 8.10.1986, *Dutartre, G. 16462-16463* (Hb. privé).

L'espèce poussait en compagnie d'*Ophioglossum lusitanicum* L., *Scilla autumnalis* L. var. *autumnalis*, *Allium chamaemoly* L., *Ranunculus paludosus* Poiret, etc.

Espèce sténo-méditerranéenne occidentale, **nouvelle pour la flore de la Corse!** La plante est connue des Baléares: Majorque, Minorque et Ibiza (voir J. DUVIGNEAUD, *Cat. Prov. Fl. Baléares*: 38, 1979, qui la considère, à tort, comme endémique), de la Péninsule ibérique, Espagne et Portugal (d'après B. VALDÈS, in *Fl. Europaea* 5: 25, 1980) et surtout d'Afrique du Nord, Maroc et Algérie où elle est commune du littoral jusque vers 2000 m (P. QUÉZEL & S. SANTA, *Nouv. Fl. Algérie*: 192, 1962). En France continentale, l'unique station connue a été découverte par Derbès en 1858: la Nerthe près de Martigues (Bouches-du-Rhône), côte miocène de Bonnieu, entre Laurons et Carro (voir R. MOLINIER, *Cat. Pl. Vasc. Bouche-du-Rhône*: 69, 1980). Ce dernier auteur semble avoir pressenti la présence de la plante en Corse lorsqu'il écrit (l.c.): "Caractéristique d'une petite association à *Allium chamaemoly* L. et *Merendera filifolia* Camb. beaucoup plus fréquente en Corse et aux îles Baléares". L'espèce n'est pas connue d'Italie ni de Sardaigne; ses stations françaises de Corse et des Bouches-du-Rhône, assez disjointes, marquent dont l'extrême limite de son aire au nord et à l'est.

G. DUTARTRE

Ornithogalum narbonense L.

- Vallée de Tavignano sous Riventosa, talus bordant la route N 200, à 12 km en aval de Corte, près d'une maisonnette ruinée, 235 m, 28.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Venaco, bords herbeux de la N 200 à 1 km au nord du débouché de la D 143, 200 m, 4.6.1986, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé); Bonifacio, pâture rive gauche du Canalli, en aval du domaine de la Source, avec *Anacamptis pyramidalis*, 30 m, 17.5.1986, *Bosc, G., Deschatres, R., Pascal, D. & Pascal, M. s.n.* (Hb. privés BOSC et DESCHATRES); Bonifacio, pâture sèche sur calcaire, près du marais de Musella, 60 m, 23.5.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bonifacio, plateau calcaire au sud de l'étang de Sperono, 15 m, 19.5.1986, *Deschatres, R., Gamisans, J. & Hébrard, J.-P. s.n.* (Hb. privé DESCHATRES).

Cette espèce, disséminée sur le plateau calcaire de Bonifacio, est très rare ailleurs dans l'île. Elle a été indiquée autrefois à Rogliano et près d'Ajaccio (J. BRIQUET, *Prodr. Fl. Corse* 1: 313, 1910).

G. BOSC & R. DESCHATRES

Ornithogalum pyrenaicum L.

- Secteur Cap Corse, Sisco, hameau supérieur, châtaigneraie fraîche dans un vallon, 450 m, 9.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12516* (Hb. privé GAMISANS), fl.; Saint-Florent, aux Strette, calcaire, 20 m, 24.5.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Caporaino, Monte a Supietra, versant nord, au pied de la falaise calcaire, 380 m, 13.6.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Lano, à la cime de la chapelle Sant'Angelo, calcaire, 1180 m, 10.7.1969, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Scala di Santa-Regina, à l'entrée de l'ancienne Scala, 540 m, 1.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Quenza, près d'un petit marais à 500 m du village, à gauche de la route de Zonza, 805 m, 17.6.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé). R. DESCHATRES, J. GAMISANS & M. MURACCIOLE

Scilla autumnalis L. var. **gracillima** Battandier

- Suartone, aux Tré Padule, surtout le long du sentier près de la grande mare occidentale Padule Maggiore, dans les places nues des pelouses sableuses fraîches, 105 m, 3.10.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); baie de Figari, côte orientale de la baie, 1 m, 16.10.1986, *Dutartre, G. 16486* (Hb. privé); golfe de Sant'Amanza, la plante est très répandue entre la Punta di Rondinara et le Cap Blanc, parmi les graviers, 6-10 m, 14.10.1986, *Dutartre,*

G. 16488 (Hb. privé); Punta di Ventilègne, abondante dans tout le secteur et tout le golfe de Ventilègne, 1-10 m, 15.10.1986, *Dutartre, G. 16487* (Hb. privé); à 500 m au S/W du pont de Ventilègne, en abondance sur les pelouses maritimes rases, près des mares littorales à *Juncus heterophyllus* Dufour, 5 m, 8.10.1984, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Tonnara-plage, pelouses sableuses un peu humides, à végétation très ouverte, à proximité de *Triglochin laxiflorum* Guss., 5 m, 2.10.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Nos indications précisent la mention succincte parue dans J. GAMISANS (*Cat. Pl. Vasc. Corse*: 82, 1985). Des bulbes rapportés des Tré Padule ont permis la préparation de mitoses de racines (Sylvie Bernard-Deschatres). La plante s'est révélée diploïde ($2n = 14$), sauf un bulbe ayant donné $2n = 21$, nombre triploïde qui peut s'expliquer soit par hybridation avec la forme tétraploïde, vraisemblablement présente aussi en Corse, soit par fécondation d'un gamète non réduit. On sait que le niveau de ploïdie de la Scille d'automne est très variable, de la diploïdie à la décaploïdie ($2n = 70$). Voir M. RUIZ REJÓN & al., *Bol. Soc. Brot., sér. 2* 53: 555-562, 1980.

R. DESCHATRES & G. DUTARTRE

Urginea fugax (Moris) Steinh.

- Suartone à la Rondinara, clairières du maquis bas dans la presque île sud (Punta di Rondinara), avec *Elaeoselinum asclepium* (L.) Bertol., 15 m, 27.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), fr.; au sud-ouest du pont de Ventilègne, maquis maritime bas, avec *Colchicum corsicum* Baker, 5 m, 26.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Tonnara, en arrière de la plage, en bordure du maquis bas près du marais à *Schoenus nigricans* L., assez abondant, 5 m, 26.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), fr.; bords du chemin conduisant de la route N 196 à la plage de Tonnara, en plusieurs points, disséminé, 10-60 m, 19.9.1984, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), fl. et fr.; golfe de Ventilègne, abondant sur la côte orientale du golfe entre Tonnara et la route N 196, 2-10 m, 15.10.1986, *Dutartre, G. 16489* (Hb. privé), fr.; Bonifacio, route de Sartène N 196 à 7.8 km de Bonifacio, point humide du maquis à droite, 100 m, 2.10.1979 *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Cette espèce, localisée dans l'extrême sud de l'île, est connue depuis longtemps dans la région de Bonifacio (voir J. BRIQUET, *Prodr. Fl. Corse* 1: 307, 1910), toutefois ses stations restaient assez vaguement indiquées.

R. DESCHATRES & G. DUTARTRE

Orchidaceae

Aceras anthropophorum (L.) Aiton fil.

- Calvi, golfe de la Revellata, petite dépression colmatée par des dépôts quaternaires gréseux calcarifères au-dessus de la plage de l'Alga, maquis bas-cistaie sur substrat arénacé, env. 40 m, 6.5.1979, *Lambinon, J. 79/261* (LG).

Espèce inégalement répartie en Corse (assez fréquente par exemple aux environs de Saint-Florent et de Corte), représentée ici par quelques pieds seulement; non signalée dans la région de Calvi par J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse* 1: 380-381, 1910). Cette station de la côte occidentale apparaît comme particulièrement intéressante lorsqu'on se réfère aux données récemment publiées par H. BLATT (*Ber. Arbeitskr. Heim. Orch.* 2: 11 et 38, Karte 7, 1985).

J. LAMBINON

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard

- Caporalino, lapiaz calcaire en face de la gare d'Omessa, 14.5.1979, *Dutartre, G. 12066* (Hb. privé); Lano, cime de la chapelle Sant'Angelo, calcaire, 1100 m, 9.5.1977, *Dutartre, G. 12063* (Hb. privé); rive droite du ruisseau de Canettu, pelouse calcaire à environ 500 m de l'étang, 30 m, 22.5.1983, *Deschatres, R.* observation; région de Bonifacio, pâture rive gauche du Canalli en aval du domaine de la Source, 30 m, 17.5.1986, *Bosc, G., Pascal, M. & Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé DESCHATRES); secteur de Bonifaci, 2 km à l'ouest de Sant'Amanza, entre Campagru et Musella, au bord de la route D 60, talus herbeux, frais sur terrain calcaire, 75 m, 19.5.1980, *Thiébaud, M.-A. 01596* (G); plateau

calcaire au-dessus de Sant'Amanza, entre l'embranchement de la route D 60 sur la D 58 et le marais de Musella, abondant, 60 m, 22.5.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Sperone, près des ruines de Piantarella, 17.5.1979, *Dutartre, G. 12065* (Hb. privé); secteur de Bonifaciu, côte sud-orientale, entre l'étang de Sperono et la pointe de Sperono, pelouse et garrigue très basse, dégradée, sur terrain calcaire, sec, exposé à l'est, 15 m, 17.5.1982, *Thiébaud, M.-A. 03173* (G).

Cette espèce n'était connue que du plateau calcaire de Bonifacio et de la région de Bastia (voir H. BLATT, *Ber. Arbeitskr. Heim. Orch.* 2: 11 et 38, Karte 8, 1985).

R. DESCHATRES, G. DUTARTRE & M.-A. THIÉBAUD

Barlia robertiana (Loisel.) W. Greuter

- Morosaglia, pentes de la Punta di Querceta Tonda au-dessus de la route D 71, sur calcaire, peu abondant, 700 m, 27.5.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Espèce rare dans l'île, connue surtout de la région de Bonifacio (voir H. BLATT, *Ber. Arbeitskr. Heim. Orch.* 2: 11 et 39, Karte 9, 1985).

R. DESCHATRES

Epipactis palustris (L.) Crantz

- Sermano, route de Bustanico D 441, le long du torrent de Vallo Rosso, rive gauche en amont du pont routier, deux pieds fleuris, 780 m, 9.7.1974, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Sermano, route de Bustanico D 441, le long du torrent de Vallo Rosso, en aval du pont, le long d'une dérivation pratiquée pour l'irrigation d'un jardin, 7 pieds, 770 m, 13.7.1974, *Conrad, M. & Deschatres, R.* observation; Sermano, lit du ruisseau de Prate, près du pont sur la route D 441, bords herbeux humides, 775 m, *Deschatres, R. & Conrad, M. s.n.* (Hb. privé DESCHATRES).

Cette espèce n'avait jamais été trouvée en Corse. Notre trouvaille a été prise en compte par J. BOUCHARD (*Fl. Prat. Corse*, 3^e éd.: 92, 1978. Voir aussi J. GAMISANS (*Cat. Pl. Vasc. Corse*: 84, 1985) et H. BLATT (*Ber. Arbeitskr. Heim. Orch.* 2: 44, Karte 20, 1985).

R. DESCHATRES & M. CONRAD

Listera cordata (L.) R. Br.

- Asco, à l'entrée du cirque de Trimbolacciu, pozzine de pente traversée par des ruisselets affluents du ruisseau de Tighietu, disséminé sur une centaine de mètres le long des ruisselets, en général dans les coussinets de sphaignes, 1350 m, 10.7.1974, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), revu plusieurs fois depuis.

Espèce circumboréale qui n'avait jamais été reconstruite en Corse, signalée par J. BOUCHARD (*Fl. Prat. Corse*, 3^e éd.: 92, 1978). Voir aussi J. GAMISANS, (*Cat. Pl. Vasc. Corse*: 85, 1985) et H. BLATT (*Ber. Arbeitskr. Heim. Orch.* 2: 47, 1985).

R. DESCHATRES

Neotinea maculata (Desf.) Stearn

- Cap Corse, au-dessus du hameau d'Anneto de San Martino di Isota, talus herbeux, abondant, fleurs blanches, 6.5.1986, *Conrad, M.* observation.

Voir également H. BLATT (*Ber. Arbeitskr. Heim. Orch.* 2: 19, Karte 27, 1985).

M. CONRAD

Ophrys bombyliflora Link

- Talus de la D 31 et dans les pentes ravagées par les incendies de l'été 1985, voisinant avec des *Geranium lanuginosum*, 1986, *Conrad, M.* observation.

Voir également H. BLATT (*Ber. Arbeitskr. Heim. Orch.* 2: 20, Karte 33, 1985).

M. CONRAD

Ophrys sphegodes Miller subsp. **praecox** Corrias

- Bonifacio, talus surplombant la route avant la chapelle Saint Roch, un seul individu, mars 1986, *Conrad, M.* observation.

Ce taxon me paraît bien proche morphologiquement de la sous-espèce type, les labelles offrant le même dessin.

Voir également H. BLATT (*Ber. Arbeitskr. Heim. Orch.* 2: 23, Karte 40, 1985).

M. CONRAD

Orchis purpurea Hudson

- Novella, pâture près de l'embranchement de la route D 12 sur la N 197, une dizaine de pieds fleuris, 420 m, 3.5.1986, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Valle-di-Rostino, route de Casa-Pitti, coteau à pivoines dominant la route, un pied fleuri, 770 m, 24.5.1986, *Deschatres, R.* observation; nord de Corte, au col San-Quilico, pelouse calcaire dominant la route N 193, 540 m, 25.4.1984, *Deschatres, R.*, diapositive; Tralonca, à 1 km du village par la route de Santa-Lucia di Mercurio, talus au-dessus de la route et pâtures au-dessous, abondant, 780-800 m, 25.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Corte, route de Castirla, pentes dominant la D 18 au niveau du Monte Cecu, 530 m, un pied fleuri, 29.5.1980, *Deschatres, R.* observation; Castellare di Mercurio, bord de la route D 41 sous le village, 570 m, 26.4.1985, *Deschatres, R.* observation; Corte, bosquet clair entre l'ancienne route de Venaco et la N 193 au nord de Botro, 510 m, 27.5.1980, *Deschatres, R.* observation; route de Saint-André de Bozio, sous Arbitro, à 3 km de ce village, une quinzaine de pieds fleuris au bord de la D 15, et de là jusqu'à Arbitro en plusieurs points, disséminé par petits groupes ou pieds isolés, 530-740 m, 25.5.1980 et 26.4.1985, *Deschatres, R.* observation; basse vallée du Tavignano à 3 km en amont de Casaperta, bord de la route N 200, 20.4.1973, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Espèce rarement signalée en Corse, disséminée dans la région centrale de Corte — Ponte-Leccia (voir J. BRIQUET, *Prodr. Fl. Corse* 1: 361, 1910; R. DE LITARDIÈRE & E. SIMON, *Bull. Soc. Bot. France* 68: 33, 1921; M. CONRAD, *Monde Pl.* 395: 7, 1978; G. DUTARTRE, *Rev. Sci. Bourbonnais* 1980: 22, 1980; H. BLATT, *Ber. Arbeitskr. Heim. Orch.* 2: 27 et 54, Karte 54). La carte de ce dernier auteur, où sont mentionnés deux points, dont un seul d'observation récente, est manifestement insuffisante.

R. DESCHATRES

Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.

- Ghisonaccia, Pinia, pineraie à *Pinus pinaster* Soland. sur terrasse alluviale dominant de quelques mètres la mer, près du marais de Cattolica, 19.5.1981, *Lambinon, J. 81/731* (LG) et 30.5.1986, *Lambinon, J. 86/105* (G, LG).

Cette station proche de la mer est également fort intéressante si on se reporte aux données de H. BLATT (*Ber. Arbeitskr. Heim. Orch.* 2: 27 et 63, Karte 57, 1985). Voir aussi R. DE LITARDIÈRE, *Candollea* 15: 22, 1955.

J. LAMBINON

*Poaceae***Aeluropus littoralis** (Gouan) Parl.

- Secteur Tenda, "désert" des Agriates, Saleccia, marais à l'ESE de la dune, secteur non inondé, 10.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12537* (Hb. privé GAMISANS), fl.; désert des Agriates, sur la vase asséchée de l'étang de Padulella, 1 m, 4.10.1984, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); côte E, Palombaggia, bord d'un étang littoral, 1 m, 4.10.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); côte E, étang saumâtre d'Asciajo, dans la partie asséchée,

1 m, 1.10.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); sur les bords du plus petit des étangs d'Acciaju, 1-2 m, 14.6.1983, *Thiébaud, M.-A. & Roguet, D. T.04398* (G).

Cette espèce, peu souvent citée en Corse, n'était pas signalée dans le secteur de Tenda.

J. GAMISANS, M. MURACCIOLE, G. DUTARTRE,
M.-A. THIÉBAUD & R. DESCHATRES

Ampelodesmos mauritanica (Poiret) T. Durand & Schinz

- Suartone, à la Rondinara, rochers maritimes siliceux d'une petite crique entre les parties nord et ouest de la plage, une trentaine de touffes dispersées sur 50 m, 7.5.1984, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Notre citation précise l'indication préliminaire citée par J. GAMISANS (*Cat. Pl. Vasc. Corse*: 57, 1985). A la suite d'indications dubitatives (Loiseleur 1828) ou très vagues ("la Corse", Bernard), la plupart des auteurs des flores tant françaises qu'italiennes mentionnent la Corse dans l'aire de cette espèce, parfois avec doute (voir M. GUINOCHET & R. DE VILMORIN, *Fl. France*, 3: 1179, 1978). Toutefois J. BRIQUET écrit (*Prodr. Fl. Corse* 1: 111, 1910): "Cette espèce n'a été vue en Corse par personne avant et après la vague indication de Bernard". J. BOUCHARD (*Fl. Prat. Corse*, 3^e éd., 1978) ne la cite pas et J. GAMISANS (*Cat. Abr. Fl. Corse* 1: 41, 1982) estime sa présence en Corse très douteuse. Nos observations apportent donc la première confirmation de l'existence en Corse de cette espèce sténoméditerranéenne sud-occidentale. On remarquera que la plante, considérée par la plupart des auteurs comme rupicole calciphile, croît en Corse sur substrat granitique.

R. DESCHATRES

Andropogon distachyos L.

- Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, rochers granitiques rive droite du Cavu en aval du pont de Purcilella, 65 m, 21.5.1986, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Cette station complète la distribution analysée par G. BOSC & R. DESCHATRES in D. JEANMONOD & al., *Candollea* 41: 15, 1986.

R. DESCHATRES

Antinoria insularis Parl.

- Suartone, aux tre Padule, bord asséché de la mare orientale, 105 m, 22.5.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), revu plusieurs fois depuis; Suartone à la Rondinara, petite mare asséchée en arrière de la plage, à l'arrivée d'un ruisseau, 21.5.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bonifacio, mares asséchées près de la Trinité, 10.5.1961, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé), revu le 15.5.1967.

Espèce très rare et localisée, citée seulement par J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse* 1: 100, 1910) de deux localités dues à Revelière: Porto-Vecchio 1856 et la Trinité 1857. La plante est citée des tre Padule par P. QUÉZEL & C. ZEVACO (*Bull. Soc. Bot. France* 111: 274-275, 1964) sous le nom d'*Antinoria agrostidea*.

G. BOSC & R. DESCHATRES

Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & Schultes

- Entre Caporalino et Francardo, pelouse aride sur calcaire au pied du Monte a Supietra, rive gauche du ruisseau de Sumano, en compagnie de *Stipa bromoides* et *Elymus campestris*, 350 m, 1.8.1977, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

R. DESCHATRES

Bromus catharticus Vahl (= *B. willdenowii* Kunth)

- Lucciana-Canonica, au sud de l'aéroport de Bastia-Poretta, bord de chemin près de l'église de Canonica, 24.9.1984, *Lambinon, J. 84/710* (LG).

D'introduction assez récente en Corse, cette espèce est manifestement en extension dans l'île, au moins sur la côte orientale: voir R. DESCHATRES, *Monde Pl.* 421-422: 6, 1985.

D'un point de vue taxonomique et nomenclatural, nous adoptons le nom *B. catharticus*, à la suite de divers auteurs récents, entre autres M. KERGUÉLEN, *Lejeunia*, n.s. 110: 30, 1983.

J. LAMBINON

Bromus commutatus Schrader var. **commutatus**

- Secteur Tenda, "Désert" des Agriates, Saleccia, entre la dune et le marais, pré salé, 10.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12545* (Hb. privé GAMISANS), fl. et fr.; Calvi, La Revellata, crête sommitale en arrière du phare, jardinet abandonné irrigué, env. 130 m, 7.6.1979, *Lambinon, J. 79/308* (BR, G, LG).

Espèce rare en Corse. Elle n'était pas connue de la région de Calvi et, dans le secteur de Tenda, elle n'était citée que de l'embouchure de l'Ostriconi: voir R. DESCHATRES, *Monde Pl.* 421-422: 4-5, 1985.

J. GAMISANS, M. MURACCIOLE & J. LAMBINON

Bromus racemosus L.

- Cap Corse près de Barcaggio, mare temporaire asséchée à *Veronica anagalloides*, 5 m, 1.6.1986, *Conrad, M. & Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé DESCHATRES).

Ce spécimen présente des lemmes de 6-7 mm et une paléole à faces latérales glabres. Cette station est à ajouter aux trois localités mentionnées par R. DESCHATRES (*Monde Pl.* 421-422: 5, 1985).

M. CONRAD & R. DESCHATRES

Corynephorus fasciculatus Boiss. & Reuter

- Albertacce, rive gauche du Golo en aval du Ponte Altu, rive gauche, garrigue sableuse, 810 m, 21.8.1974, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Seconde localité corse de cette rare espèce, trouvée autrefois par Mabillet à Corte, d'après J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse* 1: 102, 1910). J'ai déjà fait mention de cette plante (*Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Bass. Médit. Bull.* 19: 82, 1984).

R. DESCHATRES

Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy

- Cap Corse, Grigione, talus bordant la route D 80 à la sortie sud du village, peu abondant, 2.6.1986, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bastia, près de la gare, vallon du Fango, 9.4.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bastia, friches, à l'entrée du vallon du Fango, 21.5.1984, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé); Saint-Florent, route d'Oletta D 82, au niveau d'un transformateur à 2 km du pont d'Aliso, abondant, 25.5.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), revu depuis jusqu'en 1986, en progression; Olmeta-di-Tuda, carrière calcaire abandonnée au Monte di Tuda, 330 m, 1.5.1984, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Calcatoggio, bord de la route D 81, près de Fiuminale, 250 m, 19.5.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Signalée uniquement dans l'extrême sud de l'île par J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse* 1: 189, 1910), cette espèce, toujours abondante sur le plateau calcaire de Bonifacio, semble en expansion, notamment au bord des routes. On peut se demander si elle n'est pas spontanée dans la région de Saint-Florent, et sur les calcaires de Monte di Tuda.

G. BOSC & R. DESCHATRES

Dichanthium ischaemum (L.) Roberty (= *Andropogon ischaemum* L.)

- Ponte-Lecchia, rive gauche du Golo en aval du pont routier, pelouse sableuse et rocailles, abondant mais localisé, 190 m, 6.7.1969, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Espèce mentionnée succinctement par J. GAMISANS (*Cat. Pl. Vasc. Corse*: 61, 1985) pour la première fois en Corse.

R. DESCHATRES

Festuca altissima All. (= *F. silvatica* (Pollich) Vill.)

- Vizzavona, en forêt, rive droite de l'Anghione en amont du camp des Américains, berge rocheuse humide et ombragée, abondant, 1000 m, 14.7.1966, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); forêt de Marmano, ravin du ruisseau de Marmano en amont du pont sous la Maison forestière, abondant, remonte aussi le long des ruisselets affluents de la rive droite, 970-1150 m, 30.7.1969, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bastelica, gorges du Prunelli, rive gauche, à 2 km en amont de la ville, 840 m, 31.7.1975, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bavella, couloir rocheux ombragé à l'ouest du col, sous la croix Leccia, 1350 m, 19.7.1964, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

La plante n'était pas connue de l'île avant nos premières récoltes. Depuis J. GAMISANS l'a signalée en deux localités (*Candollea* 32: 56, 1977). M^{me} Conrad (*in litt.* 2.12.1985) l'a observée à Vizzavona et Valdo-Niello.

R. DESCHATRES

Festuca gigantea (L.) Vill.

- Orezza, bords ombragés du Fium Alto en aval de la source d'Orezza, 380 m, 12.7.1970, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Cambia, en remontant le ruisseau de Sarbajo au-dessus du pont routier de la D 15, 730 m, 18.7.1874, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Carticasi, route de Cambia, talus frais bordant la route D 15 au voisinage d'une petite cascade, 800 m, 18.7.1974, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Saint-André de Bozio, entre Rebia et Poggio, talus frais de la route D 15 au niveau d'une source froide, 780 m, 12.7.1970, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Saint-André de Bozio, entre Rebia et Poggio, près du pont sur le ruisseau de Guaglinella, station à *Rosa arvensis*, 780 m, 12.7.1975, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); forêt de Marmano, en remontant le ruisseau de Marmano sous la Maison forestière, abondant dans le ravin, 950-1000 m, 14.8.1970, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse* 1: 155, 1910) ne cite cette espèce que de la forêt de Marmano, d'après Rotgès. Elle ne paraît pas rare dans le Bozio et est à rechercher dans la Castagniccia.

R. DESCHATRES

Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter

- Secteur Renosu, vallée du Fium'Orbu en aval de l'Inzecca, bord de la route D 344 en aval de Trevaldine, au pied des rochers de serpentine, 150 m, 17.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur Ospedale-Cagna, côte W, au S de Campomoro, Salina, pelouse dans une vaste dépression à 20 m de la mer, 2 m, 4.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12254* (Hb. privé GAMISANS), fl.; secteur Ospedale-Cagna, côte W, au S de Campomoro, Senetosa, 300 m, au NW du phare, dépression humide, pelouse sur sol limoneux-organique, 6.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12338* (Hb. privé GAMISANS), fl.; près de l'embranchement de la route D 60 sur la D 58, replats terreux des affleurements calcaires, 60 m, 22.5.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Cette graminée, peu fréquente en Corse, n'était pas signalée dans le secteur Ospedale-Cagna.

J. GAMISANS, M. MURACCIOLE & R. DESCHATRES

Hordeum bulbosum L.

- Cap Corse, Erbalunga, bord d'un chemin de terre à la sortie nord du village, près de la station à *Plagius flosculosus*, 15 m, 12.6.1983, *Conrad, M. & Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé DESCHATRES); Lozari, extrémité nord de la plage, au pied de la falaise, 2 m, 12.5.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Lozari, bords de la route N 199 en plusieurs points, près de l'embranchement de la route de Belgodère, 15 m, 7.5.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Lozari, le long de la route de Belgodère, en plusieurs points sur environ 2 km depuis son embranchement sur la route N 199, 15-50 m, 7.5.1980, *Deschatres, R.* observation; Belgodère, Lozari, dans une prairie, mai 1982, *Muracciole, M. s.n.* (Hb. privé).

privé), vég.; côte orientale, bord de la route N 193 au niveau de Borgo-Rivincio, côté ouest, peu abondant, 65 m, 29.5.1986, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); région d'Olimi-Capella, pâture sèche en allant aux rochers calcaires de la Cima Corbaiola depuis la route D 547, 630 m, 25.6.1986, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Ces indications complètent la première mention faite dans J. GAMISANS (*Cat. Pl. Vasc. Corse*: 66, 1985), L'espèce n'était pas connue de Corse, où elle nous paraît spontanée. C. J. HUMPHRIES (*Fl. Europaea* 5: 205, 1980) ne la considère pas comme indigène en France et au Portugal. D'après S. PIGNATTI (*Fl. d'Italia* 3: 534, 1982) il s'agit d'une espèce paléo-subtropicale, répandue en Italie surtout centrale et méridionale, et en Sicile. P. ZANGHERI (*Fl. Italica* 1: 980, 1976) l'indique également en Sardaigne.

R. DESCHATRES & M. MURACCIOLE

Hordeum marinum Hudson subsp. **gussoneanum** (Parl.) Ascherson & Graebner

- Cap Corse, à la marine d'Albo, sous les *Tamaris*, 6.5.1976, *Dutartre, G. s.n.* (Hb. privé); Ostriconi, au bord de la lagune, 1 m, 7.6.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); côte NW à l'E-NE d'Ile-Rousse, embouchure de l'Ostriconi, bord du chemin herbeux, prairie maritime sur sol argilo-sableux, 7.6.1985, *Lambinon, J. 85/Cø80* (Hb. Deschatres); Francardo, rive gauche du Golo à 1 km en aval du village, 245 m, 27.5.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Corte, vallée du Tavignano, r. g. à 6 km en aval de la ville, bord de la route N 200, 315 m, 15.5.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur Plaine Orientale, delta du Fium'Orbu, en arrière de la plage d'Arinella Bianca, 17.7.1984, *Gamisans, J. 11253* (Hb. privé), fl. et fr.; marais au NE de l'étang de Palu, prairie herbeuse humide en bordure du marais côté mer, 1 m, 31.5.1983, *Thiébaud, M.-A. & Roguet, D. T.04115* (G); côte orientale, Vix, petit marais à *Eryngium barrelieri* près de la route N 198 au niveau de l'étang de Palo, 10 m, 20.5.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Ajaccio, route de la Parata, lieux humides au niveau de Vignola, 5 m, 1.6.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); côte orientale, bord de la route N 198 près de l'embranchement du chemin de la Marine de Solaro, 8 m, 7.5.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Marine de Solaro, lieu marécageux en arrière de la partie sud de la plage, 1 m, 23.5.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); sud d'Ajaccio, près de la plage de Chiavari, lieu humide, 2 m, 30.5.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Solenzara, à 3 km au nord de la ville, bord du marais de Péri, 2 m, 7.5.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur Ospedale-Cagna, côte W, au S de Campoloro, Canosellu, pelouse sur replat, à 100 m en arrière de la plage, 2 m, sol assez épais, 4.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12194* (Hb. privé GAMISANS), fl.; Porto-Vecchio, bord de la route N 198 un peu au nord de l'embranchement de Santa Giulia, 20 m, 20.5.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Santa-Giulia, près de la lagune, 1 m, 13.5.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); rive gauche de l'Ortolo près de son embouchure, sur le chemin inondé en allant à la plage d'Erbaju, 5 m, 20.5.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); sud de Sartène, à la Cala di Roccapina, marais en arrière de la plage, 1 m, 18.5.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); près du pont de Figari, prairie humide, 1 m, 18.5.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Tonnara-plage, prairie maritime, 2 m, 16.5.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bonifacio à la Trinité, prairie humide au nord du massif rocheux, 125 m, 8.4.1968, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bonifacio, pâture humide à droite de la route de Sartène, lieu-dit Padulu, 80 m, 21.5.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bonifacio, sur le chemin de terre humide conduisant de la route D 58 au marais de Musella, 60 m, 22.5.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); près de Bonifacio, dépression de Musella, 17.5.1979, *Dutartre, G. s.n.* (Hb. privé).

Contrairement aux indications de J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse* 1: 192, 1910), le subsp. *gussoneanum* est bien plus répandu en Corse que le subsp. *marinum*. Bien que la plupart des stations soient sublittorales, ce taxon n'est pas une halophile stricte et peut se rencontrer loin de la mer.

R. DESCHATRES, G. DUTARTRE, J. GAMISANS,
M. MURACCIOLE & J. LAMBINON

Leersia oryzoides (L.) Swartz

- Querciolo, au nord de la plage de Sorbu, bord des canaux près de la station de pompage, 16.9.1984, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); bord du Tavignano un peu en amont de Vaccaja, rive gauche, 10 m, 16.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); au nord de la plage de Solaro, petit marais non loin d'un beau pied isolé de *Genista aetnensis*, 13.7.1977, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Porto-Pollo, bord du Taravo, rive gauche entre la route D 57 et le fleuve près de Copola, 20 m, 8.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Porto-Pollo, à l'embouchure du Taravo, rive gauche droite (panicules incluses dans les gaines foliaires), 9.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Propriano, bord du Rizzanèse, rive gauche en aval du pont de la Rena Bianca, 5 m, 9.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); région de Sartène, bords de l'Ortolo en aval du pont sur la D 50, près des mines de Curgia, 27.8.1983, *Dutartre, G. s.n.* (Hb. privé).

Espèce rare ou peu observée d'après J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse*: 68, 1910), peut-être passée inaperçue en raison de sa floraison tardive, ou du fait de l'inflorescence restant souvent incluse dans la gaine de la feuille supérieure.

R. DESCHATRES & G. DUTARTRE

Phalaris arundinacea L. subsp. **rotgesii** (Fouc. & Mandon ex Husnot) Kerguélen

- Rives du Travo, en aval de Chisa (environ à 6 km), abondant par places, septembre 1985, *Conrad, M.* observation.

L'abondance de cette espèce par places explique sa présence: elle est amenée par le torrent jusqu'à son embouchure. Un tel entraînement jusqu'au bord de mer a également été signalé récemment dans le Travo par R. DESCHATRES & J. LAMBINON (in D. JEANMONOD & al., *Candollea* 41: 20, 1986).

M. CONRAD

Phleum subulatum (Savi) Ascherson & Graebner (= *P. tenue* (Host) Schrader)

- Bastia, vallon du Fango, pelouse sèche sous la route de Cardo, 60 m, 1.7.1960, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé)

Seconde localité corse de cette rare espèce, découverte en Corse par R. DE LITARDIÈRE à Saint-Florent (*Candollea* 7: 229-241, 1937).

R. DESCHATRES

Piptatherum coerulescens (Desf.) Beauv.

- Région d'Ajaccio, à la pointe de la Corba, rochers siliceux, avec *Succowia balearica*, 40 m, 20.4.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Osani, Réserve naturelle de Scandola, Capu Purcile, 500 m, mai 1983, *Gamisans, J. & Muracciole, M. s.n.* (Hb. privé MURACCIOLE), fl. et fr.; sud de Sartène, à la Cala di Roccapina, au pied des grands rochers siliceux dominant un chemin en corniche à environ 1 km au sud de la plage, 20 m, 23.4.1984, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Espèce peu commune dans l'île, longtemps connue de la seule région d'Ajaccio (voir J. BRIQUET, *Prodr. Fl. Corse* 1: 76, 1910), signalée depuis à Elbo dans la Réserve de Scandole, J. GAMISANS (*Candollea* 40: 112, 1985), et à la Pointe de la Revellata près de Calvi (voir J. LAMBINON, & F. PIRONET, *Webbia* 38: 745, 1984).

R. DESCHATRES & M. MURACCIOLE

Saccharum ravennae (L.) Murray (= *Erianthus ravennae* (L.) Beauv.)

- Côte orientale, marais en arrière de la plage de Cap Sud, au sud de l'embouchure du Golo, abondant, 1 m, 7.10.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Querciolo, à 1 km au nord de Marina di Sorbu, zone humide en arrière de la plage, station à *Periploca graeca*, abondant, 2 m, s.d., *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); marais en arrière de la plage d'Ang'hione, et entre celle-ci et la plage de Sorbu, très abondant, plantes très élevées (une hampe florifère atteignait 4,70 m!), 2 m, 7.10.1979, *Conrad, M. & Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé)

DESCHATRES); Aleria, rive droite du Tavignano près de son embouchure, marais en arrière de la plage, 2 m, 29.9.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

D'après J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse* 1: 63, 1910), cette espèce était localisée à Biguglia, indication reprise par J. BOUCHARD (*Fl. prat. Corse*, 3^e éd.: 57, 1978). Romagnoli a toutefois récolté *Saccharum ravennae* à Solenzara en 1830 et il en existait encore des touffes cent ans après Romagnoli en 1930, disparues depuis (*Conrad, M.* observation).

R. DESCHATRES & M. CONRAD

***Stipa pennata* L. subsp. *eriocaulis* (Borbás) Martinovsky & Skalicky**

- Lano, cime de la chapelle Sant'Angelo, sur la crête calcaire en haut de la falaise, quelques touffes, 1170 m, 21.7.1967, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), revu le 10.7.1969.

Troisième localité de ce rare taxon, découvert par R. DE LITARDIÈRE au Monte San Pedrone (*Arch. Bot., Mém.* 2: 7, 1928), puis signalée par J. GAMISANS (*Candollea* 25: 120, 1970) au Monte Piono Maggiore.

R. DESCHATRES

Trisetum flavescens* (L.) Beauv. var. *flavescens

- Cambia, route de Carticasi, talus suintant à droite à la sortie du village, 790 m, 9.6.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Plante élevée, atteignant 65 cm; chaume et nœuds glabres, gaines inférieures à longs poils soyeux plus ou moins rebroussés ou étalés, les supérieures glabres; feuilles à limbe plan pourvu de poils plus ou moins longs à la face ventrale, glabre ou glabrescent à la face dorsale. Panicule médiocre, atteignant 8 cm, assez étroite mais non contractée, à épillets plus grands que ceux de mes échantillons de *T. flavescens* var. *corsicum* (Rouy) Briq. Jusqu'ici seuls étaient connus en Corse les var. *corsicum* et *burnoufii* (Req. ex Parl.) Hackel, ce dernier jamais revu depuis sa description.

R. DESCHATRES

Potamogetonaceae

***Potamogeton crispus* L.**

- Côte orientale, dans le canal longeant la route de terre reliant les D 37 et D 406 (provenant de Querciolo et de Cruciata) à proximité de cette dernière, 18.9.1981, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé); Querciolo, au nord de la plage de Sorbu, canaux d'assainissement près de la station de pompage, 1 m, 4.5.1985, *Deschatre, R. s.n.* (Hb. privé); secteur d'Incudine-Bavella, environs de Propriano, sur le Rizzanese, près du pont de Rena-Bianca, abondant, dans 50 à 100 cm d'eau, 2 m, 5.6.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.3232* (G); Propriano, dans le Rizzanese, rive gauche en aval du pont de la Rena Bianca, abondant, 9.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

D. JEANMONOD, D. ROGUET, G. BOSC & R. DESCHATRES

***Potamogeton natans* L.**

- Secteur d'Ospedale-Cagna, petite mare sur la N 198, au NW de l'étang de Balistra et à 200 m au sud de la piste de moto-cross du lieu-dit Francole, dans la mare, abondant, 10 m, 3.6.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.3122* (G); route de Bonifacio à Porto-Vecchio N 198, dans un trou profond à gauche de la route, à 8 km de Bonifacio, en compagnie de *Nymphaea alba*, 10 m, 20.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Nouvelle station pour cette espèce considérée par J. BRIQUET comme rare (*Prodr. Fl. Corse* 1: 52-53, 1910).

D. JEANMONOD, D. ROGUET & R. DESCHATRES

*Ruppiaceae***Ruppia maritima** L. var. **brevirostris** (Agardh) Ascherson & Graebner

- Porto-Vecchio, étang sud d'Asciaju, dans l'étang dans 20 à 50 cm d'eau, 29.4.1985, *Jeanmonod, D. & Roguet, D. J.1658* (G).

Les nombreuses récoltes du genre *Ruppia* que nous avons effectués en 1985 et 1986 nous confirment que le *R. cirrhosa* (Petagna) Grande (= *R. maritima* subsp. *spiralis* (L. ex Dumort.) Ascherson & Graebner) est très répandu dans les étangs littoraux tandis que le *R. maritima* s. str. est beaucoup plus rare, notamment le var. *brevirostris* qui ne reste connu que de la région de Porto-Vecchio.

D. JEANMONOD & D. ROGUET

Ruppia maritima L. var. **maritima** (= subsp. *rostellata* (Koch) Ascherson & Graebner)

- Etang de Stagnolo (au nord de l'embouchure de la Bravona), dans l'eau saumâtre, côté mer, profondeur environ 50 cm, 30.5.1986, *Lambinon, J. 86/102* (BR, G, LG) et 1.8.1986, *Lambinon, J. 86/246* (G, LG).

A la suite d'une série de travaux récents, rappelés et amplifiés par les recherches de J. T. A. VERHOEVEN (voir notamment *Aquat. Bot.* 6: 197-268, 1979), nous considérons *R. maritima* comme une espèce distincte de *R. cirrhosa* (Petagna) Grande (= *R. maritima* subsp. *spiralis* (L. ex Dumort.) Ascherson & Graebner); notre matériel s'identifie plus précisément à la var. *maritima*, à longs podogynes (généralement plus de 2 cm de longueur). Une étude cytotaxonomique des plantes corses serait toutefois utile, à l'examen des données assez troublantes de W. VAN VIERSEN, R. J. VAN WIJK & J. R. VAN DER ZEE (*Aquat. Bot.* 11: 297-301, 1981).

J. LAMBINON

*Sparganiaceae***Sparganium erectum** L. subsp. **neglectum** (Beeby) Schinz & Thell.

- St-Florent, bords de l'Aliso près du pont de la route D 81, 1 m, 16.7.1970, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Propriano, près du pont de la Rena Bianca, bord du Rizzanese, 2 m, 23.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur d'Ospedale-Cagna, Tizzano, étang à l'arrière de la Cala di Tizzano, fossés, peu abondant, 1 m, 4.6.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.3180* (G).

Taxon assez rare, signalé seulement en quelques localités çà et là (voir J. BRIQUET, *Prodr. Fl. Corse* 1: 50, 1910; R. DE LITARDIÈRE, *Arch. Bot., Mém.* 2/1: 6, 1928 et *Arch. Bot., Mém.* 4/2: 5, 1930).

D. JEANMONOD, D. ROGUET & R. DESCHATRES

*Zannicheliaceae***Althenia filiformis** Petit

- Porto-Vecchio, étang sud d'Asciaju, dans l'étang dans 20 à 30 cm d'eau, 29.4.1985, *Jeanmonod, D. & Roguet, D. J.1658* (G).

Bien que la présence de cette espèce semblait probable en Corse (voir notamment J. BRIQUET, *Prodr. Fl. Corse* 1: 58, 1910), on n'en avait encore aucune preuve. Cette espèce est par conséquent **nouvelle pour la Corse**.

D. JEANMONOD & D. ROGUET

Zannichellia palustris L. subsp. **pedicellata** (Wahlenb. & Rosén) Arcang.

- Côte orientale, embouchure du Golo, étang un peu saumâtre de Ciavattone, 29.5.1986, *Lambinon, J. 86/85* (G, LG) et *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); bord du Tavignano un

peu en amont de Vaccaja, rive gauche, sous faible profondeur d'eau calme, 10 m, 16.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse* 1: 57-58 et 645, 1910) ne cite cette plante que de deux localités: Porto-Vecchio et Bonifacio.

R. DESCHATRES & J. LAMBINON

Amaranthaceae

***Amaranthus bouchonii* Thell.**

- Venaco, bord de la route de Vivario à 3 km de la ville, 450 m, 14.9.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), fl. et fr.; Ponte-Leccia, terrain vague dans le village, 195 m, 18.9.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), fr.; basse vallée du Tavignano en amont de Vaccaja, rive gauche, sables et galets, en compagnie d'autres *Amaranthus*, 15 m, 16.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Les deux premières localités ont fait l'objet d'une mention succincte dans J. GAMISANS (*Cat. Pl. Vasc. Corse*: 92, 1985) où elle était signalée pour la première fois en Corse. Elle est répandue et bien naturalisée en France continentale mais encore inconnue en Italie, du moins sous sa forme typique, car S. PIGNATTI (*Fl. d'Italia* 1: 179, 1982) ne signale que le var. *cacciatoi* Aellen, à capsules déhiscentes, aux environs de Rome.

R. DESCHATRES

Apiaceae

***Aegopodium podagraria* L.**

- Corte, rive gauche du Tavignano à 3 km en aval de la ville, sous les aulnes, petite plage de 2 m², 340 m, 11.4.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), fol.

J. GAMISANS (*Cat. Pl. Vasc. Corse*: 215, 1985) considérait cette espèce comme douteuse pour la Corse, sa présence éventuelle n'étant suggérée que par un échantillon de Serafini, sans indication de localité, observé par R. de Litardière dans l'herbier Requier (voir J. BRIQUET & R. DE LITARDIÈRE, *Prodr. Fl. Corse* 3/1: 108, 1938). Sa spontanéité dans l'île est rendue vraisemblable par le fait qu'il s'agit de la forme sauvage, à feuilles vertes, et non du *cultivar* horticole à feuilles panachées. Il s'agit donc d'une **espèce nouvelle pour la flore de Corse**.

R. DESCHATRES

***Angelica sylvestris* L.**

- Cap Corse, Miomo, talus frais bordant la route D 31 près d'Annetto, 255 m, 10.10.1984, *Conrad, M. & Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé DESCHATRES), fr.; côte orientale, Querciolo, au nord de la plage de Sorbu, abondant le long des canaux et dans les lieux marécageux, 1-2 m, 16.9.1984, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Cervione, au sud de Prunete, terrain humide inculte au bord de la route N 198, abondant et visible de la route, 28.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), fl. et fr.

Après les indications anciennes rappelées dans le Prodrôme (J. BRIQUET & R. DE LITARDIÈRE, *Prodr. Fl. Corse*, 3/1: 128, 1938), "env. de Bastia jusque dans la région montagneuse inférieure (Salis), Biguglia AC, Saint-Florent (Mabille)", la plante paraît subir une éclipse. R. de Litardière et G. Malcuit la recherchent en vain à Biguglia et à Saint-Florent. J. GAMISANS (*Cat. Pl. Vasc. Corse*: 215, 1985) se demande si l'angélique observée par M. CONRAD près de Miomo en 1973 (*Monde Pl.* 383: 4, 1975) ne serait pas échappée de jardin. A notre avis, *Angelica sylvestris* est parfaitement indigène en Corse, comme il l'est en France méridionale et en Italie, où sa présence est seulement douteuse dans les Pouilles et en Sardaigne (voir S. PIGNATTI, *Fl. d'Italia* 2: 228, 1982). Les localités nouvelles s'intègrent bien dans le schéma ancien, avec une extension vers le sud sur la côte orientale. Ajoutons que la plante a été récemment indiquée à Solenzara, rive droite de la rivière en amont du pont, par J. TERRISSE (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, n.s. 16: 236, 1985).

R. DESCHATRES & M. CONRAD

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

- Col Saint-Georges (commune de Grosseto, N 196 entre Grosseto et Cauro), 750 m, petit fossé au bord de la route, un seul pied, 1.6.1986, *Lambinon, J. 86/156* (LG).

La plante est manifestement introduite ici; est-il absurde d'imaginer qu'elle ait été amenée involontairement dans le vêtement ou la besace d'un botaniste du groupe qui a pique-niqué là le 4 avril 1984 (C. LAHONDÈRE, *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, n.s.* 16: 208 et 263, photo)? Il sera de toute façon intéressant de voir si la station persiste ou s'étend à l'avenir. Cette espèce n'a été mentionnée qu'une fois en Corse, dans des conditions beaucoup plus naturelles et à haute altitude, dans le massif du Rotundo (J. GAMISANS, *Candollea* 26: 342-343, 1971).

J. LAMBINON

Bunium pachypodum P. W. Ball

- Vallée du Tavignano à 12 km en aval de Corte, talus à droite de la route N 200 près d'une maisonnette ruinée, quelques pieds seulement, 240 m, 24.5.1982, *vidit* J.-P. Reduron, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé, LG).

Seconde récolte corse de cette rare espèce de Méditerranée occidentale, découverte à Sari-di-Porto-Vecchio par P. Aellen en 1935 (voir J. BRIQUET & R. DE LITARDIÈRE, *Prodr. Fl. Corse* 3/1: 100-101, 1938).

Malgré cette indication précise, la plante n'est pas mentionnée par J. BOUCHARD (*Fl. Prat. Corse*, 3^e éd., 1978), ni par P. W. BALL (*Fl. Europaea* 2: 329, 1968); d'autre part ce dernier auteur considère comme incertaine sa spontanéité en France.

R. DESCHATRES

Bupleurum gerardii All. var. **patens** Reichenb.

- Saint-André de Bozio, route de Zuani, rochers schisteux à la Pointe de Figarello, peu abondant, 1100 m, 10.7.1974, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

R. DESCHATRES

Bupleurum semicompositum L.

- Secteur Ospedale-Cagna, côte W, au S de Campomoro, Canosellu, secteur N, pelouse sur replat, 100 m en arrière de la plage, sol assez épais, 4.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12206* (Hb. privé GAMISANS), fl.; secteur Ospedale-Cagna, côte W, au S de Campomoro, Canosellu, secteur S, pelouse sur replat à 120 m en arrière de la plage, sol organique assez épais, 2 m, 4.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12215* (Hb. privé GAMISANS), fl. et fr.; secteur Ospedale-Cagna, côte W, au S de Campomoro, Salina (au S de Canosellu), pelouse dans une vaste dépression à 20 m de la mer, 2 m, 4.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12263* (Hb. privé GAMISANS), fl. et fr.

Cette espèce n'était préalablement signalée que dans le secteur de Bonifaciu (voir J. BRIQUET & R. DE LITARDIÈRE, *Prodr. Fl. Corse* 3/1: 78, 1938) et au pont de Ventilegne (J. GAMISANS, R. DESCHATRES & M. MURACCIOLE in JEANMONOD & al., *Candollea* 41: 23, 1986).

J. GAMISANS & M. MURACCIOLE

Eryngium barrelieri Boiss.

- Côte orientale, Vix, au sud du village, marais à l'ouest de la route de Bonifacio N 198, 15 m, 29.8.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Echantillons de haute taille, atteignant 30 cm. Plante revue à plusieurs reprises, jusqu'à la destruction de la station par des travaux de terrassement en 1976. La localité classique de Bonifacio, dépression de Musella, connue depuis Thomas, reste la seule actuelle (voir J. BRIQUET & R. DE LITARDIÈRE, *Prodr. Fl. Corse* 3/1: 43, 1938).

R. DESCHATRES

Hydrocotyle vulgaris L.

- Secteur Cap Corse, au-dessus de Sisco, Bocca San Giovanni, versant E, écoulement de source, 850 m, 9.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12512* (Hb. privé GAMI-SANS), ster.; près d'Ostriconi, bords de l'étang de Cannuta, 5 m, 5.5.1986, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Favone, à la sortie sud du village, fossé humide à droite de la route de Bonifacio, 5 m, 15.7.1974, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Dans le secteur du Cap, cette espèce, disséminée en Corse, n'était signalée qu'à l'embouchure de la rivière d'Albo. La première localité citée correspond à la plus haute altitude notée pour ce taxon en Corse.

J. GAMISANS, M. MURACCIOLE & R. DESCHATRES

Myrrhoides nodosa (L.) Cannon

- Santa-Lucia-di-Mercurio, bord du ruisseau de Santa-Lucia, rive gauche en aval de Piedivaldo, dans la ripisylve, abondant, 470 m, 26.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Santa-Lucia-di-Mercurio, rochers calcaires au-dessus du champ de tir de Campettine, versant nord ombragé, peu abondant, 800 m, 3.6.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur d'Incudine-Bavella, environs de Propriano, étang de Cannichia, lisière du maquis en bordure du pâturage derrière l'étang, assez abondant, 10 m, 5.6.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.3209* (G).

D. JEANMONOD & R. DESCHATRES

Pimpinella lutea Desf. (= *Reutera lutea* (Desf.) Maire)

- Favone, talus rocaillieux du bord de la route à la sortie sud du village, dans les virages (actuellement coupés par un nouveau tracé) de la N 198 entre la plage et le petit col de Guardia, 15 m, 11.8.1966, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé, LG), fl. et fr., revu depuis à plusieurs reprises; bord de la route N 198, rocailles dans les tournants au nord de l'embouchure de la Conca, à 7 km au nord de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, lieu-dit Ogliastriccione, 10 m, 23.7.1966, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Cette rare espèce, découverte en Corse par J. BOUCHARD (*Bull. Soc. Bot. France* 106: 348, 1960) reste localisée dans une petite région au nord de Porto-Vecchio. Elle a été récoltée également par J. VIVANT à Favone le 18.8.1966 (*Monde Pl.* 366: 10, 1970) sans doute dans la même station. Espèce sténo-méditerranéenne sud-occidentale (et non E.-Médit. comme l'indiquent P. QUÉZEL & S. SANTA, *Nouv. Fl. Algérie* 2: 658, 1963), dont les seules stations européennes se trouvent en Corse et dans l'île Pantellaria. La plante est commune en Algérie à l'E d'Orléansville (P. QUÉZEL & S. SANTA, l.c.) T. G. TUTIN (*Fl. Europaea* 2: 331, 1968) écrit qu'elle croît sur "sunny volcanic rocks", indication reprise par M. GUINOCHE & R. DE VILMORIN, (*Fl. France* 2: 444, 1975), ce qui n'est pourtant pas le cas en Corse.

R. DESCHATRES

Torilis arvensis (Hudson) Link subsp. **purpurea** (Ten.) Hayek var. **purpurea**

- Région de St-Florent, bord d'un ruisseau sous Oletta, 150 m, 6.7.1977, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), dét. J. P. Reduron; Bustanico, bord de la route de Carticasi D 15, près du petit col de Chiosella, 990 m, 12.7.1977, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), dét. J. P. Reduron; secteur d'Incudine-Bavella, environs de Propriano, étang de Cannichia, lisière du maquis en bordure du pâturage derrière l'étang, assez abondant, 10 m, 5.6.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.3211* (G).

Le var. *purpurea*, beaucoup plus rare que les autres taxons infraspécifiques, n'est connu que de quelques stations: étang du Loto, Bastelica et Bonifacio (J. BRIQUET & R. DE LITARDIÈRE, *Prodr. Fl. Corse* 3/1: 57-58, 1938).

D. JEANMONOD & R. DESCHATRES

*Aquifoliaceae***Ilex aquifolium** L. var. **chrysocarpa** Lœs

- Entre Bavella et Quenza, près du ruisseau de Criviscia, 950 m, novembre 1982, *Conrad, M.* observation.
M. CONRAD

*Aristolochiaceae***Aristolochia rotunda** L. subsp. **insularis** (Nardi & Arrigoni) Gamisans

- Secteur Cap Corse, Sisco, hameau supérieur, châtaigneraie fraîche dans un vallon, 450 m, 9.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12519* (Hb. privé GAMISANS), fl.; Venaco, sentier dominant la N 193 au S du village, env. 640 m, petit talus, pied d'un muret, dans les friches parsemées de *Quercus pubescens*, souche tubéreuse subcylindrique verticale, 7.6.1985, *Lambinon, J. 85/Co/89* (Hb. privé DESCHATRES).

Ces stations complètent la note de G. BOSC in D. JEANMONOD & al. (*Candollea* 41: 23, 1986).

J. GAMISANS, M. MURACCIOLE & R. DESCHATRES

Aristolochia tyrrhena Nardi & Arrigoni

- Au nord de Galeria sous la Bocca Bassa, en remontant deux petits ravins rocheux au-dessus de la D 81, lieu-dit Dispensa, 11.4.1978, *Dutartre, G. s.n.* (Hb. privé); bord de la route entre le col de la Croix et celui de Palmarella, rocailles près de la fontaine de Chiaravalle, 230 m, 24.4.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé DESCHATRES).

Voir J. GAMISANS, *Candollea* 40: 114, 1985.

R. DESCHATRES & G. DUTARTRE

*Asteraceae***Artemisia verlotiorum** Lamotte

- Cap Corse, côte orientale, Pietracorbara, entre Ponticello et Pietronacce, en bordure de la route, 8.10.1986, *Dutartre, G. 16479* (Hb. privé); Castagniccia, entre San Gavino d'Ampugnani et Prunu, en bordure de la route D 36, 490 m, 12.10.1986, *Dutartre, G. 16481* (Hb. privé).

Ces stations complètent la distribution esquissée par R. DESCHATRES & al. in D. JEANMONOD & al., *Candollea* 41: 25, 1986. La station de la Castagniccia est la première connue hors de la zone proche du littoral.

G. DUTARTRE

Bidens frondosa L.

- Carbuccia, entre la N 193 et Carbuccia, en de nombreux points dans les fossés bordant la route D 29, 18.10.1986, *Dutartre, G. 16473* (Hb. privé); entre Carbuccia et Ucciani, fossés bordant la route D 29, 18.10.1986, *Dutartre G. 16474* (Hb. privé); Ajaccio, depuis la route N 193 en direction de Peri, après le passage à niveau dans les fossés bordant la route D 229, 18.10.1986, *Dutartre G. 16477* (Hb. privé); Cuttoli-Corticchiato, fossés de la route D 303, près du village, 18.10.1986, *Dutartre G. 16472* (Hb. privé); Ajaccio, près de la gare SNCF de Mezzana, fossés bordant la D 303 entre la N 193 et le pont sur la Gravone, 18.10.1986, *Dutartre G. 16471* (Hb. privé); Ajaccio, à 1 km à l'W d'Ocana, à gauche de la route D 3 en montant depuis Ajaccio près d'une source et dans le fossé avec *Fuirena pubescens* (Poiret) Kunth, 17.10.1986, *Dutartre G. 16478* (Hb. privé); Ajaccio, fossé près de l'intersection de la route D 3 et de la N 196 où la plante est abondante, 17.10.1986, *Dutartre G. 16470* (Hb. privé); Ajaccio, embouchure du Prunelli, près de la tour de Capitello, 17.10.1986, *Dutartre G. 16475* (Hb. privé).

Cette espèce est maintenant répandue dans la région d'Ajaccio, qui fut probablement le lieu de son introduction dans l'île il y a une trentaine d'années (voir R. DESCHATRES, J. GAMISANS & J. LAMBINON in D. JEANMONOD & al., *Candollea* 41: 25, 1986).

G. DUTARTRE

Bidens tripartita L. subsp. **bullata** (L.) Rouy

- Caporalino, fossé en bordure de la N 193, près des grands rochers à *Brassica insularis*, 2.10.1975, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé), station découverte par M. & D. Pascal; vallée du Tavignano à environ 10 km en aval de Corte, fossé à droite de la route N 200, 21.8.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); côte orientale, Vix, au bord de l'étang de Palo, 1 m, 20.8.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); côte orientale, Vix, au bord de l'étang de Palo, 1 m, 20.8.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Les échantillons de Vix sont typiques; certains exemplaires de Caporalino sont également typiques, d'autres ont les feuilles supérieures trifoliolées; ceux de la vallée du Tavignano, très vigoureux, croissaient en mélange avec le *Bidens tripartita* subsp. *tripartita* et certains présentent des feuilles supérieures trifoliolées. M. Debray, qui les a étudiés en 1973, les croyait d'origine hybride et les avait nommés *Bidens tripartita* L. (s.lat.) subsp. *bullata* x subsp. *tripartita*.

R. DESCHATRES & G. BOSC

Carduncellus caeruleus (L.) C. Presl (= *Carthamus caeruleus* L.)

- Saint-Florent, bord du chemin littoral au-delà du gué d'Olzu, calcaire, 5 m, 12.5.1986, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Aleria, sur le plateau calcaire près des fouilles, 30.8.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), fr.; Bonifacio, broussailles dans la partie la plus basse du vallon de Canetto, 9.5.1973, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé); Bonifacio, enclos herbeux, route de Sant'Amanza, 25.5.1969, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé); Bonifacio, plateau calcaire près des ruines romaines de Piantarella, 10 m, 14.5.1967, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé); secteur de Bonifaci, golfe de Sant'Amanza, en bordure du chemin conduisant à l'étang de Canettu, situation sèche au bord du chemin, à environ 800 m de la mer, 20 m, 22.5.1983, *Thiébaud, M.-A. & Roguet, D. T.03877* (G); Bonifacio, plateau calcaire près des ruines de Piantarella, 10 m, 19.5.1986, *Deschatres, R., Gamisans, J. & Hébrard, J.-P. s.n.* (Hb. privé DESCHATRES); secteur de Bonifaci, côte sud-orientale, sous les ruines de Piantarella, prairie sèche en bordure de garrigue très basse et dégradée, abondant, 10 m, 19.5.1983, *Thiébaud, M.-A. & Roguet, D. T.03771* (G).

R. DESCHATRES, G. BOSC, J. GAMISANS,
J.-P. HÉBRARD & M.-A. THIÉBAUD

Centaurea cyanus L.

- Au début du chemin muletier partant de Cavalleraccia, hameau de Corscia, et allant vers le pont gênois sur le Rudda, env. 880 m, avril 1980, *Conrad, M.* observation.

M. CONRAD

Cotula coronopifolia L.

- Secteur des Agriates, étang du Loto, 2 m, 11.5.1983, *Dutartre, G. 10125* (Hb. privé); en arrière de la plage de Porto, petite zone humide entre des *Eucalyptus globulus*, avril 1986, *Conrad, M.* observation; côte orientale, secteur de Cagna-Ospedale, au nord-est de Porto-Vecchio, baie de San Ciprianu, au bord des étangs d'Arasu, marais asséché entre l'étang et la mer, 1 m, 21.5.1983, *Thiébaud, M.-A. & Roguet, D. T.03853* (G); secteur de Porto-Vecchio, mares à la plage de Palombaggia, 3 m, 5.4.1978, *Dutartre, G. 10123* (Hb. privé); secteur d'Ospedale-Cagna, Tizzano, étang à l'arrière de la Cala di Tizzano, dans le marais, partout y compris dans les zones déjà bien exondées, très abondant, 1 m, 4.6.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.3168* (G); côte occidentale, secteur de Cagna-Ospedale, Cala di Tizzano, dans la prairie inondée, marécageuse, située à

l'embouchure du ruisseau de Tizzano, au fond de la Cala, les pieds dans l'eau, 0-1 m, 21.4.1982, *Thiébaud, M.-A. 02465* (G); secteur de Sartène, col de Coralli, 105 m, 3.4.1978, *Dutartre, G. 10124* (Hb. privé); côte occidentale, secteur de Cagna-Ospedale, Cala di Furnellu, dans le marais saumâtre encore inondé, bordant l'étang formé à l'embouchure des ruisseaux de Spartano et de Bonanda, immédiatement en arrière de la plage de sables littoraux, les pieds dans l'eau, 0-1 m, 29.4.1982, *Thiébaud, M.-A. 02593* (G); secteur de Bonifacio, Punta di Ventilègne, mares asséchées, 5 m, 16.10.1986, *Dutartre, G. 10126* (Hb. privé); rive droite du golfe de Sant'Amanza, à 3 km de Gurgazo, avril 1986, *Conrad, M.* observation.

Comme l'ont déjà fait remarquer J. VIVANT (*Monde Pl.* 351: 12, 1966; *Monde Pl.* 366: 10, 1970), M. CONRAD (*Monde Pl.* 356: 8, 1967; *Monde Pl.* 401: 7, 1980), CH. SIMON (*Bauhinia* 7: 27, 1980) et D. JEANMONOD & al. (*Candollea* 41: 26-27, 1986), cette espèce est en expansion en Corse, tout comme en Europe occidentale et méditerranéenne en particulier. Elle n'est définitivement plus une rareté sur l'île de Beauté où une vingtaine de stations sont actuellement connues (fig. 1). Dans toutes les stations citées, cette espèce est très abondante. Elle se développe particulièrement rapidement entre autres par sa propriété d'émettre des stolons aussi prolifiques que longuement traçants dans les vases immergées des étangs, mares et zones palustres. Les *Cotula coronopifolia* peuvent former de véritables zonations ou des ceintures presque pures dans les stations inondées recouvertes par cinq à dix centimètres d'eau en moyenne au printemps. Après un mois d'avril assez pluvieux, nous avons pu observer, le 20 mai 1982, dans le petit marais inondé de la Cala di Roccapina, un peuplement presque pur de *Cotula coronopifolia* (*Thiébaud, M.-A. 01522* et *03224*, G), constituant une véritable prairie aquatique dressant des milliers de petits globules jaunes quelque dix centimètres au-dessus de la surface de l'eau.

M. CONRAD, G. DUTARTRE, D. JEANMONOD & M.-A. THIÉBAUD

Crepis zacintha (L.) Babcock

- Cap Corse, Macinaggio, maquis défriché à droite de la route D 80, à l'ouest du village en face le panneau d'agglomération, très abondant, 8.10.1986, *Dutartre, G. s.n.* (Hb. privé), fr.

G. DUTARTRE

Evax rotundata Moris

- Région d'Ajaccio, pelouse sableuse en arrière d'une petite plage au nord de la pointe de la Corba, 10 m, s.d., *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); région d'Ajaccio, au pied de la tour de la Parata, tonsures de la pelouse maritime, 10 m, 5.4.1971, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Porto-Vecchio, au nord de la baie de Stagnolu, sables fixés, rive droite de l'Osu à son embouchure, 2 m, s.d., *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur Ospedale-Cagna, côte W, au N de la Punta d'Ecicca, Aratesi, en arrière de la plage, zone à sol arénacé au niveau de l'*Helichrysetum*, 4 m, 5.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12267* (Hb. privé GAMISANS), fl.; golfe de Ventilègne, à proximité du pont de la route N 196, pelouse humide sableuse en arrière de la plage, 1-2 m, 14.5.1984, *Thiébaud, M.-A. 05002* (G); au sud du Pont de Ventilègne, petites surfaces sableuses sur la côte rocheuse, abondant, 2 m, 14.4.1973, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); près du Pont de Figari, sur sables humides tout près de la mer, 8.4.1971, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Tonnara-plage, pelouse rase sur arène granitique en arrière de la plage, 5 m, 16.5.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bonifacio, à Sant'Amanza, près de la pointe rocheuse séparant les deux parties de la plage, 5 m, 22.5.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bonifacio, à Calalonga, pelouse sableuse rase littorale, 2 m, 14.5.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Ile Lavezzo, près de la Cala di u Grecu, 1 m, 19.4.1984, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).




Fig. 1. — Répartition de *Cotula coronopifolia* L. (la carte est au même format que celles publiées dans les “Compléments au Prodrome de la flore corse” de D. JEANMONOD & al., 1987. Les diverses cartes transparentes sur la géologie, la végétation, le relief, présentes dans le fascicule d’“Introduction”, pourront donc être utilisées également ici).

Cette espèce, surtout représentée dans la région d'Ajaccio et le secteur de Bonifaci, n'était signalée, pour le secteur d'Ospedale-Cagna que dans la région de Portu-Vecchiu par J. BOUCHARD (*Mat. Géogr. Bot. Corse*: 132, s.d.) et de la Cala di Conca par M. CONRAD (*Monde Pl.* 395: 8, 1978).

R. DESCHATRES, J. GAMISANS, M. MURACCIOLE & M.-A. THIÉBAUD

Lactuca virosa L.

- Vizzavona, route de terre, rive gauche du Vecchio, env. 870 m, 1960-1986, *Conrad, M.* observation; près de la bergerie de Liccioja, le long du chemin muletier, abondant, 25.6.1980, env. 1000 m, *Conrad, M.* observation.

Dans la première station, cette espèce bisannuelle se maintient çà et là sur les côtés de la route, depuis notre première observation en 1960.

M. CONRAD

Leucanthemum vulgare Lam. (= *Chrysanthemum leucanthemum* L.)

- Ucciani, bord de la N 193 Ajaccio-Bocognano, rive gauche de la Gravona, bordure de la route, une seule touffe, env. 300 m, 1.6.1986, *Lambinon, J.* 86/157 (BR, G, LG).

R. DESCHATRES a fait récemment le bilan (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, n.s.* 17: 9-10, 1986) des quelques stations de cette espèce connues en Corse, depuis 1965 seulement.

J. LAMBINON

Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavillier

- Nord de Corte, au col San Quilico, terrain vague à droite de la route de Bastia, abondant mais localisé, 560 m, 9.6.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé, LG).

Plante indiquée en Corse par les auteurs des flores françaises (Coste, Rouy) et par P. ZANGHERI (*Fl. Italica* 1: 867, 1976), mais seulement avec doute par J. DOSTÁL (*Fl. Europaea* 4: 254, 1976) et non par J. BOUCHARD (*Mat. Géogr. Bot. Corse, s.d.*) ni par S. PIGNATTI (*Fl. d'Italia* 3: 172, 1982). L'espèce est d'ailleurs rare en Italie, connue seulement de Ligurie et de Sicile. Elle est bien plus commune en France méridionale.

R. DESCHATRES

Petasites fragrans (Vill.) C. Presl

- Cap Corse, route D 35 de Meria à Centuri, après Pastina, en pleine floraison, 13.2.1986, *Conrad, M.* observation.

M. CONRAD

Petasites hybridus (L.) P. Gaertner subsp. **hybridus**

- Barchetta, rive droite du Golo, en aval du pont, près du confluent du Casacconi, 90 m, 18.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), fol.; environs de San Lorenzo, 1985, *Conrad, M.* observation; Corte, rive gauche du Tavignano à 3 km en aval de la ville, 330 m, 10.5.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), fol.; Pont de Piedicorte, à 2 km en amont du hameau, en remontant le ruisseau d'Ombrone, affluent rive gauche du Tavignano, 150 m, 10.7.1970, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Plante très peu observée en Corse (voir J. GAMISANS, *Cat. Pl. Vasc. Corse*: 130, 1985).

M. CONRAD & R. DESCHATRES

Pulicaria sicula (L.) Moris

- Désert des Agriates, mares asséchées prolongeant au S/E l'étang de Guignu, 6 m, 10.10.1986, *Dutarre, G.* 16485 (Hb. privé); désert des Agriates, entre le Bocca di Vezzu et le Bocca a Vitucola sur le chemin de Malfalcu, dépression humide à 1.4 km du Bocca di Vezzu, 10.10.1986, *Dutarre, G.* 16484 (Hb. privé); côte orientale, Vix, petit marais

à *Eryngium barrelieri*, près de la N 198, 15 m, 17.7.1974, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); marine de Solaro, en arrière de la plage, chemin de terre inondé en hiver, 2 m, 30.9.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Solenzara, marais de Peri, entre la route N 198 et la plage, 1 m, 29.7.1969, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Solenzara, en bordure du marécage de Péri, 2.10.1975, *Dutartre, G. s.n.* (Hb. privé); route de Propriano, route de Portigliolo D 21, à 500 m après la voie d'accès à l'aéroport, pâture humide à droite, quelques pieds, dont un particulièrement vigoureux, avec *Plagius flosculosus*, 5 m, 23.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Porto-Vecchio, marais asséché à la sortie nord de la ville, à droite de la route D 168a, avec *Heliotropium supinum*, 5 m, 19.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Suartone, sur le fond asséché de la padule Maggiore, à l'ouest des tre padule, abondant, 105 m, 3.10.1975, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé, *Soc. Ech. Pl. Vasc.*); Suartone, aux tre padule, mares asséchées, 110 m, 22.8.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bonifacio, pâture humide à droite de la route de Sartène, lieu-dit Padulu, abondant, 80 m, 28.8.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bonifacio, marais asséché de Musella, abondant avec *Eryngium barrelieri*, 75 m, 7.8.1967, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bonifacio, bordure de la dépression de Musella, 26.9.1985, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé); Bonifacio, friche un peu humide à gauche de la route en montant à Pertusato, 1.10.1975, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé)

Cette espèce était connue surtout du sud de l'île, de la région de Bonifacio jusqu'aux environs de Sartène et Porto-Vecchio. Malgré l'indication ancienne de la plante à Saint-Florent, marais de l'Aliso (Moquin-Tandon, 1852), sa présence actuelle paraissait douteuse dans la moitié septentrionale de l'île (voir J. BOUCHARD, *Fl. Prat. Corse*, 3^e éd.: 340, 1978).

G. BOSC, R. DESCHATRES & G. DUTARTRE

Tragopogon porrifolius L. subsp. **porrifolius**

- Secteur Tenda, Saint Florent, en allant à la plage de Pezzo, assez abondant dans une friche rudéralisée à gauche du chemin, derrière la haie, probablement adventice, 5 m, 13.5.1980, *Bosc, G. & Deschatres, R. s.n.* (Hb. privés); vallée de la Navaccia, 8.8 km en amont du confluent avec la Tartagine, 330 m, pelouse rocailleuse au bord de la route, 12.5.1986, *Gamisans, J. & Hébrard, J.-P. G.11887* (Hb. privé GAMISANS), fl. et fr.

Taxon nouveau pour la flore de Corse où il est probablement adventice.

J. GAMISANS, J.-P. HÉBRARD, G. BOSC & R. DESCHATRES

Xanthium saccharatum Wallr.

- Entre Sartène et Propriano, bord du Rizzanèse, rive gauche au PK 74, en compagnie de *Xanthium italicum* Moretti, 23.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé, LG).

Espèce en principe nouvelle pour la Corse. Si l'on adopte un traitement taxonomique très analytique du groupe de *Xanthium strumarium* L. (ce qui se justifie autant que chez les *Oenothera*, *Taraxacum* et autres genres!), on doit reconnaître dans l'île trois espèces au moins: *X. strumarium* s.str., certainement rare en Corse, *X. italicum*, largement répandu, et l'espèce citée ci-avant.

Xanthium saccharatum, originaire d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale, se distingue de *X. italicum*, bien naturalisé dans le bassin méditerranéen, par un involucre fructifère à épines plus espacées, plus épaisses, par un indument hispide plus discret... (voir J. LAMBINON, *Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Bass. Médit. Bull.* 19: 32-33, 1984 et 21: 64-65, 1986). Il est naturalisé lui aussi localement dans le sud de l'Europe (Portugal, France). Un autre problème est la séparation de ce taxon par rapport à *X. orientale* L. (= *X. macrocarpum* DC.), chez lequel l'involucre fructifère est plus étroitement ellipsoïdal, les épines plus courtes, très crochues au sommet et beaucoup plus arquées. Or cette espèce a été signalée dans la région de Porto Vecchio par J. BOUCHARD (donnée reprise par J. GAMISANS, *Cat. Pl. Vasc. Corse*: 135, 1985), sub "*X. macrocarpum*", nom souvent utilisé pour plusieurs taxons différents; il pourrait fort bien s'agir en fait de *X. saccharatum*.

J. LAMBINON & R. DESCHATRES

*Balanophoraceae***Cynomorium coccineum** L.

- Ilot Ratino de l'archipel des Lavezzi, une cinquantaine d'individus, sur diverses espèces d'halophiles, 15.4.1986, *Guyot, J. & Thibault, J. C.* (Hb. privé).

Il s'agit de la première observation de cette espèce sur le territoire corse et sur le territoire national français. **L'espèce, comme la famille, sont nouvelles pour la flore de Corse.** J. Guyot et J. C. Thibault, ornithologues du Parc Naturel Régional Corse, avait déjà récolté cette plante parasite sur des îlots du nord de la Sardaigne (Corcelli, Baretilli et Piana) et me l'avait apportée pour détermination (herbier CONRAD).

M. CONRAD

*Balsaminaceae***Impatiens balfourii** Hooker fil.

- Bocognano, dans le village, cultivé dans les jardinets et échappé au bord d'un ruisseau dans un petit ravin, 640 m, 11.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); bords de la Gravona près du pont d'Ucciani, 290 m, 10.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Plante ornementale qui pourrait se naturaliser dans l'île, notamment au bord des rivières. Espèce subspontanée **nouvelle pour la flore de Corse.**

R. DESCHATRES

*Boraginaceae***Echium creticum** L. subsp. **creticum**

- Haute vallée du ruisseau de Spinu, en amont de la route D 59, Sotta-Carbini (un peu au sud du col de Buccinu), chemin de Bitalza, petit fossé au pied d'un talus à *Erica arboorea* L., *Cistus salviifolius* L., *Rubus ulmifolius* Schott, au contact de la forêt de *Quercus ilex* L. et *Arbutus unedo* L., 700 m, 31.5.1986, *Lambinon, J. 86/134* (BR, G, LG).

Selon J. GAMISANS (*Cat. Pl. Vasc. Corse: 96, 1985*), cette espèce n'avait plus été vue dans l'île depuis Mabile, en 1868. Il en existe cependant dans l'herbier *Ch. d'Alleizette* (CLF) un échantillon ainsi étiqueté: "*Echium macranthum* R. & Sch. (*E. grandiflorum* Desf.). Corse: env. de Bonifacio, juin 1921".

J. LAMBINON & R. DESCHATRES

Heliotropium supinum L.

- Porto-Vecchio, mare asséchée à la sortie nord de la ville, au bord de la route D 168a, 5 m, 19.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé, LG); Porto-Vecchio, terrain vague au nord du port de plaisance, entre la route et la mer, quelques pieds dispersés, 20.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Suartone, aux tre Padule, dans la grande mare occidentale dite Padule Maggiore, abondant mais pieds minuscules de 5 cm ou moins, 27.6.1966, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Suartone, aux tre Padule, mare orientale asséchée, quelques pieds de taille réduite, 110 m, 27.7.1966, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Espèce rare dans l'île, non revue récemment dans les localités anciennement connues (voir J. BRIQUET & R. DE LITARDIÈRE, *Prodr. Fl. Corse 3/2: 86-87, 1955*). J. VIVANT (*Bull. Soc. Bot. France 121: 34, 1975*) a indiqué l'*H. supinum* des Tre Padule parmi "quelques plantes à ajouter à la flore de Corse", ce qui est inexact. Comme le souligne cet auteur, les plantes des Tre Padule sont généralement naines (tiges de 1 à 3 cm, rarement 5), mais les caractères de la fleur et du fruit sont typiquement ceux de l'espèce. Nous avons distribué des échantillons de cette provenance à la *Soc. Fr. Ech. Pl. Vasc.* (fasc. 13, n° 5605). Ceux de Porto-Vecchio sont normalement développés.

R. DESCHATRES

*Brassicaceae***Arabis turruta** L. var. **turruta**

- Fium'Orbu, pont de Pinzalone, entrée du défilé de l'Inzecca, falaise ombragée dominant la rivière, 205 m, 3.5.1985, *Jeanmonod, D. & Roguet, D. J.1857* (G); secteur de Renosu, barrage de Tolla, peu abondant, 560 m, 7.6.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.3328* (G).

D. JEANMONOD

Biscutella rotgesii Fouc.

- Ponte-Leccia, coteau aride de serpentine à 1 km au NE de la ville, disséminé mais assez abondant, 200-250 m, 18.7.1961 (fr.) et 19.4.1965 (fl.), *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Salastraco, en remontant un ruisseau affluent du Tagnone, sur débris de serpentine, 350 m, 21.7.1975, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Cette espèce n'était connue que de la vallée du Fium'Orbo dans la région de l'Inzecca (voir J. BRIQUET, *Prodr. Fl. Corse* 2/1: 110-111, 1913). D'après J. CONTANDRIOPOULOS (*Rech. Fl. Endém. Corse*: 143, thèse n° 254, Montpellier, 1962), il s'agit d'une endémique "extrêmement rare dans l'île et localisée sur de très petites surfaces". Ajoutons qu'elle paraît se comporter comme une serpentinicole exclusive.

R. DESCHATRES

Brassica insularis Moris var. **insularis**

- Cap Corse, entre Oglistro et Olcani, falaise escarpée schisteuse à taffoni dominant la rivière d'Olcani, rive gauche, au niveau de la Punta di Solella, 250 m env., 1.5.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Localité nouvelle de cette magnifique endémique, s'ajoutant à celles déjà connues et notamment à celle qu'a récemment découverte M. CONRAD à la Penta Frescaja (D. JEANMONOD & al., *Candollea* 41: 29-30, 1986).

La plante d'Olcani est relativement abondante et bien protégée car difficilement accessible.

R. DESCHATRES

Cardamine chelidonia L.

- Cap Corse, Sisco, R. D. en amont du pont sur le ruisseau de Forcili, 165 m, 9.9.1985, *Muracciole, M. s.n.* (Hb. privé); Cap Corse, Olcani, gorges de la rivière d'Olcani sous la Punta di Solella, endroits asséchés dans le lit du torrent, 240 m, 30.4.1986, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Cap Corse, secteur de Brando, Silgaggia, abondant en bordure d'un torrent au S/W, près du village non loin des nouvelles constructions, 8.10.1986, *Dutartre, G. 16490* (Hb. privé), fr. et *Tison, J.-M. s.n.* (Hb. privé).

R. DESCHATRES, G. DUTARTRE, M. MURACCIOLE & J.-M. TISON

Coronopus didymus (L.) Sm.

- Querciolo, à 1 km au nord de Marina di Sorbu, sables en arrière de la plage, 2 m, 4.5.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Antisanti, lieu-dit Fontanelle, adventice dans un verger de clémentiniers, mai 1981, *Muracciole, M.* observation; Sagone, terrain vague dans le village, entre la route et la mer, 5 m, 24.4.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Aghione, Puralbello, adventice dans un verger de clémentiniers, mai 1981, *Muracciole, M. s.n.* (Hb. privé), revu le 3.6.1983; Olmeto, en arrière de la plage de Baracci, lieu humide au pied de la falaise, 18.6.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Espèce adventice américaine signalée succinctement pour la première fois en Corse dans J. GAMISANS (*Cat. Pl. Vasc. Corse*: 142, 1985).

M. MURACCIOLE & R. DESCHATRES

Coronopus squamatus (Forsskål) Ascherson

- Querciolo, un peu au nord de la Marine de Sorbu, 2 m, terrain rudéralisé près de la petite station de pompage, 29.5.1986, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé) & *Lambinon, J. 86/79* (G, LG); Galéria, près de la Maison de la mer, 3 m, lieu rudéralisé, 30.4.1984, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Espèce rare en Corse, ou peu indiquée; J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse* 2/1: 106, 1913) la cite seulement des environs de Bastia, d'après Salis.

R. DESCHATRES & J. LAMBINON

Diploaxis catholica (L.) DC. subsp. **catholica**

- Pinarello (au nord du golfe de Porto-Vecchio), sables rudéralisés près de la plage, avec e.a. *Emex spinosa* (L.) Campd., 21.3.1986, *Lambinon, J. 86/11* (LG).

Espèce nouvelle pour la Corse, connue du Maroc, du Portugal, d'Espagne et des Baléares. Son indigénat est évidemment très douteux dans le type de biotope anthropisé où elle a été observée.

J. LAMBINON

Lepidium heterophyllum Bentham

- Ucciani, vallée de la Gravona, au pont d'Ucciani, 290 m, peu abondant, un pied rive droite de la Gravona, sables et galets, deux pieds rive gauche, sur un parking récemment aménagé, 5.6.1986, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Ucciani, vallée de la Gravona, bord de la N 193 Ajaccio-Bocognagno, rive gauche de la Gravona, 300 m, pied d'un talus rocailleux ensoleillé bordant la route, assez abondant, 2.6.1986, *Lambinon, J. 86/158* (BR, G, LG).

Espèce à répartition atlantique nouvelle pour la Corse. Elle pourrait avoir été introduite ici par des engins de terrassement ayant participé aux travaux de la route N 193; il sera intéressant de voir si elle se maintient ou se répand dans la vallée de la Gravona. On peut signaler qu'une extension d'aire de cette plante a été constatée ces dernières années en Europe occidentale: voir notamment J. MENNEMA, *Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Bass. Médit. Bull.* 21: 83-85, 1986.

R. DESCHATRES & J. LAMBINON

Raphanus raphanistrum L. subsp. **landra** (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens

- Bastia, Arinella, vers l'embouchure de l'étang de Biguglia, friche, 28.5.1985, *Muracciole, M. & Jauzein s.n.* (Hb. privé MURACCIOLE); secteur de Rotondu, embouchure du Liamone, zone marécageuse entre la plage de San Giuseppe et la route (D 81), pré de fauche, 8 m, 9.6.1986, *Jeanmonod, D., Natali, A. & Zellweger, C. J.3423* (G); secteur d'Ospedale-Cagna, plage de la Rondinara, plage, quelques pieds, 1 m, 2.6.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.3101* (G).

Ce taxon n'est signalé qu'en quelques stations (J. BRIQUET, *Prodr. Fl. Corse* 2/1: 99, 1913).

D. JEANMONOD & M. MURACCIOLE

Rapistrum rugosum L. subsp. **linnaeanum** Rouy & Fouc.

- Ajaccio, terrain vague, route de la Parata à l'Ariadne, abondant, 16.5.1984, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé).

Rare en Corse, ce taxon avait cependant déjà été remarqué par H. Coste entre Ajaccio et la Chapelle des Grecs (J. BRIQUET, *Prodr. Fl. Corse* 2/1: 94, 1913).

G. BOSC

Rorippa sylvestris (L.) Besser

- Casamozza, bord du Golo en aval du pont routier, plusieurs touffes étendues, 15 m, 17.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), fl. et fr.; présent à la station d'agrumiculture

de San Giuliano, *Conrad, M.* observation (*in litt.* 19.10.1981); bords du Tavignano, à 2 km en amont de Pont-de-Piedicorte, 27.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Giuncaggio, Casabertola, au lieu-dit Talargo, adventice dans un verger de clémentiniers, mai 1981, *Muracciole, M.* observation; Antisanti, Campo al Quercio, lieu-dit Oscione, très abondant comme adventice dans un verger de clémentiniers, rive droite du Tavignano, mai 1981, *Muracciole, M. s.n.* (Hb. privé), fl.

Cette espèce, découverte en Corse par J. Aylès, a été signalée en plusieurs points de la vallée du Golo entre Ponte-Castirla et Casamozza par R. DE LITARDIÈRE (*Bull. Soc. Bot. France* 70: 820-821, 1924), puis dans la basse vallée du Tavignano près de Cateraggio (*Candollea* 14: 140, 1953). Malgré ces indications précises, *R. silvestris* n'est pas cité pour la Corse par D. H. VALENTINE (*Fl. Europaea* 1: 283, 1964). On constate que la plante se maintient bien dans ses stations naturelles au bord des rivières, mais aussi qu'elle peut adopter en outre un comportement de rudérale: bords de route, terrains vagues, et particulièrement vergers de clémentiniers, où elle devient une "mauvaise herbe".

R. DESCHATRES & M. MURACCIOLE

Caryophyllaceae

***Dianthus furcatus* Balbis subsp. *gyspergerae* (Rouy) Burnat ex Briq.**

— Rochers en allant à la tour de Turghio, abondant, mai 1986, *Conrad, M.* observation.

M. CONRAD

***Moehringia pentandra* Gay**

— Sables à la marine d'Albo, côte occidentale du Cap Corse, 11.5.1980, *Dutartre, G. 5173* (Hb. privé); marine de Negru, près de la tour sur la côte occidentale du Cap Corse, 11.5.1980, *Dutartre, G. 5174* (Hb. privé); Désert des Agriates, plage de Guignu, 8.5.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé) & *Dutartre, G. 5166* (Hb. privé); Agriates, anse de Malfalco, au bord du marais, 9.5.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé) & *Dutartre, G. 5174* (Hb. privé); Agriates, en arrière de la plage de Saleccia, sables sous les pins d'Alep, 9.5.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé) & *Dutartre, G. 5168* (Hb. privé); St-Florent, aux Strette, petite carrière abandonnée à droite de la route D 81, 10 m, 24.5.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); région de St Florent, en montant au Mte Sant'Angelo depuis la route D 238, balme, 150 m, 7.5.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur de Calvi, sables du Fiume Secco, entre la route D 451 et la rivière sur les sables, rive gauche, en aval du pont, 9.5.1979, *Dutartre, G. 5165* (Hb. privé); massif du Cinto, bergeries de Candela, 15.6.1981, *Dutartre, G. 5167* (Hb. privé); Ste Lucie de Mercurio, au-dessous de Piedivaldo, talus de la route neuve longeant le ruisseau de Ste Lucie, 600 m, 26.mai 1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bustanico, le long du chemin menant à la Chapelle Sant'Antone, 1010 m, 11.7.1977, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); St André de Bozio, talus frais de la route D 15 près de Poggio, 790 m, 26.5.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); vallée du Tavignano, à 8 km en aval de Corte, 8.6.1981, *Dutartre, G. 5172* (Hb. privé); vallée du Fium'Orbo en amont du défilé de l'Inzecca, 120 m, 7.5.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); sur les sables de la rive gauche du Fium'Orbo entre le défilé de l'Inzecca et Saint Antoine, 16.5.1979, *Dutartre, G. 5164* (Hb. privé); secteur d'Ajaccio, Saint Antoine, près du col de Carazzi, 10.5.1977, *Dutartre, G. 5169* (Hb. privé); Ajaccio, près de la Parata, le long d'un sentier exposé au nord, 50 m, 20.4.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Solenzara, bords frais de la rivière à 4 km environ en amont du pont de la N 198, 22.5.1980, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé); Cotti-Chiavari, allée du cimetière, 480 m. 31.5.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Plus répandu que ce que n'indique J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse* 1: 542, 1910).

G. BOSC, R. DESCHATRES & G. DUTARTRE

Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P. W. Ball

- Strettes de Saint-Florent, 10 m, 7.5.1977, *Dutartre, G. 16431* (Hb. privé); au sud d'Ile-Rousse, plage de Botre, sables à *Ephedra distachia*, 10 m, 30.4.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); col de Savi au-dessus de Montemaggiore, versant sud, maquis dégradé sur granite, env. 480 m, 2.7.1982, *Lambinon, J. s.n.* (LG); Lucciana-Casamozza, alluvions caillouteuses du Golo un peu en aval de la N 193, env. 20 m, 29.5.1986, *Lambinon, J. 86/87 & Deschatres, R.* (LG); Penta Folelli, terrain rudéral en bordure de la N 198, 2.12.1986, *Lambinon, J. 86/357* (LG); Venaco, bord de la route D 43, en mélange avec *P. prolifera*, 570 m, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé); Tatonne, talus de la route de Corte, 820 m, 20.7.1966, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur de Rotondu, nord d'Ajaccio, sur la D 81 en direction de Sagone, près du lieu-dit Guinchellu, friche après culture de céréales, assez abondant, 70 m, 9.6.1986, *Jeanmonod, D., Natali, A. & Zellweger, C. J.3395* (G); environs d'Ajaccio, bord de la route de La Parata, près du Scudo, 5 m, 1.6.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Signalé aussi près de Bastia par P. W. BALL & V. H. HEYWOOD (*Bull. Brit. Mus., Nat. Hist.* 3: 164, 1964). Certainement plus rare en Corse que *P. velutina* (Guss.) P. W. Ball & Heywood, cette espèce y est néanmoins sans doute méconnue. *Petrorhagia nanteuilii* est intermédiaire, par ses caractères morphologiques, entre *P. prolifera* (L.) P. W. Ball & Heywood et *P. velutina* (Guss.) P. W. Ball & Heywood. Alors que ces deux espèces sont diploïdes ($2n = 30$), *P. nanteuilii* ($2n = 60$) est probablement un allotétraploïde issu de leur hybridation (P. W. BALL & V. H. HEYWOOD, *Watsonia* 5: 113-116, 1962). L'hybride triploïde *P. nanteuilii* × *P. prolifera* a été obtenu expérimentalement et pourrait être rencontré en Corse; sa stérilité isole toutefois bien les deux espèces en question (S. M. THOMAS & B. G. MURRAY, *Plant Syst. Evol.* 139: 77-94, 1981).

R. DESCHATRES, G. BOSC, D. JEANMONOD & J. LAMBINON

Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood

- Bord du lac de barrage de Calacuccia, près de Sidossi, sur les terrasses sableuses exondées par la sécheresse, 800 m, 12.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Corte, sables du Tavignano, rive gauche à 3 km en aval de la ville, 330 m, 26.9.1984, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), fr.; Venaco, bords arides de la route D 43, 19.7.1974, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé), fr.; vallée de la Gravona au pont d'Ucciani, 290 m, 16.7.1967, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); environs de Ghisonaccia, bord de la D 344 à l'est de Saint-Antoine, 21.7.1974, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé); Pont de Travo, 16.9.1980, *Lambinon, J. 80/C0856* (LG); Bonifacio près de Sperone, plateau calcaire proche des ruines romaines de Piantarella, 10 m, 16.6.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Espèce peu indiquée jusqu'ici en Corse, facilement confondue avec *P. nanteuilii*. Signalée aussi à Bastia et à Bastelica par P. W. BALL & V. H. HEYWOOD (*Bull. Brit. Mus., Nat. Hist.* 3: 163, 1964). La répartition et la fréquence des trois espèces de la section *Kohlrauschia* (Kunth) P. W. Ball & Heywood restent à préciser, à l'aide d'échantillons bien déterminés. Les caractères tirés de la graine sont les seuls vraiment fiables.

G. BOSC, R. DESCHATRES & J. LAMBINON

Silene coelirosa (L.) Godron

- Désert des Agriates, milieu sableux et humide entre le point 91 sur le chemin de Malfalco et le point 106 sur le sentier conduisant au marais situé au S/E de l'étang de Guignu, 100 m, quelques pieds seulement, 5.6.1981, *Dutartre, G. 6719* (Hb. privé); Désert des Agriates, marais à l'étang de Panecallelu, localement très abondant, 2 m, 5.6.1981, *Dutartre, G. 6718* (Hb. privé); secteur de Tenda, Saint-Florent, extrémité sud-ouest du golfe de Saint-Florent, plage de sables littoraux entre Acqua Dolce et l'îlot de la Roya, 1 m, 23.6.1983, *Thiébaud, M.-A. & Roguet, D. T.04547* (G); secteur de Tenda, Saint-Florent, marais de Pezzo, pré humide bordant le marais, localement très abondant, 5 m, 29.5.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.2838* (G); secteur d'Ospedale-

Cagna, étang de Prisarella près du golfe de Rondinara, en bordure de l'étang et en lisière des lentisques et des genévriers, sable, abondant, 1 m, 2.6.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J3096* (G).

Ce magnifique silène n'était, à notre connaissance, répertorié qu'en quelques stations: Saint-Florent à la plage de l'Aliso et dans les gazons maritimes face à l'îlot, route de Pisciatello à Coti-Chiavari, Santa Giulia (J. BRIQUET, *Prodr. Fl. Corse* 1: 560-561, 1910; M. CONRAD, *Monde Pl.* 361: 5, 1968; R. DE LITARDIÈRE, *Candollea* 11: 200, 1948).

D. JEANMONOD, D. ROGUET, G. DUTARTRE & M.-A. THIÉBAUD

Silene conica L.

- Secteur Incudine-Bavella, côte E, sables maritimes à l'embouchure de la Solenzara, 1982, *Dardaine, P. s.n.* (Hb. privé).

Indication donnée dans une lettre à J. Gamisans. **Cette espèce est nouvelle pour la flore de Corse.**

J. GAMISANS

Silene inaperta L.

- Bigorno, talus rocheux de la route du col, un peu en amont du village, sur serpentine, 700 m, 7.7.1977, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); entre Barchetta et Casamozza, talus rocheux de la route de Bastia N 193, à 5 km du village, virage coupé à gauche, 50 m, 27.7.1969, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Casamozza, rive g. du Golo au niveau de la centrale thermique de Lucciana, sur sables et galets secs, 10 m, 14.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Pietralba, bord rocaillieux de la N 197 (vallée de la Navaccia) à 1 km à l'W du débouché de la D 8), 300 m, 17.7.1968, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé), revu le 3.8.1977, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Moltifao, galets de la rivière d'Asco, rive droite, au niveau du lotissement de Campo-Longo, 240 m, 8.7.1977, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Ponte-Leccia, galets de la Tartagine près du pont de chemin de fer, rive gauche amont, 190 m, 19.9.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Ponte-Leccia, coteau aride de serpentine à 1 km au nord du village, abondant avec *Notholaena marantae*, 250 m, 15.7.1966, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Galéria, sables et galets rive droite du Fango, en amont du pont aux cinq arches, 15 m, 5.6.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); bord de la route de Saliceto D 139, à 300 m de son embranchement sur celle de San Lorenzo D 39, rocailles de serpentine, sous la pointe de Scoltola, 330 m, 22.9.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); bord de la route de San Lorenzo, D 39, un peu avant le pont de Lano, sur roches schisteuses couleur chocolat (radiolarite?), 430 m, 15.9.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Lano, bord de la route D 139 à gauche dans la montée au village après le pont, rocailles de serpentine, avec *Notholaena marantae*, 470 m, 27.7.1969, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Sermano, route de Bustanico, lit asséché du ruisseau d'Arena, en aval du pont, sur serpentine, 780 m, 13.7.1974, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Salastro, route de Pinzalone (D 344A), coteau aride de serpentine, avec *Elymus corsicus*, près du petit col de Cardo, 360 m, 21.7.1975, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); vallée du Tavignano, en aval du vieux pont d'Antisanti, rocailles schisteuses proches de la route au niveau des éboulements, 110 m, 30.7.1977, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); vallée du Fium'Orbo, à l'Inzecca, sur serpentine, 260 m, 17.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Saint Antoine, route de l'Inzecca, rocailles de serpentine à l'entrée des gorges du Fium'Orbo, 120 m, 6.10.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); vallée de la Solenzara, dans le lit asséché en aval du pont de Calzatojo, rive droite, sables et galets secs, 110 m, 12.7.1961, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); côte orientale, talus bordant la N 198, à 1 km au sud de Tarco, 20 m, 27.7.1977, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

On voit que le *Silene inaperta* est beaucoup plus répandu en Corse que ne le laissaient croire les trois indications de J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse* 1: 558, 1910). Sans être serpentinicole exclusive, cette espèce croît très souvent sur rocailles de serpentine ou roches apparentées. Z. AFZAL, P. QUÉZEL & C. ZEVACO (*Bull. Soc. Bot. France* 121: 293-297, 1974) ont signalé son nombre

chromosomique $2n = 30$. Ce nombre doit être exceptionnel dans le genre; il n'apparaît pas une seule fois dans une liste d'une centaine d'espèces étudiées par N. DEGRAEVE (*Bol. Soc. Bot., sér. 2* 53: 595-643, 1980) où figure une majorité d'espèces diploïdes, $2n = 24$.

G. BOSC & R. DESCHATRES

Silene nocturna L. var. **boullui** (Jordan) Fiori & Paol.

- Cap Corse, Macinaggio, coteau à 5 km de Macinaggio, à droite de la route D 80, en direction de l'W, 6.5.1985, *Dutartre, G. 16483* (Hb. privé).

Cette indication complète la liste des localités données par G. DUTARTRE & al. (in D. JEANMONOD & al., *Candollea* 41: 31-32, 1986). Ce taxon n'était pas connu au Cap Corse.

G. DUTARTRE

Silene requienii Otth

- Secteur de Renosu, barrage de Tolla, falaise sous le barrage, en exposition nord, peu abondant, 560 m, 7.6.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.3325* (G); secteur d'Incudine-Bavella, entre Cozzano et le col de Verde, près du lieu-dit Scrivano, rochers ombragés au-dessus du ruisseau, peu abondant, 880 m, 12.6.1986, *Jeanmonod, D., Natali, A. & Zellweger, C. J.3530* (G).

Cette très belle espèce, largement répandue dans les étages supérieurs (à partir du montagnard), se trouve ici à des altitudes particulièrement basses, notamment pour la première de ces stations, nettement abyssale.

D. JEANMONOD

Silene viridiflora L.

- Secteur de Renosu, environ 1 km à l'ouest de Tolla sur la D 3 à la fontaine du lieu-dit Aja-Resca, sous-bois de châtaignier à 50 m en dessous de la fontaine, peu abondant, rare, 650 m, 7.6.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.3323* (G).

Cette espèce est toujours très localisée que ce soit en Corse ou de façon plus générale sur l'ensemble de son aire nord-méditerranéenne. Cette station est la neuvième répertoriée dans l'île (voir D. JEANMONOD, *Candollea* 40: 5-34, 1985; G. DUTARTRE & R. DESCHATRES in D. JEANMONOD & al., *Candollea* 41: 33, 1986).

D. JEANMONOD

Stellaria media (L.) Vill. subsp. **major** (Koch) Arcangeli (= *S. neglecta* Weihe)

- Bastia, sortie sud de la ville, près de la petite station ferroviaire de Lupino, bord de chemin rudéralisé, 19.3.1984, *Lambinon, J. 84/17* (LG); Sorio, bords humides de l'Aliso, 500 m, 8.5.1977, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé); Porto-Vecchio, rive droite du Stabiaccio, env. 15 m, pelouse fraîche ombragée d'eucalyptus, env. 15 m, 4.3.1983, *Lambinon, J. 83/05* (LG).

Taxon mentionné peu souvent en Corse. Nous préférons lui accorder seulement le rang de sous-espèce, en accord avec les données de G. A. M. SCHOLTE (*Proc. Kon. Nederl. Akad. Wetensch., ser. C*, 81: 442-465, 1978), rappelées récemment par l'un de nous (J. LAMBINON, *Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Bass. Médit. Bull.* 19: 70, 1983). Dans les matériaux corses précités, le nombre d'étamines fertiles varie entre 6 et 10 et les pétales sont au plus aussi longs que les sépales, c'est-à-dire un peu "courts" par rapport aux populations plus septentrionales. Une étude cytotaxonomique de la question, prolongeant les recherches de G. A. M. Scholte et d'autres, serait souhaitable.

J. LAMBINON & G. BOSC

Stellaria pallida (Dumort.) Piré (= *S. media* L. subsp. *apetala* auct.)

- Biguglia, langue sableuse entre l'étang de Biguglia et la mer, plage ouverte dans une pineraie sur maquis littoral, 23.3.1986, *Lambinon, J. 86/40* (LG); Calvi, La Revellata, côte

est, env. 100 m, bord de chemin, pelouses à annuelles en bordure du maquis, 22.3.1980, *Lambinon, J. 80/52* (LG); Alistro, pelouse ouverte des dunes littorales, en bordure de fourré entre l'Alistro et la Bravona, près de l'étang de Stagnolo, 20.3.1986, *Lambinon, J. 86/04* (G, LG); Porto, plage, endroit rudéralisé à annuelles, sur sables un peu frais, au pied de blocs granitiques, 23.3.1984, *Lambinon J. 84/47* (LG); Pisinale (à l'W d'Ajaccio et au N de la Parata), sables littoraux tassés ± rudéralisés, à env. 100 m de la mer, 23.3.1986, *Lambinon, J. 86/33* (G, LG); Anse de Favone (12 km au S de Solenzara), sables tassés près de la mer, en bordure de la N 198, 21.3.1986, *Lambinon, J. 86/10* (LG); Suartone, Anse de Rondinara, boisement dominé par de grands *Juniperus phoenicea* L., à la limite des sables dunaux et du maquis sur granite, 22.3.1986, *Lambinon, J. 86/22* et *22bis* (LG).

Espèce méconnue en Corse, où elle est manifestement répandue sur le littoral, principalement sur sables dunaux. Son développement éphémère vernal explique sans doute qu'elle ait été négligée jusqu'ici. Contrairement au cas précédent, il s'agit d'une "bonne espèce", bien caractérisée par ses fleurs apétales, ses étamines peu nombreuses (généralement 2 ou 3) et ses graines brun jaunâtre pâle d'env. 0.7 mm de diamètre. La variation principale consiste dans le fait que le calice est tantôt glabre, tantôt longuement pubescent, cela souvent dans une même station. J. LAMBINON

Chenopodiaceae

Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) Moris (= *A. glaucum* Ung.-Sternb.)

- Bords de l'étang d'Urbino, rive sud près de la mer, 1.6.1981, *Lambinon, J. 81/64* (LG); bords de l'étang d'Urbino, à la base de l'Isola Longa, 28.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Santa-Giulia, bords de la lagune, abondant, 21.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse* 1: 465, 1910) ne cite que trois localités: Saint-Florent, Porto-Vecchio et Bonifacio. Sans doute plus répandu. R. DESCHATRES & J. LAMBINON

Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen (= *C. botryodes* Sm.)

- Porto-Pollo, bord de l'étang asséché de Tanchiccia (ou Caniccia), 5 m, abondant, 8.9.1985 et 22.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bonifacio, à la queue de l'étang de Canetu, 21.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé, LG).

Plante très rare dans l'île. J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse* 1: 458, 1910) cite seulement deux localités découvertes au siècle dernier et où la plante ne paraît pas avoir été revue: Biguglia (Soleirol) et Calvi (Soleirol). R. DESCHATRES

Chenopodium urbicum L.

- Bustanico, dans le village, 820 m, et talus de la route D 15 à droite en montant au col de Chiosella, 950 m, 26.9.1984, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Saint-André de Bozio, près d'Arbitro, 740 m, 20.9.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé, G); Quinzena, à 3 km en aval du hameau, bord de la route D 343 et pâture sèche voisine, 220 m, 20.7.1975 (fol.) et 21.9.1979 (fr.), *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé, G); environs de Ghisonaccia, au sud de Calzarello, en bordure du marais de Canna, sur chemin privé piétiné par les bestiaux, 18.9.1984, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé).

Espèce rarement citée. M^{me} Conrad (*in litt.* 2.12.1985) nous dit l'avoir observée aussi dans le Bozio. R. DESCHATRES & G. BOSC

Cistaceae

Fumana ericoides (Cav.) Gand.

- Saint-Florent, près des limites de Farinole, au pied de la barre calcaire de Tuffone Niellu, exposition sud, 220 m, 7.5.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Ostriconi, talus rocheux (schistes calcaires) au bord de la route d'Ile-Rousse, près d'un virage prononcé à 500 m de la plage, 45 m, 31.3.1976, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), revu depuis à plusieurs reprises.

Ces indications précisent celles données dans le *Cat. Pl. Vasc. Corse*: 113, 1985, de J. GAMI-SANS. Le *Fumana ericoides* est très rare dans l'île. J. BRIQUET & R. DE LITARDIÈRE (*Prodr. Fl. Corse* 2/2: 185, 1936) citent deux stations où la plante a été découverte au siècle dernier: Ostriconi (Soleirol, 1824) et près de Bastia (ANDRÉ, 1854). La première semble avoir été retrouvée par J. BOUCHARD qui écrit (*Fl. Prat. Corse*, 3^e éd.: 184, 1978) "Rare. Ostriconi! A rechercher."

R. DESCHATRES

Helianthemum aegyptiacum (L.) Miller

- Vallée de la Navaccia, pentes sèches rocailleuses dominant la route N 197 de Ponte-Leccia au col San Colombano, en plusieurs points, notamment rochers à *Opuntia* à 9 km de Ponte-Leccia, et à 15 km de Ponte-Leccia, sous une maison ruinée construite en pierre de taille calcaire, 11.4.1978, *Deschatres, R.* observation; gare ruinée de Pietralba, sur le ballast de la voie, avec *H. salicifolium*, 280 m, 22.4.1973, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Ponte-Leccia, à gauche de la route d'Asco, à 500 m de son embranchement sur la N 197, tertre rocailleux, 210 m, 5.5.1976, *Dutartre, G. s.n.* (Hb. privé), revu le 8.5.1977; Moltifao, près des bergeries de Grazianaccia, quelques pieds épars dans le maquis bas à *Thymelaea tartonraira* subsp. *thomasii*, 270 m, 28.4.1895, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Asco, petites pelouses sèches rocailleuses dominant la route D 47, en plusieurs points, notamment à 0.5 et à 1.5 km du village vers l'aval, abondant, 460-560 m, 8.6.1980, *Bosc, G., Conrad, M. & Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé DESCHATRES); environs de Ponte-Leccia, route de Morosaglia, à 4 km du village, replat herbeux en suivant le sentier de la Serra Debbione, au voisinage de *Notholaena marantae*, 450 m, 21.5.1981, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé); route de Ponte-Leccia à Morosaglia, *Conrad, M.* observation; entre Ponte-Leccia et Francardo, près du pont de San Lorenzo, en deux points voisins: tertre aride rive gauche du Golo à 50 m en amont du pont, entre la route et le fleuve, 240 m, et talus bordant à gauche la route D 39, rive droite du Golo peu après le pont, 240 m, 30.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Corte, vallée du Tavignano à 6 km en aval de la ville, rive droite en amont du pont de Papineschi, pelouses sableuses, 315 m, 24.5.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Espèce assez rare en Corse, dont nous avons déjà signalé quelques localités (voir M. CONRAD & R. DESCHATRES, *Bull. Soc. Bot. France* 119: 503, 1972).

R. DESCHATRES, G. BOSC & M. CONRAD

Convolvulaceae

Calystegia silvatica (Kit.) Griseb.

- Rogliano, haies en plusieurs points dans le village, à Olivo, Campiano, 200-250 m, 5.6.1982, *Deschatres, R.* observation; Macinaggio, à 500 m du village, sur un chemin conduisant à la Punta di à Coscia, 10 m, 5.6.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bastia à l'Arinella, dans une haie du bord de la route, 28.9.1985, *Jauzein & Muracciole, M. s.n.* (Hb. privé MURACCIOLE); environ de Saint-André de Cotone, dans l'Alesani, entre un pont et un moulin, 1985, *Conrad, M.* observation.

Espèce rare dans l'île, peut-être méconnue, signalée une seule fois par M^{me} Gysperger entre Bastia et Sainte-Lucie (voir J. BRIQUET & R. DE LITARDIÈRE, *Prodr. Fl. Corse* 3/2: 74, 1955)

et jamais revue. Sa présence en Corse restait quelque peu douteuse car G. ROUY, qui avait étudié les récoltes corses de M^{me} Gysperger (à qui il a dédié le *Dianthus gyspergerae* et le *Digitalis gyspergerae*), ne cite pas cette espèce de Corse dans le tome de sa flore paru quelques années plus tard (*Fl. France* 10: 346, 1908). Elle n'est pas mentionnée par J. BOUCHARD (*Fl. Prat. Corse*, 3^e éd.: 273, 1978). R. K. BRUMMITT (*Fl. Europaea* 3: 79, 1972) l'indique en Corse avec doute, de même que P. ZANGHERI (*Fl. Italica* 1: 529, 1976) et S. PIGNATTI (*Fl. d'Italia* 2: 386, 1982). Seuls P. JOVET & R. DE VILMORIN (*Flore Coste, 4^e Suppl.*: 365, 1977) la citent comme espèce à ajouter à la flore Coste (Midi, Corse).

R. DESCHATRES, M. CONRAD & M. MURACCIOLE

Cressa cretica L.

- Cap Corse, Barcaggio, marais asséché en arrière de la plage, abondant, 2 m, 30.9.1984, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Pianottoli-Caldarello, marais de San Giovanni, petite mare littorale asséchée à l'ouest de la tour de Figari, abondant et fertile, 22.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); étang de Giovanni, dans deux petites mares, 9.9.1985, *Muracciole, M. s.n.* (Hb. privé); baie de Figari, côte orientale de la baie dans une mare asséchée en face la tour de Figari, 1 m, 16.10.1986, *Dutartre, G. 16491* (Hb. privé); golfe de Ventilegne, sur les vases d'une petite mare asséchée entre la route N 196 et la mer, 1 m, 30.8.1983, *Dutartre, G. 10132-10134* (Hb. privé).

R. DESCHATRES, G. DUTARTRE & M. MURACCIOLE

Crassulaceae

Crassula vaillantii (Willd.) Roth

- Forêt d'Aitone, mares temporaires sur les dalles rocheuses près du village de vacances de Païsole, 1160 m, 2.6.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Calanche de Piana, au-dessus de la route D 81, creux des dalles rocheuses, 600 m, 2.6.1981, *Deschatres, R. & Dutartre, G. s.n.* (Hb. privé DESCHATRES); région de Bonifacio, chaos rocheux au nord de la route D 60, dans les cavités humides des rochers, près de la Trinité, 30.3.1982, *Dutartre, G. 1165* (Hb. privé).

R. DESCHATRES & G. DUTARTRE

Sempervivum tectorum L.

- Lento, route de Bigorno, rochers surplombant la route D 5 à 500 m du village, 640 m, 3.6.1983, *Deschatres, R.* observation; les rosettes sont très développées, atteignant 13 cm de diamètre, les feuilles ont 20(-22) mm de large, sont ciliées aux marges, glabres sur les faces, colorées de brun-rouge à l'apex. Une rosette prélevée et plantée dans mon jardin y a fleuri en juillet-août 1985, permettant de confirmer la détermination.

Cette indication complète la mention préliminaire de J. GAMISANS (*Cat. Pl. Vasc. Corse*: 138, 1985). La Joubarbe des toits est assez souvent plantée dans les villages (par exemple, murette de pierres sèches au col San Quilico), mais à notre connaissance n'a jamais été indiquée en Corse dans une station naturelle.

R. DESCHATRES

Cucurbitaceae

Bryonia marmorata Petit

- Secteur de Rotondu, golfe de Pero, au nord de Cargèse, en allant vers la tour d'Omigna, très abondant dans un bosquet de *Quercus ilex*, 24.4.1986, *Conrad, M.* observation; secteur d'Ospedale-Cagna, côte ouest, près de la Punta d'Eciccia, plage d'Arana, maquis à lentisque en arrière de la plage, 1-2 m, 5.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12296* (Hb. privé GAMISANS), ♂ fl., ♀ fr.; Eciccia, Cala di Conca, rive S, formations arbustives sur chaos granitique, 20 m, 6.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12316* (Hb. privé GAMISANS), ♀ fr.

M. CONRAD, J. GAMISANS & M. MURACCIOLE

Cucumis melo L.

- Casamozza, bord du Golo en aval de la centrale thermique de Lucciana, 15 m, 17.9.1984, *Deschatres, R.* observation; route de Moltifao, terrain vague en contrebas rive droite de la rivière d'Asco, juste avant le pont de Tesa, 270 m, 25.7.1982, *Bosc, G.* observation; Corte, route d'Aleria N 200, terrain vague près du supermarché Banco, 380 m, 17.9.1984, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); bord du Tavignano à 2 km en amont de Pont-de-Piedicorte, sables humides rive gauche, plantules et pieds fleuris, 145 m, 27.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); bords de la Gravona au pont d'Ucciani, 290 m, 10.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); bord du Travo en aval du grand pont sur la route de Chisa, 1985, *Conrad, M.* observation; bord du Rizzanèse près de Propriano, rive gauche à 500 m en amont du pont de la Rena Bianca, 10 m, 23.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Ces plantes proviennent évidemment de graines jetées après consommation des melons et qui ont trouvé sur les bords des rivières des conditions favorables à leur germination et à leur croissance. Il est peu probable qu'elles aient le temps de mûrir leurs fruits avant la mauvaise saison pour donner une seconde génération. Ce sont des plantes éphémères échappées de cultures. S. PIGNATTI (*Fl. d'Italia* 2: 140, 1982) mentionne l'espèce comme commune sur tout le territoire, Corse comprise, "coltiv. e sporadicam. inselvat."

G. BOSCO, M. CONRAD & R. DESCHATRES

*Dipsacaceae***Pycnocomon rutifolium** (Vahl) Hoffmanns. & Link (= *Scabiosa rutifolia* Vahl)

- Calvi, golfe de Calvi entre la Figarella et le Fiume Secco, près du bord de mer, dunes maritimes rudéralisées, bord de sentier, 5.7.1984, *Lambinon, J.* 84/528 (G, LG).

Répondue sur la côte orientale, cette espèce n'est citée sur le littoral ouest, par J. BOUCHARD (*Mat. Géogr. Bot. Corse*: 90-91, s.d.), que dans les environs de Porto-Pollo. Il n'est pas impossible que sa présence à Calvi résulte d'une introduction plus ou moins récente.

J. LAMBINON

Scabiosa atropurpurea L. subsp. **atropurpurea**

- Cap Corse, secteur de Pietracorbara, entre Selmacci et Orneto, en bordure de la route D 232, 17.8.1983, *Dutartre, G.* 16492 (Hb. privé).

Voir aussi R. DESCHATRES, *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, n.s. 17: 14, 1986).

G. DUTARTRE

*Euphorbiaceae***Euphorbia cuneifolia** Guss.

- Vallée du Tavignano, fossé bordant la route N 200 à 29 km de Corte, 55 m, 15.5.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur Ospedale-Cagna, côte W, au S de la Punta d'Eciccia, plage d'Arana, maquis à lentisque en arrière de la plage, 1-2 m, dans la zone de transition maquis-pelouse, 5.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M.* G.12298 (Hb. privé GAMISANS), fr.; Suartone, aux tre Padule, bord de la mare orientale, 100 m, 7.5.1984, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); à 500 m au SW du pont de Ventilègne, bords d'une mare littorale à *Juncus heterophyllus*, 1 m, 22.5.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bonifacio, dépression de Musella, 55 m, 21.5.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Dans le secteur Ospedale-Cagna, cette espèce, assez rare en Corse, n'était signalée que près de Sartène et de Portu-Vecchiu d'après J. BRIQUET & R. DE LITARDIÈRE (*Prodr. Fl. Corse* 2/2: 82, 1936).

J. GAMISANS, M. MURACCIOLE & R. DESCHATRES

Euphorbia maculata L.

- Casamozza, sables de la rive droite du Golo, à 500 m en aval du pont routier, peu abondant, 15 m, 14.9.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Moltifao, au niveau du lotissement de Campo Longo, bords de la route D 147, abondant, présent aussi sur les pelouses rases entre la route et la rivière d'Asco, avec *Euphorbia chamaesyce*, 250 m, 18.9.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé, Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Bass. Médit., fasc. 18, n° 9422); nord de Ponte-Leccia, au pont du chemin de fer sur la rivière d'Asco, sur le ballast, 195 m, 19.9.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); route d'Asco, en amont du Vieux Pont, ancien dépôt de gravillon à gauche de la D 147, 300 m, 9.10.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Espèce nord-américaine, signalée comme naturalisée en Corse par P. ZANGHERI (*Fl. Italica* 1: 362, 1976).

R. DESCHATRES

Euphorbia pterococca Brot.

- Ajaccio, près de la Parata, fossé à droite de la route D 111, 10 m, 5.5.1979, *Dutartre, G. s.n.* (Hb. privé); secteur Ospedale-Cagna, côte W, Canosellu, partie S, pelouse sur replat, à 120 m en arrière de la plage, sol plus ou moins arénacé, organique, épais, 4.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12218* (Hb. privé GAMISANS), fr.; secteur Ospedale-Cagna, côte W, Salina, pelouse dans une vaste dépression à 20 m de la mer, en bordure du maquis, 4.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12255* (Hb. privé GAMISANS), fr.; au S de la Punta d'Ecicca, plage d'Arana, maquis à lentisque, en arrière de la plage, 1-2 m, en bordure du maquis, 5.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12297* (Hb. privé GAMISANS), fr.; Roccapina, près de l'"Oasis du Lion", à l'ombre des blocs rocheux proches de la route, 150 m, 9.4.1978, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), revu le 4.4.1986 (Session S.B.C.O.); secteur d'Ospedale-Cagna, embouchure du ruisseau de Francolu sur l'étang de Balistra, entre les rochers en lisière du maquis, peu abondant, 2 m, 2.6.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.3115* (G).

Dans le secteur Ospedale-Cagna, cette espèce, assez rare en Corse, n'était signalée que près de Sartène, de Portu-Vecchiu (J. BRIQUET & R. DE LITARDIÈRE, *Prodr. Fl. Corse* 2/2: 83, 1936), à Bocca di Roccapina et à la Punta di Rundinara (DUTARTRE & R. DESCHATRES in D. JEANMONOD & al., *Candollea* 41: 37, 1986).

J. GAMISANS, M. MURACCIOLE, R. DESCHATRES,
G. DUTARTRE & D. JEANMONOD

Euphorbia platyphyllos L.

- Cap corse, près de Macinaggio, lieu humide au bord d'un chemin de terre en allant à la Punta di a Coscia, 5 m, 5.5.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Casamozza, rive gauche du Golo, près de la centrale thermique de Lucciana, au bord d'un trou d'eau, 10 m, 29.5.1986, *Lambinon, J. & Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé DESCHATRES); Lucciana-Casamozza, anciennes alluvions du Golo envahies par les plantes des friches-prairies, un peu en aval de la N 193, env. 20 m, 29.5.1986, *Deschatres, R. & Lambinon, J. 86/90* (BR, G, LG); secteur de la Plaine-orientale, route de Querciolo à Marina di Sorbo, fossé humide en bordure de champ, assez abondant, 5 m, 29.5.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.2885* (G); Querciolo, champ humide à droite du chemin conduisant à la plage de Sorbu, près du fossé, 3 m, 9.5.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Querciolo, près de la Marina-di-Sorbo, aulnaie en arrière de la plage, 1 m, 2.10.1984, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Solenzara, à 2.7 km au nord de la ville, bord de la route N 198 au niveau du marais de Peri, à gauche, 5 m, 27.7.1969, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Espèce assez rare et peu signalée en Corse.

D. JEANMONOD, R. DESCHATRES & J. LAMBINON

*Fabaceae***Anagyris foetida** L.

- Côte orientale, golfe de Sant'Amanza, sous les Rocchi Bianchi, sur le versant rocheux et pierreux, à la base de la falaise maritime calcaire, 20 m, 22.5.1983, *Thiébaud, M.-A. & Roguet, D. T.03900* (G).

Ce taxon a été décrit par J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse* 2/1: 230, 1913) comme rare en Corse, mais abondant là où on le rencontre. J. GAMISANS (*Cat. Pl. Vasc. Corse*: 163, 1985) le note comme rare pour l'étage mésoméditerranéen et n'indique pas sa présence sur le littoral. La station des "Rocchi Bianchi" correspond à une falaise littorale, située à "l'ouverture" du golfe de Sant'Amanza, sur laquelle l'*Anagyris foetida* se développe à une altitude d'environ vingt mètres. Cette station, parfaitement abritée des vagues marines, n'est sujette aux embruns marins que lors des plus fortes tempêtes en provenance du secteur nord-est à est. M. Conrad (in litt.) a observé cette espèce depuis 1960 sur les falaises du goulet de Bonifacio, non loin d'une maison isolée, à droite en allant vers la mer, et en situation abritée des embruns marins de part sa position dans le goulet. L'*Anagyris foetida* a d'ailleurs été revu durant l'année 1986 en plusieurs points des environs de Bonifacio. Cette plante semble donc bien adaptée aux falaises maritimes, notamment calcaires, sans représenter toutefois une véritable espèce littorale.

M.-A. THIÉBAUD & M. CONRAD

Anthyllis tetraphylla L.

- Route de Saint-Florent à Nonza, au niveau de Farinole à 10 km de Nonza, sur un petit chemin de terre s'embranchant sur la D 80, calcaire, 30 m, 5.5.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Lozari, pente rocailleuse (calcschistes) dominant la route N 199 au nord de Lozari, sous la cote 137, 50-100 m, 13.4.1978, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Lozari, en montant à la prise d'eau, le long du chemin, sur calcaire, 60 m, 25.4.1983, *Dutartre, G. 11795* (Hb. privé); Santo-Pietro di Tenda, rocailles calcaires près d'une ancienne carrière bordant la route D 62 à 2 km au nord-est du village, 250 m, 9.5.1986, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Pietralba, au pied de la falaise de Pedano, sur calcaire, 12.5.1979, *Dutartre, G. 11794* (Hb. privé); Moltifao, coteau calcaire de Pietralbello, 250 m, 21.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Morosaglia, en montant à la Cima Pedani, pente calcaire, échantillons peu abondants et de taille réduite, 700 m, 21.5.1981, *Deschatres, R.* observation; pente calcaire à l'est de la Punta di Querceta Tonda, 14.5.1979, *Dutartre, G. 11798* (Hb. privé); côte orientale, au nord du port de Campoloro, sur des apports de terre calcaire, 2 m, 7.6.1981, *Dutartre, G. 11799* (Hb. privé); Aleria, près des fouilles, sur calcaire, 5.5.1977, *Dutartre, G. 11796* (Hb. privé); au-dessus de l'étang de Sperone, secteur de Bonifacio, sur calcaire, 2.5.1976, *Dutartre, G.* (Hb. privé).

Espèce calcicole, disséminée en Corse, indiquée seulement par J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse* 2/1: 319, 1913) des régions calcaires de Saint-Florent et Bonifacio, où elle abonde. Voir aussi les localités signalées par R. DE LITARDIÈRE (*Candollea* 14: 142, 1953; *Candollea* 15: 35, 1955).

R. DESCHATRES & G. DUTARTRE

Anthyllis vulneraria L. subsp. **vulnerarioides** (All.) Arcangeli

- A la Punta di Fornello, couloir ombragé siliceux plongeant sur Bavella, 1870 m, 21.7.1970, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Nos échantillons ont été étudiés par J. Cullen, qui écrit (*in litt.*, 1972): "This seems to be a variant of subsp. *vulnerarioides* (All.) Arc. known from the mountains of S France. It differs its lower leaves which have fewer leaflets." Cette sous-espèce était mentionnée succinctement par J. GAMISANS (*Cat. Pl. Vasc. Corse*: 163, 1985).

R. DESCHATRES

Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Ball. (*A. linnaeanum* Walpers)

- Bord de la route de Saint-Florent à Nonza, à 8 km de Nonza, sur calcaire, 21.4.1973, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Ostriconi, talus rocailleux calcaire à gauche de la route d'Ile-Rousse, avec *Fumana ericoides*, 45 m, 31.3.1976, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Ostriconi, sommet calcaire sous la Punta d'Arco, 250 m, 25.4.1983, *Dutartre, G. 11736* (Hb. privé); Lozari, pente rocailleuse (calcschistes) dominant la route N 199 au NE de Lozari sous la cote 137, avec *Anthyllis tetraphylla*, abondant, 50-100 m, 13.4.1978, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Lozari, en montant à la prise d'eau, abondant sur calcaire, 60 m, 10.5.1979, *Dutartre, G. 11738* (Hb. privé); Lozari, près du village de vacances, sur calcaire, 5.5.1985, *Dutartre, G. 11735* (Hb. privé).

Cette espèce calcicole est bien connue du bassin de Saint-Florent. La localité de Lozari était sans doute connue de Soleirol car J. BRIQUET écrit (*Prodr. Fl. Corse* 2/1: 236, 1913): "Habui... ex Corsica a Lanzari a Soleirolio (Bert., *Fl. It. VII*: 464); nous n'arrivons pas à déterminer exactement l'emplacement de cette localité".

R. DESCHATRES & G. DUTARTRE

Cytisus striatus (Hill.) Rothm.

- Ucciani, bords de la N 193, près du pont, quelques pieds subspontanés, 280 m, 2.6.1986, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé).

Il s'agit de la deuxième observation faite dans l'île (voir D. JEANMONOD & D. ROGUET in D. JEANMONOD & al., *Candollea* 41: 37, 1986).

G. BOSC

Lathyrus hirsutus L.

- Désert des Agriates, talus bordant la route D 81 près de Costa, 15.5.1983, *Dutartre, G. 5475* (Hb. privé); étang de Biguglia, frange d'hélophytes, côté mer entre Casone et l'embouchure de l'étang, 18.5.1980, *Lambinon, J. 80/708* (LG); Calvi, 5.8.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Calvi, golfe de la Revellata, plage de l'Alga, prairie fraîche au bord du sentier, en arrière de la plage, 6.5.1979, *Lambinon, J. 79/266 & Pironet, F.* (LG); près de l'étang de Crovani, plage de galets à la limite des touffes de lentisques, 5 m, 6.6.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Castagniccia, talus bordant la route D 36, entre l'intersection de la D 506 avec la D 36 et Pruno, 28.5.1981, *Dutartre, G. 5478* (Hb. privé); Figaretto (au nord de Moriani-plage), petit marais derrière l'étroit cordon dunal, 6.7.1984, *Lambinon, J. 84/533* (LG); secteur de Porto, près de Partinello, en bordure de la route D 81, 280 m, 3.6.1981, *Dutartre, G. 5483* (Hb. privé); à mi-chemin entre Piana et Cargèse, près du pont du Chiuni, bord d'un ruisseau près de la route D 81, 40 m, 14.6.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur de la Plaine-orientale, Aléria, marais derrière la plage d'Aléria, rive gauche du Tavignano, en lisière de la phragmitaie, abondant, 2 m, 30.5.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.2946* (G); pont du Liamone, 23.7.1961, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur de la Plaine-orientale, Isola longa (presqu'île de l'étang d'Urbino), au nord ouest, prairie humide en bordure du marais avec les *Carex*, avant la phragmitaie, assez abondant, 1 m, 31.5.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.2970* (G); région d'Ajaccio, à la Punta, 600 m, 16.7.1967, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Ajaccio, au-dessus des grands immeubles qui dominent le cimetière, entre la ville et la Parata, 90 m, 7.4.1978, *Dutartre, G. 5480* (Hb. privé); Bonifacio, à Sant'Amanza, marais en arrière de la plage de Maora, 1 m, 16.7.1974, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Cette espèce semble en définitive assez répandue sur le littoral corse, au moins sur la côte orientale. Elle n'était pas signalée dans la région de Calvi.

D. JEANMONOD, R. DESCHATRES, G. DUTARTRE & J. LAMBINON

Lathyrus ochrus (L.) DC.

- L'île Rousse, en bordure de la route entre Curzo et la Punta Vallitoni, 60 m, 10.5.1979, *Dutartre, G. 5404* (Hb. privé); Calvi, glacis du fort, friche à hautes herbes, env. 40 m, 14.5.1980, *Lambinon, J. 80/675* (LG et Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Bass. Médit. 20, n° 11365); entre le col de Palmarella et Galéria, 3.6.1981, *Dutartre, G. 5410* (Hb. privé); côte orientale, maquis sableux au nord du Port de Campoloro, 7.6.1981, *Dutartre, G. 5408* (Hb. privé).

Espèce rare en Corse, signalée seulement aux environs de Bastia, Ajaccio, Porto-Vecchio et Bonifacio (J. BRIQUET & R. DE LITARDIÈRE, *Prodr. Fl. Corse* 2/1: 402, 1913; R. DE LITARDIÈRE, *Candollea* 15: 36, 1955 et *Candollea* 18: 189, 1963).

J. LAMBINON & G. DUTARTRE

Lathyrus setifolius L.

- Moltifao, coteau calcaire de Pietralbello, près de la maison ruinée, 310 m, 17.5.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Ponte Leccia, coteau aride de serpentine dominant la route de Bastia à 1 km du village, 320 m, 9.5.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Omessa, bords de la voie ferrée, 350 m, 16.5.1984, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé).

Disséminé dans l'île d'après J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse* 2/1: 404-405, 1913).

G. BOSC & R. DESCHATRES

Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd.

- Secteur du Cap Corse, étang au sud de la plage de Barcaggio, parmi les *Juncus acutus*, assez abondant, 5 m, 16.6.1986, *Jeanmonod, D. & Zellweger, C. J.3636* (G); secteur de Tenda, désert des Agriates, côte ouest du golfe de Saint-Florent, en bordure de l'étang constitué à l'embouchure du Fiume Santu, zone marécageuse sur sol avec terre sableuse pouvant être inondée en saison humide, 2-3 m, 5.9.1984, *Thiébaud, M.-A. 5138* (G); secteur de Tenda, Saint-Florent, marais de Pezzo, dans le pré humide bordant le marais, assez abondant, 5 m, 29.5.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.2847* (G); secteur de Tenda, Saint-Florent, zone marécageuse et prés salés sur la rive droite de l'Aliso, 500 m avant son embouchure dans le port de Saint-Florent, 3-4 m, 21.6.1983, *Thiébaud, M.-A. & Roguet, D. T.04513* (G); côte orientale, bord de l'étang de Diane, sur une zone sableuse avec bon apport de Limon, abrité derrière un puissant "rideau" de *Juncus acutus* L., hors de l'eau, 1 m, 17.6.1981, *Thiébaud, M.-A. 01850* (G); secteur de Rotondu, embouchure du Liamone, zone exondée en lisière de la phragmitaie, très abondant, 5 m, 9.6.1986, *Jeanmonod, D., Natali, A. & Zellweger, C. J.3415* (G); secteur de la Plaine-orientale, Isola Longa (presqu'île de l'étang d'Urbino), au nord ouest, prairie humide en bordure du marais avec les *Carex*, avant la phragmitaie, assez abondant, 1 m, 31.5.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.2968* (G); secteur d'Ospedale-Cagna, étang de Padulu Tortu, 2 m, 31.5.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.2993* (G); côte orientale entre Solenzara et Porto-Vecchio, anse de Canella, petit marais en bordure du ruisseau de Canella à son embouchure, hors de l'eau, 5 m, 18.6.1981, *Thiébaud, M.-A. 01901* (G); côte occidentale, golfe de Valinco, plage de Portigliolo, petit marais en arrière de la plage, au bord de l'eau, sur sable peu limoneux, 1 m, 24.6.1981, *Thiébaud, M.-A. 02115* (G); côte orientale, golfe de Rondinara, bas marais au nord du golfe, entre la plage de sables littoraux et l'étang de Prisarella, 2-3 m, 4.5.1982, *Thiébaud, M.-A. 02786* (G).

Cette espèce est considérée par J. BRIQUET comme disséminée (*Prodr. Fl. Corse* 2/1: 335, 1936). Elle a toutefois été très peu signalée. Elle est citée dans le NW seulement à Galéria (R. DE LITARDIÈRE, *Arch. Bot., Mém.* 3/3: 19-20, 1929). Elle nous apparaît cependant comme assez fréquente dans toutes les zones humides bordant notamment les étangs littoraux.

D. JEANMONOD & M.-A. THIÉBAUD

Medicago scutellata (L.) Miller

- Secteur de Porto, à Partinello, en bordure de la route D 81, 280 m, 3.6.1981, *Dutartre, G. 4733-4734-4735* (Hb. privé); côte orientale, Bonifacio, vallon du Canali, 25 m, 1.5.1983, *Dutartre, G. 4731-4732* (Hb. privé); côte orientale, Bonifacio, en bordure de la route de Maora-plage depuis l'intersection avec la D 60, 2.5 m, 2.5.1983, *Dutartre, G. 4727-4728-4730* (Hb. privé).

G. DUTARTRE

Medicago soleirolii Duby

- Au pied de la tour de Nonza, 20.4.1986, *Conrad, M.* observation.

M. CONRAD

Melilotus italica (L.) Lam.

- Cap Corse, Baragogna, à l'embranchement de la route de Meria (D 35) sur la D 80, 190 m, 1.5.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); près de Pino, entre la route D 80 et l'embranchement de la D 33 sur la D 180 (route de Luri), 200 m avant l'intersection à droite de la route en amont, 7.5.1985, *Dutartre, G. s.n.* (Hb. privé); Nonza, au pied de la tour, abondant, 150 m, 5.5.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Caporalino, bords herbeux de la N 193, face aux rochers à *Brassica insularis*, 16.5.1980, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé); Caporalino, Monte a Supietra, bord de la voie ferrée (près de l'entrée du tunnel), 370 m, 17.5.1981, (localité connue de P. LEBRUN), *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Ajaccio, près du Campo di l'Oro, talus bordant la route N 196, abondant, 31.5.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); revu le 17.4.1981, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé).

Rare en Corse d'après J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse* 2/1: 274, 1913).

G. BOSC, R. DESCHATRES & G. DUTARTRE

Ononis natrix L. subsp. **natrix**

- Saint-Florent, route de Nonza, au bord de la D 81 à 8 km de Nonza, calcaire, 40 m, 6.8.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); plage à 8 km au sud de Nonza, assez abondant sur les sables consolidés, substrats exceptionnels pour cette espèce, 5 m, 1.5.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur du Cap Corse, Saint-Florent, près de la Punta di Saeta, sur la crête, dans une fruticée basse, calcaire, peu abondant, 100 m, 27.5.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.2768* (G); secteur de Tenda, environs de Saint-Florent, falaises au N des Stretti di Poggio, sous le Monte San Angelo, vire, reposoir à bétail, calcaire, 50 m, 12.5.1985, *Jeanmonod, D. & Roguet, D. J.2381* (G); région de Saint-Florent, en montant au M^{te} Sant'Angelo, vire sur calcaire, 7.5.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Cette espèce est rare en Corse, mais elle paraît assez fréquente dans la région de Saint-Florent jusqu'à Nonza.

D. JEANMONOD & R. DESCHATRES

Ononis pusilla L. (*O. columnae* All.)

- Bord de la route de Saint-Florent à Nonza, à 10 km de Nonza, sur calcaire, en compagnie d'*Ononis natrix*, *Fumana laevipes*, *Argyrolobium zanonii*, 80 m, 21.4.1973, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); colline calcaire dominant le Fium Albino, rive gauche, à 1 km de son embouchure, 200 m, 21.4.1973, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Saint-Florent, sur les limites de Farinole, crête calcaire de Tuffone Niellu, près de la route D 333, assez abondant, 250 m, 18.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Saint-Florent, à la Punta di Fortino, sous le sommet, calcaire, 250 m, 26.7.1969, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Cette espèce a été seulement signalée des environs de Bonifacio par Boyer (voir J. BRIQUET, *Prodr. Fl. Corse*, 1: 252, 1913). J. BOUCHARD (*Fl. Prat. Corse*, 3^e éd.: 216, 1978) l'indique de façon dubitative: " ? très rare, peut-être introduit ". Or la plante est évidemment spontanée dans le bassin calcaire de Saint-Florent, sur des sols qui correspondent à son écologie habituelle. En

revanche, nous ne l'avons pas retrouvée dans la région de Bonifacio, malgré nos recherches. Nous nous demandons si l'*Ononis pusilla* n'a pas été confondu avec l'*O. minutissima* L., qui abonde à Bonifacio, et que nous n'avons pas revu au Mont Sant'Angelo de Saint-Florent, où il a été signalé (voir J. BRIQUET, l.c.).

R. DESCHATRES

Pisum sativum L. subsp. **sativum** var. **arvense** (L.) Gams

- Secteur Ospedale-Cagna, côte W, Cala di Conca, rive S, formations arbustives sur chaos granitique, 6.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12317* (Hb. privé GAMISANS), fr.

J. GAMISANS & M. MURACCIOLE

Tetragonolobus purpureus Moench

- Au sud de l'étang de Biguglia près de la Marana, terrain sableux, une grosse touffe à rameaux étalés, 9.5.1985, *Dutartre, G. s.n.* (Hb. privé); Bonifacio, route de Sartène, à 4 km de la vieille ville, ancienne oliveraie à droite, sur calcaire, avril 1963, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Espèce très rare dans l'île, découverte par R. DE LITARDIÈRE en 1936 près de Furiani (*Candollea* 7: 229-241, 1937).

R. DESCHATRES & G. DUTARTRE

Trifolium squamosum L.

- Saint-Florent, lieu humide près de la plage de Pezzo, 2 m, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); côte orientale, au sud de Furiani, pâture près de la halte de Fornacina, 13.5.1980, *Bosc, G. & Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé DESCHATRES); plage d'Alistro, bord d'un petit marais en arrière de la plage, 5 m, 9.6.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur de la Plaine-orientale, Isola Longa (presqu'île de l'étang d'Urbino), au nord ouest, bordure de l'*Arthrocnemum* dans la ceinture avant la phragmitaie, abondant, 1 m, 31.5.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.2967* (G); Vix, bord d'un petit marais à *Eryngium barrelieri*, près de la route N 198, 10 m, 20.5.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Marine de Solaro, en arrière de la plage, lieu humide, 11.6.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Santa-Giulia, au bord de la lagune, 1 m, 13.5.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bonifacio, chemin de terre, conduisant de la route D 60 à la dépression de Musella, 60 m, 13.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bonifacio, dépression de Musella, prairie marécageuse inondée en hiver, 55 m, 10.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Espèce disséminée mais peu signalée.

D. JEANMONOD & R. DESCHATRES

Trifolium vesiculosum Savi.

- Ucciani, bords herbeux de la N 193, près du pont, 280 m, 2.6.1986, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé).

Disséminé dans l'île.

G. BOSC

Vicia pannonica Crantz subsp. **striata** (Bieb.) Nyman (= *V. purpurascens* DC.)

- Biguglia, presqu'île de San Damiano, dans un champ d'orge, abondant, 10.5.1984, *Deschatres, R. & Conrad, M. s.n.* (Hb. privé DESCHATRES); nord de Corte, bord de la route N 193 avant Bistuglio, au pied d'un coteau calcaire, 500 m, 23.5.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Plante très rare en Corse, signalée une seule fois au siècle dernier à "Bastia" où elle n'a pas été revue (voir R. DE LITARDIÈRE, *Candollea* 14: 144, 1953). Notre échantillon de Bistuglio est fleuri, et non en fruits comme nous l'avons indiqué par erreur à J. GAMISANS (*Cat. Pl. Vasc. Corse*: 174, 1985).

M. CONRAD & R. DESCHATRES

Vicia sativa L. subsp. **nigra** (L.) Ehr.

- Secteur d'Incudine-Bavella, montée de Cozzano à la Bocca di l'Usciolu, près de la crête de Miratoju, lisière de la hêtraie avec les formations en coussins épineux, peu abondant, 1250 m, 11.6.1986, *Jeanmonod, D., Natali, A. & Zellweger, C. J.3486* (G).

Placé à une altitude assez exceptionnelle, cet échantillon présente en outre des rameaux semi-souterrains à fleurs cléistogames, phénomène rare dans cette sous-espèce, mais déjà relevé par S. PIGNATTI (*Fl. d'Italia* 1: 682, 1982). Ce taxon diffère du subsp. *amphicarpa* par ses corolles plus petites (<18 mm au lieu de 20-25 mm). Sur notre échantillon, la corolle mesure 16 mm.

D. JEANMONOD

*Gentianaceae***Exaculum pusillum** (Lam.) Caruel

- Secteur Ospedale-Cagna, au S de Campomoro, Canosellu, secteur S, pelouse sur replat à 120 m de la mer, au niveau d'une dépression, 2 m, 4.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12221* (Hb. privé GAMISANS), fl. et fr.; Suartone, aux Tre Padule, sur la vase asséchée de la mare orientale, 100 m, 6.8.1967, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Cette espèce est rare en Corse. Dans le secteur Ospedale-Cagna, elle n'était signalée que dans les environs de Portu-Vecchiu par J. BRIQUET & R. DE LITARDIÈRE (*Prodr. Fl. Corse* 3/2: 39, 1955).

J. GAMISANS, M. MURACCIOLE & R. DESCHATRES

*Geraniaceae***Erodium chium** (L.) Willd.

- Balagne, Sant'Antonino, vieilles rues dans le village, abondant, 470 m, 6.5.1986, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Lumio, bord du chemin longeant le Fiume Secco et conduisant à la plage, terrain vague, 5 m, 28.4.1984, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Calvi, terrain rudéralisé dans la ville, 20.5.1973, *Auquier, P. 3036, Baguette, M. & Lambinon, J.* (LG); région d'Ajaccio, rochers siliceux près de la tour de la Parata, 20 m, 3.4.1963, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); sud de Sartène, à Roccapina, au pied du Lion, 100 m, 23.4.1984, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Les échantillons de Sant'Antonino et d'Ajaccio ont été déterminés par G. G. Guittonneau, à qui nous adressons nos remerciements.

Espèce rare en Corse, surtout répandue, semble-t-il, dans la région de Calvi-Balagne et aux environs d'Ajaccio, où la mentionnent déjà J. BRIQUET & R. DE LITARDIÈRE (*Prodr. Fl. Corse* 2/2: 16, 1936).

R. DESCHATRES & J. LAMBINON

Erodium ciconium (L.) L'Hér.

- Secteur de Renosu, 3 km au SW de Bastelica près du Ponte Vecchio sur le Prunelli, rochers exposés, peu abondant, 630 m, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.3353* (G).

Cette espèce, rare en Corse, est signalée ici pour la première fois dans la région.

D. JEANMONOD

Erodium lebelii Jordan subsp. **maruccii** (Parl.) Guittonneau

- Secteur du Cap Corse, côte orientale, plage de la baie de Tamarone, sur les sables littoraux, 2-3 m, 6.5.1984, *Thiébaud, M.-A. 04850* (G); désert des Agriates, à la plage de Guignu, 14.4.1984, *Deschatres, R. & Dutartre, G. s.n.* (Hb. privé DESCHATRES); secteur de Tenda, nord du désert des Agriates, plage de Guignu, sur les sables littoraux, 7 m, 4.5.1984, *Thiébaud, M.-A. 04765* (G); dunes d'Ostriconi, abondant, 5-40 m, 24.4.1973,

Deschatres, R. s.n. (Hb. privé); Querciuolo, plage de Sorbu, 9.5.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur de la plaine orientale, plage au sud du port de Campoloro, sur sables littoraux, de grande stature, rampante sur le sable, 5 m, 3.6.1983, *Thiébaud, M.-A. & Roguet, D. T.04154* (G); côte orientale, plage d'Alistro, 12.4.1973, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur de la plaine orientale, côte orientale, à l'étang de Diane, près de son embouchure, derrière la Tour de Diane, sur les dunes de sables littoraux, 5-7 m, 22.5.1980, *Thiébaud, M.-A. 01675* (G); Aleria, Mündung des Tavignano, Stranddünen, 21.5.1935, *Aellen, P. 3274* (G-PAE); nord d'Ajaccio, plage de Lava, 24.3.1976, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur du Rotondu, côte occidentale, golfe de Lava, plage de Lava, au sud de Porto Provenzale, sur sables littoraux, 3 m, 30.4.1982, *Thiébaud, M.-A. 02623* (G); secteur du Rotondu, côte occidentale, environ 5 km au nord-nord-est de la pointe de la Parata, plage de Minaccia, sur sables littoraux, 10 m, 6.5.1982, *Thiébaud, M.-A. 02834* (G); Solenzara, Meeresstrand beim Stagno di Chiola, 1.5.1935, *Aellen, P. 3275* (G-PAE); Solenzara, Strandsand, 12.7.1932, *Aellen, P. 22* (G-PAE); secteur de Bavella-Incudine, côte occidentale, golfe de Valinco, extrémité sud-est de la plage du Taravo, sur sables littoraux, 2-3 m, 6.4.1982, *Thiébaud, M.-A. 02388* (G); secteur de Bavella-Incudine, côte occidentale, golfe de Valinco, plage au sud-sud-est de Abbartello, sur sables littoraux, 5 m, 27.4.1982, *Thiébaud, M.-A. 02528* (G); secteur de Bavella-Incudine, côte occidentale, golfe de Valinco, Cappiciolo, plage de la Marina d'Olmeto, sur l'extrême bord de la dune de sables littoraux, avec *Ammophila arenaria* subsp. *arundinacea*, 7-8 m, 29.3.1982, *Thiébaud, M.-A. 02337* (G); entre Olmeto et Propriano, plage de Baracci, abondant, 1975, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); sud de Porto-Vecchio, plage et dunes d'Asciajo, 18.4.1984, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur de Cagna-Ospedale, côte occidentale, golfe de Tizzano, au sud-sud-est de Tizzano, plage de la Cala di l'Avena, au niveau des premières dunes de sables littoraux, 4-5 m, 13.5.1982, *Thiébaud, M.-A. 03103* (G); secteur de Cagna-Ospedale, côte occidentale, golfe de Tizzano, au sud-sud-est de Tizzano, arrière plage de la Cala di l'Avena, sur sables littoraux, à la base des dernières dunes secondaires, 8 m, 21.4.1982, *Thiébaud, M.-A. 02471* (G).

Ici encore, nous devons la détermination de quelques-uns de nos échantillons (Ostriconi, Querciuolo, Lava, Baracci) à l'obligeance de G. G. Guittonneau. En Corse, ce taxon n'était connu que des dunes de l'Ostriconi et de la plage de Pero près de Cargèse (voir G. G. GUITTONNEAU, *Boissiera* 20: 103, 1972). Il est indiqué comme plante rare sur le littoral corse par J. GAMISANS (*Cat. Pl. Vasc. Corse*: 154, 1985). Nos récentes recherches prouvent cependant qu'il n'est pas rare en Corse, mais disséminé sur pratiquement tout le pourtour de l'île, où il croît sur le sable et les dunes du littoral. Ses organes végétatifs sont caractérisés par une structure anatomique typique des psammophytes, qui répond parfaitement aux impératifs des conditions écologiques extrêmes du milieu dans lequel il se développe. Sa taille est généralement petite, sa croissance très rapide, ce qui lui permet d'accomplir son cycle reproductif, et par conséquent sa survie, en un laps de temps très court, souvent compris entre deux tempêtes ou coups de vent, après quoi il pourra être entièrement recouvert par le sable. Ce phénomène explique vraisemblablement d'une part la raison pour laquelle cette petite espèce annuelle est très disséminée, et d'autre part la raison qui lui a valu d'être peu observée avant nos recherches systématiques sur le littoral corse!

On sait que l'*Erodium lebelii* subsp. *maruccii* a été récemment découvert en France continentale, dans des bourrelets dunaires autour de l'étang de Pissevaches, dans l'Aude (G. G. GUITTONNEAU, *Bull. Soc. Bot. France* 132, Lettres Bot.: 319, 325, 1985).

R. DESCHATRES & M.-A. THIÉBAUD

Geranium silvaticum L. subsp. *silvaticum*

- A la Punta di Fornello, sous un gros bloc calcaire formant abri (contre la dent du bétail!), 1890 m, 5.8.1967 (fr.) et 14.7.1969 (fl.), *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Cette espèce a été mentionnée succinctement pour la première fois pour la Corse par J. GAMISANS (*Cat. Pl. Vasc. Corse*: 155, 1985). S. PIGNATTI (*Fl. d'Ital.* 2: 7, 1982) indique que la plante est disséminée en Italie et absente des îles méditerranéennes. La station est inattendue pour une espèce sylvestre; on peut penser qu'elle bénéficie d'un microclimat particulier. Déjà R. DE LITAR-

DIÈRE & G. MALCUIT (*Arch. Bot.* 4/5: 14, 1931), en signalant la présence au Fornello d'une fétuque du groupe *arundinacea*, faisaient remarquer que, "malgré son caractère essentiellement hygrophile, [elle] s'accommode pourtant sans inconvénient du milieu constitué par des rocaïlles sèches".

R. DESCHATRES

Lamiaceae

Lamium × **conradiae** G. Bosc

Lors de la publication de ce nom (G. BOSCO, *Candollea* 41: 59-61, 1986), la désignation formelle d'un type a été omise. Nous réparons ci-après cet oubli afin de valider l'appellation de cet hybride:

- **Holotypus**: Corse, bord du torrent de Casso, sur la route du col de Verde aux bergeries de Capanelle, env. 1400 m, juillet 1974, *Bosc, G. s.n.* (hb. privé). G. BOSCO

Par ailleurs, une erreur s'est glissée quant au prénom de l'auteur, il s'agit de **Georges** Bosc et non de Gilles Bosc.

D. JEANMONOD (éd.)

Stachys **maritima** Gouan

- Secteur de Tenda, Désert des Agriates, plage de Saleccia, derrière la rivière dans une clairière de la forêt de pin d'Alep, peu abondant, 2 m, 28.5.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.2809* (G); Saleccia, pelouse claire sableuse à annuelles, sous les pins d'Alep, très peu abondant, 10.5.1983, *Deschatres, R.* observation; nord de Cargèse, plage de Chiuni, 2 m, 22.4.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Cette espèce, assez répandue sur la côte orientale mais rare sur la côte occidentale, n'a jamais été signalée dans ces régions.

D. JEANMONOD & R. DESCHATRES

Lentibulariaceae

Utricularia **australis** R. Br.

- Secteur d'Incudine-Bavella, environs de Propriano, étang de Cannichia, dans l'étang, parmi les *Phragmites* dans 50-100 cm d'eau, assez abondant par place, 8 m, 5.6.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.3191* (G).

Nouvelle espèce pour la flore de Corse. Il serait intéressant de savoir si l'utriculaire notée à l'état stérile aux Agriates par R. Deschatres est la même espèce ou une autre (J. GAMISANS, *Cat. Pl. Vasc. Corse*: 175, 1985).

D. JEANMONOD & D. ROGUET

Malvaceae

Abutilon **theophrasti** Medicus

- Fossés au bord de la route N 198, entre Casamozza et Mignataja, 19.9.1981, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé); Mignataja, au nord de l'étang de Palo, en allant vers la mer par un chemin de terre, bord d'une vigne, et un peu plus au nord en suivant la route de Cotticcio à l'Abatesco, 3 m, 20.8.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Mignataja, revers de fossé près de la petite route conduisant à la mer, 21.7.1974, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé).

R. DESCHATRES & G. BOSCO

*Nymphaeaceae****Nymphaea alba* L.**

- Querciolo, au nord de la plage de Sorbu, canaux près de la station de pompage, 1 m, 17.9.1984, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), ster.; secteur d'Ospedale-Cagna, petite mare sur la N 198, au NW de l'étang de Balistra et à 200 m au sud de la piste de moto-cross du lieu-dit Francole, dans la mare, abondant, 10 m, 3.6.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.3121* (G); route de Bonifacio à Porto-Vecchio N 198, dans un trou d'eau profond à gauche de la route, à 8 km de Bonifacio, 10 m, 22.9.1984, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Cette localité complète les quelques stations connues de cette espèce, présente surtout sur la côte orientale. Cette station avait été citée indirectement par l'un d'entre nous (G. Dutartre) à propos du *Juncus heterophyllus* Dufour "dépression profonde creusée à gauche de la N 198 à 8 km au nord de Bonifacio, avec *Nymphaea alba* L., 6.6.1981, *Dutartre, G. observation*" (in D. JEANMONOD & al., *Candollea* 41: 11, 1986).

D. JEANMONOD, D. ROGUET, R. DESCHATRES & G. DUTARTRE

*Orobanchaceae****Orobanche teucrii* Holandre**

- Saint-André de Bozio, route de Zuani, pelouse au pied de la Punta Figarello, plusieurs pieds fleuris parasites sur *Teucrium marum* L., 1040 m, 9.6.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Cette indication complète la mention succincte parue dans J. GAMISANS (*Cat. Pl. Vasc. Corse*: 181, 1985) qui signalait cette espèce pour la première fois en Corse. Repérée le 10.7.1974, elle a été revue à plusieurs reprises, mais toujours trop tôt ou trop tard pour une détermination certaine.

R. DESCHATRES

*Paeoniaceae****Paeonia mascula* (L.) Miller subsp. *russoi* (Biv.) Cullen & Heywood var. *corsica* (Sieber ex Tausch) Gürcke**

- Secteur d'Ospedale-Cagna, massif de Cagna, vallon du ruisseau de Spinu sous la Punta di Campolelli, rochers, zone au-dessus des pins, quelques pieds, 1050 m, 1.6.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.3062* (G); secteur d'Ospedale-Cagna, massif de Cagna, sur le chemin de la D 59 aux bergeries de Bitalza, un peu en dessous de la source de Pinu Biancu, rocailles, 2 pieds à 50 m de distance, 900 m, 1.6.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.3048* (G); massif de Cagna, Bitalza, entre les blocs rocheux près des bergeries, abondant, 23.7.1977, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé), fr.

Ce taxon ne semble pas rare dans la montagne de Cagna.

D. JEANMONOD, D. ROGUET & G. BOSC

*Papaveraceae****Roemeria hybrida* (L.) DC.**

- Solenzara, dans un site rudéral, avril 1982, *Dardaine, P. s.n.* (Hb. privé), dét. M. Conrad; 3 km au sud de Solenzara, un seul individu dans un talus herbeux, avril 1986, *Conrad, M. observation.*

M. CONRAD & P. DARDAINE

*Plantaginaceae***Plantago crassifolia** Forskål

- Secteur Tenda, Saint-Florent, La Roya, pré salé entre la route et la plage, 8.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12492* (Hb. privé GAMISANS), fl.; secteur Tenda, Saint-Florent, sur la plage de sables littoraux, 1 m, 23.6.1983, *Thiébaud, M.-A. & Roguet, D. T.04548* (G); “désert” des Agriates, Saleccia, pré salé entre le marais et la dune, 10.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12544* (Hb. privé GAMISANS), ster. et fr.; secteur Ospedale-Cagna, au NE de Portu-Vecchiu, en bordure de l'étang d'Arasu, 13.10.1986, *Dutartre, G. 16500* (Hb. privé).

Cette espèce n'était pas signalée dans la région des Agriates.

J. GAMISANS, M. MURACCIOLE, G. DUTARTRE & M.-A. THIÉBAUD

*Plumbaginaceae***Armeria pungens** (Link) Hoffmanns. & Link

- Bonifacio, à la grande plage de la Cala di Ciappili, dunes en arrière de la plage, abondant et de belle venue, 5 m, 13.4.1973, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur de Bonifacio, côte sud, plage de la Cala di Ciappili, dunes secondaires et arrière plage de sables littoraux, 4-5 m, 11.5.1984, *Thiébaud, M.-A. 04918* (G).

Cette station était connue de M^{me} Conrad (comm. pers.) qui l'a visitée en 1968 avec des membres de la Société botanique de France. À propos de cette espèce, on se référera à l'inventaire et la carte des localités corses donnés par P. V. ARRIGONI (*Webbia* 25: 144-147, 1970).

R. DESCHATRES & M.-A. THIÉBAUD

Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss.

- Secteur Ospedale-Cagna, Campomoro, village, dune près du petit port, 2-3 m, plante échappée de culture, 5.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12312* (Hb. privé GAMISANS), ster. et fl.

Cette espèce est **nouvelle pour la flore de Corse**. Elle constitue, dans la localité citée, un peuplement assez dense, très probablement planté à l'origine, mais dont certains individus se sont échappés. Elle a été observée aussi près de Saint-Florent, sur la rive droite de l'Aliso, en amont du pont, dans un marais à Salicornes, par R. Deschatres (“un pied fleuri apparemment planté de frais“!).

J. GAMISANS, M. MURACCIOLE & R. DESCHATRES

*Polygonaceae***Emex spinosa** (L.) Campd.

- Pinarello (au nord du golfe de Porto-Vecchio), sables rudéralisés près de la plage, abondant, avec e.a. *Diploaxis catholica* (L.) DC., 21.3.1986, *Lambinon, J. 86/12* (G, LG).

Peut-être en expansion en Corse?: voir J. GAMISANS, *Cat. Pl. Vasc. Corse*: 187-188, 1985.

J. LAMBINON

Polygonum amphibium L.

- Secteur d'Incudine-Bavella, environs de Propriano, étang de Cannichia, dans l'étang, assez abondant, 8 m, 5.6.1986, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J3194* (G).

Cette espèce n'était signalée que de l'embouchure du Taravu (J. BRIQUET, *Prodr. Fl. Corse* 1: 449-450, 1910).

D. JEANMONOD & D. ROGUET

Polygonum salicifolium Brouss. ex Willd

- Ajaccio, embouchure du Prunelli, près de la tour de Capitello, 17.10.1986, *Dutartre, G. 16476* (Hb. privé), fl. et fr.

Complète la distribution indiquée par R. DESCHATRES & al. in D. JEANMONOD & al., *Candollea* 41: 46, 1986.

G. DUTARTRE

Rumex × **pseudopulcher** Hausskn. (= *R. crispus* L. × *pulcher* L.)

- Baie de Crovani (entre Calvi et Galéria), endroit rudéral, pied de fourré à myrte et lentisque au revers de la levée de galets de la plage, 12.6.1979, *Lambinon, J. 79/423* (LG); Sotta, route D 859 de Ceccia vers Pentanaja, friche, env. 50 m, 31.5.1986, *Lambinon, J. 86/128* (LG).

Hybride nouveau pour la Corse, connu de Grèce, Espagne et Grande-Bretagne, selon J. E. LOUSLEY & D. H. KENT (*Docks and knotweeds Brit. Isles, BSBI Handb.* 3: 178, 1981). Bien que les parents soient souvent répandus ensemble en Corse, il semble rare; ainsi, dans la station de Sotta, nous avons examiné des centaines de pieds des deux parents et n'avons découvert qu'un unique individu de l'hybride.

Un problème subsiste par ailleurs quant à l'identification précise de la ou des sous-espèces de *R. pulcher* présentes en Corse, où seule est signalée le subsp. *pulcher* (voir notamment K.-H. RECHINGER & al. in G. HEGI, *Illustr. Fl. Mitteleur.*, 3^e éd., III/1: 389-391, 1981), mais nous trouvons des formes tendant, nous semble-t-il, vers le subsp. *divaricatus* (L.) Arcang.; peut-être les critères distinctifs entre les deux taxons ne sont-ils pas bien définis?

J. LAMBINON

*Portulacaceae***Montia perfoliata** (Donn. ex Willd.) Howell (= *Claytonia perfoliata* Donn. ex Willd.)

- Secteur Rotondu, région de Vico, village d'Arbori, à côté de la fontaine, largement dominant sur 50 m² environ, dans un fond de vallon ombragé, 400 m, 17.5.1986, *Gamisans, J. & Hébrard, J.-P. G.12056* (Hb. privé GAMISANS), fr.

Espèce nouvelle pour la corse où elle peut être considérée comme naturalisée (origine nord-américaine).

J. GAMISANS & J.-P. HÉBRARD

*Primulaceae***Anagallis minima** (L.) E. H. L. Krause (= *Centunculus minima* L.)

- Secteur Rotondu, à mi-chemin entre Porto et Cargèse, en amont de la route D 81, *Isoetion* au bord du ruisseau de Finnucciaghia, 110 m, 14.6.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur Renosu, endroit humide entre Bastelica et Cauro, près de Radicale, au bord de la route D 27, 440 m, 26.7.1961, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur Ospedale-Cagna, côte W, pelouse à 100 m de la mer dans une dépression arénacée inondée au printemps, 4 m, 4.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12238* (Hb. privé GAMISANS), fl. et fr.; secteur Ospedale-Cagna, côte W, Cala di Conca, rive S, à 10 m de la mer, pelouse fraîche à sol limoneux, 5-6 m, 6.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12430* (Hb. privé GAMISANS), fl. et fr.; secteur Ospedale-Cagna, côte W, Senetosa, dépression humide 300 m au NW du phare, 8 m, pelouse sur sol limoneux-organique, 6.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12347* (Hb. privé GAMISANS), fl. et fr.

Dans le secteur Ospedale-Cagna, cette espèce, disséminée en Corse, n'était signalée que près de Sartène et à Santa Giulia d'après J. BRIQUET & R. DE LITARDIÈRE (*Prodr. Fl. Corse* 3/1: 201, 1938).

J. GAMISANS & M. MURACCIOLE

*Ranunculaceae***Clematis cirrhosa** L.

- Secteur Ospedale-Cagna, côte W, au N de Senetosa, Cala di Conca, rive gauche, formations arbustives sur chaos granitique, 6.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12318* (Hb. privé GAMISANS), ster.

Cette espèce n'était pas signalée dans le secteur Ospedale-Cagna. Elle est actuellement connue dans les secteurs Cap corse (M. CONRAD, *Monde Pl.* 372: 4, 1971; G. DUTARTRE & R. DESCHATRES in D. JEANMONOD & al., *Candollea* 41: 47, 1986); Cintu (G. DUTARTRE, *Rev. Sci. Bourbonnais* 1979: 23, 1979; J. GAMISANS, *Candollea* 40: 115, 1985; G. DUTARTRE & R. DESCHATRES, l.c.); Rotondu (M. CONRAD, *Monde Pl.* 383: 4, 1975) et Bonifaci (J. BRIQUET, *Prodr. Fl. Corse* 1: 596, 1910; M. CONRAD, *Monde Pl.* 372: 4, 1971; G. DUTARTRE & R. DESCHATRES, l.c.).

J. GAMISANS & M. MURACCIOLE

Ranunculus monspeliacus L.

- Asco, près du pont gênois, rive droite amont, en compagnie de *Vicia barbazitae*, 535 m, 20.5.1981, *Bosc, G., Conrad, M. & Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé DESCHATRES).

Cette espèce n'est nullement commune en Corse comme l'indique J. BOUCHARD (*Fl. Prat. Corse*, 3^e éd.: 158, 1978). J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse*, 1: 613, 1910) fait déjà remarquer que *R. monspeliacus* n'a été rencontré en Corse par aucun observateur depuis l'époque de Salis; ce dernier auteur l'avait indiqué d'une façon assez vague: "Fium Orbo in arvis arenosis".

G. BOSCO, M. CONRAD & R. DESCHATRES

*Rhamnaceae***Frangula alnus** Miller (= *Rhamnus frangula* L.)

- Moltifao, près de Capanacce, aulnaie rive droite de la rivière d'Asco en aval du pont de Tesa, 260 m, 27.5.1986, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Ponte-Leccia, rive droite du Golo, à 2 km du village, par la route de Bastia, plusieurs arbustes, 175 m, 3.6.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé, LG).

Espèce mentionnée succinctement dans J. GAMISANS (*Cat. Pl. Vasc. Corse*: 196, 1985) pour la première fois en Corse.

R. DESCHATRES

*Rosaceae***Geum urbanum** L.

- Saint-Florent, aux Strette, bord du ruisseau de la Strutta, 15 m, 2.5.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Caporalino, au pied du Monte a Supietra, versant nord, 450 m, 28.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Vizzavona, près de la gare, 860 m, 18.7.1967, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur d'Incudine-Bavella, entre Cozzano et le col de Verde près du lieu-dit Scrivano, talus en sous-bois de *Quercus pubescens* et *Castanea sativa*, abondant, 880 m, 12.6.1986, *Jeanmonod, D., Natali, A. & Zellweger, C. J.3528* (G); à la Punta di Fornello, entre les blocs calcaires sous le sommet, 1890 m, 22.7.1970, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Considérée comme peu fréquente par J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse* 2/1: 197, 1913), cette espèce a en effet été très peu signalée.

D. JEANMONOD & R. DESCHATRES

Potentilla argentea L.

- Vizzavona, près de la gare, abondant, 930 m, 7.7.1969, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Vizzavona, terrain vague près de la gare, 900 m, 19.7.1974, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé); Bustanico, friche près de la chapelle Sant'Antone, 1010 m, 12.7.1977, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Très rare en Corse. Deux stations seulement ont été indiquées par J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse* 2/1: 185, 1913), tandis que deux autres ont été signalées plus tard par R. DE LITARDIÈRE (*Candollea* 11: 206, 1948). Tous les échantillons corses appartiennent au var. *tenuiloba* Schwarz (= var. *multifida* Rouy & Cam.).

G. BOSC & R. DESCHATRES

Potentilla recta L.

- Cap Corse, bords de la route en corniche au nord de San-Martino-di-Lota, au pied d'un maquis brûlé à *Geranium lanuginosum*, 200 m, 7.6.1986, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé); massif de Tende, bords de la D 15, entre Volpajola et la N 193, 200 m, 27.5.1969, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé); Vivario, terrain vague près de la poste, 750 m, 14.7.1974, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé); Vezzani, bords ombragés d'un torrent débouchant sur la D 343, aux environs de Pietroso, 600 m, 22.7.1974, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé); Bocognano, talus au-dessus de la fontaine, 650 m, 2.6.1986, *Bosc, G. s.n.* (Hb. privé).

Cette espèce doit être plus répandue que ce que n'indique J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse* 2/1: 186, 1913).

G. BOSC

Rosa arvensis Hudson

- Saint-André de Bozio, entre Poggio et Mazzola, talus frais près d'un petit pont sur le ruisseau de Guaglinella, 785 m, 12.7.1975, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), fl. et fr.

Plante à morphologie typique, pollen parfait. J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse*, 2/1: 211, 1913) rappelle l'indication ancienne et assez vague de Salis, "Castagniccia", mais estime que cette espèce, qui manque à la Sardaigne et à l'Archipel toscan, ne croît probablement pas en Corse. Plante à rechercher, notamment dans le Bozio et la Castagniccia.

R. DESCHATRES

Sorbus torminalis (L.) Crantz

- Saint-André de Bozio, près de Mazzola, maquis rocheux dominant la route D 15, plusieurs sujets malingres paraissant bien spontanés, 790 m, 22.9.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Pietroso, talus en contrebas de la route de Vezzani, à droite, un arbre isolé, 590 m, 21.9.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Antisanti, Campo al Quercio, lit du ruisseau de Ramacciolo, quatre arbres, 19.5.1984, *Paradis, G. & Muracciole, M. s.n.* (Hb. privé MURACCIOLE), fl.

Ces indications complètent la mention succincte parue dans J. GAMISANS (*Cat. Pl. Vasc. Corse*: 201, 1985). L'espèce n'est pas indiquée en Corse dans J. BRIQUET (*Prodr. Fl. Corse* 2/1: 165, 1913), ni dans aucune des flores françaises consultées, et pas davantage dans TUTIN, T. G. & al. (*Fl. Europaea* 2: 68, 1968). En revanche, les auteurs italiens l'indiquent en Corse, P. ZANGHERI avec doute (*Fl. Italica* 1: 273, 1976), S. PIGNATTI de façon affirmative (*Fl. d'Italia* 1: 605, 1982). Nous ne savons sur quelles données se fondent ces indications.

R. DESCHATRES & M. MURACCIOLE

*Rubiaceae***Galium minutulum** Jordan

- Agriates, à la Punta Cavallata, cavités des rochers maritimes, 1 m, 28.4.1983, *Dutarre, G. s.n.* (Hb. privé); nord de Galeria, sous la Bocca Bassa, en remontant un petit ravin rocheux au-dessus de la D 81, lieu-dit Dispensa, 90 m, 5.4.1978, *Dutarre, G. s.n.* (Hb. privé).

privé); région d'Ajaccio, près de la Parata, talus en forte pente entre la D 111 et la mer, au niveau de la colline cotée 81, plante peu abondante, 5 m, 21.5.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); sud de Sartène, à la Cala di Roccapina, rochers maritimes au sud-ouest de la plage, 1 m, 5.4.1978, *Dutartre, G. s.n.* (Hb. privé).

Cette rare espèce, décrite par Jordan de l'île de Porquerolles, a été trouvée aussi à l'île du Levant et à Brégançon près de Bormes (Var), puis à Banyuls et Cerbère (Pyrénées-Orientales). Hors de France elle est connue de la Péninsule ibérique (Espagne et Portugal), et d'Italie au seul îlot de Giannutri dans l'Archipel toscan. S. PIGNATTI (*Fl. d'Italia* 2: 376, 1982) la qualifie de sténoméditerranéenne nord-occidentale. Mentionnée succinctement par J. GAMISANS (*Cat. Pl. Vasc. Corse*: 202, 1985) comme nouvelle pour la flore de la Corse.

R. DESCHATRES & G. DUTARTRE

Salicaceae

Salix triandra L.

- Lucciana-Casamozza, fourrés de *Salix* et *Populus nigra* L. sur alluvions du Golo, rive gauche un peu en aval de la N 193, env. 10 m, 29.5.1986, plusieurs individus ♀ (fr.) *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé) & *Lambinon, J. 86/92* (B, G, LG).

Cette récolte correspond bien au subsp. *discolor* (Koch) Arcangeli, à feuilles glauques à la face inférieure, de statut taxonomique discuté: cf. e.a. J. JALAS & J. SUOMINEN (ed.), *Atlas Fl. Europaeae* 3: 16, map 204, 1976; R. D. MEIKLE, *Willows and poplars Great. Brit. and Ireland, BSBI Handb.* 4: 60-63, 1984... Les auteurs italiens, en particulier P. ZANGHERI (*Fl. Italica* 1: 74, 1976) et S. PIGNATTI (*Fl. d'Italia* 1: 97, 1982), semblent accepter le rang de sous-espèce.

Espèce **nouvelle pour la Corse**, peut-être installée dans l'île depuis peu, mais la station découverte sur la côte orientale se raccorde bien à l'aire connue, notamment en Italie (cf. J. JALAS & J. SUOMINEN, loc. cit.).

J. LAMBINON & R. DESCHATRES

Salix × *guinieri* Chassagne (= *S. atrocinerea* Brot. × *cinerea* L.)

- Lucciana-Casamozza, fourré de *Salix* et *Populus nigra* L. sur alluvions du Golo, rive gauche, un peu en aval de la N 193, env. 10 m, 29.5.1986, *Deschatres, R. & Lambinon, J. 86/94* (G, LG), feuilles; golfe de Valinco, plage de Baracci, au sud de l'embouchure du Baracci, dépression humide dans des sables littoraux ± remaniés, 22.3.1986, fl. ♀, *Lambinon, J. 86/27* (LG) et 31.5.1986, feuilles, *Lambinon, J. 86/145* (LG).

Hybride nouveau pour la Corse mais probablement répandu dans l'île, où les deux parents croissent souvent ensemble. Il est très variable et parfois difficile à identifier avec certitude; ainsi la récolte de Casamozza est très proche de *S. cinerea*, dont elle ne diffère guère que par la face inférieure des feuilles plus glauque et la présence de rarissimes poils roussâtres. Les deux parents sont d'ailleurs peut-être à traiter plutôt au rang de sous-espèce: subsp. *cinerea* et subsp. *oleifolia* Macreight (cf. R. D. MEIKLE, *Willows and poplars Great. Brit. and Ireland, BSBI Handb.* 4: 104-110, 1984); une combinaison au rang de "nothosubspecies" serait à introduire pour cet hybride, si on admet ce point de vue.

J. LAMBINON

Santalaceae

Thesium humile Vahl

- Agriates, à la Punta Negra, sur le versant de la plage de Trave, sur sable dunaire, quelques pieds avec *Ophrys bombyliflora*, *Silene boullui*, 26.4.1983, *Dutartre, G. s.n.* (Hb. privé); Querciolo, à 1 km au nord de Marina di Sorbu, sables en arrière de la plage, rive droite du Canal, abondant, 5 m, 4.5.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Querciolo, pelouse sableuse en arrière de la plage de Sorbu, partie sud, abondant, 2 m, 9.5.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé, distribué à la *Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Bass. Médit.*, fasc. 20, n° 11122); Bonifacio, pelouse maigre sur calcaire, à l'entrée du vallon de Saint-Julien, 15.4.1965, *Deschatres, R. & Vivant, J. s.n.* (Hb. privé DESCHATRES).

Le *Thesium humile* a été longtemps connu de la seule région de Bonifacio, où il est disséminé (voir J. BRIQUET, *Prodr. Fl. Corse*, 1: 436, 1910), croissant sur calcaire ou sur silice (voir A. TERRISSE, *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, n.s. 16: 327 et 241, 1985). Dans les nouvelles localités, il croît, parfois abondamment, en arrière des plages, sur le sable fixé.

R. DESCHATRES & G. DUTARTRE

Saxifragaceae

Saxifraga paniculata Miller

- San-Gavino di Tenda, rochers schisteux bordant la route de Sorio D 62 à 1.5 km de San Gavino, abondant, 320 m, 9.5.1986, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Sorio, rochers ombragés bordant la route D 62 près du pont de Briacale sur le Fiumi Raghianti, 30.8.1985, *Deschatres, R.* observation; Sorio, à 300 m du pont de Briacale en direction de Sorio, 330 m, 26.5.1986, *Deschatres, R.* observation; au-dessus de Lento, mai 1976, *Conrad, M.* observation; Castagniccia, entre San-Cavino d'Ampugnani et Prunu, abondant sur les rochers exposés au nord, en bordure de la route D 36, 450 m, 12.10.1986, *Dutartre, G. s.n.* (Hb. privé); route de Porto à Evisa, à 12 km d'Evisa, rochers surplombant la D 84 à droite, 15.7.1977, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Ces stations sont remarquables par leur faible altitude. Le *Saxifraga paniculata* n'était pas connu du massif de Tenda (voir J. BRIQUET, *Prodr. Fl. Corse* 2/1: 158-160, 1913).

M. CONRAD, R. DESCHATRES & G. DUTARTRE

Scrophulariaceae

Cymbalaria muralis P. Gaertner, B. Meyer & Scherb.

- Lavasina, dans le mur de soutènement de la N 198, devant l'église, 1962-1986, *Conrad, M.* observation; Algajola, mur de la citadelle, 1986, *Conrad, M.* observation; Calenzana, murs de plusieurs chemins, 26.4.1986, *Conrad, M.* observation.

Ces stations complètent celles données par J. GAMISANS & al. (in D. JEANMONOD & al., *Candollea* 41: 50, 1986).

M. CONRAD

Kickxia commutata (Bern. ex Reichenb.) Fritsch. subsp. **commutata**

- Pietracorbara, près du pont de Selmacci, avril 1986, *Conrad, M.* observation.

M. CONRAD

Lathraea squamaria L.

- Barchetta, rive gauche du Golo en aval du pont, près du confluent du ruisseau de Casacconi, 90 m, 30.3.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); au sud de Ponte-Leccia, rive droite de la Casaluna, en amont du pont sur la D 39, parasite sur *Alnus glutinosa*, 250 m, 9.4.1978, *Dutartre, G. s.n.* (Hb. privé), première récolte corse à notre connaissance!; vallée du Fium Orbo en amont de Saint-Antoine, rive droite au niveau du bassin de décantation, 130 m, 29.3.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Espèce longtemps méconnue en Corse, sans doute en raison de sa floraison précoce, signalée depuis quelques années en plusieurs localités (voir M. CONRAD, *Monde Pl.* 406: 7, 1980 et *Monde Pl.* 411-412: 10, 1982 et J. TERRISSE, *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, n.s. 16: 231, 1985).

G. DUTARTRE & R. DESCHATRES

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich

- Secteur de Renosu, 3 km au SW de Bastelica près du Ponte Vecchio sur le Prunelli, pré humide en aval de la route, très abondant, 625 m, *Jeanmonod, D., Roguet, D. & Natali, A. J.3339* (G).

Cette espèce introduite a depuis quelques années été signalée çà et là: Tassu, au-dessus de Bastelica, près de Tatonne, Bustanico et Saint-Pierre de Venaco (J. GAMISANS, *Candollea* 38: 230, 1983; C. SIMON, *Bauhinia* 7: 257, 1983; R. DESCHATRES, *Bull. Soc. Bot. Centre-ouest, n. s.* 17: 13-14, 1986). Elle semble avoir tendance à se répandre.

D. JEANMONOD

Scrophularia canina L. subsp. **bicolor** (Sibth. & Sm.) W. Greuter

- Secteur Cap Corse, au-dessus de Sisco, Bocca San Giovanni, versant E, bord de la piste, rocailles en bordure du maquis, 650 m, 9.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12514* (Hb. privé GAMISANS), fl.; secteur Tenda, près d'Oletta, Cima di Zucarellu, versant W, 700 m, rocailles schisteuses, 11.6.1966, *Gamisans, J. s.n.* (Hb. privé), fl. et fr.; secteur Cintu, entre Olmi-Capella et Piana di Castifao, Cima di Luda, versant N, 600 m, bord de la route D 547, 8.7.1984, *Gamisans, J. 11127* (Hb. privé), fl. et fr.; secteur Rotondu, région de Vico, Arbori, maquis ouvert et rocailleux au N du village, 400 m environ, 17.5.1986, *Gamisans, J. & Hébrard, J.-P. G.12043* (Hb. privé GAMISANS), fl.; 800 m au N de Vivariu, bord de la route nationale, cailloutis, 630 m, 12.5.1986, *Gamisans, J. & Hébrard, J.-P. G.11859* (Hb. privé GAMISANS), fl.

Tous les spécimens cités ont la totalité ou la majorité des corolles bicolores (essentiellement pourpre-noirâtre, à marge très nette, d'un blanc jaunâtre). Ce caractère permet de les rapporter au subsp. *bicolor*, taxon de valeur parfois contestée (S. PIGNATTI, *Fl. d'Italia* 2: 538, 1982), signalé dans les îles et la péninsule italiennes et plus à l'est, mais qui n'était pas indiqué en Corse. Ce caractère de la corolle se retrouve dans les populations corses de *S. ramosissima* Loisel., espèce au demeurant assez proche de *S. canina*. Des formes un peu intermédiaires entre les deux existent d'ailleurs çà et là en Corse (par exemple, les spécimens *G.11127*, cités ci-dessus, ont souvent des cymes réduites à une, deux ou trois fleurs et se rapprochent ainsi de *S. ramosissima*) et un statut subsppécifique, au sein de *S. canina* serait certainement plus approprié.

J. GAMISANS

Verbascum virgatum Stokes

- Secteur du Rotondu, environs d'Ajaccio, quelque 500 m au sud-sud-ouest de Bocca di Pruno, en bordure de la route D 61 menant d'Ajaccio à Villanova, bas maquis dégradé en bordure de la route, 180 m, 7.5.1984, *Thiébaud, M.-A. 04869* (G).

Cette espèce, notée comme rare dans l'étage mésoméditerranéen par J. GAMISANS (*Cat. Pl. Vasc. Corse*: 210, 1985), n'a été signalée qu'une seule fois en Corse, à Bastia, par J. FOUCAUD & E. SIMON (*Trois Sem. Herb. Corse*: 153, 1898); d'autre part, elle n'a pas été reprise par J. BOUCHARD (*Mat. Géogr. Bot. Corse*: 38-42, s.d.). Elle semble bien se porter dans la localité ci-dessus décrite, où elle se développe en pieds isolés, très disséminés, dans un milieu formé d'une mosaïque de bas maquis dégradé et de prairie plutôt sèche.

M.-A. THIÉBAUD

*Solanaceae***Atropa bella-donna** L.

- Secteur d'Incudine-Bavella, montée de Cozzano à la Bocca di l'Usciolu, sous-bois de châtaignier envahi par diverses espèces du maquis, une seule touffe d'une hauteur d'environ 1.50 m, rare, 980 m, 11.6.1986, *Jeanmonod, D., Natali, A. & Zellweger, C. J.3473* (G).

La belladone est une espèce rare en Corse, où elle n'est connue que de quelques stations de l'étage montagnard des massifs centraux, principalement près des cols de Vizzavona et de Verde

(J. BRIQUET & R. DE LITARDIÈRE, *Prodr. Fl. Corse* 3/2: 254, 1955; R. DE LITARDIÈRE, *Bull. Acad. Int. Géogr. Bot.* 19: 199, 1909).

D. JEANMONOD

Hyoscyamus albus L.

- Secteur du Cap Corse, côte orientale, au sud du port de Macinaggio, à l'embouchure du ruisseau de Gioielli, décombres au bord du ruisseau et de la mer, 1 m, 6.5.1984, *Thiébaud, M.-A. 04854* (G).

Dans son "Catalogue des plantes vasculaires de la Corse" (p. 212, 1985), J. GAMISANS indique cette espèce comme rare sur le littoral. Bien que situés en pleine zone littorale, les spécimens de cette localité jouissent cependant de conditions particulières, plus ou moins rudérales, dans des décombres entre la mer, la route et le ruisseau de Gioielli qui traverse partiellement le village de Macinaggio. Cette situation exige tout de même des plantes qui s'y développent, une bonne adaptation à l'air et aux embruns marins qui s'abattent régulièrement sur cette station lors des coups de vent de secteur est.

M.-A. THIÉBAUD

Tamaricaceae

Tamarix parviflora DC.

- Côte orientale, au sud de Bastia, plage de la Marana, quelques individus chétifs en médiocre état, néanmoins fleuris, 8.5.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); côte occidentale, pont du Liamone, marais bordant la route D 81, près de l'embouchure du fleuve, en compagnie de *Tamarix gallica*, apparemment spontané, 21.4.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); côte occidentale, golfe d'Ajaccio, à l'ouest de Campo dell'Oro, arrière plage du Ricanto, sur les sables littoraux en arrière de la plage, 7 m, 16.4.1982, *Thiébaud, M.-A. 02411* (G); côte occidentale, golfe d'Ajaccio, en arrière de la grande plage de Campo dell'Oro, formant une sorte de haie dans la partie de la plage éloignée de la mer, 8.4.1973 et 3.4.1976, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé, LG); côte orientale, au nord-est de Porto-Vecchio, baie de San Ciprianu, bord nord-est des étangs d'Arasu, marais asséché, au bord des touffes de *Juncus acutus* L., sur sable et vase, 1 m, 21.5.1983, *Thiébaud, M.-A. & Roguet, D. T.03862* (G).

Cette espèce est bien caractérisée par ses fleurs tétramères, ses sépales largement scarieux, son disque synlophique et sa floraison hâtive. Elle n'a été signalée jusqu'ici qu'une seule fois en Corse, par B. BAUM (*The genus Tamarix*: 139, 1978) qui cite un échantillon de Reverchon 6538 (B, BG, G, P, PRC, S, US, W, WU) daté du 24.4.1885 et provenant d'Evisa. Dans son "Catalogue des plantes vasculaires de la Corse" (p. 214, 1985) J. GAMISANS note: "Indiqué comme cultivé en Corse par Pignatti" (*Fl. d'Italia* 2: 134, 1982), et il cite ce taxon comme rare, en Corse, pour l'étage mésoméditerranéen.

La citation de S. PIGNATTI (op. cit.) est exacte. En effet, nous avons observé cette espèce au Cap Corse, sur la côte orientale, plantée le long des allées du port de plaisance de Macinaggio (6.5.1984, *Thiébaud, M.-A. 04856* (G)) ainsi qu'à la plage de Pezzo, au sud-ouest de Saint-Florent (21.4.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé)). Il n'est pas exclu que ce petit arbre soit planté dans d'autres localités corses, en particulier dans les villes et les environs d'Ajaccio et de Porto-Vecchio, ce qui pourrait inciter à croire que les plantes des stations ci-dessus, représenteraient des "échappées" de plantations respectivement en provenance des régions d'Ajaccio et de Porto-Vecchio, mettant ainsi en doute l'indigénat de notre espèce, notamment dans la station de la grande plage de Campo dell'Oro, d'autant plus qu'en Sardaigne, le *Tamarix parviflora* ne paraît être que cultivé ou subsponané (B. DE MARTINIS, M. C. LOI & M. B. POLO, *Webbia* 37: 214, 1984). Toutefois nos spécimens de l'arrière plage du Ricanto paraissent bien subsponanés, et ceux du bord des étangs d'Arasu vraisemblablement spontanés. La spontanéité du *Tamarix parviflora* en Corse n'est donc pas du tout exclue; cette opinion est d'ailleurs renforcée au vu de la carte de distribution présentée par B. BAUM (op. cit.: 141, map 41), surtout si on complète celle-ci par la présence de notre espèce

aux îles Baléares (A. & O. SOTIAUX, *Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares* 25: 175-177, 1981; J. DUVI-GNEAUD & J. LAMBINON, *Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Bass. Médit. Bull.* 21: 14, 1986).

M.-A. THIÉBAUD, R. DESCHATRES & J. LAMBINON

Thymelaeaceae

Thymelaea tarton-raira (L.) All. subsp. **thomasii** (Duby) Briq.

- Moltifao, coteau calcaire de Pietralbello, 250 m, 21.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Morosaglia, à la Cima Pedani, près du sommet, sur calcaire, 900 m, 18.9.1979 (fol.) et 21.5.1982 (fl.), *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

On sait que cette rare endémique croît en abondance dans les maquis bas de Moltifao, le long de la route d'Asco D 47, sur substrat siliceux.

R. DESCHATRES

Ulmaceae

Ulmus laevis Pallas (= *U. effusa* Willd.)

- Ponte-Leccia, rive gauche du Golo à 200 m en amont du pont, un seul arbre jeune, 210 m, 29.5.1983 (fol.), 2.4.1984 (fl.) et 24.4.1984 (fr.), *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé, LG).

L'orme pédonculé n'est mentionné en Corse dans aucune flore, sauf celle de GUINOCHE, M. & R. DE VILMORIN (*Fl. France*, 1: 209, 1973) où il est indiqué avec doute. Est-il spontané dans l'île? L'observation d'un arbre isolé, même en situation apparemment naturelle, ne permet pas de l'affirmer, d'autant moins que nous l'avons vu aussi planté, au bord des routes et dans les villages, par exemple à Olmeto, à la sortie sud du bourg et à Pinottoli, dans le village.

R. DESCHATRES

Urticaceae

Parietaria lusitanica L. subsp. **lusitanica**

- Cap Corse, rochers bordant la route D 80 à droite, près des bergeries de Capiaja, 240 m, 1.4.1976, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur Tenda, Saint-Florent, au Monte Sant'Angelo, fentes de rochers calcaires sous le sommet, 340 m, 7.5.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur Tenda, Saint-Florent, au Monte Sant'Angelo, versant E, barre calcaire, pelouse, 50 m, 8.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12471* (Hb. privé GAMISANS), fl. et fr.; Agriates, rochers dominant la D 81 à 13 km au N d'Ile-Rousse, 230 m, 12.4.1978, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Saint-Florent, route de Casta, amas rocheux à *Asplenium*, à gauche après le champ de tir, 285 m, 6.5.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Olmeta di Tuda, murette dans le village, 280 m, 2.4.1976, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Olmeta di Tuda, vieux mur à *Cheilanthes acrostica* à la sortie du village en direction de Murato, 350 m, 13.5.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); vallée de la Navaccia, 8 km en amont du confluent avec la Tartagine, rochers secs et chauds, 330 m, 12.5.1986, *Gamisans, J. & Hébrard, J.-P. G.11872* (Hb. privé GAMISANS), fl. et fr.; secteur Cintu, côte W, l'Argentella, sur la D 81 à 15 km de Galeria, au barrage (ancienne exploitation minière), entrée d'une cave sombre et humide, 40 m, 7.5.1985, *Jeanmonod, D. & Roguet, D. J.2109* (G); Punta di Ciuttone (au N de Galeria), fruticée à lentisque, 100 m, 28.4.1984, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.10866* (Hb. privé GAMISANS), fl. et fr.; au N de Galeria, rochers en remontant un ruisseau sous la Bocca Bassa, lieu-dit Dispensa, 95 m, 14.5.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur Cintu, presqu'île de Scandola, vallon de Canalette près de la plage d'Elbo, *Clematido-Lentiscetum*, 7 m, 26.4.1984, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.10831* (Hb. privé GAMISANS), fl. et fr.; secteur Cintu, Haut Fangu, Manso sous le village, murette à *Cheilanthes tinaei*, 5.6.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur San Petrone, vallée du Tavignanu, au pont d'Altiani, sur les piles du côté E, 180 m, 15.5.1983, *Deschatres, R. s.n.*

(Hb. privé); au N de Porto-Vecchio au monument mégalithique de Torre entre les blocs granitiques, 90 m, 20.5.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur Ospedale-Cagna, côte W, au S du village de Campomoro, bergeries de Serra-Alta, pelouse nitrophile en bordure du maquis à lentisques, 148 m, 5.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12709* (Hb. privé GAMISANS), fl. et fr.; Porto-Vecchio, en ville, vieux mur, 20 m, 13.4.1968, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur Bonifaciu, au vallon de Saint-Julien, murettes de pierre sèche calcaire le long du chemin de la Carruba, 20 m, 10.4.1978, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

J. GAMISANS, J.-P. HÉBRARD, M. MURACCIOLE,
R. DESCHATRES & D. JEANMONOD

Valerianaceae

Veronica montana L.

- Secteur Cap Corse, Sisco, hameau supérieur, châtaigneraie fraîche dans un vallon, 450 m, 9.6.1986, *Gamisans, J. & Muracciole, M. G.12518* (Hb. privé GAMISANS); secteur Cintu, Moltifao, près de Capanacce, aulnaie rive droite de la rivière d'Asco, en aval du pont de Tesa, 260 m, 27.5.1985, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur Rotondu, Porto, rive gauche de la rivière de Porto, sous les aulnes et les eucalyptus en arrière de la plage, 13.5.1982, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); secteur Renosu, Vizzavona, rive droite de l'Agnone, suintements, 950 m, 18.7.1967, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Ghisoni, en remontant un ruisseau qui coupe la route du col de Sorba, à 4 km de Ghisoni, 950 m, 30.7.1967, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); ravin de Marmano, sous le col de Verde, en remontant le ruisseau de Marmano depuis le pont sur la route, 30.7.1969, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

J. GAMISANS, M. MURACCIOLE & R. DESCHATRES

Verbenaceae

Lippia nodiflora (L.) Michx

- Barcaggio, marais en arrière de la plage, à l'est du village, 1 m, 23.7.1975, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), revu depuis à plusieurs reprises.

Cette espèce subtropicale, peu commune en région méditerranéenne, se trouve toujours, localisée mais assez abondante, dans le "petit marais en face de l'île de la Giraglia" où Revelière l'avait découverte (voir J. BRIQUET & R. DE LITARDIÈRE, *Prodr. Fl. Corse* 3/2: 127, 1955). Il semble qu'elle n'avait pas été revue depuis le milieu du siècle dernier dans sa seule station corse, qui est aussi la seule française. Il est regrettable qu'elle ne figure pas sur les listes des plantes protégées, soit nationale, soit régionale.

R. DESCHATRES

B — CONTRIBUTION 4

4. — Robert DESCHATRES & Gilles DUTARTRE: Contribution à l'étude du genre *Hieracium* en Corse

Il y a dix ans, après étude des matériaux abondants, exsiccata anciens et récoltes récentes, B. DE RETZ publiait une liste commentée de tous les taxons, espèces et sous-espèces, dont la présence est attestée dans l'île (*Bull. Soc. Bot. France* 123: 571-579, 1976). Dans ce compendium, l'auteur recense 31 espèces, dont une nouvelle pour la Corse (*Hieracium humile* Jacq.) et 90 sous-espèces, dont 10 nouvelles pour l'île. Pour chacune des nouveautés, ainsi que pour les taxons les plus rares déjà connus, sont citées succinctement une ou plusieurs récoltes, sans précisions topographiques (exemple: *Hieracium amplexicaule* L. subsp. *speluncarum* (Arvet-Touvet) Zahn, Monte d'Oro: de RETZ, 1954). Pour les autres taxons, la répartition est seulement esquissée (exemple: *Hieracium bernardii* Rouy: R dans le massif montagneux central).

Depuis lors, de nouvelles récoltes sont venues s'ajouter aux anciennes, toutes déterminées avec la plus grande obligeance par B. de Retz, à qui nous exprimons notre gratitude pour le travail long et minutieux auquel il s'est astreint. Nous commençons ci-dessous la publication *in extenso* des résultats de ces déterminations.

Subgen. HIERACIUM

Hieracium amplexicaule L. subsp. **chenevardianum** (Arvet-Touvet) Zahn

- Monte d'Oro, fentes des rochers près des bergeries de Puzzatelli, 1550 m, 23.7.1974, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Monte d'Oro, au-dessus de Tortetto, 1560 m, 13.8.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); à la Punta di Fornello, rochers calcaires, 1900 m, 3.8.1967, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Vizzavona, près de la cascade des Anglais, 1150 m, 14.7.1974, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Vizzavona, en forêt près du camp des Américains, 950 m, 19.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Hieracium amplexicaule L. subsp. **petraeum** (Hoppe) Zahn

- Massif du Monte Cinto, rochers entre le Haut-Asco et le Monte Cinto, 1900 m, 21.8.1983, *Dutartre, G. 15217* (Hb. privé); Asco, cirque de Trimbolacciu au pied de la grande barre rocheuse obstruant la vallée, 1680 m, 17.9.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Monte Rotundo, rocailles au niveau des cascades de Triggione, 1940 m, 28.7.1974, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Monte d'Oro, à la Scala, 2100 m, 9.8.1962, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); forêt de Vizzavona, à la cascade des Anglais, 1200 m, 5.7.1976, *Dutartre, G. 15219-15220* (Hb. privé); Punta di l'Oriente, 1600 m, 15.7.1985, *Sondaz, H. s.n.* (Hb. privé SONDAZ & DUTARTRE); Bavella, rochers à l'ouest du col, 1350 m, 19.7.1964, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Aiguilles de Bavella, à l'ouest du col, 1350 m, 12.7.1961, *Deschatres, R. & Loiseau, J.-E. s.n.* (Hb. privé DESCHATRES).

Hieracium amplexicaule L. subsp. **pseudocerinthoides** (Arvet-Touvet) Zahn

- Massif du Monte Cinto, rochers entre le Haut-Asco et le Monte Cinto, 2000 m, 21.8.1983, *Dutartre, G. 14435* (Hb. privé); Monte d'Oro, versant est, près des bergeries de Puzzatelli, 1550 m, 23.7.1964, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Sous-espèce très rare dans l'île.

Hieracium amplexicaule L. subsp. **pulmonarioides** (Vill.) Zahn

- Massif du Monte Rotundo, rochers près du lac de Capitello, 12.8.1978, *Dutartre, G. 15523* (Hb. privé); Monte d'Oro, cheminée à *Polystichum lonchitis* (L.) Roth., au-dessus de la Scala, 2230 m, 13.8.1967, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Hieracium humile Jacq. subsp. **pseudocotetti** Zahn

- A la Punta di Fornello, fissures des rochers calcaires du sommet, 1900 m, 3.8.1967, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Hieracium laurinum Arvet-Touvet subsp. **lactescens** (Rouy) Zahn

- Bocognano, talus à droite sur le chemin de Busso, 600 m, 13.9.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), localité indiquée par M^{me} Conrad.

Sous-espèce endémique corse.

Hieracium leiopogon Gren. subsp. **chabertianum** (Arvet-Touvet) Zahn

- A la Punta di Fornello, rochers calcaires du sommet, 1900 m, 3.8.1963, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé) “J. Vivant a récolté aussi cette même plante à la Punta di Fornello, le 24.7.1968” B. de Retz; lapiaz à la Punta di Fornello, 1900 m, 22.7.1977, *Dutartre, G. 15534* (Hb. privé).

Hieracium murorum L. subsp. **cardiophyllum** (Jordan) Zahn

- Asco, rochers près du pont génois sur le Stranciacone, 600 m, 15.8.1978, *Dutartre, G. 14681* (Hb. privé).

Hieracium murorum L. subsp. **exotericum** (Jordan) Zahn

- Bonifatto, sur le chemin de Spasimata, 950 m, 6.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Vizzavona, bord de l'Agnone, rive droite, près du confluent de l'Acqua Bollita, 1000 m, 9.7.1969, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Hieracium murorum L. subsp. **tenuiflorum** (Arvet-Touvet) Zahn

- Vizzavona, talus de la route entre le Foce et la maison forestière, 1050 m, 9.7.1969, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Hieracium pallidum Biv. subsp. **comatulum** (Jordan) Zahn

- Asco, au-dessus du refuge de Stagno, en allant vers les névés du cirque de Triumbolacciu, 1420 m, 31.7.1966, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Hieracium pallidum Biv. subsp. **cyaneum** (Arvet-Touvet) Zahn

- Asco, au-dessus du refuge de Stagno, en allant au col qui donne accès à la Combe Rouge, 1850 m, 16.7.1966, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Monte Cinto, couloir rocheux au-dessus de la pozzine des bergeries de Manica, 18.7.1977, *Dutartre, G. 15532* (Hb. privé); Monte San Petrone, 1500 m, 24.7.1984, *Sondaz, H. s.n.* (Hb. privés SONDAZ & DUTARTRE); Monte Rotundo, fissures des rochers subhorizontaux près du lac del Oriente, 2050 m, 21.7.1969, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Zicavo, rochers près des bergeries de Basseta, 13.7.1976, *Dutartre, G. 15500* (Hb. privé); Plateau du Coscione, bergeries de Matalza, 1650 m, 29.8.1983, *Dutartre, G. 15495* (Hb. privé); Coscione, à la Punta di Renuccio, fentes des rochers près du sommet, 1745 m, 26.7.1974, *Deschatres, R. & Gamsans, J. s.n.* (Hb. privé DESCHATRES); Coscione, fissures de rochers sur une croupe dominant le col de Chiralba, 1750 m, 25.7.1974, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Monte Incudine, entre le col de Luana et le Monte Incudine, 1900 m, 30.8.1983, *Dutartre, G. 15496-15497* (Hb. privé).

Hieracium pallidum Biv. subsp. **floccosum** Zahn

- Asco, en montant à la station de Stagno, en forêt de la Carozzica, entre la route D 147 et la rivière d'Asco, 940 m, 31.5.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Monte Renoso, rocailles non loin du sommet, 2340 m, 29.7.1967, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Hieracium pallidum Biv. subsp. **lasiophyllum** (Koch) Zahn

- Bonifatto, à l'extrémité du chemin carrossable en direction de Spasimata, 560 m, 6.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); massif du Monte Cinto, forêt de la Carozzica, 1350 m, 19.8.1983, *Dutartre, G. 14425* (Hb. privé); Monte Renoso, versant Est, bord de la route sous la station de Capanelle, 1500 m, 18.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); montagne de Cagna, entre le tunnel de Scaffi d'Ocholo et le col de Bacino par la route D 59, 750 m, 28.8.1983, *Dutartre, G. 14423* (Hb. privé).

Hieracium pallidum Biv. subsp. **schmidtii** (Tausch) Zahn

- Montagne de Cagna, rochers près des bergeries de Cagna, 2.6.1981, *Dutartre, G. 14166* (Hb. privé); récolté aussi dans la même région le 13.6.1981 par R. Deschatres.

Sous-espèce mentionnée succinctement pour la première fois en Corse par J. GAMISANS (*Cat. Pl. Vasc. Corse*: 125, 1985).

Hieracium praecox Schultz Bip. subsp. **basalticum** (Schultz Bip.) Zahn

- Col de Bavella, entre la maison forestière et le col par la route D 268, au nord du col, 1100 m, 4.7.1979, *Dutartre, G. 15440* (Hb. privé).

Sous-espèce mentionnée succinctement pour la première fois en Corse par J. GAMISANS (l.c., p. 125).

Hieracium praecox Schultz Bip. subsp. **bounophilum** (Jordan) Zahn

- Massif du Monte Cinto, forêt près du pont sur le Stranciacone, entre Asco et le Haut-Asco, 800 m, 29.5.1981, *Dutartre, G. 16063* (Hb. privé); Saint-André de Bozio, talus sous Arbitro, 720 m, 2.7.1977, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Coscione, à la Punta di Renuccio, rochers sous le sommet, 1740 m, 26.7.1974, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Monte Incudine, rochers près du sommet, 2050 m, 4.8.1967, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Corbini, à proximité du village, 28.8.1983, *Dutartre, G. 16065* (Hb. privé).

Hieracium praecox Schultz Bip. subsp. **cinerascens** (Jordan) Zahn

- Désert des Agriates, talus de la route D 81 à 5 km à l'ouest de Casta, 5.5.1983, *Dutartre, G. 14089-14091-14094* (Hb. privé); Morosaglia, entre le Bocca Serna et la Cima Pedani, calcaire, 750 m, 21.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Castagniccia, entre Porta et Croce, 550 m, 27.5.1981, *Dutartre, G. 14109-14110-14111* (Hb. privé); massif du Monte Cinto, pont sur le Stranciacone entre Asco et le Haut-Asco, 800 m, 29.5.1981, *Dutartre, G. 14106* (Hb. privé); Corte, vallée de la Restonica, rive droite, 700 m, 31.7.1977, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Pancheraccia, talus bordant la route D 14, 500 m, 30.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); forêt de Vizzavona, près du camp des Américains, 950 m, 31.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); col de Vizzavona, 1160 m, 22.8.1983, *Dutartre, G. 14096* (Hb. privé); col de Verde, 1280 m, 31.8.1983, *Dutartre, G. 14092-14093* (Hb. privé); Zicavo, en amont du pont Saint-Antoine, entre Zicavo et le col de Verde par la route D 69, 31.8.1983, *Dutartre, G. 14090*; plateau du Coscione, à 3 km de l'intersection de la D 69 et de la D 428, sur la D 428, en montant à la chapelle San Pietro, 31.8.1983, *Dutartre, G. 14088* (Hb. privé); Bavella, à l'ouest du col, couloir rocheux à *Festuca silvatica*, 1350 m, 20.7.1970, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Zonza, rive gauche du Rizzanèse, en bordure de la route D 268, non loin de la fontaine située à 2 km au S/E de Zonza, 28.8.1983, *Dutartre, G. 14095* (Hb. privé); montagne de Cagna, près des bergeries de Cagna, 2.6.1981, *Dutartre, G. 14107-14108* (Hb. privé).

Hieracium praecox Schultz Bip. subsp. **dasyadenium** Zahn

- Murato, talus dans une châtaigneraie en allant au col de Bigorno, 650 m, 27.5.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bonifatto, sur le chemin de Spasimata, 1000 m, 6.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Morosaglia, coteau calcaire entre la Bocca Serna et la Cima Pedani, 750 m, 21.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Asco, route de Stagno, talus rocheux à 900 m, en amont du pont, 860 m, 9.7.1977, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); massif du Monte Cinto, entre Asco et le Haut-Asco, forêt de la Carrozzica, 980 m, 29.5.1981, *Dutartre, G. 15527* (Hb. privé); massif du Monte Cinto, près des bergeries de Manica, 18.7.1977, *Dutartre, G. 15529* (Hb. privé); Haut-Asco, à l'entrée du cirque de Trimbolacciu, sous les pins Laricio, près de la pozzine à *Trientalis*, 1350 m, 29.5.1981, *Dutartre, G. 15526* (Hb. privé); Calanche de Piana, près de l'auberge les Roches Bleues,

4.5.1977, *Dutartre, G. 15530-15531* (Hb. privé); Saint-André de Bozio, talus près d'Arbitro, 750 m, 2.7.1977, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Evisa, route du col de Vergio, talus à droite près de l'embranchement de la route de Cristinacce, 900 m, 4.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); vallée du Tavignano, à 6 km en aval de Corte, rive droite, talus de la route N 200, 315 m, 15.5.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Vizzavona, rive gauche de l'Anghione, près du camp des Américains, 950 m, 19.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); col de Vizzavona, 1100 m, 22.8.1983, *Dutartre, G. 15525* (Hb. privé); col de Verde, 1280 m, 31.8.1983, *Dutartre, G. 15524* (Hb. privé).

Sous-espèce endémique Corse.

Hieracium praecox Schultz Bip. subsp. **fallens** (Jordan) Zahn

- Au-dessus de Bonifatto, sur le chemin montant à Spasimata, 1050 m, 6.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Sous-espèce mentionnée succinctement pour la première fois en Corse par J. GAMISANS (l.c., p. 125).

Hieracium praecox Schultz Bip. subsp. **furcillatum** (Jordan) Zahn

- Lento, talus frais à gauche de la route de Canavaggia, 630 m, 23.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Morosaglia, coteau calcaire à orchidées près de la Bocca Serna, à l'est de la Punta di Querceta Tonda, 700 m, 27.5.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); entre le col de Prato et Stretta par la route D 71, 27.5.1981, *Dutartre, G. 15426-15427* (Hb. privé); vallée du Tavignano, à 6 km en aval de Corte, talus à droite de la route N 200, 315 m, 15.5.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Pancheraccia, talus frais bordant la route D 14, 500 m, 30.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); col de Vizzavona, 1100 m, 22.8.1983, *Dutartre, G. 15420* (Hb. privé); plateau du Coscione, à 3 km de l'intersection de la D 69 et de la D 428, sur la D 428 en montant à la chapelle San Pietro, 31.8.1983, *Dutartre, G. 15421* (Hb. privé).

Hieracium praecox Schultz Bip. subsp. **glaucinum** (Jordan) Zahn

- Oletta, versant nord du Monte Torricelle, à 4 km à l'ouest d'Ortale, 4.6.1981, *Dutartre, G. 15411* (Hb. privé); plateau du Coscione, près de la cascade située vers les bergeries de Matalza, 29.8.1983, *Dutartre, G. 15412* (Hb. privé); entre Carbini et Levie, sur la rive droite du Fiumicicoli, 28.8.1983, *Dutartre, G. 15413* (Hb. privé).

Hieracium praecox Schultz Bip. subsp. **pallidifrons** Sudre

- Massif du Monte Cinto, entre le Haut-Asco et le Monte Cinto, au départ du GR 20, 1500 m, 21.8.1983, *Dutartre, G. 14999* (Hb. privé); Corte, gorges de la Restonica, rochers bordant la route en aval du pont de Tragone, 920 m, 1.6.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Haute Restonica, rive droite en aval du pont détruit de Lamaghiosu, 1250 m, 8.6.1981, *Dutartre, G. s.n.* (Hb. privé); Vezzani, près de la fontaine de Padula, sur les blocs rocheux moussus, 910 m, 10.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Hieracium praecox Schultz Bip. subsp. **pallidulum** (Jordan) Zahn

- Castagniccia, en bordure de la route N 845 à la Porta, 27.5.1981, *Dutartre, G. 15396* (Hb. privé); côte orientale, au nord du port de Campoloro, 7.6.1981, *Dutartre, G. 15397* (Hb. privé); forêt d'Aitone, près de la maison forestière, 2.7.1979, *Dutartre, G. 15406* (Hb. privé); col de San Cervone, sommet calcaire entre le col et la Punta Alta, 950 m, 15.5.1979, *Dutartre, G. 15399* (Hb. privé); massif du Monte Rotundo, bergeries de Timozzo, 17.7.1976, *Dutartre, G. 15403* (Hb. privé); massif du Monte Rotundo, bergeries de Grotelle, 18.7.1976, *Dutartre, G. 15401* (Hb. privé); Pancheraccia, talus bordant la

route D 14, 500 m, 30.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); plateau du Coscione, près de la cascade située vers les bergeries de Matalza, 29.8.1983, *Dutartre, G. 15392-15393* (Hb. privé).

Hieracium praecox Schultz Bip. subsp. **pseudobounophilum** Zahn

- Monte Renoso, bord de la route sous la station de Capanelle, 1500 m, 18.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Hieracium praecox Schultz Bip. subsp. **pseudocyaneum** Zahn

- Forêt de Marmano, près du gué sur le sentier conduisant aux Pozzi du Monte Renoso, 18.8.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); montagne de Cagna, près des bergeries de Cagna, 2.6.1981, *Dutartre, G. 14165* (Hb. privé).

Hieracium praecox Schultz Bip. subsp. **runcinatilobatum** Zahn

- Castagniccia, entre la Porta et Croce par la route N 845, dans les châtaigneraies, 27.5.1981, *Dutartre, G. 14167* (Hb. privé); plateau du Coscione, en allant de San Pietro à l'Incudine, près des bergeries de Cavallara, 1530 m, 3.8.1964, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Punta di Fornello, lapiaz du sommet, 1900 m, 26.8.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Sous-espèce endémique Corse.

Hieracium praecox Schultz Bip. subsp. **similatum** (Jordan) Zahn

- Oletta, versant nord du Monte Torricelle, à 4 km à l'ouest d'Ortale, 4.6.1981, *Dutartre, G. 16041* (Hb. privé); Murato, talus dans la châtaigneraie en montant au col de Bigorno, 670 m, 25.5.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Asco, en aval du village, 600 m, 29.5.1981, *Dutartre, G. 16045* (Hb. privé); Asco, route de Stagno, 900 m, 31.5.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); massif du Monte Cinto, forêt près du Haut-Asco, 29.5.1981, *Dutartre, G. 16409* (Hb. privé); massif du Monte Cinto, près des bergeries de Manica, 18.7.1977, *Dutartre, G. 16044* (Hb. privé); Asco, à l'entrée du cirque de Trimbolacciu, près de la pozzine à *Trientalis*, 1350 m, 22.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Morosaglia, coteau calcaire entre la Bocca Serna et la Cima Pedani, 750 m, 31.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); forêt de Marmano, versant nord sous le col de Verde, 1200 m, 31.8.1983, *Dutartre, G. 16036* (Hb. privé); entre Carbini et Levie, sur la rive droite du Fiumicicoli, 28.8.1983, *Dutartre, G. 16040* (Hb. privé).

Hieracium racemosum Waldst. & Kit. subsp. **apenninum** (Levier) Zahn

- Morosaglia, route de Saliceto D 15, talus rocheux dans la châtaigneraie, 780 m, 18.9.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); vallée du Tavignano, à 6 km en aval de Corte sur la rive droite, talus rocailleux ombragé en amont du pont, 320 m, 28.9.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); entre le col de Verde et Ghisoni, à 8.5 km de Ghisoni, 31.8.1983, *Dutartre, G. 14442-14443-14444* (Hb. privé); forêt de Marmano, au nord du col de Verde par la route D 69, 1200 m, 31.8.1983, *Dutartre, G. 14440-14445-14446* (Hb. privé); Zicavo, à 3 km de Zicavo en direction d'Aullène par la route D 69, 31.8.1983, *Dutartre, G. 14441* (Hb. privé).

Hieracium racemosum Waldst. & Kit. subsp. **crinitum** (Sibth. & Sm.) Zahn

- Massif du Monte d'Oro, vallée du Verghello, bord d'un torrent près de la réserve de moulons, 800 m, 15.8.1972, *Conrad, M. & Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé DESCHATRES); au-dessus de Canaglia, en montant au col de Manganello, 850 m, 15.8.1972, *Conrad, M. & Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé DESCHATRES).

Hieracium racemosum Waldst. & Kit. subsp. **hervieri** (Arvet-Touvet) Zahn

- Bocognano, route de Vizzavona, talus à droite à 1 km du village, 750 m, 13.9.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Mentionné succinctement par J. GAMISANS (l.c., p. 125) pour la première fois en Corse, cette sous-espèce est selon B. de Retz "absolument conforme aux deux isotypes de Hervier (des environs de Saint-Etienne, Loire) que je possède en herbier et à ceux qui sont au Muséum de Paris".

Hieracium racemosum Waldst. & Kit. subsp. **provinciale** (Jordan) Zahn

- Zicavo, talus de la route D 69, près du garage des véhicules du service d'incendie, 725 m, 29.8.1983, *Dutartre, G. 14447-14448-14449* (Hb. privé).

Cette récolte bien caractéristique, confirme la présence de cette sous-espèce en Corse où elle n'avait jusqu'ici été signalée qu'une fois et par R. DE LITARDIÈRE (*Bull. Acad. Int. Géogr. Bot.* 19: 96-211, 1909).

Hieracium racemosum Waldst. & Kit. subsp. **pyramoides** Zahn

- Cirque de Bonifato, au terminus de la route, 18.8.1978, *Dutartre, G. 14639-14641* (Hb. privé); col de Vizzavona, près de la maison forestière, 29.8.1978, *Dutartre, G. 14640* (Hb. privé).

Sous-espèce endémique Corse.

Hieracium racemosum Waldst. & Kit. subsp. **restonicanum** Zahn

- Massif du Monte Cinto, entre Asco et la Haut-Asco, forêt de Carrozzica, 1250 m, 19.8.1983, *Dutartre, G. 14460-14461* (Hb. privé); forêt de l'Ospedale, chaos rocheux au-dessus de la route D 368, 950 m, 28.8.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Sous-espèce endémique Corse.

Hieracium racemosum Waldst. & Kit. subsp. **subhirsutum** (Jordan) Zahn

- Morosaglia, route de Saliceto D 15, talus rocheux dans la châtaigneraie, 780 m, 18.9.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Castagniccia, entre Morosaglia et Castineta par la route D 15, 20.8.1983, *Dutartre, G. 14452-14456* (Hb. privé); région de la Castagniccia, Croce, talus du bord de la route en sous-bois, 730 m, 31.8.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Saint-André de Bozio, talus frais bordant la route entre Poggio et Mazzola, 780 m, 20.9.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Hieracium racemosum Waldst. & Kit. subsp. **vizzavonae** Zahn

- Massif du Monte Cinto, entre Asco et le Haut-Asco, sur la rive droite du Stranciacone, 800 m, 19.8.1983, *Dutartre, G. 14626-14631* (Hb. privé); près de la maison forestière sous le col de Vizzavona, 29.8.1978, *Dutartre, G. 14637-14638* (Hb. privé); col de Vizzavona, 1100 m, 22.8.1983, *Dutartre, G. 14627-14628* (Hb. privé); Zicavo, à 3 km de Zicavo en direction d'Aullène par la route D 69, 31.8.1983, *Dutartre, G. 14635-14636* (Hb. privé).

Hieracium ramosissimum Schleicher subsp. **adenoclinium** (Arvet-Touvet) Zahn

- Massif du Monte Cinto, près du pont sur le Stranciacone entre Asco et le Haut-Asco, 850 m, 15.8.1978, *Dutartre, G. 14622* (Hb. privé); Lano, cime de la chapelle Sant'Angelo, au pied de la falaise calcaire, 1150 m, 19.7.1974, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Hieracium sabaudum L. subsp. **dumosum** (Jordan) Zahn

- Vallée du Tavignano à 6 km en aval de Corte, rive droite en amont du pont, talus rocaillieux ombragé, 320 m, 28.9.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Sous-espèce mentionnée succinctement par J. GAMISANS (l.c., p. 125) pour la première fois en Corse.

Hieracium sabaudum L. subsp. **lugdunense** (Rouy) Zahn

- Cap Corse, Olcani, talus de la route à l'entrée du village, près de la fontaine, 340 m, 4.8.1974, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Tattone, talus bordant la route de Corte, 810 m, 14.9.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Sous-espèce mentionnée succinctement par J. GAMISANS (l.c., p. 125) pour la première fois en Corse.

Hieracium sabaudum L. subsp. **nemorivagum** (Jordan) Zahn

- Corte, gorges de la Restonica près du camping municipal de Tuani, rive droite en amont du petit pont, 900 m, 8.10.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); massif du Monte d'Oro, vallée du Verghello, près de la réserve de mouflons, 800 m, 14.8.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Vizzavona, rive gauche de l'Anghione, 950 m, 19.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); entre le pont de Solella et le col de Vizzavona, éboulis rocheux d'une ancienne carrière à droite de la route N 193, 1070 m, 13.9.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Hieracium sabaudum L. subsp. **salicetorum** (Sudre) Zahn

- Zonza, route de Quenza D 420, près du pont sur le torrent de Saint-Antoine, 660 m, 19.8.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Hieracium sabaudum L. subsp. **scabiosum** (Sudre) Zahn

- En montant de Solenzara à Bavella, près du col de Larone, bord de la route forestière 4, 620 m, 30.9.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Hieracium sabaudum L. subsp. **vagum** (Jordan) Zahn

- Cap Corse, Morsiglia, talus frais bordant la route D 80, un peu au nord du village, 200 m, 6.10.1979, *Conrad, M. & Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé DESCHATRES).

Hieracium sabaudum L. subsp. **virescens** (Sonder) Zahn

- Levie, rive droite du Fiumicicali, en amont du pont sur la route D 59, entre Carbini et Levie, 28.8.1983, *Dutartre, G. 14272* (Hb. privé); Sartène, rive droite de l'Ortolo, en amont du pont de la route D 50, près des mines de Curgia, 27.8.1983, *Dutartre, G. 14273* (Hb. privé).

Cette sous-espèce est **nouvelle pour la flore de la Corse**.

Hieracium symphytaceum Arvet-Touvet subsp. **pseudorotgesianum** Zahn

- Vizzavona, bord de sentier en forêt, près de la poste, 930 m, 12.8.1967, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Vizzavona, talus d'un chemin dans la hêtraie, près de la gare, 940 m, 28.7.1970, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); ravin de Marmano, sous le col de Verde, 980 m, 14.7.1970, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Hieracium umbrosum Jordan subsp. **corsicolum** Zahn

- Vizzavona, bord de la route en forêt, près de la Foce, 1130 m, 9.7.1969, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Vizzavona, sous la Foce, ravin de l'Acqua Bollita, 1100 m, 9.7.1969, *Des-*

chatres, *R. s.n.* (Hb. privé, “Feuilles moins nettement dentées que dans le subsp. *corsicum* typique (simple variété?)“ B. de Retz; Vizzavona, en forêt près du camp des Américains, 950 m, 19.6.1981, *Deschatres*, *R. s.n.* (Hb. privé); ravin de Marmano, rive droite en amont du pont de la route du col de Verde, 980 m, 17.6.1981, *Deschatres*, *R. s.n.* (Hb. privé).

Sous-espèce endémique Corse.

Hieracium umbrosum Jordan subsp. **subexilentum** Zahn

- Punta di Fornello, lapiaz du sommet, 1900 m, 26.8.1972, *Deschatres*, *R. s.n.* (Hb. privé); Bavella, à l'ouest du col, couloir rocheux sous la croix Leccia, 1350 m, 28.7.1967, *Deschatres*, *R. s.n.* (Hb. privé).

Hieracium umbrosum Jordan subsp. **umbrosum**

- Au-dessus de Bonifatto, sur le chemin montant à Spasimata, 1000 m, 6.6.1981, *Deschatres*, *R. s.n.* (Hb. privé); massif du Monte Cinto, entre le refuge du Haut-Asco et le Monte Cinto, 1880 m, 21.8.1983, *Dutartre*, *G. 15011* (Hb. privé); Vizzavona, près du camp des Américains, 950 m, 19.6.1981, *Deschatres*, *R. s.n.* (Hb. privé); Coscione, à la Punta di Renuccio, blocs rocheux sous le sommet, 1740 m, 26.7.1974, *Deschatres*, *R. & Gamisans*, *J. s.n.* (Hb. privé DESCHATRES).

Hieracium viscosum Arvet-Touvet subsp. **scariolifolium** (Arvet-Touvet) Zahn

- Corte, vallée de la Restonica, en amont du pont de Tragone, près de l'embranchement du chemin conduisant au Monte Rotundo, 1040 m, 7.8.1970, *Deschatres*, *R. s.n.* (Hb. privé); Monte Rotundo, vallée du Timozzo, 1150 m, 4.8.1966, *Deschatres*, *R. s.n.* (Hb. privé); Monte d'Oro, à la Fenêtre de Vizzavona, 2100 m, 12.7.1961, *Deschatres*, *R. & Loiseau*, *J.-E. s.n.* (Hb. privé DESCHATRES); Vizzavona, en forêt, au camp des Américains, 950 m, 12.7.1966, *Deschatres*, *R. s.n.* (Hb. privé); col de Vizzavona, 1160 m, 22.8.1983, *Dutartre*, *G. 14436* (Hb. privé); Zicavo, à 5 km de Zicavo en direction d'Aullène par la route D 69, 31.8.1983, *Dutartre*, *G. 14437-14438-14439* (Hb. privé); Coscione, à la Punta di Renuccio, entre les blocs rocheux sous le sommet, 1740 m, 26.7.1974, *Deschatres*, *R. & Gamisans*, *J. s.n.* (Hb. privé DESCHATRES); Aiguilles de Bavella, couloir rocheux à l'ouest du col, 10.8.1962, *Deschatres*, *R. s.n.* (Hb. privé).

Hieracium wiesbaurianum Uechtr. subsp. **fissifurcum** (Arvet-Touret & Gautier) Zahn

- Massif de l'Incudine, vallée d'Asinao, en montant vers le névé entre les deux moraines, 1800 m, 25.8.1972, *Deschatres*, *R. s.n.* (Hb. privé).

Hieracium wiesbaurianum Uechtr. subsp. **wiesbaurianum**

- Morosaglia, pelouse calcaire à orchidées près de la Bocca Serna, 700 m, 27.5.1980, *Deschatres*, *R. s.n.* (Hb. privé); col de San Cervone, sommet calcaire entre le col et la Punta Alta, 950 m, 15.5.1979, *Dutartre*, *G. 14645* (Hb. privé).

Sous-espèce mentionnée succinctement par J. GAMISANS (l.c., p. 126) pour la première fois en Corse.

Subgen. PILOSELLA

Hieracium adriaticum Naegeli subsp. **aitonense** Zahn

- Désert des Agriates, talus bordant la route D 81 près de Casta, 15.5.1983, *Dutartre*, *G. 14053-14055* (Hb. privé); Agriates, au bord de la route D 81, talus près de Lavandaio, 260 m, 30.5.1983, *Deschatres*, *R. s.n.* (Hb. privé); Sermano, route de Bustanico, talus marneux au-dessus de la route D 441, 780 m, 9.6.1981, *Deschatres*, *R. s.n.* (Hb. privé);

secteur de Porto, entre Partinello et Porto, 3.6.1981, *Dutartre, G. 14054* (Hb. privé); Vizzavona, près de la gare, bord du chemin conduisant au camp des Américains, 960 m, 7.7.1969, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); pâture près de la maison forestière de Marmano, à droite de la route en montant au col de Verde, 980 m, 17.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Sous-espèce endémique Corse.

Hieracium adriaticum Naegeli subsp. **caricinoides** Zahn

- Quenza, pelouse près d'un petit marais à gauche de la route de Zonza, 810 m, 15.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); entre Zonza et Quenza, rochers rive droite du torrent de Criviscia, en amont du pont de la route D 420, 670 m, 15.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

“Une rareté de la flore hiéraciologique corse“ (B. de Retz).

Hieracium cymosum L. subsp. **lanipedicellum** Naegeli & Peter

- Monte d'Oro, versant Ouest, ravin de Tortetto, rive gauche de l'Anghione sous la cascade près du refuge CAF ruiné, 1600 m, 19.7.1969, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Vizzavona, au camp des Américains, clairière de la hêtraie, 950 m, 13.7.1966, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bocognano, bord de la route d'Ajaccio, en amont du pont d'Ucciani, 340 m, 25.5.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), “diffère un peu du subsp. *lanipedicellum* typique par une moindre abondance des poils de l'inflorescence“ B. de Retz; ravin de Marmano, rive droite en amont du pont de la route menant au col de Verde, 990 m, 17.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Hieracium fulvisetum Bertol. subsp. **fulvisetum**

- Asco, route de Stagno, à 900 m en amont du pont, rochers à *Dryopteris tyrrhena*, 860 m, 9.7.1977, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); massif du Monte Cinto, Asco, en forêt de Carozzica entre la route de Stagno et la rivière, 2.6.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); massif du Monte Cinto, bergeries de Manica, 18.7.1977, *Dutartre, G. 15516* (Hb. privé); massif du Monte Rotundo, non loin des bergeries de Timozzo, 17.7.1976, *Dutartre, G. 15222* (Hb. privé); Monte Rotundo, rochers au niveau des cascades de Triggione, 1940 m, 28.7.1974, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Monte d'Oro, ravin de Tortetto, 1590 m, 19.7.1969, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Vizzavona, au camp des Américains, clairière de la hêtraie, 950 m, 13.7.1966, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); vallée du Tavignano, au pont d'Altiani, rive droite amont, 180 m, 15.5.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), “pas bien caractérisé, mais je ne vois guère ce que cela pourrait être d'autre“ B. de Retz.; Punta di Fornello, versant d'Asinao, pelouse calcaire, avec *Vicia glauca*, 1850 m, 26.8.1972, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), “forme un peu réduite et moins hérissée“ B. de Retz; Punta di Fornello, près du sommet, 1900 m, 23.7.1977, *Dutartre, G. 15223* (Hb. privé).

Hieracium fulvisetum Bertol. subsp. **pseudostyppinum** Zahn

- Corte, vallée du Tavignano, à 6 km en aval de la ville, rive droite, bord de la route N 200, 315 m, 27.5.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); région de Corte, route du Bozio D 14 au départ du chemin du champ de tir de Campettine, pelouse calcaire humide à *Ophrys*, 330 m, 28.5.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); pâture près de la maison forestière de Marmano, 980 m, 17.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

“Une des grandes raretés hiéraciologiques de la flore de Corse. Avait déjà été récolté à Marmano en 1900, comme je l'ai indiqué dans le *Bull. Soc. Bot. France* 123: 579, 1976“ (B. de Retz).
Sous-espèce endémique de Corse.

Hieracium lactucella Wallr. subsp. **nanum** (Scheele) P. D. Sell. (= *H. auricula* L. subsp. *micranthum* (Huet du Pav.) Zahn

- Massif du Monte Cinto, bergeries de Manica, 18.7.1977, *Dutartre, G. 15517* (Hb. privé); massif du Monte Rotundo, au-dessus de la cascade près des bergeries de Grotelle, 15.7.1976, *Dutartre, G. 15518-16068* (Hb. privé); massif du Monte Rotundo, pozzine entre le lac de Melo et le lac de Capitello, 12.8.1978, *Dutartre, G. 16069* (Hb. privé); massif du Monte Renoso, bergeries des pozzi du Renoso, 24.8.1978, *Dutartre, G. 15515* (Hb. privé); plateau du Coscione, pozzine au-dessous des bergeries de Matalza, 29.8.1983, *Dutartre, G. 15501* (Hb. privé); massif du Monte Incudine, entre le col de Luana et le Monte Incudine, 1850 m, 30.8.1983, *Dutartre, G. 15502* (Hb. privé).

Cette espèce est répandue à l'étage montagnard.

Hieracium litardiereanum Zahn

- Forêt de Marmano, clairière près du col de Verde, forme un peu réduite, 1280 m, 14.7.1970, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Espèce endémique Corse.

Hieracium pilosella L. subsp. **euroalpinum** Zahn

- Albertacce, rive droite du Golo, à 500 m en aval du Ponte Alto, au pied des grands rochers sculptés par l'érosion, 840 m, 23.7.1974, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Sous-espèce mentionnée succinctement pour la première fois en Corse par J. GAMISANS (l.c., p. 127).

Hieracium pilosella L. subsp. **impexum** Zahn

- Bustanica, friche à *Rhinanthus alectorolophus* près de la chapelle Sant'Antone, peu abondant, 1000 m, 12.7.1977, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Sous-espèce mentionnée succinctement par J. GAMISANS (l.c., p. 127) pour la première fois en Corse. Selon B. de Retz "ces échantillons sont anormaux par l'absence de stolons".

Hieracium pilosella L. subsp. **subvirescens** Naegeli & Peter

- Albertacce, en aval du Ponte-Alto, rive droite du Golo, à droite de la route de Casamaccioli D 218, 840 m, 20.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); forêt de Marmano, près de la maison forestière, pâture en contrebas de la route, abondant, 970 m, 18.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Sous-espèce mentionnée succinctement par J. GAMISANS (l.c., p. 127) pour la première fois en Corse.

Hieracium pilosella L. subsp. **trichadenium** Naegeli & Peter

- Canaglia, chemin de terre descendant vers le ruisseau et les prairies de fauche, 660 m, 14.9.1979, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); entre Zonza et Quenza, rive gauche du torrent de Criviscia en amont du pont de la route D 368, 670 m, 15.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Hieracium pilosella L. subsp. **trichophorum** Naegeli & Peter

- Cap Corse, Monte Stello, près des bergeries situées à l'est de Bocca di Santa Maria, 6.6.1981, *Dutartre, G. 15050-15051* (Hb. privé); Pietroso, bord de la route de Saparelle D 343, talus rocheux à droite, avec *Carex olbiensis*, 600 m, 10.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Sous-espèce mentionnée succinctement par J. GAMISANS (l.c., p. 127) pour la première fois en Corse.

Hieracium pilosella L. subsp. **trichosoma** Naegeli & Peter

- Cap Corse, Sisco, au col Saint-Jean, pelouse, 960 m, 12.6.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Morosaglia, coteau calcaire entre la Bocca Serna et la Cima Pedani, clairière, 700 m, 23.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Albertacce, rive gauche du Golo à 500 m en aval du Ponte-Alto, au pied des grands rochers, 840 m, 23.7.1974, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Punta di Querceta Tonda, 700 m, 15.5.1979, *Dutartre, G. 15054* (Hb. privé); Corte, rive gauche du Tavignano en amont de la ville, petite pelouse au-delà de l'Alpa Mariuccia, 700 m, 8.7.1969, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Sermano, route de Bustanico, coteau marneux humide au-dessus de la route D 441, avec *Ophrys apifera*, 780 m, 9.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Vizzavona, rive gauche de l'Anghione, près du camp des Américains, 950 m, 19.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); forêt de Marmano, sous le col de Verde, au sud, clairière, 1270 m, 30.7.1969, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Bavella, à l'ouest du col, couloir ombreux sous la Croix Leccia, 1350 m, 12.7.1969, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Ces indications justifient la remarque de B. de Retz (l.c.): "*Hieracium pilosella* est très vraisemblablement plus répandu en Corse que ne le laisseraient entendre les indications données ci-dessus, parce que souvent négligé par les herborisants".

Hieracium piloselloides Vill. subsp. **canipedunculum** (Naegeli & Peter) Zahn

- Secteur de Ponte-Leccia, sommet calcaire au S/W du col de Serna, 900 m, 28.5.1981, *Dutartre, G. 14179* (Hb. privé); côte orientale, maquis au nord du port de Campoloro, 2 m, 7.6.1982, *Dutartre, G. 14178* (Hb. privé); Corte, à 6 km en aval de la ville, bord de la route N 200, 315 m, 27.5.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Quenza, près d'un petit marais à gauche de la route de Zonza, 810 m, 17.6.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Hieracium piloselloides Vill. subsp. **praealtum** (Vill.) Zahn

- Au nord de Corte, bord de la route de Bastia N 193, un peu avant le col San Quilico, 550 m, 27.5.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Hieracium piloselloides Vill. subsp. **poretanum** (Naegeli & Peter) Zahn

- Bustanica, friche près de la chapelle Sant'Antone, 1000 m, 12.7.1977, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Hieracium piloselloides Vill. subsp. **tavignanum** Zahn

- Castagniccia, talus bordant la route D 36 entre l'intersection de la D 506 et de la D 36 et Pruno, 28.5.1981, *Dutartre, G. 14049-14050-14051* (Hb. privé); Saint-Pierre de Venaco, bord de la route N 193, talus frais, 750 m, 31.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Tattone, bord de la route de Vizzavona, 840 m, 7.7.1969, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Sous-espèce endémique Corse.

Hieracium pseudopilosella Ten. subsp. **pseudopilosella**

- Lano, en montant à la cime de la chapelle Sant'Angelo, versant de Lano, pelouse calcaire à mi-pente, 800 m, 7.6.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), déjà récolté dans la même station par R. de Litardière et Malcuit le 18.7.1927; Lano, cime de la chapelle San Angelo, près du sommet, calcaire, 1180 m, 7.6.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), "moins typique que la récolte faite à mi-pente et paraissant un peu une forme de passage vers *H. pilosella* L. subsp. *trichosoma* N. P." B. de Retz; Pietroso, bord de la route D 343 en face de la Croix Jean Bilger, 600 m, 27.5.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Hieracium pseudopilosellinum Zahn subsp. **pseudopilosellinum**

- Vizzavona, près de la cascade des Anglais, rochers rive droite du torrent, 1150 m, 7.7.1969, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Endémique.

Hieracium schultesii F. W. Schultz subsp. **soleirolianum** (Arvet-Touvet & Briq.) Zahn

- Bonifatto, près des anciennes bergeries de Spacimata, 1400 m, 6.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Asco, route de Stagno, entre la D 147 et le Stranciacone, 900 m, 31.5.1983, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Asco, près de la station du Haut-Asco, petite pozzine à *Trientalis* à l'entrée du cirque de Triumbolacciu, 1340 m, 10.7.1977, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); massif du Monte Cinto, rochers sous le Haut-Asco, 1400 m, 10.7.1977, *Dutartre, G. 15016* (Hb. privé); sous le col de Vergio, pente à *Betula pendula* près du départ du sentier conduisant à la Paglia Orba, 1320 m, 17.7.1969, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Albertacce, en aval du Ponte Alto, rive droite du Golo, à droite de la route de Casamaccioli, 840 m, 20.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Saint-André de Bozio, talus frais au bord de la route d'Arbitro, 750 m, 10.7.1977, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Corte, sur le chemin du Monte Rotundo, pinède à *Cephalanthera rubra*, rive gauche du ruisseau de Timozzo, affluent de la Restonica, 1200 m, 21.7.1969, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Hieracium zizianum Tausch subsp. **sardonium** Zahn

- Cap Corse, monte Stello, au près des bergeries situées à l'est du Bocca di Santa Maria, 6.6.1981, *Dutartre, G. 14052* (Hb. privé); Cap Corse, Serra di Pigno, 950 m, 6.6.1981, *Dutartre, G. 14221-14222* (Hb. privé); Moltifao, coteau calcaire de Pietrabello, 250 m, 8.6.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Ponte-Leccia, route de Bastia, à 2 km en aval du village, bord de la D 193, 180 m, 24.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); près de Ponte-Leccia, route de Francardo, entre la D 193 et la voie ferrée, 195 m, 9.6.1980, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Morosaglia, coteau calcaire entre la Bocca Serna et la Cima Pedani, clairière, 700 m, 22.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Caporalino, au Monte a Supietra, pelouse calcaire, versant nord, 360 m, 28.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), "sous un état un peu anormal, grêle et pauciflore" B. de Retz; au nord de Corte, coteau calcaire bordant la route N 193 près de Bistuglio, 500 m, 22.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé), "sous un état un peu anormal, grêle et pauciflore" B. de Retz; Bustanico, friche près de la chapelle Sant'Antone, 1010 m, 9.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Corte, bord de la route N 200 à 4 km en aval de la ville, 350 m, 29.5.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé); Vizzavona, rive gauche de l'Anghione, au camp des Américains, 950 m, 19.6.1981, *Deschatres, R. s.n.* (Hb. privé).

Sous-espèce endémique cyrno-sarde.

