

Zeitschrift:	Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany
Herausgeber:	Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Band:	45 (1990)
Heft:	1
Artikel:	Flaveria bidentis (L.) Kuntze (Asteraceae) : nueva adventicia para España
Autor:	Hansen, Alfred / Carrión, José-S.
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-879693

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 10.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Flaveria bidentis (L.) Kuntze (Asteraceae), nueva adventicia para España

ALFRED HANSEN
&
JOSÉ-S. CARRIÓN

RÉSUMÉ

HANSEN, A. & J.-S. CARRIÓN (1990). *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze (Asteraceae), adventice nouvelle pour l'Espagne. *Candollea* 45: 235-239. En espagnol, résumés français et anglais.

Flaveria bidentis (L.) Kuntze a été récoltée pour la première fois en Espagne en 1986. Les auteurs fournissent une description de la plante et des localités où cette espèce est introduite et naturalisée.

ABSTRACT

HANSEN, A. & J.-S. CARRIÓN (1990). *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze (Asteraceae), new adventitious plant for Spain. *Candollea* 45: 235-239. In Spanish, French and English abstracts.

Flaveria bidentis (L.) Kuntze has been collected first in Spain in 1986. A plant description is given together with the localities where this species is introduced and naturalized.

El género *Flaveria* Juss. (Asteraceae, Helenieae) incluye alrededor de 20 especies (POWELL, 1978), de las cuales solamente una es originaria de Australia, siendo el resto plantas primordialmente americanas.

Flaveria bidentis (L.) Kuntze (= *F. contrayerba* (Cav.) Pers.) es una especie nativa de América del Sur (Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile y Argentina), pero su presencia ha sido señalada en otras partes del mundo y actualmente hay testimonios de la misma en el sudeste de Estados Unidos, oeste de la India, África (varios países desde Egipto a Sudáfrica) y Europa.

Descripción (Fig. 1). — *F. bidentis* F. bidentis es una especie anual de hasta 1 m de altura. Tallos escasamente vilosos y a menudo purpúreos. Hojas opuestas, sésiles o cortamente pecioladas, al menos las inferiores están connadas en la base, elíptico-lanceoladas, 5-18 cm de longitud y 1-7 cm de anchura, verde-azuladas, de glabras a densamente pubescentes, aserradas y trinerviadas. Inflorescencias en capítulos que se agrupan en cimas escorpioides. Involucros oblongos, de hasta 5 mm; algunas brácteas cóncavas y de ápice obtuso. Lígula oval y oblícua, sobre pasando apenas a las brácteas involucrales. 2-8 flósculos, con corola de unos 2 mm de longitud, siendo la porción tubular aproximadamente de 1 mm, la garganta infundibuliforme y los lóbulos agudos. Anteras con la base entera, de 1 mm de longitud aproximada. Ramas del estílo truncadas en las flores regulares. Aquenios de 2-2.5 mm, oblanceolados o subclavados, con 8-10 nervios, sin vilano.

En su área natural se trata de una hierba con cierta preferencia por los lugares húmedos (bordes de ríos y arroyos, pastizales, zonas portuarias, etc.), y con frecuencia aparece como ruderal o viaria.



Fig. 1. — *Flaveria bidentis*.
A, parte superior de un especímen; B, capítulo; C, ligula; D, flósculo.




Fig. 2. — Localidades conocidas de *Flaveria bidentis* en Europa.




Fig. 3. — Situación geográfica del especímen de *Flaveria bidentis* encontrado en el SE de España.

En Europa (Fig. 2) ha sido observada en Inglaterra (Gloucester s.a., POWELL, 1978; CLEMENT & FOSTER, 1984), Francia (BEDARIEUX, Montpellier, 1906; THELLUNG, 1912; cerca de Millau, al NW de Montpellier, 1983), Suecia (Mölndal, SE de Göteborg, 1934; BLOM, 1936) y Grecia (cerca de Pirgos, Peloponeso, 1986, HANSEN & STRID, 1989). Finalmente, en España (Fig. 3) ha sido encontrada una planta aislada de *F. bidentis* en el margen de un camino próximo a la carretera nacional 301 (Casas Nuevas, Hellín, Albacete, AB XH 2061; leg. J. Carrión, 22.11.1986, det. A. Hansen). El pliego-testigo ha sido depositado en el Herbario MUB de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia (MUB 28389).

En Egipto se conoce, al menos desde 1876, y se encuentra obviamente bastante naturalizada (ASCHERSON & SCHWEINFURTH, 1887; TÄCKHOLM, 1956).

Su introducción en Europa parece relacionarse ocasionalmente con la importación de algodón y de lana (Francia, Suecia). Este hecho no es exclusivo, puesto que hay otras especies de *Flaveria*, como *F. australasica* Hooker y *F. trinervia* (Spreng.) Mohr supuestamente llegadas a Europa con el comercio lanar (PROBST, 1949).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ASCHERSON, P. & G. SCHWEINFURTH (1887). *Illustration de la flore d'Egypte*.
BLOM, E. (1936). Bidrag till kännedomen om Sveriges adventivflora III. *Medd. Göteborgs Bot. Trädg.* 11: 159-182.
CLEMENT, E. J. & M. C. FOSTER (1984). *Alphabetical Tallylist of alien and adventice plants found in the British Isles*. 4 edit.
HANSEN, A. & A. STRID (1989). In: GREUTER, W. & T. RAUS (eds.), Med-Checklist Notulae, 15. *Willdenovia* 19: 28.
POWELL, A. M. (1978). Systematics of *Flaveria*. *Ann. Miss. Bot. Gard.* 65(2): 590-636.
PROBST, R. (1949). *Wolladventivflora Mitteleuropas*. Solothurn.
TÄCKHOLM, V. (1956). *Students'Flora of Egypt*.
THELLUNG, A. (1912). *La flore adventice de Montpellier*.

