**Zeitschrift:** Candollea: journal international de botanique systématique =

international journal of systematic botany

**Herausgeber:** Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève

**Band:** 52 (1997)

Heft: 2

**Artikel:** Données nouvelles sur la flore de Djibouti

**Autor:** Lebrun, Jean-Pierre

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-879438

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Données nouvelles sur la flore de Djibouti

JEAN-PIERRE LEBRUN

#### RÉSUMÉ

LEBRUN, J.-P. (1997). Données nouvelles sur la flore de Djibouti. *Candollea* 52: 223-238. En français, résumés français et anglais.

Corrections et additions au "Catalogue des plantes vasculaires de la République de Djibouti" (1989) et à l'ouvrage "Les plantes vasculaires de la République de Djibouti. Flore illustrée" (1994). Quarante-six espèces spontanées sont à ajouter à la flore de ce pays qui en compte maintenant 672.

#### **ABSTRACT**

LEBRUN, J.-P. (1997). New data on the flora of Djibouti. Candollea 52: 223-238. In French, French and English abstracts.

Corrections and additions to the "Catalogue des plantes vasculaires de la République de Djibouti (1989) and to the work "Les plantes vasculaires de la République de Djibouti. Flore illustrée" (1994). Forty-six spontaneous species are to add to the flora of this country which now numbers six hundred and seventy-two.

KEY-WORDS: Djibouti - Floristics.

L'étude de la végétation et des potentialités pastorales de la République de Djibouti, réalisée en 1986-1987, eut pour conséquence floristique, la publication en 1989 d'un catalogue des plantes vasculaires de ce pays, alors assez peu connu au plan botanique. Mais à ce moment là, nous n'envisagions pas, du moins à court terme, la production d'une flore; c'est un concours de circonstances qui a permis la sortie en 1994 de l'ouvrage intitulé "Les plantes vasculaires de la République de Djibouti", qui d'ailleurs apporte quelques modifications au "Catalogue". Comme des conditions juridiques particulières empêchent, du moins actuellement, une diffusion normale du second ouvrage, nous avons tenu à rassembler ici des corrections et additions au "Catalogue"; elles sont dues aussi bien à des révisions d'échantillons déjà vus qu'à la détermination de récoltes que nous n'avions pas encore étudiées. Par ailleurs, deux nouveaux collecteurs ont été identifiés comme ayant effectivement herborisé à Djibouti:

- Raymond DECARY (1891-1973), surtout connu pour ses récoltes à Madagascar (19390 Phanérogames); il ramassa quelques plantes à Djibouti, dont *Parkinsonia aculeata*, avant décembre 1919; ce qui est conforme à ce qu'on sait de lui puisqu'il débarqua à Diégo-Suarez pour la première fois en juillet 1916. A cette époque, on se rendait par bateau dans la Grande-île avec escale à Djibouti.
- Le second est très vraisemblablement Louis DEVAUX (? 1932) qui fut Adjoint à la Direction de l'Enseignement à Madagascar, pendant près de 35 ans; nous avons retrouvé une petite collection réalisée avant avril 1894 qu'on peut lui attribuer.

CODEN: CNDLAR

ISSN: 0373-2967 52(2) 223 (1997)

CONSERVATOIRE ET JARDIN

BOTANIQUES DE GENÈVE 1997

De plus, il est confirmé que Louis Yacinthe BOIVIN (1808-1852), botaniste-voyageur, a bien collecté à Djibouti; par l'existence de trois échantillons: *Boivin 1084* (type de *Cleome polytricha* Franchet), *Boivin 1090, Limonium axillare* (20.10.1847), *Boivin 1091, Dichanthium foveolatum* (20.10.1847) et *Boivin 1110, Withania somnifera* (22.10.1847), tous de Tadjoura.

En ce qui concerne ROCHET D'HÉRICOURT, lors de son second voyage, il quitta Moka (Arabie) le 28 mai 1842. Il arriva à Tanjourra (Tadjoura, Djibouti) trois jours après. Mais il fut obligé de repartir bientôt pour Moka où il arriva le 13 juin. Il en repartit le 1<sup>er</sup> septembre, fit relâche à Rahiéta, et arriva enfin à Ambabo le 6. Il repartit, le 15 septembre de cette localité, pour se diriger vers l'Ethiopie qu'il atteint vers le 9 octobre.

On peut préciser qu'il récolta quatre échantillons en des lieux actuellement situés dans la République de Djibouti (fig. 1); ils sont déposés dans l'herbier d'Afrique du Muséum à Paris; ce sont les suivants: Rochet D'Héricourt 60, Aerva javanica, à Gaubâde (= Goba'ad), Rochet D'Héricourt 61, Solanum somalense, Rochet D'Héricourt 62, Calotropis procera, Rochet D'Héricourt 64, Cassia senna, tous les trois d'Ambabo (fig. 2); on peut éventuellement y ajouter le Rochet D'Héricourt 56 bis, Desmidorchis acutangula, "en plusieurs localités du désert de l'Adel".

Finalement, corrections et additions faites, nous pouvons aujourd'hui fixer à 672 espèces, la richesse floristique actuelle de ce territoire.

Nous avons étudié, personnellement, au moins 3567 échantillons (numéros d'herbier). Mais il reste encore des découvertes à y faire, propres à accroître ce chiffre; surtout en explorant l'Ouest et le Sud du pays. Par ailleurs, près de 65 espèces ont été signalées par Cufodontis et surtout par Bavazzano, mais nous n'avons pas eu l'occasion d'en voir des échantillons; nous ne les avons donc pas compté comme existant réellement à Djibouti, car la flore de ce petit pays n'est pas aussi facile à appréhender qu'on pourrait se le figurer de prime abord; la prudence s'impose; surtout dans certains genres (*Hibiscus, Fagonia, Euphorbia, Caralluma* (s. l.), *Commiphora*, par exemple).

Nous ne saurions terminer cette introduction, sans évoquer la mémoire du colonel Edouard Chedeville, l'un des plus importants collecteurs de plantes à Djibouti, décédé à Paris le 9 décembre 1996 dans sa 91° année.

#### Commentaires sur la liste

Dans l'énumération qui suit, les nouveaux taxons sont numérotés de 1 à 46. Sont précédés d'un tiret les noms de taxons changés suite à de nouvelles déterminations ou suite à des synonymisations récentes. Sont précédés d'un tiret et sont entre crochets les taxons à supprimer de la flore spontanée de la République de Djibouti suite à des erreurs de détermination ou à leur statut d'adventice ou de plante cultivée. Les noms de taxons sans numéro ni tiret font l'objet d'un simple commentaire.

### ACANTHACEAE

#### Barleria acanthoides Vahl

Cité comme B. sp. aff. mucronifolia Lindau par Bavazzano in Webbia 26: 326 (1972).

Ajouter: Chedeville 1723, 1969, Bolli, 600 m et 700 m., P!

Le véritable B. mucronifolia n'existe pas à Djibouti.

is 60. Saponière, remeillie à gambade au /3 a désert, elle se trouve dans tout le pays Padel.

A rua tomentosa. Fork.

Nº 60. Seponaire recuillie a garbate on the Indisert ; elle to trouve dans tout le grays s'asil. Rochet Mexiconst. (1883)

a ambabo, sur howan indianvans un terrain sininemment Tilicing.

gros et de forme sphérique, lors qu'on came les branches sertes de cot orbrisseau, den coule un sue laiteup, qui a la propriet de de propriet de propr

Fig. 1. - Etiquettes des récoltes de Rochet d'Héricourt à Djibouti (septembre 1842), P!




Fig. 2. – Les deux localités certaines des récoltes de Rochet d'Héricourt à Djibouti (●).

### 1 **B.** ventricosa Hochst. ex Nees

Confirmé par: Chedeville 332, Day, P!

### 2 Justicia odora (Forssk.) Lam.

Cité comme J. sp. aff. lorteae Rendle par Lebrun & al., Cat. Pl. Djibouti: 220 (1989).

Signalé par Bavazzano; confirmé par les échantillons: Audru 8895, plaine de Maigoïta, sable fin; Audru 8120, Balli Sonbla; César 2228, Asa Gueyla; César 2934, Moussa Ali, ALF!

Sudan, Ethiopie, Somalie, Kenya-Namibie, Botswana-Arabie (espèce des zones sèches à aire disjointe).

### 3 Ruspolia pseuderanthemoides Lindau

Signalé par Bavazzano; confirmé par: *Saboureau 299*, Sousto; *Chedeville 1196*, Randa, 900 m; *Chedeville 1842*, Randa, 900 m; *Chedeville 2515*, Goh, 1500 m, P!

Ethiopie, Somalie.

#### ALOACEAE

### 4 Aloe macrocarpa Tod.

var. macrocarpa

Deschamps 19, Mont Gouda, 1750 m, commun dans les oueds, P! (dét.: S. Carter, Kew). Erithrée, Ethiopie, Somalie – var. major Berger: Bénin, Nigéria, Cameroun, Sudan.

### 5 A. mcloughlinii Christian

Cité comme A. sp. par Lebrun & al., Cat. Pl. Djibouti: 235 (1989). César 2822, plateau du Yager, ALF! (dét.: S. Carter, Kew). Ethiopie.

### AMARYLLIDACEAE

### 6 Scadoxus multiflorus (Martyn) Raf.

Signalé par Bavazzano; confirmé par Chedeville 1791, Day.

#### ANACARDIACEAE

### [Ozoroa insignis Del.]

Signalé par Cufodontis probablement d'après les échantillons *Deschamps 31*, Bankoualé et s.n., Mont Gouda, P! qui sont des *Tarchonanthus camphoratus (Asteraceae*).

#### APIACEAE

### 7 **Psammogeton canescens** (DC.) Vatke

#### subsp. canescens

Aubert de la Rüe s.n. (15.2.38), pente du Mont Waidoleli, cote 100, Godoria (golfe d'Aden); Aubert de la Rüe s.n. (31.3.38), vallée du Magale, 600-800 m, Mont Goudah, P!; César 2291, Arta, escarpement; Audru 7598 et 7601, Randa, éboulis; Audru 7792, piste Randa — Day lieu-dit Oudaléguéra, pelouse discontinue sur colline rhyolithique 1085 m; Audru 8902, idem, lieu-dit Dertim, 900 m; Audru 8932, Randa, sol détritique; Labonne 60, Day, ALF!

Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan, Turkménistan (Espèce polymorphe).

Genre nouveau pour l'Afrique tropicale.

#### APOCYNACEAE

### 8 Carissa edulis (Forssk.) Vahl

Signalé par Bavazzano; confirmé par: *Aubert de la Rüe s.n.*, forêt du Daï, Mont Goudah, autour du puit d'Ourano, 1400 m; *Chedeville 707, 708*, Ourano, P!

Zones sèches d'Afrique tropicale – Madagascar – Arabie – Indes et Indochine.

### ASCLEPIADACEAE

### 9 **Duvalia somalensis** Lavranos

Découvert en Somalie septentrionale en octobre 1968; retrouvé par J. Blot en mai 1988 non loin de la localité du type, mais en territoire Djiboutien: entre Ali Sabieh et Asamo, substrat calcaire, ALF! (photo); également récolté à Ali Sabieh par D. Plowes et cultivé par G. S. Barad [voir Cactus Succ. J. (U.S.) 67: 360-361 (1995)].

# Echidnopsis hirsuta Plowes

Lavranos & Newton 13178 cult. sub Plowes 5054 (type), Eger'aleita 1600 m, Goda Mountains.

Endémique de Djibouti.

L'échantillon *César 2675* en provenance du Yager (éloigné des Monts Goda), ainsi peut-être que l'échantillon *s.n.* et *s.n.c.* de l'herbier de Paris, appartiennent éventuellement au véritable *E. planiflora* Bally; mais il faudra attendre de disposer d'échantillons fleuris pour en décider réellement.

### 10 Pachycymbium kochii (Lavranos) Gilbert

Voir Audru & al. in Candollea 47: 527-532 (1992); ibidem, 49: 187-194 (1994).

Audru s.n., Gabla Digué sur la piste joignant le pylone de télévision à Sagallou; steppe buissonnante basse à *Psiadia punctulata* et *Euryops arabicus*; cultivé comme plante d'appartement à Maisons-Alfort, a fleuri en août 1991.

Somalie.

### 11 P. sacculatum (N. E. Br.) Gilbert

Voir Audru & al. in Candollea 49: 187-194 (1994).

Audru 7730, 8128, piste Randa – forêt du Day, km 4, steppe herbeuse rase à Aizoon canariense et Cymbopogon commutatus, alt. 1085m; sur lithosol stabilisé sur rhyolithes ou cailloux et rochers affleurants sont très abondants. Cultivé à Genève, a fleuri en août 1992 et fin avrildébut mai 1993.

Ethiopie.

#### ASTERACEAE

# 12 Blumea lacera (Burm. f.) DC.

Signalé par Bavazzano; confirmé par: Chedeville 2470, Goh, ravin, 1200 m, P!

Le B. sp. aff. B. solidaginoides (Poir.) DC. cité par Bavazzano est un Volutaria sp. en mauvais état.

# Conyza stricta Willd.

Cité comme C. abyssinica A. Rich. par Bavazzano in Webbia 26: 331 (1972).

Chedeville 1091, Goda, de 1200 à 1600 m; 1839, près Randa; Chedeville 1530, Goda, vers 1000 m, P!

Le véritable C. abyssinica n'existe pas à Djibouti.

# 13 Filago abyssinica Sch. Bip. ex A. Rich.

Signalé par Bavazzano; confirmé par: Chedeville 687, Day.

### 14 Geigeria alata (DC.) Oliv. & Hiern

Cité par Cufodontis; confirmé par *Jousseaume s.n.*, Djibouti et *Taschdjean 16*, oasis Hambouly, P!

### 15 Iphiona scabra DC.

Voir Anderberg in Nord. J. Bot. 5: 186 (1985).

Cité comme *Pluchea sarcophylla* Chiov. par Bavazzano in Webbia 26: 332 (1972).

Cité d'après Cufodontis; confirmé par: Chedeville 2405, Assa Ragid, P!

Le véritable Pluchea sarcophylla n'existe pas à Djibouti.

### 16 Volutaria djiboutensis Wagenitz

Nouvelle espèce publiée en 1996 (Ann. Naturhist. Mus. Wien 98B, Suppl.: 178) sur la base des échantillons suivants: *Audru 7707* (holotype, ALF), *Naegelé 107* (K), *Lavranos 10444* (K), *Audru 7880* (ALF), *Audru 7890* (ALF), *C. M. Curle 102* (K).

Endémique de Djibouti.

### 17 Vernonia schimperi DC.

Cité comme V. aff. leopoldii (Sch. Bip.) Vatke par Bavazzano in Webbia 26: 331 (1972). Confirmé par: Chedeville 1511, 1492, Day; Saboureau 272, Djibouti (s.l.), P!

### 18 Xanthium strumarium L.

Audru 8931, As Eyla, ALF!

Régions chaudes du Monde.

#### BIGNONIACEAE

# 19 Stereospermum kunthianum Cham.

Signalé par Bavazzano; confirmé par: Chedeville 2448, Randa, 900 m, P!

### BORAGINACEAE

# 20 Cordia quercifolia Klotzsch

Voir Warfa in Nord. J. Bot. 9: 652 (1990).

Audru 3167, Gamaré, ALF!

Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, Ethiopie, Afrique orientale – Arabie, Indes, Sri Lanka.

# Heliotropium longiflorum (A. DC.) Jaub. & Spach

syn.: H. somalense Vatke

Aux échantillons cités, ajouter: Schantz 3, above Djibouti.

### 21 H. rariflorum Stocks

subsp. rariflorum

Cité comme *H. strigosum* Willd. par Lebrun & al., Cat. Pl. Djibouti: 192 (1989), quoad specim. *César 3164*; et comme *Echiochilon verrucosum* (Beck) Johnston par Lebrun & al., Cat. Pl. Djibouti: 194 (1989).

Signalé par Bavazzano; confirmé par: *César 3164*, Gamaré; *2268 et bis*, Yager; *2316*, Ali Sabieh; *Audru 8337*, route Tadjoura-Randa, entre Amisso et Adgen; *8180*, piste Sagallou – piste pylone, lieu-dit Gabla Digué, ALF!

### 22 Trichodesma ehrenbergii Schweinf. ex Boiss.

Courbon s.n., Tadjoura, P!

Sudan, Egypte – Israël – Arabie saoudite, Yémen.

#### BRASSICACEAE

# 23 Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss.

Deschamps s.n., assez fréquent dans le ravin d'Ourano (Mont Gouda, 1750 m d'alt.).

De l'Espagne à la Grèce – Du Maroc à l'Egypte; Ethiopie, Somalie – Arabie, Moyen-Orient jusqu'à l'Iran.

#### CAPPARIDACEAE

### 24 Cleome hamburyana Penzig

Récolté une fois à Djibouti par Eric Weiss; l'échantillon en mauvais état n'a pu être conservé – A rechercher.

Sudan, Ethiopie, Erythrée, Somalie, Kenya.

### 25 C. polytricha Franch.

Le type de cette espèce a été récolté à Djibouti: *Boivin 1084*, croît dans les terrains calcaires, Téjoura, 20.10.1841, P!

### C. ramosissima Parl.

Voir Thulin, Fl. Somalia 1: 56 (1993).

Cité comme C. viscosa L. par Lebrun & al., Cat. Pl. Djibouti: 44 (1989) quoad specim. Audru 8649.

Le véritable C. viscosa n'existe pas à Djibouti.

### 26 Dipterygium glaucum Decne.

*Audru s.n.*, Dorra (4.1990), colline basaltique (un seul pied), ALF! Sudan, Egypte, Ethiopie – Arabie et jusqu'au NW des Indes.

### Maerua crassifolia Forssk.

Cité comme M. thomsonii T. Anders. par Lebrun & al., Cat. Pl. Djibouti: 45 (1989).

Ajouter les spécimens: *Audru 7521, 7487*, plaine de Hanlé, piste forage Gabaïta, jardins de Téwao.

Le véritable M. thomsonii n'existe pas à Djibouti.

### 27 Maerua triphylla A. Rich.

var. calophylla (Gilg) De Wolf

Chedeville 174, Day.

Sudan, Ethiopie, Somalie, Afrique orientale; Rwanda, Zaïre – Mascareignes.

### CHENOPODIACEAE

Halothamnus somalensis (N. E. Br.) Botsch.

Cité comme H. bottae Jaub. & Spach par Lebrun & al., Cat. Pl. Djibouti: 70 (1989).

Ajouter les échantillons: César 2348, 2359, Asa Gueyla; Chedeville 1167, Yager, 1000 m; Denis 79, oued Magala.

Le véritable *H. bottae* n'existe pas à Djibouti.

#### Suaeda

Compte tenu des synonymies établies par Boulos *in* Kew Bull. 46: 295 (1991), il n'existe que quatre espèces de ce genre à Djibouti. Cette conception est confirmée par Friis & Gilbert *in* Thulin (ed.), Fl. Somalia 1: 132-134 (1993).

- Suaeda aegyptiaca (Hasselq.) Zoh.
- S. monoica Forssk.
- **S. pruinosa** Lange
- **S.** vermiculata Forssk, ex J. F. Gmel.

### COLCHICACEAE

28 Iphigenia oliveri Engl.

Voir Thulin in Nord. J. Bot. 15: 405 (1995).

Cité comme *I. somaliensis* Bak., *I.* cf. *somaliensis* et *I.* sp. aff. *I. oliveri* Engl. par Lebrun & al., Cat. Pl. Djibouti: 236 (1989).

Gaddes 1-29 et Popov 1344.

Ethiopie, Somalie, Kenya, Tanzanie.

### CONVOLVULACEAE

- Convolvulus auricomus (A. Rich.) Bhandari

syn.: C. faurotii Franch. - Type: Faurot s.n., plante d'Obock, Golfe de Tadjoura, P!

# 29 C. hystrix Vahl

Signalé par Bavazzano; confirmé par: Jousseaume s.n., Obock, P!

### CYPERACEAE

### Schoenoplectus subulatus (Vahl) Lye

Ce nom a priorité sur *S. littoralis* (Schrad.) Palla (voir Lye *in* Thulin (éd.), Fl. Somalia 4: 103 (1995)).

Cité comme S. maritimus (L.) Lye par Lebrun & al., Cat. Pl. Djibouti: 245 (1989).

Ajouter: Koechlin 188.

Le véritable S. maritimus n'existe pas à Djibouti.

### EPHEDRACEAE

### 30 Ephedra foemina Forssk.

Voir Miller & Cope, Fl. Arab. Socotra 1: 78 (1996).

Cité comme *E.* sp. aff. *ciliata* par Collenette, Ill. Guide Flow. Saudi Arab.: 231 (1985) et Lebrun & al., Cat. Pl. Djibouti: 37 (1989) quoad specim. *César 3075* et *Koechlin 171*, liane sur *Juniperus procera*, Day.

Egypte (Sinaï), Ethiopie, Somalie – Arabie saoudite, Yémen, Jordanie.

### EUPHORBIACEAE

### 31 Euphorbia longetuberculosa Boiss.

Voir Carter in Kew Bull. 40: 810 (1985) et Brit. Cact. Succ. J. 6: 63, fig. 7 (1988).

Cité comme E. sp. par Lebrun & al., Cat. Pl. Djibouti: 108 (1989).

César 3248, plateau du Gamaré, 900 m.

Ethiopie, Somalie, Kenya – Yémen Sud.

#### FABACEAE

# 32 Rhynchosia minima (L.) DC.

var. *minima* 

Jousseaume s.n., Djibouti, P!

Iles du Cap Vert – Zones sèches d'Afrique tropicale, d'Amérique tropicale (incl. Caraïbes) et d'Asie tropicale.

# 33 Vigna frutescens A. Rich.

Aubert de la Rüe s.n., Monts Mabla, entre 500 et 1100 m d'altitude, le long de la piste d'Obock à Sismo, P!

Du Nigeria à l'Ethiopie; Afrique orientale; Mozambique, Angola; Botswana.

### GERANIA CEAE

# - Geranium favosum Hochst. ex A. Rich.

Cité comme G. ocellatum Cambess. par Lebrun & al., Cat. Pl. Djibouti: 75 (1989), quoad specim. Audru 7700, 7592, 8270; César 2650 et Denis 184.

Le véritable G. ocellatum n'existe pas à Djibouti.

### LAMIACEAE

### 34 Endostemon tereticaulis (Poir.) Ashby

Aubert de la Rüe s.n., Monts Mabla (entre 500 et 1100 m d'alt.), le long de la piste Obock-Sismo.

Du Sénégal à l'Ethiopie; Afrique orientale, Rhodésie, Botswana – Afrique du Sud (Transvaal).

# 35 Scutellaria arabica Jaub. & Spach

Voir Paton in Kew Bull. 47: 47 (1992).

Cité comme S. sp. nov. par Lebrun & al., Cat. Pl. Djibouti: 230 (1989); Audru & al., Pl. Djibouti 2: 775 (1994).

Aubert de la Rüe s.n., Mont Goudah, sommet Est, 1715 m; Chedeville 304, Day, 1600 m; Saboureau s.n., Djibouti.

Sudan, Ethiopie – Arabie saoudite, Yémen.

# - Becium filamentosum (Forsk.) Chiov.

Cité comme Ocimum affine Hochst. ex Benth. par Lebrun & al., Cat. Pl. Djibouti: 225 (1989).

Ajouter: César 2738, Randa.

#### MALVACEAE

### 36 Hibiscus somalensis Franchet

Cité comme *H. aponeurus* Sprague & Hutch. par Lebrun & al., Cat. Pl. Djibouti: 95 (1989) quoad specim: *César 2395*.

Somalie.

### NYCTAGINACEAE

### - [Bougainvillea glabra Choisy]

Audru 8731, Ambouli, sable fin, planté, ALF!

### POACEAE

# - Aeluropus lagopoides (L.) Trin. ex Thw.

Cité comme *Dactyloctenium robecchii* (Chiov.) Chiov. par Lebrun & al., Cat. Pl. Djibouti: 253 (1989).

Ajouter: Koechlin 19.

Le véritable Dactyloctenium robecchii n'existe pas à Djibouti.

### Aristida adscensionis L.

Cité comme *A. congesta* Roem. & Schult. et comme *A. adoensis* Hochst. ex A. Rich. par Bavazzano *in* Webbia 26: 341 (1972).

Ajouter *Chedeville 834*, Der Ballaa (Dakka) (forme à panicule contractée); *Chedeville 856*, Ourano.

Le véritable A. congesta n'existe pas à Djibouti.

# - Aristida mutabilis Trin. & Rupr.

Cité comme A. congesta Roem. & Schult. par Lebrun & al., Cat. Pl. Djibouti: 248 (1989). Ajouter: Audru 8348.

Le véritable A. congesta n'existe pas à Djibouti.

# - [Arundo donax L.]

Audru s.n. (avril 1990), jardin au sud de Djibouti, sur sable, planté, ALF!

Originaire du bassin méditerranéen et des régions plus orientales jusqu'à la Birmanie – Largement introduit ailleurs.

# - Cymbopogon commutatus (Steud.) Stapf

Cité comme *Hyparrhenia hirta* (Steud.) Stapf par Cufodontis *in* Bull. Jard. Bot. Nat. Belg. 40: 1403 (1970) et Bavazzano *in* Webbia 26: 346 (1972).

Spécimens vus: *Chedeville 1986*, Yager, plateau latéritique, 400 m (sub nom. *H. hirta*); *Chedeville 1987*, Randa, 950 m (sub nom. *H. hirta*); *Chedeville 809*, Sira, 600 m (sub nom. *H. hirta*).

### 37 Eragrostis namaquensis Nees

#### var. namaquensis

Audru 8920, dépression de Madjoul, sol sablo-argileux, après exondation.

Afrique tropicale surtout dans sa partie méridionale.

Espèce parfois traitée comme synonyme d'*E. japonica* (Thunb.) Trin.

# Hyparrhenia hirta (L.) Stapf

Cité comme H. dichroa (Steud.) Stapf par Bavazzano in Webbia 26: 346 (1972).

Ajouter: Chedeville 871, Ourano; Saboureau 275, Essiso.

Le véritable H. dichroa n'existe pas à Djibouti.

### 38 Odyssea mucronata (Forssk.) Stapf

Cité comme *Aeluropus lagopoides* (L.) Trin. ex Trimen par Bavazzano *in* Webbia 26: 337 (1972) quoad specim. *Chedeville 2087*.

Chedeville 2087, Gaherré, près de la Mer Rouge, P!

Erythrée, Yémen, Arabie saoudite.

### - Paspalum scrobiculatum L.

Signalé par Cufodontis et Bavazzano in Webbia 26: 344 (1972).

Confirmé par: Chedeville 2150, mare de Lale Soli, P!

# 39 Rhynchelytrum repens (Willd.) Hubb.

Signalé par Cufodontis & Bavazzano; confirmé par: Chedeville 2081, Gemedda, P!

### POLYGALACEAE

# Polygala senensis Klotzsch

Voir Paiva in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 157 (1988); El género Polygala: 250 (1993).

var. calcicola (Chodat) Paiva

César 3132, Assa Guela, oued, ALF!

var. *senensis* 

Cité comme P. obtusissima Chodat par Lebrun & al., Cat. Pl. Djibouti: 57 (1989).

Voir les échantillons cités dans notre Catalogue.

Thulin, Fl. Somalia, 1: 82 (1993), *P. obtusissima* est une bonne espèce incluant *P. calcicola* Chodat et ses synonymes.

### RUBIACEAE

### 40 Pavetta gardeniifolia A. Rich.

var. gardeniifolia

Signalé par Bavazzano; confirmé par: *Deschamps 30*, Bankoualé et *Chedeville 158*, Randa, P!

### - [Pentanisia longituba (Franch.) Oliv.]

Signalé par Cufodontis; confirmé par: *Audru 8930*, As Eyla, jardin, adventice probable, ALF! – A rechercher à l'état spontané.

### SCROPHULARIACEAE

### 41 Aptosimum pumilum (Hochst.) Benth.

*Audru 8901* (20.10.1989), plaine de Margoïta, sable, ALF! De la Mauritanie à la Somalie; Tanzanie.

### SOLANACEAE

#### 42 Datura stramonium L.

Deschamps s.n., Mont Gouda, 1750 m d'altitude, P! Pays chauds.

### 43 Solanum thruppii Wright, Kew Bull.: 129 (1894)

Voir Whalen in Gentes Herb. 12: 265-266 (1984).

Cité comme S. adoense A. Br. par Lebrun & al., Cat. Pl. Djibouti: 199 (1989) quoad specim. Chedeville 1760, Gamoyra.

Somalie, Ethiopie, Sudan, Egypte, Tanzanie.

### TILIACEAE

### - Grewia tenax (Forssk.) Fiori

Cité comme G. tembensis Fres. par Lebrun & al., Cat. Pl. Djibouti: 89 (1989) quoad specim. Audru 7925, César 2671, 2197, 2470, 2227, 2270, Blot 241 (l'échantillon Audru 7978 est un G. velutina).

Le véritable G. tembensis n'existe pas à Djibouti.

### TRIBULACEAE

### 44 Tribulus cistoides L.

Chedeville 11, Afambo, croupes basaltiques, dans un trou recueillant l'eau de pluie, P! Afrique orientale et Nord-orientale dans les régions côtières – Madagascar, îles Mascareignes – Iles du Cap Vert – Amérique dans les régions les plus chaudes.

# VERBENACEAE

### 45 *Clerodendrum myricoides* (Hochst.) R. Br. ex Vatke

Signalé par Lebrun & al., Cat. Pl. Djibouti: 224 (1989) sous le binom *C. discolor* (Kl.) Vatke et par Cufodontis sous celui de *C. neumayeri* Vatke et, dans ce cas, probablement d'après l'échantillon *Deschamps 14*, ravin d'Ourano.

# Priva adhaerens (Forssk.) Chiov.

Cité comme Chascanum hildebrandtii (Vatke) Gillett par Lebrun & al., Cat. Pl. Djibouti: 223 (1989).

Ajouter: Audru 7832 et César 2894.

Le véritable *Chascanum hildebrandtii* n'existe pas à Djibouti.

# ZYGOPHYLLACEAE

### 46 Fagonia arabica L.

Audru 8743, Mouloud, jardin, sol sablonneux.

De l'Algérie au Pakistan.

### F. socotrana (Balf. f.) Schweinf.

Cité comme F. migiurtina Hadidi par Lebrun & al., Cat. Pl. Djibouti: 99 (1989) quoad specim.: Audru 7771.

Le véritable F. migiurtina n'existe pas à Djibouti.

#### SUPPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE

- FAYE, B. (1979). Mangrove, sécheresse et dromadaire. Sécheresse 4: 47-55.
- FRIIS, I. (1988). Forest Types and Forest Trees of Tropical North East Africa, 1 vol. 350 pp.
- FRIIS, I. & MESFIN TADESSE (1990). The evergreen forests of tropical N.E. Africa. *Mitt. Inst. Allg. Bot. Hamburg* 23a: 249-263.
- BRONGNIARD, A. (1860). Notice de M. Adolphe Brongniard sur les résultats relatifs à la botanique obtenus par M. le docteur Alfred Courbon, pendant le cours d'une exploration de la Mer Rouge exécutée en 1859-60. *Bull. Soc. Bot. France* 7: 898-905.
- BRONGNIARD, A. & al. (1861). Rapport sur un Mémoire de M. Courbon, chirurgien de la Marine de première classe intitulé: Résultats relatifs à l'histoire naturelle, obtenus pendant le cours d'une exploration de la mer Rouge, exécutée en 1859-1860, par ordre de l'Empereur, par M. le capitaine de frégate de Russel. *Compt. Rend. Séances Acad. Sci.* 52: 426-440.
- FRANK, G. (1989). Carallumas of Djibouti. Asklepios 46: 71-72.
- LAVRANOS, J. J. (1975). Note on the northern temperate element *in* the flora of the Ethio-Arabian region. *Boissiera* 24: 67-69.
- SAVARY, C. (1990). Edgar Aubert de la Rüe, un naturaliste pas comme les autres. Mus. Genève 304: 7-11.
- RATSIMAMANGA, R. in CORNEVIN, R. (Ed.). Hommes et destins (Dictionnaire biographique d'Outre-Mer). Publ. Acad. Sci. Outre-Mer, Mém. ser. 9, 3, Madagascar: 169.
- TASCHDJIAN, E. (1933). Note sur les Dattiers de la Côte française des Somalis. Rev. Bot. Appl. Agric. Trop. 13: 146-147, 798-801.