

Zeitschrift: Candollea : journal international de botanique systématique =
international journal of systematic botany

Herausgeber: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève

Band: 58 (2003)

Heft: 1

Artikel: Notulae ad Floram paraquaiensem, 89

Autor: Ramella, Lorenzo / Perret, Patrick

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-879291>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 09.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Notulae ad Floram paraquaiensem, 89

LORENZO RAMELLA
&
PATRICK PERRET (eds.)

RÉSUMÉ

RAMELLA, L. & P. PERRET (éds.) (2003). Notulae ad Floram paraquaiensem, 89. *Candollea* 58: 75-78. En espagnol, résumés français et anglais.

Vingt-huitième partie d'une série mise à disposition des collaborateurs du projet "Flora del Paraguay" pour la publication de nouveautés taxonomiques, nomenclaturales ou floristiques et de compléments à des traitements déjà publiés. Ces *Notulae* permettent aussi aux éditeurs de faire paraître des informations d'ordre administratif et de présenter l'avancement des travaux. — *Notula 89. Eleocharis canindehyensis* F. Mereles & S. González (*Cyperaceae*), une espèce nouvelle pour la flore du Paraguay, par Fátima Mereles & M. Socorro González-Elizondo.

ABSTRACT

RAMELLA, L. & P. PERRET (éds.) (2003). Notulae ad Floram paraquaiensem, 89. *Candollea* 58: 75-78. In Spanish, French and English abstracts.

Twenty-eighth installment of a series dedicated to the presentation of taxonomic, nomenclatural or floristic novelties in relation with the project "Flora del Paraguay" as well as complements to already published treatments. Organizational information and accounts on the advancement of the project are sometimes added by the editors. — *Notula 89. Eleocharis canindehyensis* F. Mereles & S. González (*Cyperaceae*), a new species for the flora of Paraguay, by Fátima Mereles & M. Socorro González-Elizondo.

KEY-WORDS: Paraguay – Floristics – Systematics.

89. MERELES, Fátima & M. Socorro GONZALEZ-ELIZONDO: *Eleocharis canindehyensis* F. Mereles & S. González (*Cyperaceae*), una nueva especie para la flora del Paraguay

***Eleocharis canindehyensis*¹ F. Mereles & S. González, spec. nova (Fig. 1).**

E. minima Kunth affinis, sed spiculis copiose (usque 200) proliferis, stamine ut videtur solitario, achenio punctulato breviore ad rostrum depresso et minusculo apiculato differt.

Holotypus: PARAGUAY. Canindeyú: "15 km SE of Katueté, 24°15'S, 65°40'W. Isolated pond in middle of cultivated field", 15.II.1984, Hahn, W. 2069 (MO). **Isotypi:** (CIIDIR, FCQ, GENT, US).

¹ El epíteto *canindehyensis* proviene del nombre del departamento en donde fue hallado y en donde se encuentra la primera Reserva de la Biosfera para el Paraguay.




Fig. 1. – *Eleocharis canindehyuensis* F. Mereles & S. González
A) aspecto general de la planta; **B)** vaina: vista lateral, frontal y detalle; **C)** espiga; **D)** aquenio.
 [A-D: Hahn 2069].

Hierba acuática o arraigada sobre suelos inundables, perenne, densamente cespitosa. Raíz fibrosa, rizomas inconspicuos y ascendentes, muy cortos, de 0.6-1 mm lat., con cubierta membranácea de color pajizo. *Tallos*: 12-16 cm x 0.1-0.6 mm, los prolíferos 0.4-0.5(-0.6) mm lat., los estériles 0.1-0.2 mm lat., de color verde en las plantas acuáticas, a veces amarillo parduzco en las palustres, erectos, curvos o decumbentes, esponjosos, de sección circular o elipsoide y con múltiples y finas estrías longitudinales, o de sección subcuadrangular con un surco sobre cada lado. *Vainas*: membranáceas, las inferiores opacas o translúcidas, de color pajizo, muy frágiles, las superiores de color pajizo o verdoso, hialinas, algo arrugadas, ápice muy oblicuo, de boca aguda, fácilmente rotas y desgarradas por el lado ventral. *Inflorescencias*: espigas copiosamente proliferadas, por lo general ausentes y substituidas en la punta de los tallos por múltiples (hasta 200) tallitos capilares muy cortos y ligeramente curvados formando densas “cabezuelas”. *Espiguillas*: de 5 mm o más long. x aproximadamente 0.5 mm lat., ovadas, agudas, de 12 a 15 flores. *Gluma inferior*: estéril, abrazando a la espiguilla, más corta (1.1 mm long.) que las glumas florales, translúcida, el ápice redondeado, por lo demás similar a las glumas florales. *Glumas florales*: 1.4-2 x 0.8-1.1 mm, membranáceas, carenadas, elípticas, agudas, de color verde o pajizo a lo largo de la nervadura central, el ápice y los bordes hialinos. *Flores hermafroditas*: estilo trifido de color pardo rojizo; estambre 1 (?). *Aquenio*: diminuto, 0.6-0.7 mm (incluyendo el tubérculo y la base) x 0.35-0.42 mm, de sección triangular, los ángulos costulados, los lados convexos, obovoide, ápice truncado, base corta y angosta; superficie de color blanquecino o pajizo a grisáceo, someramente porosa, la capa exterior fácilmente desprendible y dejando ver una superficie interior de color pajizo a grisáceo; tubérculo de 0.05-0.12 mm long. x aproximadamente 0.27 mm lat. en la base, cortamente piramidal, apiculado, agudo en el centro, de base ligeramente más ancha que el ápice del aquenio, de color pardo; setas perigonales nulas o 1-2, mucho más cortas que el aquenio, pajizas.

Fenología. – Fructifica en febrero.

Ecología. – Es una hierba de hábitos acuáticos o palustres; parte de su vida se encuentra sumergida en aguas léticas y parte como planta palustre, enraizada en el fango o en suelo arenoso húmedo. En la fase acuática desarrolla tallos muy verdes, transparentes; cuando palustre se vuelven pardos, decumbentes o semi-erectos. Crece en lagunas con agua estancada, en sabanas hidromorfas con suelo arenoso-arcilloso, con abundante hierro. Aparentemente, la forma acuática es anterior a la terrestre y probablemente desarrolle aquenios únicamente en la forma terrestre.

Distribución. – Hasta el momento sólo se conoce de dos localidades muy cercanas entre sí, en el Departamento de Canindeyú.

Material adicional examinado. – PARAGUAY. Canindeyú: “Reserva Natural del Bosque Mbaracayu, Lagunita”, 5.XII.1997, Schinini, A. & M. Dematteis 33302b (CTES, MO).

- Obs. 1.* *E. canindeyuensis* pertenece al subgen. *Eleocharis* subser. *Chaetariae* (C. B. Clarke) Svenson s. l. (GONZALEZ-ELIZONDO & PETERSON, 1997). Presenta aquenios con superficie someramente porosa y representa un ejemplo adicional de la amplia variación en la superficie del aquenio que existe en ese grupo de plantas (GONZALEZ-ELIZONDO & PETERSON, 1997).
- Obs. 2.* *E. canindeyuensis* parece estar relacionada con el complejo de *E. minima* Kunth; se distingue principalmente por su hábito densamente prolífico, con el ápice de los tallos con múltiples vástagos capilares muy cortos formando “cabezuelas”.

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Gerrit Davidse por llamar nuestra atención hacia esta interesante especie y a Elsa Zardini por facilitar el contacto entre Fátima Mereles y Socorro González. A los encargados del Herbario del Jardín Botánico de Missouri por las facilidades brindadas para la revisión y dibujo del material. Al Dr. Roy Gereau por comentarios al manuscrito y al Comité Editorial de Candollea por sugerencias para mejorar la calidad de éste.

Socorro González agradece a COFAA y EDI del I. P. N. por los estímulos brindados.

Fátima Mereles agradece a la Beca Elizabeth E. Bascom para Botánicas Latinoamericanas otorgada por el Missouri Botanical Garden, por los subsidios para la realización de los estudios en el género.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

GONZALEZ-ELIZONDO, M. S. & P. M. PETERSON (1997). A classification of and key to the supraspecific taxa in Eleocharis (Cyperaceae). *Taxon* 46: 433-449.

Dirección de las autoras: Fátima Mereles: Depto. de Botánica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Asunción, Casilla de Correo 11001-3291, Campus UNA, Paraguay. E-mail: fmereles@sce.cnc.una.py

M. Socorro González-Elizondo: CIIDIR Unidad Durango, Instituto Politécnico Nacional, Apdo. 738, Durango, Dgo. 34000, Mexico. E-mail: sgonzalez@omanet.com.mx