

<b>Zeitschrift:</b>	Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany
<b>Herausgeber:</b>	Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
<b>Band:</b>	64 (2009)
<b>Heft:</b>	2
<b>Artikel:</b>	Toulicia radlkoferi Ferrucci (Sapindaceae, Sapindeae) : une nueva especie para Brasil
<b>Autor:</b>	Ferrucci, María S.
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-879212">https://doi.org/10.5169/seals-879212</a>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 13.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# **Toulisia radlkoferi Ferrucci (Sapindaceae, Sapindeae), una nueva especie para Brasil**

**María S. Ferrucci**

## **Abstract**

FERRUCCI, M. S. (2009). *Toulisia radlkoferi* Ferrucci (Sapindaceae, Sapindeae), a new species for Brazil. *Candollea* 64: 283-288. In Spanish, English and French abstracts.

*Toulisia eriocarpa* Radlk. is an invalid name. Based on the same type, *Toulisia radlkoferi* Ferrucci (Sapindaceae: Sapindeae) is described and illustrated. Its relationships with *Toulisia reticulata* Radlk. are discussed. An identification key to the species of *Toulisia* Aubl. sect. *Toulisia* is provided.

## **Résumé**

FERRUCCI, M. S. (2009). *Toulisia radlkoferi* Ferrucci (Sapindaceae, Sapindeae), une nouvelle espèce pour le Brésil. *Candollea* 64: 283-288. En espagnol, résumés anglais et français.

*Toulisia eriocarpa* Radlk. est un nom invalide. Basée sur le même type, *Toulisia radlkoferi* Ferrucci (Sapindaceae: Sapindeae) est décrite et illustrée. Ses affinités avec *Toulisia reticulata* Radlk. sont discutées. Une clé d'identification des espèces de *Toulisia* Aubl. sect. *Toulisia* est fournie.

## **Key-words**

SAPINDACEAE – SAPINDEAE – *Toulisia* – Brasil

---

Dirección del autor: Instituto de Botánica del Nordeste (UNNE-CONICET). C. C. 209, W3400CBL – Corrientes, Argentina. E-mail: [msferrucci@yahoo.com.ar](mailto:msferrucci@yahoo.com.ar)

Propuesto el 17 Julio 2008. Aceptado el 5 Noviembre 2009.

Editado por P. Perret

## Introducción

*Toulisia* Aubl. es un pequeño género neotropical que se distribuye desde Venezuela hasta Paraguay nororiental; el mismo pertenece a la tribu *Sapindeae* (RADLKOFER, 1878, 1932). *Toulisia* comparte la tribu con seis géneros, de los cuales tres son americanos. Se reconoce entre sus congéneres por los frutos esquizocárpicos con 3 mericarpos samaroideos, con la porción seminífera en el ápice, siendo el género *Porocystis* Radlk. el más afín, este último comparte con *Toulisia* el tipo de fruto esquizocárpico pero se diferencia porque los mericarpos poseen un lóculo central grande, inflado o ligeramente comprimido lateralmente, y están desprovistos de alas. Además, el embrión en *Toulisia* presenta el cotiledón externo curvo y el interno con un pliegue, mientras en *Porocystis* ambos cotiledones son rectos (RADLKOFER, 1932; ACEVEDO-RODRÍGUEZ, 1998).

RADLKOFER (1932) en la monografía de la familia reconoció para el género *Toulisia* 14 especies distribuidas en cuatro secciones, una de ellas de posición incierta por carecer de flores el único material disponible sobre el cual se basó la descripción de la especie. Los caracteres de valor diagnóstico para reconocer las secciones están dados por la morfología floral. Posteriormente, *T. acuminata* Radlk., una de las especies incluidas en la monografía, sobre la base de caracteres del fruto y el embrión fue transferida a *Porocystis* (ACEVEDO-RODRÍGUEZ, 1998). Por otra parte, STEYERMARK (1988) describió *Toulisia anomala* para la Guayana Venezolana, la cual fue transferida luego al género *Vourana* Aubl. por ACEVEDO-RODRÍGUEZ (1997).

La mayoría de las especies de *Toulisia* son arbóreas y se encuentran en ambientes selváticos, pero existen cuatro especies arbustivas, de las cuales *T. crassifolia* Radlk. y *T. tomentosa* Radlk. son características de los cerrados de Brasil. En este país se encuentra el mayor centro de diversidad del género, ya que allí están representadas las cuatro secciones y viven once de las trece especies.

La especie del epígrafe presentada en este trabajo está basada en “*T. eriocarpa* Radlk.” (HOEHNE, 1925), la cual nunca fue publicada por Radlkoffer. En esta contribución se describe esta especie para las regiones centro-oeste y norte de Brasil, y además se presenta el análisis del polen a fin de proveer una completa descripción de la misma.

## Materiales y métodos

Este estudio está basado en la literatura y en el análisis de material de herbario. Se trabajó con materiales depositados en los siguientes herbarios: INPA, M, NY, R y S.

El polen se obtuvo de material de herbario, las muestras para microscopio óptico se acetolizaron según ERDTMAN (1966), se montaron en gelatina glicerinada y se encuentran depositadas en la Palinoteca de la Universidad Nacional del Nordeste (PAL-CTES), Argentina.

Para las mediciones se usó un microscopio óptico Leica DM LB2 binocular y se midieron 20 granos de polen. La terminología usada es la sugerida por ERDTMAN (1966) y PUNT & al. (2007). Para el análisis de la arquitectura de pared se utilizaron fotomicrografías obtenidas con un microscopio electrónico de barrido JEOL 5800 LV operando a 20 KV; se utilizaron granos acetolizados, metalizados con oro-paladio.

## Resultados

### *Toulisia radlkofferi* Ferrucci, spec. nova (fig. 1, 2)

≡ *Toulisia eriocarpa* Radlk. in Arch. Bot. São Paulo 1: 140. 1925 [nomen inval.].

**Typus: BRASIL. Mato Grosso:** Botica, Rio Jamary, IX.1918 (fl, fr joven), J. G. Kuhlmann 2129 (holo-: R!, 3 cartulinas; iso-: M!, 1 cartulina).

*Species nova T. reticulata* Radlk. affinis, sed arboribus parvis (versus 15-23 m), indumento pilis brevibus et crispatis (versus pilis adpressis), hypophyllo cum nervo medio et nervis secundariis pubescentibus (versus nervis glabris vel glabratibus), floribus cum disco unilaterali glabro vel glabrativo (versus pubescenti), fructibus cum coccorum loculis longitudine alis minoribus (versus loculis longitudine alas aequantibus) et endocarpio piloso (versus glabro) differt.

Árboles de 2-5 m de altura, sin ramificaciones, con hojas en verticilos terminales; indumento denso de pelos breves, curvos o crespos, castaño-amarillentos a ferrugíneos en ejes de la hoja y ejes de la inflorescencia; brácteas, bractéolas y sépalos seríceos. Tallo joven con médula fistulosa, con lenticelas lineares, pequeñas y ferrugíneas, distribuidas también en ejes de la hoja. Hojas: pecíolo subterete, base foliar ensanchada, de 10-33 cm long.; lámina abruptamente paripinnada con 18-21 folíolos alternos; raquis subterete, estriado, en la porción apical semiterete bicanaliculado, ca. 50 cm long., de 2,5-4,5 mm diá.; pecíolo 3-10 mm long., bicanaliculado, ensanchado en la base; folíolos subcoriáceos, algo discoloros, asimétricos, en parte súculos, algo ampollosos, con la semi-lámina interna más ancha; ovado-lanceolados, 15,5-24 × 3,5-6 cm; base redondeado-cuneada, ápice en acumen agudo, margen entero, subrevoluto, epífilo con venas amarillentas, venación reticulada bastante cerrada, glabro, vena media algo sobresaliente, hipofilo verde pálido, vena media prominente, venas secundarias oblicuas, 18-20 pares, castaño-amarillentas, prominentes, opaco, glabrescente, pubérulo sobre venas principales, pelos breves, curvos o crespos, venación broquidodroma. Tirso dobles o pleiotirso, subterminales, con el eje principal de hasta 60 cm long., de 6,5-7 mm diá. en la base hasta 2,5 mm diá. en la porción apical, inflorescencias parciales glomeruliformes, plurifloras, con pedúnculo de hasta 1 mm long., distanciadas entre sí en los ejes laterales, pedicelos




Fig. 1. – *Toulicia radlkoferi* Ferrucci. A. Hoja; B. Porción de inflorescencia; C. Flor estaminada, sólo conserva un sépalo, desprovista de pétalos, se aprecia el hemidisco nectarífero; D. Pétalo, cara interna; E. Fruto inmaduro.

[A, E: Kuhlmann 2129, M; B-D: Forero & Wrigley 7050, M] [Dibujo de Laura Simón, Corrientes]

floral ca. 2 mm long., en el fruto 3-4 mm long., articulado poco por encima de la mitad, veloso; brácteas triangulares, 1-2 mm long., bractéolas conformes, menores. Flores estaminadas, 6-7 mm long.; 2 sépalos externos ovados, cuculados, ápice obtuso, ca. 3 × 2,5 mm, cara adaxial glabra, abaxial sericea; 3 internos ovado-suborbiculares, 3-3,5 × 3 mm, cara abaxial sericea en 3/4 proximales, margen con pelos glandulares y no glandulares. Pétalos 4, blanquecinos, ca. 4 × 2 mm, vellosos en ambas caras, escama ventral con dos apéndices filiformes que sobrepasan al pétalo. Hemidisco nectarífero, glabro o glabrescente. Estambres 8, en la flor estaminada de 3-5,8 mm long., filamento acintado, veloso en 3/4 proximales, antera oblonga. Pistilodio ca. 0,8 mm long., piloso en vena dorsal. Flor pistilada no vista. Fruto esquizocárpico, subcartáceo, de contorno oblongo- u ovado-ancho, 24-27 × 13-16 mm a la altura de la porción seminífera, en la base 17,5-18 mm lat., 3 mericarpos samaroideos, con la porción seminífera apical semiorbicular, el estílo de ca. 3 mm long., escotadura apical incurva con ramas del estílo parcialmente separadas, lóculos hinchados sin constricción debajo de los mismos y alas descendentes; epicarpo pubescente, pelos amarillentos, pubescencia más densa sobre los lóculos, endocarpo subreticulado piloso, pelos breves, erectos. Semilla inmadura, inserta en la mitad del lóculo. Granos de polen isopolares, tricolporados, medianos, subesferoidales-suboblatos a prolato-esferoidales, el eje polar (16,5)-30,93 (-38,75) µm, diádm. ecuatorial (19-)34,37(-37,5) µm; sexina tecida, rugulada con nanoporaciones, el colpo con membrana apertural con microgránulos.

*Distribución, ecología y fenología.* – *Toulisia radlkoferi* estaría restringida a Brasil, donde se encuentra en los estados de Mato Grosso, Rondonia y Acre. El material estudiado la documenta para la selva ribereña y para la vegetación secundaria al costado del camino. Florece entre agosto y septiembre, con frutos inmaduros en septiembre.


*Etimología.* – El epíteto específico es en honor a Ludwig Adolph Timotheus Radlkoffer, el eximio taxónomo que realizó la monografía de la familia a nivel mundial.

*Especímenes adicionales examinados.* – **BRASIL. Acre:** Boca do Acre, Rios Purus & Acre, capoeira on high ground behind terra firme, opposite Boca do Acre, Rio Purus, 19.IX. 1966 (fl/fr immature), G. T. Prance & al. 2402 (INPA, NY, R, S). **Rondonia:** Porto Velho to Cuiabá highway, 6 km south of Ariquemes, 14.VIII.1968 (fl), E. Forero & B. L. Wrigley 7050 (INPA, M, NY, S).

Este taxón fue inicialmente reconocido en 1922 como una nueva especie por Radlkoffer, sobre la base de un espécimen de herbario depositado en M, que le fuera enviado por el botánico F. C. Hoehne, aunque nunca publicó su hallazgo. En 1925, HOEHNE publica un artículo sobre las Sapindaceas Mattogrossenses, en el cual enumera y provee de un breve comentario de los especímenes coleccionados en el estado de Mato Grosso

durante la construcción de las líneas telegráficas; la implantación de las mismas fue encargada al militar Cândido Mariano da Silva Rondon. Entre las especies citadas figura el nombre “*Toulisia eriocarpa* Radlk. nov. sp.”, acompañado de la transcripción de parte de los datos de la etiqueta “Arvore erecta, sem ramificações, que, pelo seu aspecto, muito se parece com a *Sohnregia excelsa*, da familia das *Rutaceas*, últimamente descoberta na Amazonia peio Sr. George Huebner, de Manáos”. El sólo carácter “árbol erecto sin ramificaciones” no es diagnóstico para especies en *Toulisia*. Más adelante HOEHNE señala “Onde o Dr. Radlkoffer descreveu esta e as demais novas especies desta colleccão, ainda não é possível dizer” lo que evidencia su convicción, errada, de que la especie ya había sido publicada anteriormente por el mencionado autor. Finalmente, una nota al principio del artículo da la siguiente precisión: “As novas especies fóram publicada na Europa”, lo cual indica que Hoehne no tiene intención de validar los nuevos nombres. Por lo tanto, *T. eriocarpa* tal como aparece en el trabajo de HOEHNE (1925) es inválido. Llama la atención que fuera ignorada por Radlkoffer al considerar el género en la monografía de la familia (RADLKOFER, 1932). A pesar de ser un nomen nudum, el nombre de *T. eriocarpa* fue registrado en el Suplemento VII del “Index Kewensis” (HILL, 1929). Además, la especie ha sido conocida a través de una excelente fotografía del ejemplar Kuhlmann 2129 (bajo Hoehne 2129) en M, distribuida por el Field Museum of Natural History (F).

*Toulisia radlkoferi* pertenece a la sección *Toulisia* (≡ sect. *Eutoulisia* Radlk.) que se caracteriza por las flores con 4 pétalos, el apéndice basal profundamente bifido, el hemidisco nectarífero, las inflorescencias con las flores reunidas en gomérulos y los folíolos enteros, grandes y numerosos. Entre sus congéneres, la especie más afín es *T. reticulata* Radlk., especie hasta ahora citada para Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil (RADLKOFER, 1932; KILLEEN & SCHULENBERG, 1998; JØRGENSEN, 1999; DALY & al., 2008), con quien comparte el indumento en ejes de la inflorescencia, brácteas, bractéolas y sépalos, el pecíolo y raquis subteretes, el número de folíolos, éstos algo discoloros, con la venación reticulada bastante cerrada como así también la textura, forma y asimetría de los mismos. Sin embargo *T. radlkoferi* se distingue de *T. reticulata* por el porte, arbólito de 2-5 m de altura (contra árbol de 15-23 m en *T. reticulata*), por el indumento constituido por pelos crespos (contra pelos adpresos), por el hipofilo con venación principal pubescente (contra venación principal glabra o glabriúscula), por las flores con el disco unilateral glabro o glabriúsculo (contra disco pubescente), por los frutos con una relación porción seminífera/ala de 1: 2,5 (contra una relación 1: 1) y por el endocarpo piloso (contra endocarpo glabro).



**Fig. 2.** – *Toulicia radlikoferi* Ferrucci. Fotomicrografías obtenidas con microscopio electrónico de barrido. **A.** Grano de polen, vista polar; **B.** Grano de polen, vista ecuatorial; **C.** Detalle de vista polar, mostrando la sexina rugulada con nanoporaciones.

[Forero & Wrigley 7050, M]

#### Clave para la identificación de las especies de *Toulicia* Aubl. sect. *Toulicia*

1. Raquis foliar lateralmente complanado, vena media prominente en el lado abaxial. Sépalos externos ovado-agudos. Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana Francesa y Brasil (Acre)..... *T. guianensis* Aubl.
- 1a. Raquis foliar terete o subterete. Sépalos externos nunca ovado-agudos ..... 2
2. Hemidisco nectarífero glabro o glabriúsculo ..... 3
- 2a. Hemidisco nectarífero pubescente ..... 4
3. Árbol de 7-25 m de altura. Folíolos elípticos. Pétalos ca. 3,5 mm long., porción apical del apéndice petalífero de menor longitud que el pétalo. Frutos obovados. Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana Francesa y Brasil (Roraima) ..... *T. pulvinata* Radlk.
- 3a. Arbolito de 2-5 m de altura. Folíolos ovado-lanceolados. Pétalos ca. 4 mm long., porción apical del apéndice petalífero de mayor longitud que el pétalo. Frutos ovado-subrectangulares. Brasil (Acre, Rondonia, Mato Grosso) ..... *T. radlikoferi* Ferrucci
4. Árbol de 15-23 m de altura. Folíolos ovado-lanceolados, planos, cartáceos, asimétricos. Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil (Acre) ..... *T. reticulata* Radlk.
- 4a. Arbolitos. Folíolos elípticos u oblongos, coriáceos ..... 5
5. Folíolos oblongos, asimétricos, ampollosos. Brasil (Amazonas) ..... *T. bullata* Radlk.
- 5a. Folíolos elípticos, subsimétricos, planos. Brasil (Amazonas) ..... *T. elliptica* Radlk.

#### Agradecimientos

Agradezco a J. Fontella Pereira por la corrección de la diagnosis en latín, a Massimiliano Dematteis y especialmente a Susana Martínez por la consulta nomenclatural, a Laura Simón por la preparación de la lámina y a Walter Medina por la digitalización de las imágenes. La revisión del material en los herbarios europeos citados fue posible gracias a una Beca de la Myndel Botanica Foundation. Este trabajo ha sido subsidiado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (PIP 6000) y por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste (PI 038/06).

#### Referencias

- ACEVEDO-RODRÍGUEZ, P. (1997). Novelties in Neotropical Sapindaceae. *BioLlania* 6: 143-151.
- ACEVEDO-RODRÍGUEZ, P. (1998). Novelties in Neotropical Sapindaceae II. Notes on Averrhooidium, Serjania, and Porocystis. *Novon* 8: 105-106.
- DALY, D. C., M. SILVEIRA & E. J. FERREIRA (2008). Preliminary Checklist of the Flora of Acre, Brazil. [<http://www.nybg.org/bsci/acre/www1/checklist.html>]
- ERDTMAN, G. (1966). *Pollen morphology and plant taxonomy. Angiosperms*. New York.
- HILL, A. W. (1929). *Index Kewensis Plantarum Phanerogamarum, Supplementum VII*. London.
- HOEHNE, F. C. (1925). Sapindaceas Mattogrossenses. *Arch. Bot. São Paulo* 1: 131-142.

JØRGENSEN, P. M. (1999). Sapindaceae. In: JØRGENSEN, P. M. & S. LEÓN-YÁÑEZ (ed.), Catalogue of the Vascular Plants of Ecuador. *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 75: 882-888.

KILLEEN, T. J. & T. S. SCHULENBERG (1998). A biological assessment of Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Bolivia. *RAP Working Papers* 10: 1-272.

PUNT, W., P. P. HOEN, S. BLACKMORE, S. NILSSON & A. LE THOMAS (2007). Glossary of pollen and spore terminology. *Rev. Paleobot. Palynol.* 143: 1-81.

RADLKOFER, L. (1878). Ueber Sapindus und damit in Zusammenhang stehende Pflanzen. *Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. München* 8: 221-408.

RADLKOFER, L. (1932). Sapindaceae. Toulicia. In: ENGLER, A. (ed.), *Pflanzenr.* 98: 618-629.

STEYERMARK, J. A. (1988). Toulicia. Flora of the Venezuelan Guayana-V. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 75: 1076.