

Zeitschrift: Cahiers d'archéologie romande
Herausgeber: Bibliothèque Historique Vaudoise
Band: 150 (2014)

Artikel: Les restes animaux du site du Mormont : Eclépens et La Sarraz, Canton de Vaud, vers 100 avant J.-C.
Autor: Méniel, Patrice
Anhang: Inventaire des restes animaux par dépôt
Autor: Méniel, Patrice
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-835630>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

MORMONT II

LES RESTES ANIMAUX

CAR 150

Fichier PDF
Lausanne 2014

Inventaire des restes animaux par dépôt






Cette étude présente les restes animaux recueillis dans 204 fosses fouillées entre 2006 et 2011. Les mammifères domestiques sont au nombre de 335, alors que les oiseaux et les mammifères sauvages sont très rares.

On note la présence de grands boeufs et de grands chevaux, mais l'essentiel consiste en petits animaux typiques de la fin de l'âge du Fer. À l'exception des porcs, morts en majorité entre six mois et un an, les mammifères ont fait l'objet de modalités de gestion (âges

et sexes) guère différentes de celles d'un cheptel. Certains animaux ont été consommés. Les mandibules et les scapula de bœufs sont présentes en grand nombre. D'autres animaux ont été retrouvés sous forme de squelettes, parfois incomplets, enfouis dans un état de décomposition plus ou moins avancé. La présentation d'une cinquantaine de fosses permet d'illustrer la diversité des dépôts et des associations; l'intégralité du corpus figure sur le CD inséré dans la couverture.

L'analyse de la distribution des restes animaux révèle une organisation d'ensemble, avec des amas culinaires à la périphérie, et des squelettes plus fréquents vers le centre; quant aux crânes, présents au nord-est et absents au sud-ouest, ils permettent de scinder le site en deux zones. L'interprétation envisage deux hypothèses, celle d'un lieu de culte et celle d'un camp de réfugiés, d'assiégés ou d'un groupe en transit.



LES RESTES ANIMAUX DU SITE DU MORMONT
Eclépens et La Sarraz, canton de Vaud, vers 100 avant J.-C.

CAHIER D'ARCHÉOLOGIE ROMANDE N° 150

MORMONT II

PATRICE MÉNIEL

LES RESTES ANIMAUX DU SITE DU MORMONT
ECLÉPENS ET LA SARRAZ, CANTON DE VAUD, VERS 100 AVANT J.-C.

À François Poplin, sans qui ce volume ne serait pas.

LAUSANNE 2014

Volume préparé et mis en forme par Cécile Méniel

Avant propos

Ce volume est consacré à la présentation de l'ensemble des dépôts d'ossements du site. Il est organisé par dépôts (ensemble mobilier = EM), mais présente également les restes non localisés dans les fosses (vrac).

Chaque ensemble est présenté par le biais d'un certain nombre de données générales : altitude par rapport au fond de la fosse, épaisseur, profondeur, nombre et masse des restes.

Viennent ensuite des inventaires par espèces et par catégories de vestiges, en distinguant les squelettes, les ensembles anatomiques et les ossements, comme cela a été fait dans le texte.

Les photos, lorsqu'elles sont disponibles, sont présentées.

La présentation a été standardisée afin de faciliter la lecture et la recherche des données, mais cela compte tenu de la grande diversité des ensembles, conduit à faire côtoyer des fiches assez clairsemées avec d'autres beaucoup plus fournies.

Les silhouettes, en jaune pour les ossements et en gris pour les squelettes, symbolisent les nombres minimum d'individus de fréquence (NMI) par dépôt. On constatera parfois que les estimations d'âges ou de sexe font état d'un nombre de sujets supérieur à ce NMI établi sur l'os le plus fréquent, c'est qu'il s'agit alors d'un NMI de combinaison, ce que nous n'avons pas fait, du fait de l'incohérence introduite.

Les fréquences entre espèces ont été représentées en regard de celles obtenues sur l'ensemble des restes du site qui servent de référence. Ces représentations ont été réalisées pour les dépôts comportant plus d'une quarantaine de restes déterminés ; les effectifs figurent systématiquement sur ces figures. Les écarts avec les valeurs moyennes du site sont illustrés par des silhouettes, en rouge lorsqu'il y a un sur effectif, en blanc lorsqu'on est à l'équilibre et en bleu pour les déficits. Ces écarts ont été estimés de manière relative, en tenant compte notamment du nombre de données.

Les distributions anatomiques des restes de bovins ont été représentées selon les mêmes principes, avec la comparaison aux moyennes du site, pour les séries de plus d'une trentaine de restes.

DÉPÔT 17-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,38 m
 épaisseur du dépôt : 0,02 m
 altitude par rapport au fond : 0,90 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 43 g PR déterminés : 43 g



INVENTAIRE

- bœuf : calcanéum G, métacarpe D

DÉPÔT 20-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 1,5 m
 NR total : 2 NR déterminés : 1
 PR total : 494 g PR déterminés : 490 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule D, coxal (490 g).
 - un reste indéterminé (grand mammifère, 4 g)

Âge

bœuf : un de 11 ans

DÉPÔT 21-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 3,80 m
 épaisseur du dépôt : 0,10 m
 altitude par rapport au fond : 0,25 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 15 g PR déterminés : 15 g



INVENTAIRE

- bœuf : côte G

DÉPÔT 21-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 3,80 m
 épaisseur du dépôt : 0,90 m
 altitude par rapport au fond : 0,45 m
 NR total : 9 NR déterminés : 5
 PR total : 158 g PR déterminés : 148 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, côte, humérus droit et métapode (148 g).
 - ours : crâne entier d'adulte, un condyle sectionné, des coups sur le palais (non pesé).
 - 4 indét. (10 g).



Fosse 21, EM2 (décapage 2)

DÉPÔT 21-VRAC(2006)

NR total : 7 NR déterminés : 2
 PR total : 181 g PR déterminés : 149 g




INVENTAIRE

- bœuf : métacarpe D (29 g).
- cheval : radius G (120 g).
- 5 indét. (32 g).

DÉPÔT 22-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,44 m
 épaisseur du dépôt : 0,21 m
 altitude par rapport au fond : 1,11 m
 NR total : 20 NR déterminés : 9
 PR total : 825 g PR déterminés : 777 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, incisive, axis, côte
- cheval : atlas, 3 côtes


Ensembles anatomiques
 bœuf : paire de mandibule

Âges

bœuf : un de 4,5 ans et un de plus de 12 ans

DÉPÔT 22-VRAC (2006)

NR total : 20 NR déterminés : 10
 PR total : 825 g PR déterminés : 777 g



INVENTAIRE

- bœuf : une mandibule D, incisive, une axis et une côte (694 g)
- cheval : atlas et 3 côtes (83 g)
- 10 indét. (48 g)

Ensemble anatomique
 bœuf : une paire de mandibules

DÉPÔT 26-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 1,21 m
 épaisseur du dépôt : 0,15 m
 altitude par rapport au fond : 0,05 m
 NR total : 1589 NR déterminés : 677
 PR total : 2821 g PR déterminés : 1918 g



INVENTAIRE



os non brûlés :

- bœuf : 6 dents, humérus, 2 malléolaires, 2 tarses, phalange I (59 g).
- porc : 3 dents, métacarpe, phalange I (13 g).
- caprinés : mandibule, 8 dents, humérus, ulna D, métatarse (32 g).
- cheval : 2 métapode latéraux, sésamoïde (7 g).
- 297 indétt. (176 g).



os calcinés :

- bœuf : 23 mandibules, 5 nasaux, 10 chevilles, 27 éclats de crâne, 26 cervicales, 6 thoraciques, 4 lombaires, 4 coccygiennes, 39 côtes, cart. costal, 34 os longs, 8 scapula, 16 humérus, 8 radius, coxal, 13 tibia, 2 talus, 4 calcanéum, 2 carpes, 4 tarses, 14 métapodes, 6 phalanges I, phalange III (1470 g).
- porc : 14 mandibules, 4 dents, 5 frgts de crâne, thoracique, 2 lombaires, 5 côtes, 5 os longs, scapula, 3 ulna, 7 coxaux, 4 tibia, calcanéum, phalange II (112 g).
- caprinés : mandibule, zygomatique, thoracique, lombaire, 8 côtes, 2 os longs, 2 scapula, 8 radius, 2 ulna, coxal, fémur, 6 métapodes, 2 phalanges I (48 g).
- chien : métapode (1 g).
- 912 indétt. (903 g).

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



DÉPÔT 26-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 1,21 m
 épaisseur du dépôt : 0,23 m
 altitude par rapport au fond : 0,29 m
 NR total : 293 NR déterminés : 146
 PR total : 1857 g PR déterminés : 1507 g



INVENTAIRE

os non brûlés :

- bœuf : paire de mandibules, 2 mandibules, maxillaire G, molaire, scapula, humérus D, radius G, tibia G, talus D, 2 calcaneums G, 2 carpes, naviculaire, tarse, métatarse G, 2 phalanges III (779 g).
- porc : 2 molaires, temporal G, coxal, fémur G (24 g).
- caprinés : mandibule D, 3 molaires (21 g).
- 89 indét. (404 g).


os calcinés :

- bœuf : 3 mandibules, prémaxillaire, 2 dents, temporal, occipital, frgt de crâne, thoracique, 2 lombaires, 2 coccygiennes, disque vert., 4 côtes, scapula, humérus, 2 tibia, 2 phalanges II, phalange III (258 g).
- porc : molaire, scapula D, humérus D (21 g).
- 147 indét. (350 g).



Âges

bœuf : un de 2,5 ans et un de 9 ans
 capriné : un de 6 ans

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



DÉPÔT 26-VRAC (2006)

NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 9 g PR déterminés : 9 g



INVENTAIRE

os calcinés :

- bœuf : côte (2 g).
- porc : coxal G (7 g).

DÉPÔT 37-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 1,60 m
 épaisseur du dépôt : 0,45 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 2 NR déterminés : 1
 PR total : 89 g PR déterminés : 77 g



INVENTAIRE

- bœuf : scapula gauche (cassée) (77 g)
- 1 indét. (12 g).

DÉPÔT 37-VRAC (2006)

NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 35 g PR déterminés : 35 g



INVENTAIRE

- bœuf : côte, scapula droite (35 g).



Fosse 37, EM1 (Décapage 1)

DÉPÔT 39-EM4 (2006)

profondeur de la fosse : 4,49 m
 épaisseur du dépôt : 0,04 m
 altitude par rapport au fond : 4,10 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 25 g PR déterminés : 25 g



INVENTAIRE

- bœuf : un éclat de coxal et un fragment de métatarse

DÉPÔT 39-VRAC (2006)

NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 107 g PR déterminés : 107 g



INVENTAIRE

- bœuf : une cheville, la moitié distale d'un humérus

DÉPÔT 42-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,67 m
 épaisseur du dépôt : 0,25 m
 altitude par rapport au fond : 0,02 m
 NR total : 9 NR déterminés : 9
 PR total : 481 g PR déterminés : 481 g



Fosse 42, EM1 (Décapage 7)

INVENTAIRE

- bœuf : 2 cervicales, thoracique, côte, 2 radius, 2 sésamoïdes (141 g).
- caprinés : **squelette** sans tête d'une chèvre juvénile (entre 9 et 15 mois)(340 g).

Âge

caprinés : un de 12 mois

DÉPÔT 42-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,67 m
 épaisseur du dépôt : 0,88 m
 altitude par rapport au fond : 0,49 m
 NR total : 12 NR déterminés : 7
 PR total : 1359 g PR déterminés : 1358 g



Fosse 42, EM2 (Décapage 5)

INVENTAIRE

- bœuf : occipital, cervicale, radius, coxal (185 g).
- porc : vertèbre (9 g).
- **squelette** complet de jument de 12 ans environ. (1,14 m)(1157 g).
- 5 indét. (11 g).

Âge

cheval : un de 13 ans

Sexe

cheval : une femelle

DÉPÔT 42-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 2,67 m
 épaisseur du dépôt : 0,24 m
 altitude par rapport au fond : 1,38 m
 NR total : 12 NR déterminés : 6
 PR total : 317 g PR déterminés : 312 g



INVENTAIRE

- bœuf : cervicale, scapula D, coxal G, fémur D, frgt de fémur (276 g).
- caprinés : scapula G (6 g).
- 6 indét. (5 g).

DÉPÔT 42-VRAC (2006)

NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 1 g PR déterminés : 1 g



INVENTAIRE

- porc : carpe

DÉPÔT 43-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : ? (fond non atteint)

NR total : 11 NR déterminés : 6

PR total : 376 g PR déterminés : 352 g



INVENTAIRE

- bœuf adulte : mandibule D, côte, tibia D et métatarse G (227 g).

- cheval adulte : humérus G et métacarpe G (125 g).

- 5 indét. (24 g).

Âge

bœuf : un de 4,5 ans

DÉPÔT 43-EM2 (2006)

NR total : 1 NR déterminés : 0

PR total : 1 g

DÉPÔT 44-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 1,50 m

épaisseur du dépôt : 0,50 m

altitude par rapport au fond : 0,30 m

NR total : 2 NR déterminés : 2

PR total : 11 g PR déterminés : 11 g



INVENTAIRE

- bœuf : phalange I (8 g).

- porc : talus (3 g).

DÉPÔT 44-vrac (2006)

NR total : 1 NR déterminés : 0

DÉPÔT 45-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,87 m
 épaisseur du dépôt : 0,75 m
 altitude par rapport au fond : 0,38 m
 NR total : 26 NR déterminés : 15
 PR total : 598 g PR déterminés : 571 g

**INVENTAIRE**

- cheval : **squelette** d'un grand cheval mâle de 10 ans, 1,47 m. Il manque le membre pelvien droit, retrouvé dans la fosse 74.
- bœuf : occipital, mandibule D, thoracique, côte, radio-ulna D, ulna G, 2 coxaux, calcaneum, phalange I (473 g).
- caprinés : 2 lombaires, humérus G, 2 fémur (37 g).
- 11 indét. (27 g)

Âge

cheval : un de 10 ans

Sexe

cheval : un mâle

DÉPÔT 45-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,87 m
 épaisseur du dépôt : 0,03 m
 altitude par rapport au fond : 2,35 m
 NR total : 8 NR déterminés : 8
 PR total : 109 g PR déterminés : 109 g

**INVENTAIRE**


- bœuf : cheville, maxillaire, lombaire, côte, coxal, métatarse (102 g).
- porc : talus D (3 g).
- caprinés : humérus G (4 g).



Fosse 45, EM 1 (décapage 2)

DÉPÔT 46-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 0,67 m
 épaisseur du dépôt : 0,20 m
 altitude par rapport au fond : 0,30 m
 NR total : 641 NR déterminés : 26
 PR total : 500 g PR déterminés : 147 g

**INVENTAIRE**

os calcinés :

- bœuf : 4 chevilles, 4 cervicales, disque vertébral, radius, coxal D, 2 carpes, métatarse, phalange II (100 g).
- porc : 2 éclats de maxillaires, thoracique, scapula, 2 coxaux, carpe (22 g).
- caprinés : coxal D (3 frgts), tibia (25 g).
- 615 indét. (353 g)

Sexes

bœuf : une femelle
 capriné : une femelle



Fosse 46, EM 1 (décapage 1)

DÉPÔT 49-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,76 m
 épaisseur du dépôt : 0,02 m
 altitude par rapport au fond : 1,30 m
 NR total : 23 NR déterminés : 23
 PR total : 981 g PR déterminés : 981 g

**INVENTAIRE**

- bœuf : cheville, cervicale, côte, scapula D, humérus D, radius D, radius G, ulna, coxal G, tibia G (2 frgts), talus G, méta-carpe G, 2 phalange I (773 g)
- porc : molaire, pariétal, sacrée, tibia G (37 g)
- caprinés : frgt de crâne, fémur G (11 g)
- cheval : métatarse et phalange I (160 g)

Sexes

bœuf : un châtré et une femelle

DÉPÔT 51-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 5,57 m
 épaisseur du dépôt : 0,10 m
 altitude par rapport au fond : 2,70 m
 NR total : 3 NR déterminés : 3
 PR total : 42 g PR déterminés : 42 g



INVENTAIRE

- bœuf : métapode (10 g).
 - cheval : cervicale, scapula (32 g).

DÉPÔT 51-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 5,57 m
 épaisseur du dépôt : 0,06 m
 altitude par rapport au fond : 3,77 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 137 g PR déterminés : 137 g



INVENTAIRE

- bœuf : humérus D

DÉPÔT 51-EM4 (2006)

profondeur de la fosse : 5,57 m
 épaisseur du dépôt : 0,05 m
 altitude par rapport au fond : 4,05 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 124 g PR déterminés : 124 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule D

DÉPÔT 51-EM5 (2006)

profondeur de la fosse : 5,57 m
 épaisseur du dépôt : 0,05 m
 altitude par rapport au fond : 5,10 m
 NR total : 156 NR déterminés : 16
 PR total : 154 g PR déterminés : 87 g



INVENTAIRE

- bœuf : 13 frgts de crâne, scapula, humérus (86 g).
 - porc : dent (1 g).
 - 140 indét. (67 g).

DÉPÔT 52-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 3,77 m
 épaisseur du dépôt : 0,07 m
 altitude par rapport au fond : 1,40 m
 NR total : 1 NR déterminés : 0
 PR total : 1 g

DÉPÔT 52-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 3,77 m
 épaisseur du dépôt : 0,24 m
 altitude par rapport au fond : 1,56 m
 NR total : 31 NR déterminés : 5
 PR total : 152 g PR déterminés : 143 g



INVENTAIRE

- bœuf : thoracique, côte, carpe, métatarse (83 g)
- porc : mandibule G (60 g)
- 26 indét (9 g)

Âge

porc : un de 15 mois

Sexe

porc : une femelle

DÉPÔT 52-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 3,77 m
 épaisseur du dépôt : 0,18 m
 altitude par rapport au fond : 1,84 m
 NR total : 4 NR déterminés : 4
 PR total : 450 g PR déterminés : 450 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule G, scapula, humérus D, carpe

Âge

bœuf : un de 8 ans

DÉPÔT 53B-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 5,10 m
 épaisseur du dépôt : 0,10 m
 altitude par rapport au fond : 1,20 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 190 g PR déterminés : 190 g



INVENTAIRE

- bœuf : tibia D (170 g).
- Loup juvénile : paire de maxillaires et mandibules cassées = tête osseuse (20 g).
- bœuf : côte, phalange I

ensemble anatomique :

- loup : tête osseuse (détruite lors d'un éboulement)

DÉPÔT 60-vrac (2006)

NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 12 g PR déterminés : 12 g



INVENTAIRE

- bœuf : phalange II (9 g)
- porc : atlas (3 g)

DÉPÔT 63-EM1 (2006-8)

profondeur de la fosse : 3,32 m
 épaisseur du dépôt : 0,15 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 19 NR déterminés : 2




INVENTAIRE

- bœuf : scapula
- caprinés : lombaire
- 17 indét.

DÉPÔT 63-vrac (2006-8)

NR total : 6 NR déterminés : 5
 PR total : 542 g PR déterminés : 405 g



INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules G, mandibule D, talus G (469 g)
- cheval : dent jugale inf. (36 g)
- 1 indét. (37 g)

Âge

bœuf : un de 2,5 ans

DÉPÔT 68-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,28 m
 épaisseur du dépôt : 0,10 m
 altitude par rapport au fond : 0,40 m
 NR total : 91 NR déterminés : 11
 PR total : 172 g PR déterminés : 122 g



INVENTAIRE

- bœuf : cervicale, mandibule, 2 côtes, radius (91 g).
- caprinés : maxillaire, 2 prémolaires, molaire (24 g).
- chien : cervicale, scapula G (7 g).
- 80 indéts. (50 g).

DÉPÔT 68-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,28 m
 épaisseur du dépôt : 0,60 m
 altitude par rapport au fond : 0,90 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 15 g PR déterminés : 15 g



INVENTAIRE

- bœuf : phalange I

DÉPÔT 68-vrac (2006)

NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 88 g PR déterminés : 88 g



INVENTAIRE

- bœuf : tibia cassé

DÉPÔT 73-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,27 m
 épaisseur du dépôt : 0,32 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 6 NR déterminés : 1



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule



Fosse 73, EM1 (décapage 1A)

DÉPÔT 74-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,65 m
 épaisseur du dépôt : 0,17 m
 altitude par rapport au fond : 0,35 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 1604 g PR déterminés : 1604 g



INVENTAIRE

bœuf : éclat fémur (10 g).

Ensemble anatomique

- cheval : patte arrière D (tibia, tarse, métatarse) du grand cheval adulte de la fosse 45 (1594 g).

DÉPÔT 74-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,65 m
 épaisseur du dépôt : 0,34 m
 altitude par rapport au fond : 0,63 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 0 g PR déterminés : 0 g



INVENTAIRE

- **squelette** de porc, truie d'un an, il manque une partie du train arrière (jambon gauche et pieds).(non pesé)

Âge

porc : un de 12 mois

Sexe

porc : une femelle



Fosse 74, EM2 (décapage 5B)

DÉPÔT 74-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 2,65 m

épaisseur du dépôt : 0,39 m

altitude par rapport au fond : 0,98 m

NR total : 22 NR déterminés : 15

PR total : 688 g PR déterminés : 681 g



INVENTAIRE

- bœuf : **squelette** complet d'un taureau d'un an, main gauche de veau. mandibule G, frgt de crâne, 2 lombaires, 3 côtes, coxal D, fémur D, calcanéum G, métatarse D (500 g).
- porc : maxillaires D et G (32 g).
- cheval : tibia G juv (10 g).
- 7 indét. (7 g).

Âges

bœuf : un de 15 mois

porc : un de 18 mois

Sexe

bœuf : un mâle



Fosse 74, EM3 (décapage 4B)

DÉPÔT 74-VRAC (2006)

profondeur de la fosse : 2,65 m
 NR total : 19 NR déterminés : 3
 PR total : 52 g PR déterminés : 37 g



INVENTAIRE

- bœuf : tibia, calcanéum, tarse (37 g).
 - 16 indét. (15 g).

DÉPÔT 77-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 4,13 m
 épaisseur du dépôt : 0,20 m
 altitude par rapport au fond : 1,03 m
 NR total : 8 NR déterminés : 6
 PR total : 174 g PR déterminés : 137 g



INVENTAIRE

- bœuf : atlas, sacrum, côte, humérus, coxal, calcanéum, phalange I (137 g).
 - 2 indét. (37 g).

DÉPÔT 77-VRAC (2006)

NR total : 4 NR déterminés : 3
 PR total : 150 g PR déterminés : 149 g



INVENTAIRE

- bœuf : éclat de crâne, côte, humérus (149 g).
 - 1 indét. (1 g).

DÉPÔT 78-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,62 m
 épaisseur du dépôt : 0,06 m
 altitude par rapport au fond : 0,81 m
 NR total : 24 NR déterminés : 8
 PR total : 220 g PR déterminés : 162 g



INVENTAIRE

- bœuf : molaire sup, thoracique, 3 côtes, 2 radius, métatarse (162 g).
 - 16 indét. (58 g).

DÉPÔT 78-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,62 m
 épaisseur du dépôt : 0,13 m
 altitude par rapport au fond : 1,36 m
 NR total : 7 NR déterminés : 3
 PR total : 51 g PR déterminés : 41 g



INVENTAIRE

- bœuf : côte, phalange I (40 g).
 - porc : incisive (1 g).
 - 4 indét. (10 g).

DÉPÔT 79-EM2 (2006-7)

profondeur de la fosse : 4,1 m
épaisseur du dépôt : 0,70 m
altitude par rapport au fond : 0,21 m
NR total : 3 NR déterminés : 2
PR total : 13452 g PR déterminés : 13446 g



INVENTAIRE

- bœuf : **squelette** complet d'une vache de 4 ans (1,14 m).
- cheval : **squelette** complet d'un cheval de deux ans.
- 1 indét. (6 g).

Âges

bœuf : un de 4,5 ans
cheval : un de 2 ans

Sexe

bœuf : un châtré




Fosse 79, EM2 (découpage B7)



Fosse 79, EM2 (découpage 2)

DÉPÔT 79-EM3 (2006-7)

profondeur de la fosse : 4,10 m
 épaisseur du dépôt : 0,51 m
 altitude par rapport au fond : 1,36 m
 NR total : 48 NR déterminés : 28
 PR total : 1247 g PR déterminés : 1176 g



INVENTAIRE

- bœuf : axis, thoracique, lombaire, 7 côtes, 3 humérus, 3 fémurs G, patella G, tibia G, tibia, métapode, 2 phalanges I (765 g).
- cheval : mandibule D, tibia D (379 g).
- porc : canine, coxal D (11 g).
- caprinés : axis, fémur (21 g).
- 20 indét. (71 g).

Sexe

bœuf : un châtré
 porc : un mâle

**DÉPÔT 79-EM4 (2006-7)**

épaisseur du dépôt : 0,61 m
 altitude par rapport au fond : 2,75 m
 NR total : 6 NR déterminés : 6
 PR total : 536 g PR déterminés : 536 g

INVENTAIRE

- bœuf : mandibule G, maxillaire D, côte, radius, coxal G, calcanéum G (536 g).

Âge

-bœuf : un de 6 ans

DÉPÔT 80-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 3,01 m
 épaisseur du dépôt : 0,31 m
 altitude par rapport au fond : 1,29 m
 NR total : 3 NR déterminés : 3
 PR total : 31 g PR déterminés : 31 g



INVENTAIRE

- bœuf : cervicale, côte, métacarpe

DÉPÔT 80-VRAC(2006)

NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 82 g PR déterminés : 82 g



INVENTAIRE

- cheval : fémur D

DÉPÔT 81-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 0,55 m
 épaisseur du dépôt : 0,11 m
 altitude par rapport au fond : 0,04 m
 NR total : 6 NR déterminés : 6
 PR total : 102 g PR déterminés : 102 g



INVENTAIRE

- bœuf : 2 éclats de crâne, scapula, humérus, phalange II (87 g).
- porc : tibia D (15 g).

DÉPÔT 83-EM1 (2006)



profondeur de la fosse : 2,42 m
 épaisseur du dépôt : 0,19 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 179 NR déterminés : 97
 PR total : 6523 g PR déterminés : 6355 g

INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules, prémaxillaire, éclat de crâne, atlas, 2 cervicales, 9 thoraciques, 5 lombaires, sacrée, coccygienne, 6 côtes, 2 cart. cost, 2 scapula, 9 humérus, 4 radius, radio-ulna, 2 coxaux, 2 fémurs, patella, 3 tibia, calcanéum, 2 carpes, 2 phalanges I, 2 phalanges II, sésamoïde (1530 g).
 - porc : lombaire, 6 côtes, scapula, humérus (40 g).

- caprinés :

- **squelette** d'un mouton immature (manque, entre autres, la tête, le radius D, les pieds ant, les 2 fémurs).
 - **squelette** de mouton, vers 5 ans, 0,58 m au garrot; il manque les pieds.
 - **squelette** partiel d'un agneau (2 épaules, gigot g), vers 2 ans
 mandibule, 5 dents, axis, cervicale, 2 côtes, 2 scapula, humérus, 2 radius, ulna G, fémur D, tibia D, 2 métacarpes, phalange I (122 g).

- 82 indét. (168 g).



Âges

bœuf : un de 2,5 ans
 caprinés : un de 4,5 ans





Fosse 83, EM1 (décapage B4)

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



■ excédant □ moyenne ■ déficit

DÉPÔT 83-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,42 m
 épaisseur du dépôt : 0,37 m
 altitude par rapport au fond : 0,22 m
 NR total : 235 NR déterminés : 69
 PR total : 2084 g PR déterminés : 1661 g



INVENTAIRE

- bœuf : **squelette** sans tête d'une vache immature, 1,06 m au garrot.
 4 mandibules, prémaxillaire, 4 frgt de crâne, incisive, prémolaire, atlas, axis, 4 cervicales, 9 thoraciques, lombaire, 3 sacrées, coccygienne, 10 côtes, 3 scapula, 4 humérus, 2 radius, 2 coxaux, 2 fémur, patella G, tibia, carpe, 2 métatarses, sésamoïde (1628 g).
- porc : thoracique, côte, tibia D (13 g).
- caprinés : 2 molaires sup, lombaire, 2 fémur (19 g).
- 166 indét. (423 g).

Âges

bœuf : un de 18 mois, un de 3 ans et un de 3,5 ans



Sexes

bœuf : deux femelles





Fosse 83, EM2 (décapage B1)

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



DÉPÔT 83-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 2,42 m
 épaisseur du dépôt : 0,05 m
 altitude par rapport au fond : 1,72 m
 NR total : 8 NR déterminés : 8
 PR total : 130 g PR déterminés : 130 g



INVENTAIRE

- bœuf : lombaire, côte, humérus G, radius, tibia, métatarse (114 g).
 - caprinés : radius, tibia (16 g).

DÉPÔT 83-VRAC (2006)

NR total : 103 NR déterminés : 89
 PR total : 1636 g PR déterminés : 1608 g



INVENTAIRE

- bœuf : 6 mandibules, maxillaire G, prémaxillaire G, 2 prémolaires, 7 molaires, 2 éclats de crâne, cheville, axis, 3 cervicales, 2 thoraciques, lombaire, 18 côtes, 3 scapula, humérus, radius, 3 coxaux, 2 tibia, talus G, 2 métacarpes, 4 métatarses, 2 phalange I (1459 g).
 - porc : 3 mandibules, 3 incisives, temporal, côte, scapula, radius G, tibia D, calcanéum D (82 g).
 - caprinés : 5 dents, scapula D, humérus G, 2 radius G, 2 tibia, métacarpe (67 g).
 - 14 indét. (28 g).

Ensemble anatomiques :

-bœuf : paire de mandibules

Âges

-bœuf : un de 18 mois, un de 2 ans et un de 3,5 ans
 -caprinés : un de 4,5 ans
 -porc : un de 6 mois et deux de 12 mois

DÉPÔT 84-EM2 (2006-7)

profondeur de la fosse : 3,45 m
 épaisseur du dépôt : 0,05 m
 altitude par rapport au fond : 2,90 m
 NR total : 5 NR déterminés : 4
 PR total : 124 g PR déterminés : 124 g



INVENTAIRE

- bœuf : cheville, scapula D, humérus G, métatarse D (124 g)
 - 1 indét.

DÉPÔT 85-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,22 m
 épaisseur du dépôt : 0,32 m
 altitude par rapport au fond : 0,08 m
 NR total : 6 NR déterminés : 6
 PR total : 313 g PR déterminés : 313 g



INVENTAIRE

- bœuf : molaire, cheville, lombaire, éclat de sacrum, fémur (231 g).
 - cheval : fémur D (82 g).

DÉPÔT 85-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,22 m
 épaisseur du dépôt : 0,20 m
 altitude par rapport au fond : 0,70 m
 NR total : 3 NR déterminés : 3
 PR total : 198 g PR déterminés : 198 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule G, coxal G (129 g).
 - cheval : tibia G (69 g).

DÉPÔT 85-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 2,22 m
 épaisseur du dépôt : 0,33 m
 altitude par rapport au fond : 1,02 m
 NR total : 1 NR déterminés : 0
 PR total : 35 g PR déterminés : 0 g

DÉPÔT 85-VRAC (2006)

NR total : 99 NR déterminés : 19
 PR total : 686 g PR déterminés : 550 g



INVENTAIRE

- bœuf : paire de mandibules, mandibule, 2 molaires, 2 chevilles, sacrum, 3 côtes, 2 humérus D, radius, talus D, métacarpe, métatarse D, phalange I, phalange II (544 g).
 - porc : coxal (6 g)
 - 80 indét. (136 g)

DÉPÔT 86-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,24 m
 épaisseur du dépôt : 0,10 m
 altitude par rapport au fond : 0,86 m
 NR total : 34 NR déterminés : 8
 PR total : 274 g PR déterminés : 105 g



INVENTAIRE

- bœuf : cheville, 2 mandibules, ulna, coxal, phalange I (183 g).
 - porc : fémur fœtus.
 - caprinés : tibia G (22 g).
 - 26 indét. (69 g).

DÉPÔT 87-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 3,06 m
 épaisseur du dépôt : 0,14 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 9 NR déterminés : 9
 PR total : 1340 g PR déterminés : 1340 g



INVENTAIRE

- bœuf : 2 crânes, maxillaire, paire de mandibules adulte, mandibule, 2 côtes, humérus G (1340 g).

Âge

bœuf : un de 8 ans



Fosse 87, EM1 (décapage A4)

DÉPÔT 87-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 3,06 m
 épaisseur du dépôt : 0,28 m
 altitude par rapport au fond : 0,34 m
 NR total : 25 NR déterminés : 16
 PR total : 376 g PR déterminés : 349 g



INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules, zygomatique, lombaire, 2 côtes, humérus, calcanéum, métatarse, 2 phalange I, phalange III (331 g).
 - porc : pariétal G et frontal (5 g).
 - caprinés : métatarse D (8 g).
 - cheval : scapula éclat (5 g).
 - 9 indét. (27 g).

Âge

bœuf : un de plus de 12 ans

Sexes

bœuf : une femelle

DÉPÔT 87-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 3,06 m
 épaisseur du dépôt : 0,17 m
 altitude par rapport au fond : 0,77 m
 NR total : 38 NR déterminés : 23
 PR total : 671 g PR déterminés : 643 g



INVENTAIRE

- bœuf : molaire, zygomatique, frgt de crâne, cervicale, thoracique, 5 côtes, 2 humérus, radius G, fémur G, tibia D, 3 métatarses, phalange I (589 g).
 - porc : scapula G, humérus D (28 g).
 - caprinés : mandibule G (16 g).
 - cheval : frgt de crâne (10 g)
 - 15 indét. (28 g).

Sexe

bœuf : une femelle

DÉPÔT 90-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 0,86 m
 épaisseur du dépôt : 0,60 m
 altitude par rapport au fond : 0,13 m
 NR total : 11 NR déterminés : 11
 PR total : 551 g PR déterminés : 551 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule D, maxillaire G, frontal, prémolaire, côte, métapode, phalange II (211 g)
- caprinés : mandibule D, zygomatique, tibia (36 g).

Ensembles anatomiques

cheval : parties d'un **squelette** d'un jeune cheval (1,14 m au garrot) : les deux pieds antérieurs, fémur et tibia G, les os du tarse D

Âge

caprinés : un de 6 ans

DÉPÔT 91-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,66 m
 épaisseur du dépôt : 0,15 m
 altitude par rapport au fond : 0,02 m
 NR total : 19 NR déterminés : 16
 PR total : 454 g PR déterminés : 452 g



INVENTAIRE

- bœuf : maxillaire G, molaire, cervicale, calcaneum G, 2 phalanges I, 2 phalanges II (209 g).
- porc : mandibule et maxillaire D (19 g).
- caprinés : humérus D, métacarpe G (18 g).
- chien : pariétal, fémur (6 g).
- 3 indét. (2 g).

Ensembles anatomiques

bœuf : cinq cervicales de bœuf en connexion (200 g).

porc : parties d'un **squelette** d'un porc (mâle, vers un an) : tête, cervicales, 2 épaules, jambon D (non pesé)

Âges

bœuf : un de 2,5 ans

porc : deux de 6 mois et un de 12 mois

Sexe

porc : un mâle

DÉPÔT 92-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,64 m
épaisseur du dépôt : 0,02 m
altitude par rapport au fond : 0 m
NR total : 3 NR déterminés : 2
PR total : 22 g PR déterminés : 15 g



INVENTAIRE

- bœuf : métatarse G (14 g).
- porc : lombaire (1 g).
- 1 indét. (7 g).

DÉPÔT 93-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 0,89 m
épaisseur du dépôt : 0,10 m
altitude par rapport au fond : 0,14 m
NR total : 5 NR déterminés : 5
PR total : 144 g PR déterminés : 144 g




INVENTAIRE

- bœuf : frgt de crâne, mandibule D, 2 prémolaires, molaire sup

DÉPÔT 94-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 4,66 m
 épaisseur du dépôt : 1,49 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 159 NR déterminés : 146
 PR total : 9653 g PR déterminés : 9607 g

**INVENTAIRE**

- bœuf : 6 mandibules, maxillaire, frontal, incisive, 2 lombaires, 2 côtes, scapula D, 2 humérus G, 2 radius, ulna, coxal D, 2 carpes, naviculaire, métacarpe G, 2 métatarses, métapode, phalange I, 2 phalanges III (1586 g).
- porc : 2 mandibules, 3 incisives, frgt de crâne, scapula D, humérus G (169 g).
- caprinés : frontal, pariétal, scapula, fémur G, tibia D, naviculaire (41 g).
- cheval : deux **squelettes** de juments 13 (1,32 m) en dessous et 15 ans (1,26 m) au dessus, mais en contact étroit et partiellement distingués. Il manque une partie du sujet supérieur, partiellement amputé au décapage, mais il est probable que ces deux **squelettes** étaient complets (290 pièces, 7804 g)
- chien : ulna D (7 g).
- 13 indét. (46 g).

Âges

bœuf : trois de 18 mois
 cheval : deux de 13 ans et un de 15 ans
 porc : un de 5 mois, un de 2,5 ans

Sexes


bœuf : un mâle
 capriné : une femelle
 cheval : trois femelles
 porc : une femelle





Fosse 94, EM1 (décapage A1)

Fosse 94-EM1

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



DÉPÔT 94-VRAC (2006)

NR total : 53 NR déterminés : 3
 PR total : 148 g PR déterminés : 29 g



INVENTAIRE


- bœuf : mandibule, lombaire (27 g).
- caprinés : radius D (2 g).
- 50 indét. (119 g).

Âges

bœuf : trois de 18 mois
 cheval : deux de 13 ans et un de 15 ans
 porc : un de 5 mois, un de 2,5 ans

DÉPÔT 96-EM1 (2006-8)

profondeur de la fosse : 2,2 m
 épaisseur du dépôt : 0,42 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 242 NR déterminés : 84
 PR total : 1988 g PR déterminés : 1729 g



INVENTAIRE

- bœuf : 7 mandibules, maxillaire G, crâne, 2 frontaux, zygomatique, 3 frgt de crânes, éclat de crâne, 2 molaires, atlas, 4 thoraciques, 8 côtes, scapula, 3 humérus, 6 fémurs, carpe, 4 métacarpes, 2 métatarses, 3 métapodes, 2 phalanges III (1548 g).
- porc : occipital, 2 incisives, côte (12 g).
- caprinés : mandibule, 2 éclats de crâne, temporal, pariétal, incisive, molaire, 2 atlas, cervicale, 3 lombaires, côte, scapula D, humérus D, radius D, 2 ulna, coxal D, fémur D, métatarse, phalange I, 2 phalanges II (139 g).
- chien : paire de scapula et d'humérus (30 g).
- 158 indét. (259 g).



Âge

capriné : un de 18 mois



Sexe

capriné : une femelle

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



■ excédant □ moyenne ■ déficit

DÉPÔT 96-EM2 (2006-8)

profondeur de la fosse : 2,2 m
épaisseur du dépôt : 0,26 m
altitude par rapport au fond : 0,35 m
NR total : 88 NR déterminés : 30
PR total : 1786 g PR déterminés : 1698 g

**INVENTAIRE**

- bœuf : métatarse, naviculaire et cunéiforme (73 g).
2 mandibules, incisive, frontal, 2 zygomatiques, 2 frgts de crâne, lombaire, 5 côtes, radius D, 2 fémurs, 2 phalange II, phalanges III, sésamoïde (868 g).
- porc : canine, atlas, cervicale, lombaire (32 g).
- caprinés : 2 scapula, fémur (8 g).
- 58 indét. (88 g).

Ensembles anatomiques

- bœuf : métatarse, naviculaire et cunéiforme de bœuf (73 g).
- porc : squelette d'une truie âgée ; il manque la scapula D, les humérus, les carpes et métacarpes, le bassin et le fémur D (717 g)

Âges

- bœuf : un de 9 ans
- porc : un de 6 ans

Sexe


- porc : un mâle



Fosse 96, EM2 (décapage B4)

DÉPÔT 96-EM3 (2006-8)

profondeur de la fosse : 2,2 m
 épaisseur du dépôt : 0,20 m
 altitude par rapport au fond : 0,62 m
 NR total : 221 NR déterminés : 140
 PR total : 4569 g PR déterminés : 4383 g



INVENTAIRE

- bœuf : 11 mandibules, crâne, maxillaire G, prémaxillaire, frontal, zygomatique, occipital, cheville, frgt de crâne, 6 éclats de crâne, 5 dents, 2 atlas, 2 cervicales, 2 thoraciques, 2 lombaires, sacrée, 21 côtes, 2 scapula, 2 humérus, 3 radius, 2 coxaux, 3 fémurs, 4 tibia, talus, 4 carpes, 2 naviculaires, 2 métacarpes D, 2 métatarses, 2 phalanges I, 3 phalanges II, 5 phalanges III, sésamoïde (3242 g).
- porc : crâne ?, 2 mandibules, 2 maxillaires G, zygomatique G, temporal G, occipital G, atlas, 4 lombaires, 2 côtes, fémur, phalange III (408 g).
- caprinés : mandibule G, frontal, 5 molaires, 2 atlas, axis, 2 thoraciques, lombaire, humérus, radius, coxal, tibia, calcaneum (115 g).
- cheval : axis, 4 fémurs (618 g).
- 79 indét. (186 g).

Âges

bœuf : un de 2,5 ans, un de 3 ans, trois de 4,5 ans et un de 8 ans
 porc : un de 12 mois et un de 6 ans

Sexes

bœuf : une femelle
 porc : un mâle et une femelle

DÉPÔT 96-EM4 (2006-8)

profondeur de la fosse : 2,2 m
 épaisseur du dépôt : 0,16 m
 altitude par rapport au fond : 1,11 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 13 g PR déterminés : 13 g





Fosse 96, EM3 (décapage B2)

INVENTAIRE



- bœuf : coxal (éclat)

Fosse 96-EM3

Fréquence des animaux




Choix des parties de bœuf



■ excédant □ moyenne ■ déficit

DÉPÔT 96-VRAC (2006-8)

NR total : 28 NR déterminés : 12
 PR total : 284 g PR déterminés : 222 g



INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules, molaire, éclat de crâne, lombaire, carpe, phalange I (169 g).
- porc : 2 mandibules, canine inf, calcanéum G (47 g).
- caprinés : molaire (2 g).
- 16 indét. (62 g).

Âge
 porc : un de 11 mois

Sexes
 porc : deux mâles

DÉPÔT 101-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 1,84 m
 épaisseur du dépôt : 0,73 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 209 NR déterminés : 85
 PR total : 2517 g PR déterminés : 2503 g





INVENTAIRE



- bœuf : 5 mandibules, 2 prémaxillaires D, 3 maxillaires, occipital, zygomatique G, 2 chevilles, 3 dents, 2 axis, cervicale, thoracique, 6 lombaires, 12 côtes, scapula G, humérus, 2 radius, 3 coxaux, 3 fémurs, 2 patella, 4 métacarpes, 5 métatarses, 3 métapodes, phalange I, phalange III (2029 g).
- cheval : occipital, 7 thoraciques, 5 côtes, scapula, humérus D (241 g).
- porc : 3 molaires sup, métacarpe (16 g).
- caprinés : mandibule G (17 g).
- 124 indét. (214 g).

Âges
 bœuf : un de 4,5 ans et un de 9 ans
 porc : un de 15 mois
 capriné : un de 10 ans

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf





Fosse 101, EM1 (décapage AB2)

DÉPÔT 102-EM1 (2006)

NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 26 g PR déterminés : 26 g



INVENTAIRE

- bœuf : patella, phalange I

DÉPÔT 104-VRAC (2006)

profondeur de la fosse : 4,84 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 139 g PR déterminés : 139 g



INVENTAIRE

- bœuf : incisive, radius G

DÉPÔT 105-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 4,99 m
 épaisseur du dépôt : 0,25 m
 altitude par rapport au fond : 0,67 m
 NR total : 5 NR déterminés : 4
 PR total : 22 g PR déterminés : 18 g



INVENTAIRE

- bœuf : prémolaire inf, éclat de crâne, sésamoïde (11 g)
 - caprinés : humérus G (7 g)
 - 1 indét. (4 g)

DÉPÔT 107-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,64 m
épaisseur du dépôt : 0,34 m
altitude par rapport au fond : 0,22 m
NR total : 7 NR déterminés : 6
PR total : 200 g PR déterminés : 197 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, prémaxillaire, lombaire, 2 radio-ulna G (196 g).
- caprinés : déciduale (1 g).
- 1 indét. (3 g).

DÉPÔT 107-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,64 m
épaisseur du dépôt : 0,13 m
altitude par rapport au fond : 0,69 m
NR total : 4 NR déterminés : 4
PR total : 263 g PR déterminés : 263 g



INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules D, radius D, tibia

Âges

bœuf : un de 15 mois et un de 2 ans

DÉPÔT 107-VRAC (2006)

NR total : 9 NR déterminés : 2
PR total : 96 g PR déterminés : 68 g




INVENTAIRE

- cheval : coxal, métatarse G (68 g)
- 7 indét. (28 g)

DÉPÔT 109-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,95 m
 épaisseur du dépôt : 0,65 m
 altitude par rapport au fond : 0,30 m
 NR total : 97 NR déterminés : 58
 PR total : 4230 g PR déterminés : 4122 g



INVENTAIRE

- bœuf : 7 mandibules D, 5 mandibules G, 2 mandibules, 4 maxillaires, incisive, crâne, crâne entier, frgt de crâne, zygomatique D, temporal D, 3 chevilles, éclat de crâne, atlas, cervicale, 2 sacrées, scapula D, radius D, 4 coxaux, 5 fémurs, tibia G, carpe, calcanéum G, tarse, 2 métacarpes G, 2 phalanges I, phalange III (4085 g).
- porc : côte, fémur, tibia D (22 g)
- caprinés : radius D, fémur (15 g)
- 39 indét. (108 g).

Ensemble anatomique
 bœuf : paire de mandibule



Âges
 bœuf : un de 5 mois, un de 12 mois, deux de 2,5 ans, un de 4,5 ans et un de 8 ans

Sexe
 bœuf : un mâle





Fosse 109, EM1 (décapage A1)

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



■ excédant □ moyenne ■ déficit

DÉPÔT 109-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 2,95 m

épaisseur du dépôt : 0,42 m

altitude par rapport au fond : 1,62 m

NR total : 61 NR déterminés : 21

PR total : 849 g PR déterminés : 790 g



INVENTAIRE

- bœuf : 4 mandibules, paire de mandibules, zygomatique, cheville, frgt de crâne, 2 molaires, axis, 2 côtes, 2 scapula, fémur G, 4 métatarses (788 g).

- porc : humérus (2 g).

- 40 indét. (59 g).

Âge

bœuf : un de 2 ans

DÉPÔT 109-VRAC(2006)

NR total : 11 NR déterminés : 11

PR total : 495 g PR déterminés : 495 g



INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules D, 5 éclats de crâne, côte, 2 scapula G, métatarse

Âge

bœuf : un de 2 ans

DÉPÔT 112-EM1 (2006)



profondeur de la fosse : 2,42 m
 épaisseur du dépôt : 0,33 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 332 NR déterminés : 166
 PR total : 4419 g PR déterminés : 3547 g

INVENTAIRE

- bœuf : 20 mandibules, 2 prémaxillaires, 20 dents, nasal, 2 frontaux, zygomatique, 10 frgts de crânes, cheville, 2 cervicales, 3 thoraciques, 6 lombaires, 2 sacrées, 2 sacrum, 11 côtes, 2 scapula, 2 humérus, radius, 5 coxaux, fémur, 3 tibia, talus D, calcanéum, carpe, 2 tarses, métacarpe, 10 phalanges I, 4 phalanges II, 3 phalanges III, 2 sésamoïdes (3059 g).
- cheval : thoracique (38 g).
- porc : **"squelette** de cochon de lait en connexion mais en très mauvais état de conservation." (non prélevé) crâne et mandibules, 3 mandibules, maxillaire, 2 dents, thoracique, lombaire, côte, 3 scapula, humérus, radius G, 2 fémurs, tibia, métacarpe (261 g).
- 3 mandibules, 6 dents, cheville, axis, 2 thoracique, lombaire, scapula G, 2 humérus D, coxal, talus, calcanéum G (189 g).
- 166 indét. (872 g).

Ensemble anatomique caprinés: tibia G avec talus et calcanéum (24 g)

Âges

bœuf : un de 3,5 ans, un de 8 ans et un de 11 ans
 porc : un de 1 mois et un de 2 mois



Sexes

bœuf : un châtré, une femelle et un mâle
 porc : deux femelles
 capriné : un mâle





Fosse 112, EM1 (décapage AB3)

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



■ excédant □ moyenne ■ déficit

DÉPÔT 112-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,42 m
 épaisseur du dépôt : 0,35 m
 altitude par rapport au fond : 0,39 m
 NR total : 255 NR déterminés : 124
 PR total : 6479 g PR déterminés : 6138 g



INVENTAIRE

- bœuf : paire de pieds; main G; distum de tibia, tarse et pieds G (858 g)
 7 mandibules, dent, crâne, frontal, zygomatique, 3 chevilles, 4 cervicales, thoracique, 7 lombaires, sacrum, 3 sacrées, 20 côtes, 2 scapula, 3 humérus, 2 radius, radio-ulna D, 7 coxaux, 2 fémurs D, patella, 7 tibias, 2 talus, 5 calcanéums, carpe, 3 métacarpes, métatarse G, métapode, 5 phalanges I, 3 phalanges II, 4 phalanges III, sésamoïde (4860 g).
- cheval : coxal, tibia G (225 g).
- porc : mandibule D, incisive, atlas, 2 humérus, ulna G, métapode (90 g).
- caprinés : cheville, mandibule, lombaire, 2 radius, 2 coxaux, tibia D, métacarpe (105 g).
- 131 indét. (341 g).

Ensembles anatomiques

bœuf : paire de distum de tibia ; tarse et pieds G ; tibia, talus et calcanéum G ; métacarpe, phal I et II, G ; tarse et métatarse G (858 g)

Âges

bœuf : un de 2 ans et un de 6 ans
 porc : un de 5 ans


Sexes

bœuf : trois femelles et un mâle
 capriné : une femelle





Fosse 112, EM2 (décapages A1)

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



DÉPÔT 112-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 2,42 m
épaisseur du dépôt : 0,09 m
altitude par rapport au fond : 1,92 m
NR total : 5 NR déterminés : 2
PR total : 100 g PR déterminés : 90 g



INVENTAIRE

- bœuf : côte (6 g).
- cheval : tibia G (84 g).
- 3 indét. (10 g).

DÉPÔT 114-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 1,55 m
épaisseur du dépôt : 0,16 m
altitude par rapport au fond : 0,45 m
NR total : 10 NR déterminés : 9
PR total : 164 g PR déterminés : 159 g




INVENTAIRE

- bœuf : prémolaire, thoracique, lombaire, tarse, 2 métacarpes, 2 métatarses (156 g).
- porc : phalange I (3 g).
- 1 indét. (5 g).

DÉPÔT 115-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,05 m
 épaisseur du dépôt : 0,28 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 178 NR déterminés : 116
 PR total : 10833 g PR déterminés : 10633 g



INVENTAIRE

- bœuf : crâne entier et paire de mandibules ; cervicales I à VII, 11 thoraciques et 13 côtes (3387 g).
 8 mandibules G, paire de mandibules, hyoïde, crâne, maxillaire D, 2 frontaux, frgt de crâne, éclat de crâne, 3 chevilles, 2 molaires, hyoïde, atlas, 3 cervicales, 3 thoraciques, 2 lombaires, sacrée, coccygienne, 16 côtes, 2 scapula, 4 humérus, 6 radius, 3 ulna, 4 coxaux, 7 fémurs, patella, 2 tibias, 4 talus, 3 calcanéum, tarse, 2 carpes, 2 métacarpes, 4 métatarses, 2 phalanges I, phalange II, sésamoïde (6365g).
- cheval : 2 scapula, radius D (597 g).
- porc : calcanéum D (5 g)
- caprinés : crâne, paire de mandibules, vertèbre, côte, 2 humérus, radius D, coxal D, fémur G, tibia D, talus G, carpe, métatarse D (279 g).
- 62 indétt. (200 g)

Ensembles anatomiques

- bœuf : crâne entier et paire de mandibules ; cervicales I à VII, 11 thoraciques et 13 côtes (1747 g).


Âges

bœuf : un de 15 mois, sept de 2 ans, un de 6 ans et un de 7 ans
 capriné : un de 2 ans et un de 10 ans



Sexes

bœuf : quatre femelles

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf





Fosse 115, EM1 (décapage B4)




Fosse 115, EM1 (décapage A4)



Fosse 115, EM1 (décapage AB5)

DÉPÔT 115-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,05 m
 épaisseur du dépôt : 0,42 m
 altitude par rapport au fond : 0,30 m
 NR total : 88 NR déterminés : 47
 PR total : 1648 g PR déterminés : 1615 g

**INVENTAIRE**

- bœuf : 2 mandibules G, frgt de crâne, nasal, 3 dents, axis, 2 lombaires, 4 côtes, cart. cost., 2 scapula, humérus D, 2 radius D, 3 ulna, 2 fémurs, 2 tibia, carpe (1368 g).
- porc : frgt de crâne (27 g).
- caprinés : 2 mandibules, frontal D, 2 atlas, axis, lombaire, côte, radius D, coxal D, carpe, métacarpe G, métatarse D, phalange I, phalange II (142 g).
- cheval : éclat de crâne, cervicale (64 g).
- 41 indét. (33 g).


Ensemble anatomique
 bœuf : 2 carpes (14 g)

Âges

bœuf : un de 2,5 ans
 capriné : un de 6 ans

Sexe

capriné : une femelle

Fréquence des animaux**DÉPÔT 115-EM3 (2006)**

profondeur de la fosse : 2,05 m
 épaisseur du dépôt : 0,05 m
 altitude par rapport au fond : 1,47 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 23 g PR déterminés : 23 g

**INVENTAIRE**

- bœuf : scapula, humérus

DÉPÔT 116-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,59 m
 épaisseur du dépôt : 0,53 m
 altitude par rapport au fond : 0,76 m
 NR total : 24 NR déterminés : 13
 PR total : 393 g PR déterminés : 363 g



INVENTAIRE

- bœuf : 3 mandibules, 3 côtes, 2 radius G, phalange III (185 g).
- cheval : radius, tibia D (167 g).
- caprinés : mandibule D, molaire sup. (11 g).
- 11 indét. (30 g).

DÉPÔT 116-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,59 m
 épaisseur du dépôt : 0,05 m
 altitude par rapport au fond : 1,39 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 149 g PR déterminés : 149 g



INVENTAIRE

- bœuf : humérus G, métacarpe D

Sexe

bœuf : une femelle

DÉPÔT 116-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 2,59 m
 épaisseur du dépôt : 0,15 m
 altitude par rapport au fond : 1,54 m
 NR total : 14 NR déterminés : 13
 PR total : 762 g PR déterminés : 762 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, temporal, frgt de crâne, lombaire, 2 scapula, humérus G, tibia D, métacarpe G, métatarse G (424 g).
- caprinés : lactéale (1 g).
- cheval : radio-ulna, tibia D (337 g).
- 1 indét.

DÉPÔT 116-VRAC (2006)

NR total : 15 NR déterminés : 9
 PR total : 273 g PR déterminés : 256 g



INVENTAIRE

- bœuf : éclat de crâne, sacrum, 2 côtes, 2 fémurs D, métacarpe G, phalange I, phalange III (256 g).
- 6 indét. (17 g).

DÉPÔT 117-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,53 m
 épaisseur du dépôt : 0,18 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 12 NR déterminés : 12
 PR total : 189 g PR déterminés : 189 g




INVENTAIRE

- bœuf : 2 chevilles, 3 thoraciques, 2 métatarses D (158 g).
- porc : temporal D&G, occipital, zygomatique, fémur G (27 g).
- chien : tibia G (4 g).

DÉPÔT 117-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 2,53 m
 épaisseur du dépôt : 0,27 m
 altitude par rapport au fond : 0,32 m
 NR total : 30 NR déterminés : 25
 PR total : 3183 g PR déterminés : 3162 g



INVENTAIRE

- bœuf : 6 mandibules G, mandibule D, crâne, frontal, 4 côtes, scapula D, scapula G, humérus G, fémur G, fémur D, métacarpe D, 2 métatarses (2901 g).
- cheval : métacarpe G (28 g).
- porc : crâne, ulna D (189 g).
- caprinés : mandibule D (44 g).
- 5 indét. (21 g).

Âges


bœuf : un de 2,5 ans, deux de 4,5 ans et un de 6 ans
 capriné : un de 4,5 ans
 porc : un de 18 mois



Fosse 117, EM3 (décapages A1a)

DÉPÔT 118-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,88 m
 épaisseur du dépôt : 0,33 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 20 NR déterminés : 16
 PR total : 597 g PR déterminés : 585 g



INVENTAIRE

- bœuf : lombaire, côte, humérus G, fémur D, tibia G, phalange II (475 g)
- porc : molaire, éclat de crâne (9 g).
- caprinés : mandibule G, crâne, frgt de crâne, sacrée, côte, phalange II (95 g).
- 4 indé. (12 g).

Ensembles anatomiques

bœuf : paire de mandibules
 caprinés : tarse D en connexion (6 g)

Âges

bœuf : un de 18 mois
 capriné : un de 5 ans

Sexe

caprinés : une femelle

DÉPÔT 118-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,88 m
 épaisseur du dépôt : 0,14 m
 altitude par rapport au fond : 0,63 m
 NR total : 28 NR déterminés : 16
 PR total : 529 g PR déterminés : 492 g



INVENTAIRE

- bœuf : frgt de crâne, cervicale, coccygienne, 2 côtes, scapula D, tibia G, phalange II (365 g).
- porc : atlas, côte, humérus G (24 g).
- caprinés : mandibule G, axis, fémur, métatarse D (80 g).
- cheval : ulna G (23 g)
- 12 indé. (37 g).

Âge


capriné : un de 18 mois

Sexe

bœuf : une femelle

DÉPÔT 118-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 2,88 m
 épaisseur du dépôt : 0,27 m
 altitude par rapport au fond : 0,78 m
 NR total : 11 NR déterminés : 10
 PR total : 266 g PR déterminés : 265 g



INVENTAIRE

- bœuf : frgt de crâne, 2 côtes, 2 scapula, 2 métacarpes D (260 g).
- caprinés : dent, 2 métacarpes (4 g).
- 1 indé. (1 g).

DÉPÔT 118-EM5 (2006)

profondeur de la fosse : 2,88 m
 épaisseur du dépôt : 0,06 m
 altitude par rapport au fond : 2,10 m
 NR total : 69 NR déterminés : 16
 PR total : 287 g PR déterminés : 255 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, cheville, 9 côtes, tibia G, métapode (242 g).
- cheval : côte (4 g).
- caprinés : coxal G, métatarse G (9 g).
- 53 indét. (32 g).

DÉPÔT 119-EM1 (2006)

NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 18 g PR déterminés : 18 g



INVENTAIRE

- bœuf : occipital

DÉPÔT 121-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,71 m
 épaisseur du dépôt : 0,08 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 6 NR déterminés : 6
 PR total : 1234 g PR déterminés : 1234 g



INVENTAIRE

- bœuf : crâne (1000 g)
- caprinés : crâne, atlas, côte, scapula, radius G (234 g)

Sexes

capriné : deux femelles

DÉPÔT 121-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,71 m
 épaisseur du dépôt : 0,10 m
 altitude par rapport au fond : 0,28 m
 NR total : 10 NR déterminés : 10
 PR total : 433 g PR déterminés : 433 g



INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibule D, lombaire, coxal, (335 g)
- caprinés : humérus D, calcanéum, métatarse G, phalange I (18 g)
- cheval : métapode (10 g)

Ensemble anatomique


bœuf : pied D métatarse, naviculaire et cuboïde (70 g)

Âge

bœuf : un de 4,5 ans

DÉPÔT 126-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 3,78 m
 épaisseur du dépôt : 0,62 m
 altitude par rapport au fond : 0,01 m
 NR total : 43 NR déterminés : 43
 PR total : 2243 g PR déterminés : 2243 g





INVENTAIRE

- bœuf : maxillaire G, temporal, 2 axis, thoracique, lombaire, sacrée, 5 côtes, 5 scapula, 2 humérus G, 10 radius, 2 ulna G, 2 coxaux D, 2 tibia, calcanéum G (1991 g).
- porc : 2 mandibules, maxillaire, frontal, frgt de crâne (113 g).
- cheval : radius G (139 g).



Ensemble anatomique
 bœuf : paire de mandibules

Âges
 bœuf : un de 2 ans
 porc : deux de 18 mois

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



DÉPÔT 126-VRAC (2006)

NR total : 5 NR déterminés : 5
 PR total : 565 g PR déterminés : 565 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, 2 scapula, coxal G (555 g).
- cheval : tibia (10 g).

Âge
 bœuf : un de 4,5 ans

DÉPÔT 131-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,21 m

épaisseur du dépôt : 0,29 m

altitude par rapport au fond : 0,21 m

NR total : 26 NR déterminés : 15

PR total : 12718 g PR déterminés : 12697 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule G, maxillaire D, 2 chevilles, 2 côtes, humérus, métatarse G (464 g).

- porc : - **squelette** de truie (14 mois) ; il manque les mandibules, des vertèbres, des côtes, la scapula G, les métacarpes (190 g).- **squelette** de porc juvénile (6 mois) ; il manque la plupart des vertèbres (sauf 5 thor.), scapula D, la main G, le tibia G. mandibule G (7 g).- cheval : **squelette** complet d'une jument de 10 ans (1,16 m au garrot) (6580 g).

thoracique, côte, tarse D (35 g).

- 11 indét. (21 g)

Âges

bœuf : un de 16 mois et un de 22 mois

cheval : deux de 10 ans et un de 11 ans

porc : un de 6 mois et deux de 15 mois

Sexes

cheval : une femelle

porc : deux femelles



Fosse 131, EM1 (décapage AB2)



Fosse 131, EM1 (décapage A3)



Fosse 131, EM1 (décapage B1)

DÉPÔT 132-VRAC (2006)

profondeur de la fosse : 2,44 m

NR total : 15 NR déterminés : 7

PR total : 597 g PR déterminés : 569 g



INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules G, thoracique, humérus D, métapode (520 g)

- cheval : dent jugale inf. (34 g)

- porc : humérus G (15 g)

- 8 indét. (28 g)

Âge

bœuf : un de 2,5 ans

DÉPÔT 137-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 3,37 m

épaisseur du dépôt : 0,47 m

altitude par rapport au fond : 0,01 m

NR total : 38 NR déterminés : 27

PR total : 785 g PR déterminés : 757 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule G, 2 cervicales, 3 thoraciques, lombaire, 6 côtes, coxal, 4 tibia, tarse, métacarpe G, phalange II (678 g)

- porc : pariétal, frgt de crâne, canine inf, humérus D, ulna D (57 g)

- caprinés : radio-ulna G (22 g)

- 11 indét. (28 g)

Sexe

porc : un mâle

DÉPÔT 137-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 3,37 m

épaisseur du dépôt : 0,07 m

altitude par rapport au fond : 2,48 m

NR total : 3 NR déterminés : 3

PR total : 216 g PR déterminés : 216 g




INVENTAIRE

- bœuf : mandibule D, humérus G (196 g).

- ours : canine supérieure (20 g), remonte sur le crâne de la fosse 21.

DÉPÔT 142-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 3,04 m
 épaisseur du dépôt : 0,22 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 9 NR déterminés : 9
 PR total : 469 g PR déterminés : 469 g



INVENTAIRE

- bœuf : côte, coxal D, 2 tibia, talus D, calcanéum D (341 g).
- porc : 2 côtes (8 g).
- cheval : frgt de crâne (120 g).

Sexe

bœuf : une femelle

DÉPÔT 142-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 3,04 m
 épaisseur du dépôt : 0,34 m
 altitude par rapport au fond : 1,04 m
 NR total : 39 NR déterminés : 18
 PR total : 1302 g PR déterminés : 1262 g



INVENTAIRE

- bœuf : crâne, mandibule, temporal, éclat de crâne, 2 thoraciques, 2 côtes, scapula D, coxal D (745 g).
- cheval : mandibule, cervicale (340 g).
- porc : mandibule D, radius D, tibia G (73 g).
- caprinés : humérus G, métatarse D (104 g).
- 21 indét. (40 g).

Ensemble anatomique

cheval : paire de prémaxillaires

Âge

cheval : un de 3 ans et un de 4,5 ans

Sexe

porc : une femelle

DÉPÔT 142-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 3,04 m
épaisseur du dépôt : 0,37 m
altitude par rapport au fond : 1,62 m
NR total : 33 NR déterminés : 11
PR total : 1613 g PR déterminés : 1531 g



INVENTAIRE

- bœuf : crâne, éclat de crâne, humérus G, radius G, talus G, métatarse D, phalange I (1159 g)
- porc : mandibule D, canine inf (16 g).
- caprinés : mandibule D (6 g).
- cheval : mandibule (350 g)
- 22 indéts (82 g)

Âge

cheval : un de 12 ans

Sexes


bœuf : un châtré et une femelle
cheval : un mâle
porc : un mâle



Fosse 142, EM3 (décapage B2)

DÉPÔT 143-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 1,15 m
 épaisseur du dépôt : 0,33 m
 altitude par rapport au fond : 0,14 m
 NR total : 512 NR déterminés : 267
 PR total : 7874 g PR déterminés : 6870 g



INVENTAIRE

- bœuf : 5 mandibules D, 2 mandibules, 5 maxillaires, 8 dents, crâne, zygomatique, temporal, 2 occipitaux, 2 chevilles, 8 éclats de crâne, atlas, 2 axis, 5 cervicales, 3 thoraciques, 13 lombaires, 2 sacrées, 18 côtes, 14 scapula, 10 humérus, 6 radius, 5 ulna, 7 coxaux, 10 fémurs, 7 tibia, talus G, calcanéum G, tarse, 2 métacarpes D, 6 métatarses, 3 phalanges I, 2 phalanges II (4971 g).
- porc : paire de mandibules, 5 mandibules, maxillaire, canine sup, incisive, lombaire, 2 côtes, 5 scapula, 2 humérus, 3 radius, 2 ulna D, coxal, fémur D, 6 tibia, 3 talus, 3 calcanéums, tarse, 3 métacarpes, 3 métatarses, 3 métapodes, mp lat, 2 phalange I, phalange II (590 g).
- caprinés : 4 mandibules G, maxillaire G, 5 molaires, cervicale, côte, 2 humérus D, 5 radius, coxal D, 3 fémurs, 3 tibias, métacarpe, 6 métatarses, 3 phalanges I (259 g).
- cheval : mandibule, cervicale, 3 thoraciques, 3 lombaires, côte, 2 radius, ulna, 2 fémurs, tibia D, métacarpe G, métapode lat, 3 phalanges I, phalange II, 2 phalanges III (1039 g).
- chien : scapula D, ulna D (11 g).
- 245 indét (1004 g).

Ensemble anatomique

cheval : côtes, 6 thoraciques et 3 lombaires

Âges

bœuf : deux de 18 mois, un de 2 ans, un de 2,5 ans et un de 6 ans
 caprinés : deux séniles
 porc : un de 6 mois, un de 18 mois, un de 2,5 ans et un de 3,5 ans



Sexes

bœuf : trois femelles
 porc : six femelles





Fosse 131, EM1 (décapage A3)

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



■ excédant ■ moyenne ■ déficit

DÉPÔT 146-EM1 (2006)


profondeur de la fosse : 2,26 m

épaisseur du dépôt : 1,87 m

altitude par rapport au fond : 0 m

NR total : 2129 NR déterminés : 856

PR total : 29666 g PR déterminés : 26930 g

**INVENTAIRE**

- bœuf : 31 mandibules, 3 maxillaires, 14 incisives, 20 dents, crâne, frontal, zygomatique, temporal, cheville, 3 frgt de crâne, 8 éclats de crâne, 10 cervicales, 10 thoraciques, 6 lombaires, 2 sacrées, 2 coccygiennes, 44 côtes, 15 scapula, 7 humérus, 4 radius, 5 ulna, 14 coxaux, 14 fémurs, patella, 15 tibias, 3 malléolaires, 2 talus, 6 calcanéum, 3 carpe, 2 naviculaires, tarse, 4 métacarpes, 4 métatarses, 4 métapodes, 7 phalanges I, 4 phalanges II, 4 phalanges II, 2 phalanges III, sésamoïdes

(9419 g)

- porc : 6 mandibules, 3 maxillaires, 8 dents, frontal, 2 temporaux, 2 pariétaux, 3 frgts de crâne, éclat de crâne, atlas, thoracique, 3 lombaires, sacrée, 9 côtes, 4 scapula, 8 humérus, 3 radius, 4 ulna, coxal, 2 fémurs, patella, 9 tibias, 2 talus, calcanéum, 2 carpes, 3 métacarpes, 2 métatarses, 4 métapodes, 3 métapodes lat, 3 phalanges I, phalange II, 2 phalanges III, phal I lat (805 g).

- caprinés : 4 mandibules, 2 maxillaires, 14 dents, 3 frontaux, pariétal, occipital, cheville, 3 rochers, 5 éclats de crâne, 2 cervicales, 2 lombaires, 6 scapula, 8 humérus, 11 radius, 4 ulna, 6 coxaux, 8 fémurs, 12 tibias, 2 talus, 2 calcanéum, carpe, 2 naviculaires, 4 métacarpes, 4 métatarses, 8 phalanges I, phalange II (916 g).

- chien : paire mandibules, frontal, 2 éclat de crâne, cervicale, scapula, humérus, coxal, 3 tibias, talus, métapode (121 g)

- 1273 indéterm. (2736 g).

Ensembles anatomiques

bœuf : tibia et tarse D (134 g)

cheval : restes de carcasses de cinq sujets (464 pièces, 15669 g).

porc : crâne et mandibules (150 g)

caprinés : tibia et tarse (12 g)

chien : maxillaire et mandibule de chien (23 g)

Âges

bœuf : deux de 2 ans,

quatre de 2,5 ans, deux

de 4,5 ans, trois de 6

ans et trois de 8 ans

capriné : un de 6 mois,

un de 7 ans et un de 10

ans

cheval : un de 12 mois,

un de 3 ans, deux de 3,5

ans, deux de 4 ans, un

de 5 ans, deux de 7 ans,

trois de 8 ans et un de

12 ans

porc : un de 6 mois, un

de 11 mois et deux de

12 mois

Sexes

bœuf : un mâle et deux

femelles

capriné : cinq femelles

cheval : cinq femelles

et deux mâles

porc : une femelle, deux


mâles et un châtré





Fosse 146, EM1 (décapage B8)

Fosse 146-EM1

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



Fosse 146, EM1 (décapage B8)

DÉPÔT 148-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 1,52 m
 épaisseur du dépôt : 0,42 m
 altitude par rapport au fond : 0,04 m
 NR total : 66 NR déterminés : 29
 PR total : 621 g PR déterminés : 587 g



INVENTAIRE

- bœuf : nasal, 2 lombaires, disque vert., 3 côtes, coxal, 2 métacarpes, métatarse, 2 métapodes, phalange I, 2 phalanges III (466 g).
- porc : frontal, scapula D, humérus, phalange I (27 g).
- caprinés : mandibule D, frontal D, 2 lombaires, 2 tibia, 2 phalanges II, sésamoïde (94 g)
- 37 indét. (34 g)


Sexes

bœuf : une femelle

capriné : une femelle

DÉPÔT 148-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 1,52 m
 épaisseur du dépôt : 0,47 m
 altitude par rapport au fond : 0,59 m
 NR total : 318 NR déterminés : 185
 PR total : 4282 g PR déterminés : 3867 g



INVENTAIRE

- bœuf : radius et carpe G de bœuf (75 g)
 6 mandibules, 4 maxillaires, 4 dents, nasal, zygomatique, 2 temporaux, 3 occipitaux, cheville, éclat de crâne, cervicale, 7 thoraciques, 6 lombaires, coccygienne, 1 disque vert., 18 côtes, 5 scapula, 4 humérus, 5 radius, 2 ulna, 5 coxaux, 5 fémurs, patella, 2 calcaneum, 4 carpes, 3 naviculaires, tarse, 3 métacarpes, 7 métatarses, 4 métapodes, 3 phalanges I, 5 phalanges II, sésamoïde (3076 g).
- porc : mandibule, 2 maxillaires, thoracique, lombaire, 2 côtes, scapula G, 3 humérus, radius D, 2 ulna, 2 fémurs, 2 tibia, calcanéum, carpe, 2 métacarpe, métatarse 3, métapode, phalange I, phalange III (314 g).
- caprinés : 4 pieds : 2 antérieurs, 2 postérieurs (74 pièces)
 paire de mandibules, 3 molaires, frontal, cheville, 2 côtes, scapula, humérus, 5 radius, 4 ulna, fémur, 2 tibia, talus, 2 calcanéum, carpe, 2 métacarpes, 2 métatarse, 3 phalanges I, (309 g).
- cheval : humérus, fémur (134 g).
- chien : maxillaire, zygomatique, pré-maxillaire, coxal (34 g).
- 133 indét. (415 g).

Ensembles anatomiques

bœuf : radius et carpe G de bœuf (75 g)

caprinés : paire de mandibules, 4 pieds

Âges

bœuf : un de 2 ans et un de 2,5 ans

capriné : un de 12 mois

porc : un de 12 mois et un de 18 mois

Sexes

bœuf : un mâle

capriné : deux femelles


porc : une femelle




Fosse 148, EM1 (décapage A2)

Fosse 148-EM2

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf




DÉPÔT 148-VRAC (2006)

NR total : 33 NR déterminés : 29
 PR total : 691 g PR déterminés : 682 g

INVENTAIRE

- bœuf : maxillaire D, temporal D, disque vertébral, 2 côtes, scapula G, humérus D, coxal D, 2 carpes, naviculaire, tarse, métacarpe, métatarse, phalange II (640 g).
- porc : ulna D, calcanéum D, métacarpe, phalange I (8 g).
- caprinés : 2 molaires, humérus G, fémur, talus D, calcanéum D, métacarpe D, 2 phalanges I, phalange II (34 g).
- 4 indét. (9 g).



DÉPÔT 149-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,5 m
 épaisseur du dépôt : 0,27 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 86 NR déterminés : 37
 PR total : 1792 g PR déterminés : 1676 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule G, maxillaire D, molaire, nasal, pariétal, occipital, éclat de crâne, thoracique, lombaire, 5 côtes, radius G, coxal G, fémur D, 2 métatarses, 2 phalanges I, 2 phalanges II, 4 sésamoïdes (1165 g).
- cheval : éclat de crâne, tibia D, métacarpe D, phalange II (244 g).
- porc : calcanéum G (7 g).
- caprinés : molaire, mandibule G, radio-ulna G (60 g).
- 49 indéts. (116 g).

Ensemble anatomique caprinés : crâne et mandibule droite de chèvre (200 g).



Âges
 bœuf : un de 2,5 ans
 caprinés : un de 5 ans et un de 6 ans

Sexe
 caprinés : une femelle





Fosse 149, EM1 (décapage AB2)

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



DÉPÔT 155-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 1,75 m
 épaisseur du dépôt : 0,23 m
 altitude par rapport au fond : 0,93 m
 NR total : 6 NR déterminés : 3
 PR total : 446 g PR déterminés : 437 g



INVENTAIRE

- bœuf : lombaire (7 g)
 - 3 indét. (9 g).

Ensembles anatomiques

bœuf : paire de mandibules (340 g)

chèvre : éléments de deux épaules = scapula G, humérus D, radius D, ulna D, 2 métacarpes, phalanges I et II (90 g).

Âge

bœuf : un de 4,5 ans

Sexe

caprinés : une femelle

DÉPÔT 155-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 1,75 m
 épaisseur du dépôt : 0,04 m
 altitude par rapport au fond : 1,38 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 87 g PR déterminés : 87 g



INVENTAIRE

- bœuf : métacarpe

Sexe

bœuf : un mâle

DÉPÔT 160-VRAC (2006)

profondeur de la fosse : 3,01 m
 NR total : 3 NR déterminés : 2
 PR total : 35 g PR déterminés : 32 g



INVENTAIRE

- bœuf : lombaire, métapode (32 g)
 - 1 indét. (3 g)

DÉPÔT 161-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,78 m
 épaisseur du dépôt : 0,10 m
 altitude par rapport au fond : 0,08 m
 NR total : 1 NR déterminé : 0

DÉPÔT 164-VRAC (2006)

NR total : 4 NR déterminés : 3
 PR total : 119 g PR déterminés : 114 g



INVENTAIRE

- bœuf : humérus D, 2 coxaux (114 g)
 - 1 indét. (5 g)

DÉPÔT 165-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 3,67 m
épaisseur du dépôt : 0,25 m
altitude par rapport au fond : 0,07 m
NR total : 5 NR déterminés : 4
PR total : 454 g PR déterminés : 446 g

INVENTAIRE

- bœuf : mandibule D, 2 thoraciques, coxal D (446 g).
- 1 indét. (8 g).

DÉPÔT 165-VRAC (2006)

NR total : 1 NR déterminés : 1
PR total : 260 g PR déterminés : 260 g

INVENTAIRE

- bœuf : mandibule G

Âge

bœuf : un de 6 ans



Fosse 165, EM1 (décapage AB1)

DÉPÔT 166-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,57 m
épaisseur du dépôt : 0,24 m
altitude par rapport au fond : 0,04 m
NR total : 13 NR déterminés : 13
PR total : 1049 g PR déterminés : 1049 g

**INVENTAIRE**

- bœuf : cheville, radio-ulna G, coxal G, fémur, 4 tibia, métacarpe G, phalange I, phalange II (614 g)

Ensembles anatomiques

bœuf : radio-ulna et carpe D (300 g), tibia et tarse D (135 g)



Fosse 166, EM1 (décapage B2)

DÉPÔT 166-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,57 m
 épaisseur du dépôt : 0,18 m
 altitude par rapport au fond : 0,34 m
 NR total : 50 NR déterminés : 39
 PR total : 2160 g PR déterminés : 2111 g



INVENTAIRE

- bœuf : frontal D, temporal G, éclat de crâne, 2 frgt de crâne, 2 cervicales, thoracique, sacrée, 5 côtes, 2 humérus, 3 ulna, fémur D, 4 tibia, calcanéum G, métatarse G, phalange I (829 g).
- porc : mandibule G, maxillaire G, lombaire, humérus G, fémur D, tibia D (191 g).
- caprinés : paire de frontaux, tibia D, métatarse (144 g).
- cheval : humérus G, fémur D (172 g).
- 11 indét. (49 g).

Ensembles anatomiques

bœuf : tibia, talus et calcanéum G (285 g)
 cheval : radio-ulna et carpe D (490 g)


Âges

bœuf : un de 2,5 ans
 cheval : un de 3,5 ans
 porc : un de 18 mois


Sexes

bœuf : deux femelles
 caprinés : une femelle

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



DÉPÔT 166-EM4 (2006)

profondeur de la fosse : 2,57 m
 épaisseur du dépôt : 0,10 m
 altitude par rapport au fond : 1,49 m
 NR total : 1 NR déterminés : 440
 PR total : 1 g PR déterminés : 440 g




INVENTAIRE

- bœuf : crâne adulte distal (440 g).

DÉPÔT 167-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 4,2 m
 épaisseur du dépôt : 0,31 m
 altitude par rapport au fond : 0,39 m
 NR total : 20 NR déterminés : 11
 PR total : 257 g PR déterminés : 231 g

**INVENTAIRE**

- bœuf : atlas, cervicale, lombaire, disque vert, 3 côtes, scapula G, tibia G (220 g)
- porc : incisive (1 g)
- caprinés : tibia G (5 g)
- 9 indét. (26 g)

DÉPÔT 168-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 3,58 m
 épaisseur du dépôt : 0,38 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 51 NR déterminés : 50
 PR total : 950 g PR déterminés : 942 g

**INVENTAIRE**




- 1 indét. (8 g).

Ensembles anatomiques

bœuf : frontal, cheville, éclat de crâne, 3 cervicales, 8 thoraciques, 1 lombaire, 24 côtes, paire de scapula, scapula, 2 humérus, tibia, 2 métacarpes, métatarses G, phalange I, phalange III (942 g).


Sexe

bœuf : une femelle

Fréquence des animaux**Choix des parties de bœuf**

■ excédant ■ moyenne ■ déficit

DÉPÔT 168-EM2 (2006)



profondeur de la fosse : 3,58 m
 épaisseur du dépôt : 0,05 m
 altitude par rapport au fond : 0,88 m
 NR total : 54 NR déterminés : 53
 PR total : 2047 g PR déterminés : 2033 g

INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules G, cheville, cervicale, 7 lombaires, 2 sacrum, 26 côtes, scapula G, humérus, radius D, coxal D, 2 fémurs, tibia G, métacarpe G, métatarse D, 2 phalanges I (1778 g).
- caprinés : axis (4 g).
- 1 indét. (14 g).

Ensembles anatomiques

bœuf : humérus et radius D (201 g) ; tarse et métatarse G (50 g)


Âges

bœuf : un de 2 ans et un de 9 ans



Sexe

bœuf : trois femelles

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



DÉPÔT 168-EM3 (2006)



profondeur de la fosse : 3,58 m
 épaisseur du dépôt : 0,26 m
 altitude par rapport au fond : 1,20 m
 NR total : 7 NR déterminés : 6
 PR total : 302 g PR déterminés : 299 g

INVENTAIRE


- bœuf : mandibule G, atlas, humérus, radius G, fémur G, métacarpe G (299 g).
- 1 indét. (3 g).

Ensembles anatomiques

bœuf : humérus et radius D (201 g) ; tarse et métatarse G (50 g)

DÉPÔT 169-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 3,6 m
 épaisseur du dépôt : 0,76 m
 altitude par rapport au fond : 0,70 m
 NR total : 15 NR déterminés : 15
 PR total : 6395 g PR déterminés : 6305 g



INVENTAIRE

- bœuf : 3 mandibules, 3 côtes, 2 fémurs, 2 tibia, métatarse D (780 g).
- caprinés : fémur D (15 g).
- cheval : **squelette** auquel il manque le pied ant. D et les doigts antérieurs d'un étalon âgé d'un an et demi environ. (4379 g)
- lombaire, métacarpe (53 g).

Âges

bœuf : deux de 2,5 ans
 cheval : deux de 18 mois

Sexe

cheval : un mâle



Fosse 169, EM1 (décapages AB5)

DÉPÔT 169-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 3,60 m
 épaisseur du dépôt : 0,37 m
 altitude par rapport au fond : 1,94 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 138 g PR déterminés : 138 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule D, côte

DÉPÔT 169-VRAC (2006)

NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 42 g PR déterminés : 42 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule

DÉPÔT 170-EM1 (2006)

NR total : 4 NR déterminés : 4
 PR total : 48 g PR déterminés : 48 g



INVENTAIRE

- bœuf : scapula, côte
- porc : 2 lacrymaux

DÉPÔT 175-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 1,65 m

épaisseur du dépôt : 0,05 m

altitude par rapport au fond : 0,10 m

NR total : 28 NR déterminés : 27

PR total : 969 g PR déterminés : 965 g

**INVENTAIRE**

- bœuf : paire de mandibules, 4 incisives, maxillaire D, 3 carpes, métacarpe, métatarse G, phalange I, phalange II, phalange III (800 g).

- caprinés : 2 humérus, radius G, tibia, , métacarpe, métatarse, 3 phalanges I, phalange II, sésamoïde (62 g).

- 1 indét. (4 g).

Ensemble anatomiques :

porc : paire de mandibules et paire d'épaules (84 g).

caprinés : paire de métacarpes (19 g)

Âges

bœuf : un de 18 mois et un de 8 ans

porc : un de 15 mois

Sexe

porc : une femelle



Fosse 175, EM1 (décapages B1)

DÉPÔT 176-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 3,76 m
 épaisseur du dépôt : 0,09 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 3 NR déterminés : 3
 PR total : 402 g PR déterminés : 402 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule G, humérus D (192 g).
 - cheval : fémur G (210 g).

Âges

bœuf : un de 18 mois

DÉPÔT 176-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 3,76 m
 épaisseur du dépôt : 0,35 m
 altitude par rapport au fond : 1,5 m
 NR total : 10 NR déterminés : 9
 PR total : 830 g PR déterminés : 829 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule D, cervicale, sacrum, scapula D, humérus D, ulna D, tibia G, 2 calcanéums (829 g).
 - 1 indét. (1 g).

Âge

bœuf : un de 2,5 ans



Fosse 176, EM1 (décapages B1)

DÉPÔT 176-VRAC (2006)

NR total : 6 NR déterminés : 6
 PR total : 200 g PR déterminés : 200 g



INVENTAIRE

- bœuf : nasal, lombaire, côte, coxal G, calcanéum G (196 g).
 - caprinés : métatarse D (4 g).

DÉPÔT 178-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 1,62 m
épaisseur du dépôt : 0,02 m
altitude par rapport au fond : 0,46 m
NR total : 4 NR déterminés : 4
PR total : 28 g PR déterminés : 28 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, cervicale, côte (22 g).
- caprinés : lombaire (6 g).

DÉPÔT 178-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 1,62 m
épaisseur du dépôt : 0,10 m
altitude par rapport au fond : 0,65 m
NR total : 14 NR déterminés : 13
PR total : 379 g PR déterminés : 374 g



INVENTAIRE

- bœuf : cervicale, thoracique, côte, radius G, métatarse G, phalange I (287 g).
- porc : 2 fémur, phalange I (57 g).
- caprinés : 2 humérus G, radius D, talus G (30 g).
- 1 indét. (5 g).

DÉPÔT 183-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 3,82 m
 épaisseur du dépôt : 0,20 m
 altitude par rapport au fond : 0,69 m
 NR total : 3 NR déterminés : 2
 PR total : 20 g PR déterminés : 20 g



INVENTAIRE

- bœuf : scapula G (18 g).
- porc : mp lat (2 g).
- 1 indét.

DÉPÔT 183-VRAC (2006)

NR total : 37 NR déterminés : 16
 PR total : 288 g PR déterminés : 268 g




INVENTAIRE

- bœuf : molaire, 2 lombaires, scapula D, 2 humérus, fémur G, tibia G, tarse, métatarse (248 g).
- porc : 3 côtes, tibia (6 g).
- caprinés : fémur, tibia D (14 g).
- 21 indét. (20 g).

DÉPÔT 184-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 3,6 m
 épaisseur du dépôt : 0,05 m
 altitude par rapport au fond : 2,28 m
 NR total : 7 NR déterminés : 7
 PR total : 130 g PR déterminés : 130 g



INVENTAIRE

- bœuf : 3 mandibules (100 g).
- porc : côte, humérus D (22 g).
- caprinés : patella, os long (8 g).

DÉPÔT 186-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 4,35 m
 épaisseur du dépôt : 0,35 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 15 NR déterminés : 7
 PR total : 153 g PR déterminés : 143 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, côte, radius D (70 g).
- caprinés : 2 mandibules, éclat de crâne (45 g).
- cerf : andouiller sectionné (28 g).
- 8 indét. (10 g).

Âge

caprinés : un de 2 ans

DÉPÔT 186-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 4,35 m
 épaisseur du dépôt : 0,23 m
 altitude par rapport au fond : 0,47 m
 NR total : 8 NR déterminés : 8
 PR total : 206 g PR déterminés : 296 g



INVENTAIRE

- bœuf : cervicale, côte, scapula D, radius G, carpe (189 g).
- caprinés : éclat de crâne, cervicale, coxal G (17 g).

DÉPÔT 186-VRAC (2006)

NR total : 3 NR déterminés : 2
 PR total : 38 g PR déterminés : 37 g



INVENTAIRE

- bœuf : talus G (35 g)
- caprinés : humérus (2 g)
- 1 indét. (1 g)

DÉPÔT 189-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,26 m
 épaisseur du dépôt : 0,21 m
 altitude par rapport au fond : 0,44 m
 NR total : 8 NR déterminés : 7
 PR total : 241 g PR déterminés : 241 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule D, frgt de crâne, côte, 2 tibia D (225 g)
- caprinés : scapula D (1 g)
- cheval : tarse (15 g)
- 1 indét.

Âge

bœuf : un de 12 mois

DÉPÔT 189-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,26 m
 épaisseur du dépôt : 0,42 m
 altitude par rapport au fond : 0,81 m
 NR total : 13 NR déterminés : 13
 PR total : 647 g PR déterminés : 647 g



INVENTAIRE


- bœuf : mandibule D, crâne, frgt de crâne, axis, 2 côtes, humérus D, fémur, tibia D, paire de calcanéum, métatarse D (607 g).
- porc : coxal G (30 g).
- caprinés : tibia (10 g).



Fosse 189, EM2 (décapage B3)

DÉPÔT 196-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 1,21 m
 épaisseur du dépôt : 0,64 m
 altitude par rapport au fond : 0,02 m
 NR total : 155 NR déterminés : 78
 PR total : 3686 g PR déterminés : 3514 g



INVENTAIRE


- bœuf : 5 mandibules, 5 maxillaires, 2 dents, crâne, 2 frgt de crâne, 2 atlas, axis, 4 cervicales, thoracique, lombaire, 8 côtes, 4 scapula, 6 humérus, 3 radius, 3 ulna, 2 coxaux, 5 fémurs, 4 tibia, malléolaire, 2 talus, calcanéum, carpe, tarse, métacarpe, métatarse, phalange III (3325 g).
- cheval : cervicale (5 g).
- porc : mandibule D, humérus G, 2 fémurs (21 g).
- caprinés : 2 humérus, radio-ulna G (32 g).
- 77 indét. (172 g).

Ensembles anatomiques
 bœuf : radius G et carpe (81 g) ; tarse G (50 g)





Fosse 196, EM1 (décapage A4)

Fréquence des animaux




Choix des parties de bœuf



DÉPÔT 196-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 1,21 m
 épaisseur du dépôt : 0,36 m
 altitude par rapport au fond : 0,33 m
 NR total : 1051 NR déterminés : 300
 PR total : 6334 g PR déterminés : 5236 g



INVENTAIRE

- bœuf : 18 mandibules, 2 maxillaires, 25 dents, zygomatique, frgt de crâne, 9 éclats de crâne, 2 atlas, 2 axis, 7 cervicales, 8 thoraciques, 5 lombaires, sacrée, 23 côtes, 11 scapula, 12 humérus, 9 radius, 4 ulna, 13 coxaux, 8 fémurs, 3 tibia, 8 talus, 4 calcanéum, 8 carpes, 3 tarses, 5 métacarpes, 6 métatarses, 3 métapodes, 11 phalanges I, 8 phalanges II, 2 phalanges III, sésamoïde (4058 g).
- porc : 2 mandibules, 5 dents, maxillaire D, pariétal D, cervicale, côte, scapula, 2 humérus, radius G, ulna D, 2 coxaux, 3 fémurs, 2 métacarpes, métatarse, 3 métapodes, mp lat, phalange I (110 g)
- caprinés : 3 mandibules, 6 dents, occipital, éclat de crâne, scapula G, 2 humérus G, 4 radius, 2 coxaux, fémur, 6 tibia, métacarpe, métatarse, métapode, phalange II (285 g).
- cheval : 4 mandibules, côte, humérus, coxal, fémur D, carpe, métacarpe, métatarse, phalange I (571 g).
- chien : scapula D, humérus D (3 g).
- 751 indét. (1098 g).

Ensemble anatomique

bœuf : humérus et radius D (209 g)



Âges

bœuf : un de 6 mois, un de 6 ans et un de 8 ans
 caprinés : un de 7 ans



Sexes

bœuf : un châtré, cinq femelles et deux mâles

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



DÉPÔT 196-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 1,21 m
épaisseur du dépôt : 0,33 m
altitude par rapport au fond : 0,43 m
NR total : 55 NR déterminés : 9
PR total : 259 g PR déterminés : 231 g



INVENTAIRE

- bœuf : humérus, coxal G, métatarse D, 2 phalanges I (100 g).
- cheval : tibia D, phalange I (121 g).
- porc : ulna D (2 g).
- caprinés : tibia (8 g).
- 46 indét. (28 g).

DÉPÔT 196-VRAC (2006)

NR total : 7 NR déterminés : 6
PR total : 90 g PR déterminés : 88 g




INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, 2 côtes, radius G, calcanéum D (85 g)
- caprinés : fémur (3 g)
- 1 indét. (2 g)

DÉPÔT 198-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 4,8 m
 épaisseur du dépôt : 0,05 m
 altitude par rapport au fond : 0,04 m
 NR total : 26 NR déterminés : 19
 PR total : 535 g PR déterminés : 504 g




INVENTAIRE

- bœuf : mandibule G, dent, axis, cervicale, thoracique, sacrum, cart cost., 4 côtes, 2 scapula G, 3 humérus, tibia, métacarpe (503 g).
 - caprinés : coxal D (1 g)
 - 7 indé. (31 g)

DÉPÔT 198-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 4,80 m
 épaisseur du dépôt : 0,10 m
 altitude par rapport au fond : 1,71 m
 NR total : 55 NR déterminés : 20
 PR total : 803 g PR déterminés : 695 g



INVENTAIRE

- bœuf : 3 mandibules D, mandibule G, molaire sup, éclat de crâne, lombaire, scapula D, humérus D, tibia D, métacarpe G, métacarpe, 2 métatarses G, 2 phalanges I, 2 phalanges II (663 g)
 - porc: côte (-).
 - cheval : métacarpe G (32 g)
 - 35 indé. (108 g)

Âges

bœuf : un de 4,5 ans, un de 6 ans et un de 9 ans

DÉPÔT 198-VRAC (2006)

NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 15 g PR déterminés : 15 g



INVENTAIRE

- bœuf : tibia (15 g).

DÉPÔT 199-EM1 (2006-7)

profondeur de la fosse : 2,90 m
 épaisseur du dépôt : 0,11 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 3 NR déterminés : 2
 PR total : 64 g PR déterminés : 59 g



INVENTAIRE

- bœuf : métatarse D (52 g).
 - porc : fémur G (7 g).
 - 1 indét (5 g).

DÉPÔT 199-EM2 (2006-7)

profondeur de la fosse : 2,90 m
 épaisseur du dépôt : 0,14 m
 altitude par rapport au fond : 1,15 m
 NR total : 3 NR déterminés : 3
 PR total : 192 g PR déterminés : 192 g



INVENTAIRE

- bœuf : tibia D (180 g).
 - porc : mandibule, humérus (12 g).

DÉPÔT 200-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,04 m
 épaisseur du dépôt : 0,61 m
 altitude par rapport au fond : 0 m



NR total : 13 NR déterminés : 13
 PR total : 630 g PR déterminés : 630 g

INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules, molaire, côte, 2 scapula, humérus G, 2 coxaux, métacarpe G, 2 métatarses (620 g).
 - caprinés : coxal D (10 g).



Fosse 200, EM1 (décapage B1)

DÉPÔT 201-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 4,61 m
 épaisseur du dépôt : 0,05 m
 altitude par rapport au fond : 2,83 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 48 g PR déterminés : 48 g



INVENTAIRE

- bœuf : calcanéum G

DÉPÔT 201-EM4 (2006)

profondeur de la fosse : 4,61 m
 épaisseur du dépôt : 0,06 m
 altitude par rapport au fond : 3,33 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 19 g PR déterminés : 19 g



INVENTAIRE

- bœuf : zygomatique G (15 g).
 - porc : mandibule D (4 g).

DÉPÔT 201-VRAC (2006)

NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 8 g PR déterminés : 8 g



INVENTAIRE

- bœuf : lactéale

DÉPÔT 202-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 3,71 m
 épaisseur du dépôt : 0,08 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 2 NR déterminés : 1



INVENTAIRE

- porc : **squelette** complet un an, non pesé
 - 1 indét. (2 g)

Âge

porc : un de 12 mois

Sexe

porc : une femelle



Fosse 202, EM1 (décapage A2)

DÉPÔT 202-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 3,71 m
 épaisseur du dépôt : 0,08 m
 altitude par rapport au fond : 1,38 m
 NR total : 9 NR déterminés : 9
 PR total : 400 g PR déterminés : 400 g



INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules, atlas, cervicale, 3 coccygiennes (379 g).
 - caprinés : humérus, radius (21 g).

DÉPÔT 203-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 1,52 m
 épaisseur du dépôt : 0,32 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 32 NR déterminés : 22
 PR total : 1145 g PR déterminés : 1115 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule D, cheville, lombaire, côte, humérus D, 2 radius, coxal, métacarpe D, métatarse D (838 g).
- porc : phalange I (1 g).
- caprinés : 5 dents, pariétal, 2 côtes (30 g).
- 10 indét. (30 g).

Ensemble anatomique

bœuf : talus et calcanéum en connexion (46 g)
 un mouton adulte : éléments de squelette : épaule D, radio-ulna G, 2 tibia, calcanéum et métatarse D (120 g).
 un mouton juvénile : épaule G, radius G, 2 métacarpes, gigot G, tibia D, talus et métatarse G (80 g).

Âge

bœuf : un de 7 ans

**DÉPÔT 203-EM2 (2006)**

profondeur de la fosse : 1,52 m
 épaisseur du dépôt : 0,31 m
 altitude par rapport au fond : 0,55 m
 NR total : 10 NR déterminés : 10
 PR total : 1961 g PR déterminés : 1961 g

INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules, crâne entier, côte, scapula G, humérus G, tibia D, métacarpe D (1921 g).
- porc : tibia G (8 g).
- cheval : scapula G (32 g)

Âge

bœuf : un de 3,5 ans



Fosse 203, EM2 (décapage B1)

DÉPÔT 203-VRAC (2006)

NR total : 18 NR déterminés : 8
 PR total : 159 g PR déterminés : 145 g




INVENTAIRE

- bœuf : sacrée, côte, 3 humérus, tarse, métapode (141 g).
- caprinés : lombaire (4 g).
- 10 indét. (14 g).

DÉPÔT 205-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 1,51 m
 épaisseur du dépôt : 0,45 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 214 NR déterminés : 74
 PR total : 3753 g PR déterminés : 3218 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, atlas, 5 cervicales, 5 thoraciques, 2 lombaires, 7 côtes, 2 scapula, 2 humérus, 3 radius, ulna, 2 fémurs, malléolaire, 2 carpes, calcanéum, métacarpe D (855 g).
- porc : incisive, lombaire, 2 ulna, fémur, 2 tibia, carpe, métacarpe, métapode, phalange I, 3 phalange II (163 g).
- caprinés : molaire, humérus D, 3 tibia, métacarpe D, métatarse D, 2 métapodes, 6 phalanges I, phalange II (76 g).
- cheval : 2 thoraciques, 1 côtes (46 g).
- 140 indét. (535 g).

Ensembles anatomiques

bœuf : tibia avec tarse G (448 g)
 porc : fémur, tibia, talus et naviculaire D (45 g)
 cheval : carcasse de grand cheval (étalon adulte, 3,5 ans, 1,43 m), manque les deux postérieurs (1630 g).

Âge

cheval : 3,5 ans



Sexe

cheval : étalon





Fosse 205, EM1 (décapage AB4)

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



DÉPÔT 205-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 1,51 m
 épaisseur du dépôt : 0,34 m
 altitude par rapport au fond : 0,38 m
 NR total : 93 NR déterminés : 29
 PR total : 488 g PR déterminés : 383 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule D, 3 lombaires, 4 côtes, sternèbre, scapula, humérus, 2 radius, coxal D, fémur, carpe, calcanéum (297 g).
- porc : 3 tibia D, métatarse (24 g).
- caprinés : fémur, tarse, métacarpe G, 2 métatarses, phalange II (51 g).
- cheval : 2 côtes (11 g).
- 64 indét. (105 g).

Âge

bœuf : un de 18 mois

DÉPÔT 205-VRAC (2006)

NR total : 7 NR déterminés : 7
 PR total : 101 g PR déterminés : 101 g



INVENTAIRE

- bœuf : 2 lombaires, 3 côtes, tibia (100 g).
- coq : coracoïde (1 g)

DÉPÔT 206-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 3,39 m
 épaisseur du dépôt : 0,45 m
 altitude par rapport au fond : 0,20 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 154 g PR déterminés : 154 g



INVENTAIRE

- bœuf : occipital, fémur D (154 g)

DÉPÔT 207-VRAC (2006)

profondeur de la fosse : 3,68 m
 NR total : 1
 PR total : 10 g

INVENTAIRE

- 1 éclat de crâne indéterminé

DÉPÔT 208-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 4,21 m
 épaisseur du dépôt : 0,08 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 3 NR déterminés : 3
 PR total : 255 g PR déterminés : 255 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule G, côte
 - porc : éléments d'un **squelette** : mandibule G, humérus G, ulna D, métacarpe D, phalanges ant, coxal D, fémur G, tibia G, 2 pieds post complets (130 g).



fosse 208, EM1 (décapage AB5)

DÉPÔT 208-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 4,21 m
 épaisseur du dépôt : 0,42 m
 altitude par rapport au fond : 2,76 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 45 g PR déterminés : 45 g



INVENTAIRE

- bœuf : côte (15 g).
 - porc : maxillaire D (un an) (30 g).

Âges

porc : un de 6 mois et un de 12 mois

DÉPÔT 208-VRAC (2006)

NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 169 g PR déterminés : 169 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule G (160 g).
 - caprinés : tibia D (9 g).

DÉPÔT 209-EM1 (2006)


profondeur de la fosse : 1,22 m

épaisseur du dépôt : 0,25 m

altitude par rapport au fond : 0,27 m

NR total : 35 NR déterminés : 26

PR total : 2309 g PR déterminés : 2151 g

**INVENTAIRE**

- bœuf : crâne, temporal, occipital, cheville, frgt de crâne, cervicale, thoracique, lombaire, 4 côtes, scapula G, coxal D, fémur, patella, 3 métatarses (954 g).

- porc : métapode lat (1 g).

- caprinés : maxillaire et frgt de crâne (74 g).

- cheval : fémur D, fémur G (306 g).

- 9 indét. (158 g).

Ensembles anatomiques

bœuf : très jeune veau : tête et deux épaules (de la scapula au radius); cuisseau D, tibia G, 2 pieds post (358 g); métatarse et tarse en connexion (100 g).

Âges

bœuf : deux de 5 mois

Sexes

bœuf : une femelle et un mâle

caprinés : une femelle



Fosse 209, EM1 (décapage B1)

DÉPÔT 210-EM1 (2006-7)

profondeur de la fosse : 3,65 m
 épaisseur du dépôt : 0,01 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 5 NR déterminés : 5
 PR total : 285 g PR déterminés : 285 g



INVENTAIRE

- bœuf : scapula, radio-ulna, radius, coxal, fémur (285 g)

DÉPÔT 210-EM2 (2006-7)

profondeur de la fosse : 3,65 m
 épaisseur du dépôt : 0,60 m
 altitude par rapport au fond : 0,70 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 12026 g PR déterminés : 12026 g



INVENTAIRE

- cheval : deux **squelettes** étalons de cinq ans
 - bœuf : scapula

Âges

cheval : un de 5 ans et un de 6 ans

Sexes

cheval : deux mâles



Fosse 210, EM2 (décapage AB)

DÉPÔT 210-EM3 (2006-7)

profondeur de la fosse : 3,65 m
 épaisseur du dépôt : 0,05 m
 altitude par rapport au fond : 3,17 m
 NR total : 4 NR déterminés : 4
 PR total : 159 g PR déterminés : 159 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, radius G, talus, métacarpe (159 g)

DÉPÔT 212-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 4,08 m
 épaisseur du dépôt : 0,03 m
 altitude par rapport au fond : 1,22 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 123 g PR déterminés : 123 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule D (120 g).
 - caprinés : tibia (3 g).

Âge

bœuf : un de 16 mois

DÉPÔT 213-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 1,57 m
épaisseur du dépôt : 0,18 m
altitude par rapport au fond : 0,57 m
NR total : 2 NR déterminés : 2
PR total : 58 g PR déterminés : 58 g



INVENTAIRE

- bœuf : tibia D (28 g).
- cheval : dent jugale inf (30 g).

DÉPÔT 216-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 3,13 m
épaisseur du dépôt : 0,02 m
altitude par rapport au fond : 1,96 m
NR total : 4 NR déterminés : 4
PR total : 672 g PR déterminés : 672 g



INVENTAIRE

- cheval : mandibule G, radius G, coxal G, métacarpe G

Âge


cheval : un de 4 ans

Sexe

cheval : un mâle

DÉPÔT 218-EM3 (2006-8)

profondeur de la fosse : 4,81 m
 épaisseur du dépôt : 0,35 m
 altitude par rapport au fond : 0,76 m
 NR total : 21 NR déterminés : 12



INVENTAIRE


- bœuf : frgt de crâne, mandibule, thoracique, 2 coxaux, 2 carpes,
- porc : mandibule
- caprinés : frontal, cervicale, humérus, métatarse
- 9 indét.

Sexes

bœuf : une femelle et un mâle
 porc : un mâle

DÉPÔT 218-EM4 (2006-8)

profondeur de la fosse : 4,81 m
 épaisseur du dépôt : 0,18 m
 altitude par rapport au fond : 1,19 m
 NR total : 8 NR déterminés : 8




INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules D, zygomatique, cervicale, tibia, métatarse.
- caprinés : scapula, métatarse.

DÉPÔT 218-EM5 (2006-8)

profondeur de la fosse : 4,81 m
 épaisseur du dépôt : 0,43 m
 altitude par rapport au fond : 1,46 m
 NR total : 27 NR déterminés : 19



INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules, éclat de crâne, molaire, thoracique, lombaire, côte, radius, métatarse, phalange II
- porc : molaire, ulna
- caprinés : 2 molaires, lombaire, côte, coxal, 2 tibia
- 8 indét

DÉPÔT 218-VRAC (2006-8)

NR total : 4 NR déterminés : 2



INVENTAIRE

- bœuf : fémur, patella
- caprinés : côte, scapula, tibia, métatarse, métapode
- 2 indét.

DÉPÔT 219-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 4,00 m
 épaisseur du dépôt : 0,10 m
 altitude par rapport au fond : 2,60 m
 NR total : 2 NR déterminés : 1
 PR total : 495 g PR déterminés : 480 g



INVENTAIRE

- bœuf : humérus G (480 g).
- 1 indét. (15 g).

DÉPÔT 220-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,42 m
 épaisseur du dépôt : 0,07 m
 altitude par rapport au fond : 1,32 m
 NR total : 22 NR déterminés : 15
 PR total : 575 g PR déterminés : 547 g



INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules, maxillaire G, frgt de crâne, éclat de crâne, cervicale, tibia, métacarpe G, 3 métatarses, 2 phalanges I (417 g)
- cheval : scapula D, tibia G (130 g)
- 7 indét. (28 g)

DÉPÔT 220-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,42 m
 épaisseur du dépôt : 0,20 m
 altitude par rapport au fond : 1,83 m
 NR total : 27 NR déterminés : 17
 PR total : 528 g PR déterminés : 498 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, 2 dents, 2 frgt de crâne, cervicale, thoracique, 2 côtes, scapula D, humérus, 3 ulna, fémur D, calcaneum D (453 g)
- caprinés : mandibule G (45 g)
- 10 indét. (30 g)

Âges

bœuf : un de 11 ans
 caprinés : un de 6 ans

DÉPÔT 220-VRAC (2006)

NR total : 4 NR déterminés : 4
 PR total : 110 g PR déterminés : 110 g




INVENTAIRE

- bœuf : prémolaire, tibia G, talus G (102 g).
- cheval : côte (8 g).

DÉPÔT 221-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 1,75 m
 épaisseur du dépôt : 0,37 m
 altitude par rapport au fond : 0,18 m
 NR total : 110 NR déterminés : 65
 PR total : 2737 g PR déterminés : 2594 g



INVENTAIRE

- bœuf : 7 mandibules, 4 dents, 2 zygomatiques D, cheville, frgt de crâne, 2 éclats de crâne, cervicale, 2 thoraciques, 3 côtes, scapula, 3 humérus, 3 radius, coxal G, 2 tibia, 3 carpes, 5 métacarpes, 3 métatarses, métapode, 3 phalanges I, 2 phalanges II, 4 phalanges III, 6 sésamoïdes (1770 g).
- porc : incisive (2 g).
- caprinés : frontal, cervicale (17 g).
- cheval : crâne sans prémaxillaire, 3 ans, éclat de crâne (805 g).
- 45 indét. (143 g).



Âges

bœuf : un de 12 mois et un de 22 mois
 cheval : un de 3 ans



Sexes

bœuf : un mâle
 caprinés : une femelle

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



■ excédant □ moyenne ■ déficit

DÉPÔT 222-EM1 (2006-8)

profondeur de la fosse : 3,57 m
 épaisseur du dépôt : 0,19 m
 altitude par rapport au fond : 0,17 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2



INVENTAIRE

- bœuf : crâne, fémur (NP)

DÉPÔT 222-EM3 (2006-8)

profondeur de la fosse : 3,57 m
 épaisseur du dépôt : 0,03 m
 altitude par rapport au fond : 1,56 m
 NR total : 19 NR déterminés : 14
 PR total : 720 g PR déterminés : 692 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule G, côte, 2 radius D, coxal G, métatarse D (325 g).
 - porc : mandibule G (7 g).
 - caprinés : paire de cheville, cheville, radius G, fémur, métatarse (115 g).
 - cheval : éclat de crâne, scapula D (245 g).
 - 5 indét. (28 g).

Âge

bœuf : un de 11 ans

Sexes

caprinés : une femelle et un mâle

DÉPÔT 222-EM5 (2006-8)

profondeur de la fosse : 3,57 m
 épaisseur du dépôt : 0,26 m
 altitude par rapport au fond : 2,40 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 113 g PR déterminés : 113 g



INVENTAIRE

- bœuf : scapula G

DÉPÔT 222-VRAC (2006-8)

NR total : 16 NR déterminés : 9



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule G, lombaire, sacrum, côte, métatarse G, phalange II.
 - porc : mandibule D, temporal.
 - caprinés : temporal D.
 - 7 indét.

Âge

porc : un de 15 mois

DÉPÔT 224-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,84 m
 épaisseur du dépôt : 0,27 m
 altitude par rapport au fond : 0,40 m
 NR total : 17 NR déterminés : 10
 PR total : 622 g PR déterminés : 592 g



INVENTAIRE

- bœuf : côte, humérus D, tibia D, métacarpe D (198 g).
- porc : 2 humérus, talus G (77 g).
- caprinés : frgt de crâne, ulna D (7 g).
- cheval : radius D (210 g).
- 7 indét. (30 g)

Sexe

caprinés : une femelle

DÉPÔT 225-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 3,58 m
 épaisseur du dépôt : 0,08 m
 altitude par rapport au fond : 0,88 m
 NR total : 6 NR déterminés : 6
 PR total : 296 g PR déterminés : 296 g



INVENTAIRE

- bœuf : frontal, frgt de crâne, côte, métatarse G, phalange I (270 g).
- cheval : métacarpe (26 g).

DÉPÔT 225-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 3,58 m
 épaisseur du dépôt : 0,06 m
 altitude par rapport au fond : 1,20 m
 NR total : 3 NR déterminés : 3
 PR total : 71 g PR déterminés : 71 g




INVENTAIRE

- bœuf : côte, calcanéum, métacarpe D

DÉPÔT 226-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,62 m
 épaisseur du dépôt : 0,10 m
 altitude par rapport au fond : 0,07 m
 NR total : 43 NR déterminés : 13
 PR total : 332 g PR déterminés : 208 g



INVENTAIRE

- bœuf : prémaxillaire, axis, cervicale, thoracique, lombaire, phalange III (61 g)
- cerf : frgt de bois (merrain) de chute scié (49 g)
- porc : 2 humérus G, tibia G (11 g)
- caprinés : crâne, temporal D, tibia D (187 g)
- 30 indéts. (24 g)

Sexe

caprinés : une femelle



Fosse 226, EM1 (décapage A2)

DÉPÔT 226-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,62 m
 épaisseur du dépôt : 0,46 m
 altitude par rapport au fond : 0,95 m
 NR total : 39 NR déterminés : 22
 PR total : 1170 g PR déterminés : 1113 g



INVENTAIRE

- bœuf : 3 mandibules, cheville, atlas, lombaire, sacrum, 4 humérus, 3 coxaux, tibia G, carpe, métacarpe G (756 g).
- porc : humérus G (14 g).
- caprinés : frontal G, pariétal, disque vert. (13 g).
- 17 indéts. (57 g)

Ensemble anatomique

bœuf : lombaire et sacrum (330 g)

Âge

bœuf : un de 4,5 ans

Sexe

caprinés : une femelle



Fosse 226, EM2 (décapage 1)

DÉPÔT 226-VRAC (2006)

NR total : 4 NR déterminés : 4
 PR total : 190 g PR déterminés : 190 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, lombaire, coxal G, fémur

DÉPÔT 227-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 3,86 m
 épaisseur du dépôt : 0,19 m
 altitude par rapport au fond : 0,02 m
 NR total : 2 NR déterminés : 1
 PR total : 35 g PR déterminés : 30 g



INVENTAIRE

- bœuf : scapula G (30 g).
- 1 indé. (5 g).

DÉPÔT 227-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 3,86 m
 épaisseur du dépôt : 0,56 m
 altitude par rapport au fond : 0,36 m
 NR total : 10 NR déterminés : 9
 PR total : 975 g PR déterminés : 975 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, molaires, côte, 2 calcaneum (434 g).
- cheval : dent jugale sup, humérus G, 2 phalange I (541 g).
- 1 indé. (-)

Âg

bœuf : un de 2,5 ans



Fosse 227, EM2 (décapage A2)

DÉPÔT 227-VRAC (2006)

NR total : 6 NR déterminés : 5
 PR total : 219 g PR déterminés : 211 g



INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules, fémur G (141 g).
- porc : 2 mandibules (70 g).
- 1 indé. (8 g).

Sexe

porc : une femelle

DÉPÔT 228-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 3,64 m
 épaisseur du dépôt : 0,12 m
 altitude par rapport au fond : 0,31 m
 NR total : 3 NR déterminés : 3
 PR total : 1207 g PR déterminés : 1207 g



INVENTAIRE

- bœuf : tibia D (190 g).
 - cheval : crâne entier, cervicale (1017 g).

Âge

cheval : un de 13 ans

Sexe

bœuf : une femelle
 cheval : une femelle

DÉPÔT 228-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 3,64 m
 épaisseur du dépôt : 0,16 m
 altitude par rapport au fond : 0,76 m
 NR total : 3 NR déterminés : 3
 PR total : 185 g PR déterminés : 185 g



INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibule (175 g).
 - porc : mandibule D (10 g)

Âge

bœuf : un de 8 mois

Sexe

caprinés : une femelle

DÉPÔT 228-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 3,64 m
 épaisseur du dépôt : 0,08 m
 altitude par rapport au fond : 1,58 m
 NR total : 9 NR déterminés : 9
 PR total : 626 g PR déterminés : 626 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule G, atlas, radius, tibia, 2 métapodes (101 g).
 - porc : mandibule G (7 g).
 - cheval : paire de maxillaires (= crâne ?), maxillaire (518 g).

DÉPÔT 228-VRAC (2006)

NR total : 6 NR déterminés : 3
 PR total : 193 g PR déterminés : 184 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule G, cheville, radius (184 g).
 - 3 indét. (9 g).

Âge

bœuf : un de 6 ans



Fosse 228, EM3 (décapage A1)

DÉPÔT 229-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 3,56 m
 épaisseur du dépôt : 0,35 m
 altitude par rapport au fond : 0,03 m
 NR total : 10 NR déterminés : 9
 PR total : 1046 g PR déterminés : 1043 g

**INVENTAIRE**

- bœuf : maxillaire G, humérus, phalange II (422 g).
 - 1 indét. (3 g).

Ensembles anatomiques


caprinés : patte de mouton : tibia, calcanéum, métatarse, phalanges (50 g) crâne et mandibule de caprinés (37 g)

Âges

caprinés : un de 20 mois et un de 2 ans

DÉPÔT 229-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 3,56 m
 épaisseur du dépôt : 0,26 m
 altitude par rapport au fond : 0,76 m
 NR total : 60 NR déterminés : 38
 PR total : 4312 g PR déterminés : 4187 g

**INVENTAIRE**

- bœuf : 6 mandibules, maxillaire D, temporal D, 2 chevilles, 2 cervicales, 3 thoraciques, côte, humérus, coxal, 4 fémurs, 2 tibia G, 4 métacarpes D, 2 métatarses (2662 g).
 - porc : 2 mandibules G, scapula (67 g).
 - caprinés : paire de maxillaires (45 g).
 - cheval : crâne entier de jument 7 ans, côte, paire de coxaux, métacarpe D (1413 g).
 - 22 indét. (125 g).

Âges

bœuf : un de 5 mois, un de 2 ans, deux de 2,5 ans et un de 3 ans

caprinés : un de 22 mois

cheval : un de 7 ans

porc : un de 5 mois et un de 6 mois

Sexes


cheval : une femelle





Fosse 229, EM1 (décapage B2)

Fosse 229-EM2

Fréquence des animaux




Choix des parties de bœuf



DÉPÔT 229-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 3,56 m
 épaisseur du dépôt : 0,15 m
 altitude par rapport au fond : 2,24 m
 NR total : 12 NR déterminés : 10
 PR total : 747 g PR déterminés : 742 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule G, coxal D, 3 tibia G, métacarpe D (486 g).
- porc : canine inf (2 g).
- caprinés : tibia D (11 g).
- cheval : 2 radius D (243 g).
- 2 indét. (5 g).

Sexes

bœuf : deux femelles

porc : une femelles

DÉPÔT 229-VRAC (2006)

NR total : 3 NR déterminés : 2
 PR total : 100 g PR déterminés : 100 g



INVENTAIRE

- cheval : 2 prémolaires sup (100 g).
- 1 indét.

Sexe

bœuf : une femelle

DÉPÔT 230-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 3,01 m
 épaisseur du dépôt : 0,05 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 95 g PR déterminés : 95 g



INVENTAIRE

- bœuf : scapula D

DÉPÔT 232-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,62 m
 épaisseur du dépôt : 0,14 m
 altitude par rapport au fond : 0,03 m
 NR total : 5 NR déterminés : 5
 PR total : 508 g PR déterminés : 508 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule G, thoracique, tarse (407 g).
 - porc : dent (1 g).

Ensemble anatomique

bœuf : tarse et métatarse G (100 g)

Âge

bœuf : un de 2 ans

DÉPÔT 232-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,62 m
 épaisseur du dépôt : 0,23 m
 altitude par rapport au fond : 0,48 m
 NR total : 26 NR déterminés : 21
 PR total : 1950 g PR déterminés : 1942 g



INVENTAIRE

- bœuf : 3 mandibules D, crâne sans prémaxillaire, cheville, cervicale, 3 thoraciques, sacrée, sacrum, 2 côtes, scapula D, humérus G, patella, phalange III (1907 g).
 - porc : maxillaire D, coxal D, fémur D (20 g).
 - cheval : thoracique (15 g).
 - 5 indét. (8 g).

Âges

bœuf : un de 2 ans, un de 2,5 ans et un de 3 ans

Sexe

bœuf : une femelle



Fosse 232, EM2 (décapage B1)



Fosse 232, EM2 (décapage A1)

DÉPÔT 232-VRAC (2006)

NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 132 g PR déterminés : 132 g



INVENTAIRE

- bœuf : thoracique, métacarpe D (132 g).

Âge

bœuf : un de 2 ans

DÉPÔT 233-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,56 m
 épaisseur du dépôt : 0,15 m
 altitude par rapport au fond : 0,39 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 106 g PR déterminés : 106 g



INVENTAIRE

- bœuf : humérus D (106 g)

DÉPÔT 234-VRAC (2006)

NR total : 3
 PR total : 9 g

INVENTAIRE

- 3 indé. (9 g), peut-être des os humains ?

DÉPÔT 235-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 3,27 m
 épaisseur du dépôt : 0,30 m
 altitude par rapport au fond : 0,60 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 1650 g PR déterminés : 1650 g



INVENTAIRE

- cheval : crâne immature (1650 g).

Âge

cheval : un de 2 ans



Fosse 235, EM1 (décapage B1)

DÉPÔT 235-VRAC (2006)

NR total : 1 NR déterminés : 0
 PR total : 2 g

DÉPÔT 236-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,74 m
 épaisseur du dépôt : 0,13 m
 altitude par rapport au fond : 0,53 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 74 g PR déterminés : 74 g



INVENTAIRE

- bœuf : scapula D (74 g).

DÉPÔT 236-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 2,74 m
 épaisseur du dépôt : 0,22 m
 altitude par rapport au fond : 0,88 m
 NR total : 7 NR déterminés : 7
 PR total : 931 g PR déterminés : 931 g



INVENTAIRE

- bœuf : 3 mandibules, cheville, coxal D, calcanéum G (923 g).
 - chien : tibia G (8 g).

Âges

bœuf : un de 2,5 ans et un de 3,5 ans

Sexe

bœuf : un mâle



Fosse 236, EM3 (décapage B1)

DÉPÔT 237-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,08 m
 épaisseur du dépôt : 0,19 m
 altitude par rapport au fond : 0,01 m
 NR total : 85 NR déterminés : 23
 PR total : 1051 g PR déterminés : 991 g



INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules, maxillaire G, occipital, cheville, zygomatique D, axis, 2 lombaires, 2 côtes, scapula D, 2 humérus, 2 radius D, tibia D (657 g).
- porc : ulna D (13 g).
- caprinés : mandibule G, tibia D (16 g).
- cheval : 2 fémur G, fémur D (296 g).
- 62 indét. (60 g) = fragmentation récente

Âge

bœuf : un de 2 ans

DÉPÔT 238-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,29 m
 épaisseur du dépôt : 0,05 m
 altitude par rapport au fond : 0,09 m
 NR total : 24 NR déterminés : 17
 PR total : 589 g PR déterminés : 572 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule D, molaire, éclat de crâne, cheville, atlas, cervicale, 2 thoraciques, 2 côtes, scapula G, humérus G, coxal, naviculaire (554 g).
- caprinés : mandibule D, molaire, métatarse G (18 g).
- 7 indét. (17 g).

Sexe

bœuf : une femelle



Fosse 238, EM1 (décapage A1)

DÉPÔT 239-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,99 m
 épaisseur du dépôt : 0,25 m
 altitude par rapport au fond : 0,19 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 19 g PR déterminés : 19 g

INVENTAIRE

- porc : mandibule D (19 g).

Âge

porc : un de 15 mois

DÉPÔT 241-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,46 m
 épaisseur du dépôt : 0,31 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 14 NR déterminés : 7
 PR total : 322 g PR déterminés : 306 g

INVENTAIRE

- bœuf : incisive, crâne, cheville, hyoïde, fémur, métacarpe D, sésamoïde (306 g).
 - 7 indét. (16 g)

DÉPÔT 241-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 2,46 m
 épaisseur du dépôt : 0,43 m
 altitude par rapport au fond : 1,27 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 31 g PR déterminés : 31 g

INVENTAIRE

- bœuf : métacarpe (31 g)

DÉPÔT 241-EM4 (2006)

profondeur de la fosse : 2,46 m
 épaisseur du dépôt : 0,08 m
 altitude par rapport au fond : 2,01 m
 NR total : 6 NR déterminés : 5
 PR total : 681 g PR déterminés : 679 g

INVENTAIRE

- bœuf : humérus G, radius D (58 g).
 - cheval : mandibule G, 2 dent jugales inf (621 g).
 - 1 indét. (2 g).

DÉPÔT 246-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 4,96 m
 épaisseur du dépôt : 0,05 m
 altitude par rapport au fond : 0,09 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 26 g PR déterminés : 26 g



INVENTAIRE

- bœuf : métatarse (18 g).
 - caprinés : fémur (8 g).

DÉPÔT 246-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 4,96 m
 épaisseur du dépôt : 0,27 m
 altitude par rapport au fond : 0,47 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 9 g PR déterminés : 9 g



INVENTAIRE

- bœuf : côte (9 g).

DÉPÔT 246-EM5 (2006)

profondeur de la fosse : 4,96 m
 épaisseur du dépôt : 0,33 m
 altitude par rapport au fond : 2,21 m
 NR total : 9 NR déterminés : 4
 PR total : 192 g PR déterminés : 182 g



INVENTAIRE

- bœuf : fémur, 2 tibia, calcanéum D (182 g).
 - 5 indét. (10 g).

DÉPÔT 247-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 1,3 m
 NR total : 7 NR déterminés : 6
 PR total : 219 g PR déterminés : 209 g



INVENTAIRE

- cheval : scapula, coxal, talus D, calcanéum D, tarse, mp lat (213 g).
 - 1 indét. (10 g).

DÉPÔT 249-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,04 m
 épaisseur du dépôt : 0,16 m
 altitude par rapport au fond : 0,42 m
 NR total : 6 NR déterminés : 6
 PR total : 286 g PR déterminés : 286 g




INVENTAIRE

- bœuf : mandibule D, cervicale, côte, calcanéum G, tarse G (282 g).
 - cheval : côte (4 g).

Âge

bœuf : un de 6 mois



Fosse 249, EM1 (décapage B1)

DÉPÔT 251-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 4,28 m
 épaisseur du dépôt : 0,10 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 5 NR déterminés : 5
 PR total : 579 g PR déterminés : 579 g



INVENTAIRE

- bœuf : atlas (39 g).
- caprinés : 2 lombaires (20 g).
- cheval : paire de mandibules, humérus D (520 g).

Ensemble anatomique

cheval : paire de mandibules

Âge

cheval : un de 9 ans

Sexe

cheval : un mâle

DÉPÔT 251-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 4,28 m
 épaisseur du dépôt : 0,31 m
 altitude par rapport au fond : 0,63 m
 NR total : 8 NR déterminés : 7
 PR total : 858 g PR déterminés : 853 g



INVENTAIRE

- bœuf : frgt de crâne, cheville, côte (100 g).
- caprinés : crâne sans prémaxillaire, tibia D (210 g).
- cheval : fémur D (88 g).
- 1 indét. (5 g).

Ensemble anatomique

bœuf : tibia, tarse, métatarse et phalanges I D (455 g).

Sexes

bœuf : une femelle
 caprinés : une femelle



Fosse 251, EM2 (décapage B3)

DÉPÔT 251-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 4,28 m
 épaisseur du dépôt : 0,03 m
 altitude par rapport au fond : 1,49 m
 NR total : 6 NR déterminés : 6
 PR total : 517 g PR déterminés : 517 g




INVENTAIRE

- bœuf : crâne, 2 humérus, radius, tibia, métatarse D (517 g).

DÉPÔT 254-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 1,18 m
épaisseur du dépôt : 0,10 m
altitude par rapport au fond : 0,39 m
NR total : 9 NR déterminés : 7
PR total : 158 g PR déterminés : 141 g

**INVENTAIRE**

- bœuf : axis, coxal G, tarse, 2 métatarses D (123 g).
- caprinés : fémur, tibia G (18 g).
- 2 indét. (17 g).



Fosse 254, EM1 (décapage AB1)

DÉPÔT 255-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,49 m
 épaisseur du dépôt : 0,19 m
 altitude par rapport au fond : 0,01 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 240 g PR déterminés : 240 g



INVENTAIRE


- bœuf : fémur, tibia, talus et calcaneum D en connexion (140 g).

Ensemble anatomique

bœuf : 3 côtes en position anatomique

DÉPÔT 255-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,49 m
 épaisseur du dépôt : 0,32 m
 altitude par rapport au fond : 0,41 m
 NR total : 694 NR déterminés : 282
 PR total : 4434 g PR déterminés : 3971 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule D, prémolaire, frontal, frgt de crâne, 9 éclats de crânes, axis, 5 cervicales, 4 thoraciques, 9 lombaires, sacrée, sacrum, 3 coccygiennes, 3 disques vert., 17 côtes, 2 scapula, 6 humérus, 4 radius, 2 ulna, 4 coxaux, 8 fémurs, 2 tibias, 2 malléolaires, 3 carpes, tarse, 2 métacarpes D, 2 métapodes, 2 phalanges I, phalange II, 3 phalanges III, 4 sésamoïdes (2395 g).
- porc : 4 mandibules, frontal, zygomatique, pariétal, éclat de crâne, 2 cervicales, thoracique, lombaire, 7 côtes, 5 scapula, 2 radius, 4 coxaux, 2 fémurs, 4 tibias, carpe, 2 tarses, 3 métacarpes, 2 métatarses, métapode, 2 métapodes lat, 2 phalanges I, phalange III (200 g).
- caprinés : 6 mandibules, 3 incisives, molaire, 2 atlas, 3 axis, 7 cervicales, 6 thoraciques, 8 lombaires, 16 côtes, 2 scapula, 8 humérus, 5 radius, 2 ulna, coxal, 8 fémurs, 8 tibia, 4 talus, 2 calcaneum, 2 carpes, 4 métacarpes, 3 métapodes, 8 phalanges I, phalange III (352 g).
- cheval : 3 fémurs D, métacarpe G (873 g).
- chien : 2 mandibules D, 2 maxillaires, canine, zygomatique G, pariétal G, atlas, lombaire, humérus D, fémur G, calcaneum D, 2 phalanges I (50 g).
- coq : coracoïde (1 g).
- 412 indét. (463 g).

Âges


bœuf : un de 4,5 ans
 caprinés : un de 6 mois, un de 15 mois et un de 5 ans
 chien : deux de 4 ans
 porc : un de 1 mois et un de 12 mois

Sexes



bœuf : deux femelles
 caprinés : une femelle
 porc : un mâle

Fosse 255-EM2

Fréquence des animaux




Choix des parties de bœuf



Fosse 255, EM2 (décapage B1)

DÉPÔT 256-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,66 m
épaisseur du dépôt : 0,24 m
altitude par rapport au fond : 0,16 m
NR total : 25 NR déterminés : 25
PR total : 3853 g PR déterminés : 3853 g

**INVENTAIRE**

- bœuf : cheville, 11 côtes, sternèbre, 3 scapula, humérus, 2 tibia, 2 humérus avec radio-ulna et carpes (691 g).

Ensembles anatomiques

bœuf : crâne avec branche mandibule, sept ensembles de côtes (4 paires et 3 trios), paire d'épaules de veau ; tibia et tarse (2942 g).

cheval : coxal G et frgt de sacrum (220 g).

Âge

bœuf : un de 3 ans

Sexe


cheval : une femelle



Fosse 256, EM1 (décapage B3)

DÉPÔT 256-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,66 m
 épaisseur du dépôt : 0,69 m
 altitude par rapport au fond : 0,48 m
 NR total : 504 NR déterminés : 361
 PR total : 15174 g PR déterminés : 15570 g



INVENTAIRE

- bœuf : crâne, 16 mandibules, maxillaire, 2 prémaxillaires, 3 dents, temporal, 2 chevilles, 2 hyoïdes, 2 rochers, frgt de crâne, 2 éclats de crâne, 4 atlas, 2 axis, cervicale, 19 thoraciques, 12 lombaires, 4 sacrées, 3 sacrum, 2 coccygiennes, 2 vertèbres, 33 côtes, sternèbre, cart. cost., 8 scapula, 12 humérus, 7 radius, 5 ulna, 22 coxaux, 9 fémurs, patella, 6 tibia, 3 malléolaires, 2 talus, 5 calcanéum, 2 carpes, naviculaire, 6 métacarpes, 4 métatarses, métapode, 4 phalanges I, phalange III, 3 sésamoïdes (12373 g).
- porc : 14 mandibules, 3 maxillaires, 9 dents, occipital, fragt de crâne, éclat de crâne, atlas, côte, 4 scapula, 3 humérus, 2 radius, ulna, 2 coxaux, fémur, 2 tibia, métatarse (624 g).
- caprinés : 9 mandibules, 6 dents, 4 frontaux, 2 pariétaux, 2 occipitaux, cheville, cervicale, thoracique, sacrée, 2 côtes, 6 scapula, humérus, 6 radius, 2 ulna, 5 coxaux, 4 fémurs, patella, 2 tibia, carpe, 2 métacarpes, métatarse, phalange I (562 g).
- cheval : maxillaire, incisive, crâne, occipital, atlas, 2 côtes, 3 scapula, humérus, 2 coxaux, 7 fémurs, patella, carpe (1589 g).
- chien : 2 fémurs, tibia, métatarse (26 g).
- 143 indét. (396 g).

Ensemble anatomique

bœuf : 3 tibia avec leurs tarses, carpe et métacarpe D (1012 g).

Âges



bœuf : un de 6 mois, un de 8 mois, deux de 15 mois, quatre de 2 ans, trois de 2,5 ans, un de 3,5 ans et un de 4,5 ans
 caprinés : un de 12 mois, un de 15 mois, deux de 2 ans, un de 6 ans et un de 7 ans
 cheval : un de 2,5 ans et un de 3 ans
 porc : un de 6 mois, deux de 11 mois et huit de 12 mois

Sexes



bœuf : neuf femelles et trois mâles
 caprinés : cinq femelles
 porc : deux femelles et trois mâles

Fosse 256-EM2

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf





Fosse 256, EM2 (décapage 1A)

DÉPÔT 256-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 2,66 m

épaisseur du dépôt : 0,13 m

altitude par rapport au fond : 1,04 m

NR total : 1 NR déterminés : 1

PR total : 700 g PR déterminés : 700 g



INVENTAIRE

- cheval : fragment de crâne

AGE

- cheval : 2,5 ans

DÉPÔT 257-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,39 m
 épaisseur du dépôt : 0,32 m
 altitude par rapport au fond : 0,01 m
 NR total : 10 NR déterminés : 10
 PR total : 185 g PR déterminés : 185 g



INVENTAIRE

- bœuf : cheville, lombaire, scapula D, patella (141 g).
- porc : radio-ulna, fémur (23 g).

Ensemble anatomique
 caprinés : 4 cervicales (21 g).



Fosse 257, coupe, avec les deux EM

DÉPÔT 257-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,39 m
 épaisseur du dépôt : 0,37 m
 altitude par rapport au fond : 0,46 m
 NR total : 12 NR déterminés : 11
 PR total : 1320 g PR déterminés : 1317 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule G, scapula D, humérus D, 2 coxaux D, fémur D (515 g).
- cheval : 3 fémur, 2 tibia D (802 g).
- 1 indét. (3 g).

Sexe

bœuf : une femelle



Fosse 257, EM2 (décapage A3)

DÉPÔT 257-VRAC (2006)

NR total : 2 NR déterminés : 0
 PR total : 4 g

DÉPÔT 258-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,32 m
 épaisseur du dépôt : 0,04 m
 altitude par rapport au fond : 0,08 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 40 g PR déterminés : 40 g



INVENTAIRE

- bœuf : 2 côtes (40 g).

DÉPÔT 258-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,32 m
 épaisseur du dépôt : 0,13 m
 altitude par rapport au fond : 0,24 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 235 g PR déterminés : 235 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule D (235 g).

Âge

bœuf : un de 2 ans

DÉPÔT 258-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 2,32 m
 épaisseur du dépôt : 0,51 m
 altitude par rapport au fond : 0,44 m
 NR total : 6 NR déterminés : 5
 PR total : 790 g PR déterminés : 787 g



INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules, scapula D, métatarse G (785 g).
 - caprinés : fémur (2 g).
 - 1 indét. (3 g).

Âges

bœuf : un de 2 ans et un de 3,5 ans



Fosse 258, EM3 (décapage AB1)

DÉPÔT 259-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,20 m
épaisseur du dépôt : 0,26 m
altitude par rapport au fond : 0,09 m
NR total : 3 NR déterminés : 2
PR total : 37 g PR déterminés : 30 g

INVENTAIRE

- bœuf : occipital, côte (30 g).
- 1 indét. (7 g).

DÉPÔT 259-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,20 m
épaisseur du dépôt : 0,39 m
altitude par rapport au fond : 0,39 m
NR total : 14 NR déterminés : 14
PR total : 631 g PR déterminés : 631 g

INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, 2 molaires, cheville, 2 lombaires, radius, tibia (341 g).
- cheval : 2 scapula, coxal D, 2 fémurs D (283 g).
- caprinés : humérus G (7 g).

Âge

bœuf : un de 16 mois



Fosse 259, EM3 (décapage B1)

DÉPÔT 261-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,02 m
 épaisseur du dépôt : 0,08 m
 altitude par rapport au fond : 0,34 m
 NR total : 9 NR déterminés : 2
 PR total : 85 g PR déterminés : 50 g



INVENTAIRE

- bœuf : occipital, calcanéum D (50 g).
 - 7 indéts. (35 g).

DÉPÔT 261-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,02 m
 épaisseur du dépôt : 0,12 m
 altitude par rapport au fond : 0,51 m
 NR total : 15 NR déterminés : 13
 PR total : 571 g PR déterminés : 556 g



INVENTAIRE

- bœuf : occipital, côte (30 g).
 - 1 indéts. (7 g).

Âge

bœuf : un de 2,5 ans

Sexe

bœuf : un mâle



Fosse 261, EM2 (décapage B1)

DÉPÔT 262-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 3,92 m
 épaisseur du dépôt : 0,05 m
 altitude par rapport au fond : 0,42 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 45 g PR déterminés : 45 g



INVENTAIRE

- bœuf : talus D (31 g).
 - cheval : côte (14 g).

Sexe

bœuf : un châtré

DÉPÔT 262-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 3,92 m
 épaisseur du dépôt : 0,24 m
 altitude par rapport au fond : 0,82 m
 NR total : 17 NR déterminés : 2
 PR total : 68 g PR déterminés : 65 g



INVENTAIRE

- bœuf : radius, humérus D (65 g).
 - 15 indéts. (3 g).

DÉPÔT 263-EM1 (2006-8)

profondeur de la fosse : 3,72 m
 épaisseur du dépôt : 0,14 m
 altitude par rapport au fond : 0,09 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 110 g PR déterminés : 110 g



INVENTAIRE

- bœuf : humérus D (110 g).

DÉPÔT 263-EM3 (2006-8)

profondeur de la fosse : 3,72 m
 épaisseur du dépôt : 0,20 m
 altitude par rapport au fond : 0,99 m
 NR total : 9 NR déterminés : 9
 PR total : 605 g PR déterminés : 605 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, occipital, cheville, cervicale, sacrum, humérus D, calcanéum D (142 g)
 - cheval : maxillaire G, tibia (463 g)

Âge

cheval : un de 4 ans

Sexes

bœuf : une femelle
 cheval : un mâle



Fosse 263, EM3 (décapage A1)

DÉPÔT 264-VRAC (2006)

profondeur de la fosse : 4,07 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 198 g PR déterminés : 198 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule D (198 g).

DÉPÔT 265-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 3,29 m
 épaisseur du dépôt : 0,21 m
 altitude par rapport au fond : 0,47 m
 NR total : 8 NR déterminés : 8
 PR total : 434 g PR déterminés : 434 g

INVENTAIRE

- bœuf : mandibule D, 2 lombaires, scapula D, radius G, coxal G, fémur G, métacarpe (434 g).

Sexe

bœuf : une femelle

DÉPÔT 265-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 3,29 m
 épaisseur du dépôt : 0,26 m
 altitude par rapport au fond : 0,80 m
 NR total : 10 NR déterminés : 10
 PR total : 497 g PR déterminés : 497 g

INVENTAIRE

- bœuf : mandibule D, molaire, thoracique, 3 humérus, coxal D (462 g).
 - caprinés : crâne, cervicale (32 g).
 - cheval : éclat de crâne (3 g).

Âge

bœuf : un de 4,5 ans

Sexe

caprinés : un mâle

DÉPÔT 266-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,46 m
 épaisseur du dépôt : 0,28 m
 altitude par rapport au fond : 0,07 m
 NR total : 15 NR déterminés : 15
 PR total : 93 g PR déterminés : 93 g

INVENTAIRE

- bœuf : atlas, humérus, tibia D (54 g).
 - caprinés : côte, humérus D, radius G (21 g).
 - cheval : 9 côte (18 g).

DÉPÔT 266-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,46 m
 épaisseur du dépôt : 0,30 m
 altitude par rapport au fond : 0,40 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 68 g PR déterminés : 68 g

INVENTAIRE

- bœuf : maxillaire G, vertèbre (68 g).

DÉPÔT 267-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 3,23 m
 épaisseur du dépôt : 0,24 m
 altitude par rapport au fond : 0,88 m
 NR total : 16 NR déterminés : 13
 PR total : 665 g PR déterminés : 644 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule D, lombaire, sacrée, scapula D, coxal G, fémur (191 g).
- porc : crâne, thoracique, radius D (175 g).
- caprinés : cervicale (4 g).
- cheval : axis, cervicale (44 g).
- 3 indét. (21 g).

Ensemble anatomique

cheval : 4 lombaires en connexion (230 g)

Âge

porc : un de 2 mois

DÉPÔT 268-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 3,05 m
 épaisseur du dépôt : 0,09 m
 altitude par rapport au fond : 0,38 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 3 g PR déterminés : 3 g




INVENTAIRE

- bœuf : côte

DÉPÔT 268-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 3,05 m
 épaisseur du dépôt : 0,26 m
 altitude par rapport au fond : 0,86 m
 NR total : 58 NR déterminés : 48
 PR total : 2986 g PR déterminés : 2974 g



INVENTAIRE

- bœuf : 3 mandibules, maxillaire D, zygomatique, temporal D, axis, sacrée, 9 côtes, 4 humérus D, radius G, 5 fémurs, tibia D, talus D, calcanéum (2011 g).
- porc : canine, coxal D, fibula (41 g).
- caprinés : lactéale, 2 chevilles, 2 talus G, tarse (32 g).
- cheval : mandibule D, coccygienne, coxal G (571 g).
- chien : mandibule D (7 g).
- 10 indét. (12 g)..

Ensembles anatomiques

bœuf : paire de mandibules (300 g)
 cheval : 3 coccygiennes (12 g)

Âges

bœuf : un de 6 mois, un de 2 ans et un de 3,5 ans

Sexes



caprinés : une femelle
 cheval : une femelle
 porc : un mâle





Fosse 268, EM3 (décapage B1)

Fosse 268-EM3

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



■ excédant □ moyenne ■ déficit

DÉPÔT 269-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,05 m
 épaisseur du dépôt : 0,39 m
 altitude par rapport au fond : 0,05 m
 NR total : 8 NR déterminés : 8
 PR total : 625 g PR déterminés : 625 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule D (450 g)

Ensemble anatomique
 bœuf : 7 côtes G (175 g).

Âges

bœuf : un de 6 ans



Fosse 269, EM1 (décapage B4)

DÉPÔT 269-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,05 m
 épaisseur du dépôt : 0,11 m
 altitude par rapport au fond : 1,23 m
 NR total : 3 NR déterminés : 2
 PR total : 35 g PR déterminés : 33 g



INVENTAIRE

- bœuf : côte, scapula (33 g).
 - 1 indét. (2 g).

DÉPÔT 269-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 2,05 m
 épaisseur du dépôt : 0,26 m
 altitude par rapport au fond : 1,39 m
 NR total : 22 NR déterminés : 7
 PR total : 345 g PR déterminés : 305 g



INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules G (272 g).
 - porc : mandibule D (20 g).
 - caprinés : maxillaire D, 2 dents, frgt de crâne (13 g).
 - 15 indét. (40 g).

Âge

bœuf : un de 2,5 ans

Sexe

porc : une femelle

DÉPÔT 270-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 1,75 m
 épaisseur du dépôt : 0,21 m
 altitude par rapport au fond : 0,01 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 16 g PR déterminés : 16 g



INVENTAIRE

- bœuf : fémur (16 g).

DÉPÔT 270-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 1,75 m
 épaisseur du dépôt : 0,26 m
 altitude par rapport au fond : 0,24 m
 NR total : 16 NR déterminés : 10
 PR total : 223 g PR déterminés : 202 g



INVENTAIRE

- bœuf : maxillaire D, prémolaire, cervicale, radius D, ulna G, fémur, tarse, phalange II (173 g).
 - caprinés : paire de maxillaires, tibia (29 g).
 - 6 indét. (21 g).

DÉPÔT 270-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 1,75 m
 épaisseur du dépôt : 0,43 m
 altitude par rapport au fond : 0,57 m
 NR total : 83 NR déterminés : 54
 PR total : 2190 g PR déterminés : 2064 g



INVENTAIRE

- bœuf : 4 mandibules, 2 maxillaires, prémaxillaire, cheville, éclat de crâne, axis, cervicale, thoracique, lombaire, 4 côtes, scapula D, 2 humérus, 2 radius, 2 ulna, coxal, 2 fémurs, 2 tibia, calcanéum, 3 métacarpes, métatarse, phalange II (1901 g).
 - porc : mandibule D, dent (34 g).
 - caprinés : 2 maxillaires D, 8 dents, pariétal, 3 tibia (102 g).
 - chien : mandibule G, canine, ulna D (27 g).
 - 29 indét (126 g).

Âges


bœuf : un de 2,5 ans, un de 3 ans et un de 9 ans
 porc : un de 12 mois





Fosse 270, EM3 (décapage A1)

Fosse 270-EM3

Fréquence des animaux




Choix des parties de bœuf



DÉPÔT 271-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 1,11 m
 épaisseur du dépôt : 0,23 m
 altitude par rapport au fond : 0,02 m
 NR total : 27 NR déterminés : 15
 PR total : 777 g PR déterminés : 750 g

**INVENTAIRE**

- bœuf : mandibule G, incisive, paire de maxillaires, côte, radius, 2 coxaux, patella, 2 phalanges II (192 g)
- porc : **squelette** très mal conservé (10 mois), manque des vertèbres et le bassin (500 g)
- caprinés : 2 lactéales (4 g).
- 12 indét. (27 g).

Ensembles anatomiques

bœuf : des restes d'un veau (scapula, humérus et radius D, radius G, fémur, tibia, métatarse et phalanges D, tibia g) ; tibia et pied D (54 g)

Âges

bœuf : deux de 5 mois et un de 6 mois
 porc : un de 10 mois



Fosse 271, EM1 (décapage B2)

DÉPÔT 271-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 1,11 m
 épaisseur du dépôt : 0,13 m
 altitude par rapport au fond : 0,25 m
 NR total : 4 NR déterminés : 3
 PR total : 58 g PR déterminés : 48 g

**INVENTAIRE**

- bœuf : ulna D, fémur, phalange I (48 g).
- 1 indét. (10 g).

DÉPÔT 272-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 0,89 m
 épaisseur du dépôt : 0,34 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 110 NR déterminés : 73
 PR total : 4141 g PR déterminés : 4082 g



INVENTAIRE

- bœuf : **squelette** d'une vache adulte sans tête : très mal conservée.
 4 mandibules, 11 dents, atlas, axis, 6 cervicales, 7 thoraciques, 4 lombaires, 28 côtes, ulna D, fémur, talus G (1447 g).
- caprinés : maxillaire, 2 molaires, 2 humérus, radius D, métatarse (35 g)
- 37 indét. (59 g)


Âges

bœuf : un de 15 mois et un de 3 ans


Sexe

bœuf : une femelle

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



Fosse 272, EM1 (décapage 1)

DÉPÔT 274-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 3,74 m
 épaisseur du dépôt : 0,27 m
 altitude par rapport au fond : 0,39 m
 NR total : 25 NR déterminés : 23
 PR total : 1233 g PR déterminés : 1215 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, 6 incisives, temporal, thoracique, ulna G, 3 fémurs D, tibia G, 2 métacarpes D, métatarse G (588 g).
- porc : mandibule D, côte, thoracique, tibia (21 g).
- caprinés : métacarpe D (6 g).
- 2 indét. (18 g).

Ensemble anatomique

bœuf : paire de mandibules (600 g)

Âge

bœuf : un de 4,5 ans



Fosse 274, EM1 (décapage B1)

DÉPÔT 274-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 3,74 m
 épaisseur du dépôt : 0,16 m
 altitude par rapport au fond : 3,10 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2



INVENTAIRE

- bœuf : cheville, atlas

DÉPÔT 275-EM1 (2006)


profondeur de la fosse : 3,12 m

épaisseur du dépôt : 0,47 m

altitude par rapport au fond : 1,61 m

NR total : 1080 NR déterminés : 597

PR total : 17673 g PR déterminés : 16329 g



INVENTAIRE

- bœuf : 27 mandibules, 12 maxillaires, 4 prémaxillaires, 13 dents, nasal, 4 frontaux, 5 temporaux, pariétal, 7 occipitaux, 4 chevilles, hyoïde, 15 frgt de crâne, 8 éclats de crâne, 7 atlas, 2 axis, 13 cervicales, 21 thoraciques, 19 lombaires, 8 sacrées, 2 sacrum, 5 coccygiennes, 3 disques vert., 71 côtes, cartilage costal, 13 scapula, 11 humérus, 8 radius, 4 ulna, 16 coxaux, 10 fémurs, patella, 14 tibias, malléolaire, 3 talus, 5 calcanéums, 2 naviculaires, 8 métacarpes, 5 métatarses, 2 métapodes, 5 phalanges I, phalange II, 4 phalanges III (11172 g).

- porc : 8 mandibules, 4 maxillaires, prémaxillaire, canine, frontal, temporal, 2 pariétaux, thoracique, 3 lombaires, sacrée, sacrum, 9 côtes, 4 scapula, 2 radius, coxal, 3 fémurs, 3 tibia, phalange III (368 g).

- caprinés : 3 mandibules, 4 maxillaires, prémaxillaire, 11 dents, crâne, nasal, 5 frontaux, pariétal, 2 occipitaux, 4 chevilles, hyoïde, 2 frgts de crâne, 2 atlas, 2 axis, 3 cervicales, 9 thoraciques, 2 lombaires, 3 côtes, 9 scapula, 3 humérus, 7 radius, 2 ulna, 13 coxaux, 4 fémurs, 5 tibia, 2 calcanéum, 3 métacarpes, 4 phalanges I, phalange II (937 g).

- cheval : 3 incisives, crâne, 2 frgts de crâne, éclat de crâne, 3 cervicales, 2 thoraciques, 27 côtes, scapula, radius, 2 ulna, radio-ulna, 8 coxaux, 2 fémurs, patella, tibia, 2 calcanéum, 3 carpes, 3 métacarpes, métatarse, métapode lat, 2 phalanges I, 2 phalanges II, 2 phalanges III (3560 g).

- 483 indét. (1344 g).

Ensembles anatomiques

bœuf : tibia et talus (210 g) ; lombaire et sacrum (82 g)

Âges

bœuf : un de 7 mois, huit de 2 ans, un de 2,5 ans et deux de 9 ans

cheval : un de 3,5 ans et un de 5 ans

porc : un de 1 mois, un de 2 mois, un de 4 mois, un de 6 mois, un de 12 mois et un de 15 mois

Sexes



bœuf : un châtré, huit femelles et deux mâles

caprinés : neuf femelles et un mâle



cheval : quatre mâles

porc : deux femelles et un mâle

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf





Fosse 275, EM1 (décapage B1)



Fosse 275, EM1 (décapage B2)



Fosse 275, EM1 (décapage B3)

DÉPÔT 275-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 3,12 m

épaisseur du dépôt : 0,10 m

altitude par rapport au fond : 2,21 m

NR total : 8 NR déterminés : 8

PR total : 114 g PR déterminés : 114 g



INVENTAIRE

- bœuf : scapula G (8 g).

- porc : mandibules, thoracique, humérus (30 g)

- caprinés : atlas (3 g)

- cheval : 2 fémurs G (63 g)

Ensemble anatomique
porc : tibia et talus (10 g)

Sexe

porc : un mâle

DÉPÔT 276-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,48 m
épaisseur du dépôt : 0,14 m
altitude par rapport au fond : 0,78 m
NR total : 1 NR déterminés : 1
PR total : 320 g PR déterminés : 320 g



INVENTAIRE


- cheval : coxal G (320 g)

Sexe

cheval : une femelle

DÉPÔT 276-VRAC (2006)

NR total : 17 NR déterminés : 11
PR total : 601 g PR déterminés : 676 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule G, côte, 2 humérus, coxal, 2 phalanges II (236 g).
- porc : mandibule (7 g).
- cheval : radius G, coxal, coxal G (333 g).
- 6 indét. (25 g).

DÉPÔT 279-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,31 m
épaisseur du dépôt : 0,30 m
altitude par rapport au fond : 0,01 m
NR total : 5 NR déterminés : 5
PR total : 47 g PR déterminés : 47 g

INVENTAIRE

- caprinés : 3 côtes, scapula D, coxal D (47 g).

DÉPÔT 279-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,31 m
épaisseur du dépôt : 0,30 m
altitude par rapport au fond : 0,51 m
NR total : 29 NR déterminés : 11
PR total : 5841 g PR déterminés : 5801 g



INVENTAIRE

- bœuf : prémaxillaire, molaire, 5 côtes, scapula, ulna (235 g).
- caprinés : radio-ulna D (26 g).
- 18 indét. (40 g).

Ensemble anatomique

squelette de vache (1,04 m, 7 ans)(5540 g)

Âges

bœuf : deux de 8 ans

Sexe


bœuf : une femelle



Fosse 279, EM2 (décapage B6)

DÉPÔT 279-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 2,31 m
 épaisseur du dépôt : 0,49 m
 altitude par rapport au fond : 0,92 m
 NR total : 239 NR déterminés : 189
 PR total : 7679 g PR déterminés : 7030 g



INVENTAIRE

- bœuf : 16 mandibules, 5 maxillaires, 8 dents, crâne, 2 frontaux, zygomatique, 2 occipitaux, 3 chevilles, hyoïde, 2 frgts de crâne, 2 éclats de crâne, 3 cervicales, 6 thoraciques, 4 lombaires, 11 côtes, 9 scapula, 13 humérus, 11 radius, 4 ulna, 11 fémurs, 3 tibia, talus, 3 calcanéum, carpe, 2 métacarpes, 5 métatarses, 3 métapodes, 5 phalanges I, 4 phalanges II, 2 phalanges III (5934 g).
- porc : 4 mandibules, thoracique, humérus, fémur, phalange I, phalange II (147 g).
- caprinés : 5 mandibules, maxillaire, 3 dents, atlas, lombaire, 2 humérus, radius, radio-ulna, coxal, 4 fémurs, 4 tibia, 2 calcanéum, 2 métacarpes, 4 métatarses, 3 phalanges I (307 g).
- cheval : humérus G (200 g).
- 140 indét. (649 g).

Âges

bœuf : un châtré
 porc : une femelle


Sexes

bœuf : un de 5 mois, un de 2,5 ans, un de 6 ans et un de 8 ans
 caprinés : un de 18 mois, un de 3 ans, un de 6 ans et un de 7 ans
 porc : deux de 2 mois et un de 16 mois




Fosse 279, EM3 (décapage B1)

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



DÉPÔT 280-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,92 m
 épaisseur du dépôt : 0,16 m
 altitude par rapport au fond : 0,02 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 200 g PR déterminés : 200 g

INVENTAIRE

- caprinés : crâne (200 g)

Sexe

caprinés : une femelle

DÉPÔT 280-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,92 m
 épaisseur du dépôt : 0,28 m
 altitude par rapport au fond : 0,74 m
 NR total : 26 NR déterminés : 23
 PR total : 1161 g PR déterminés : 1139 g

INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules G, maxillaire G, vertèbre, 6 scapula, radius D, ulna D, fémur D, 2 tibia, tarse, métatarse G, métapode (1029 g).
 - porc : mandibule D (50 g).
 - caprinés : mandibule G, tibia, métacarpe G (55 g).
 - cheval : phalange II (5 g).
 - 3 indét. (22 g).

Âges

bœuf : un de 2 ans
 caprinés : un de 2 ans
 porc : un de 4,5 ans

Sexe

porc : une femelle



Fosse 280, EM2 (décapage 2)



Fosse 280, EM2 (décapage 1)

DÉPÔT 281-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,44 m
 épaisseur du dépôt : 0,13 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 5 NR déterminés : 5
 PR total : 285 g PR déterminés : 285 g




INVENTAIRE

- bœuf : maxillaire D, côte, 2 scapula, métacarpe D (285 g).

DÉPÔT 281-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,44 m
 épaisseur du dépôt : 0,24 m
 altitude par rapport au fond : 1,29 m
 NR total : 81 NR déterminés : 72
 PR total : 1724 g PR déterminés : 1691 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule D, 6 incisives, prémolaire, frgt de crâne, cervicale, 2 thoraciques, lombaire, 4 coccygiennes, 10 côtes, cart. costal, scapula G, radius D, 2 coxaux, fémur G, 2 patella, tibia D, talus G, calcanéum G, 2 torses, métatarse G, 2 sésamoïdes (1053 g).
 - porc : **squelette** (crâne et mandibules, lombaires, 2 scapula, membre post D), crâne entier (mâle 1 an), 3 vertèbres, épaule D. 3 dents, pariétal G, atlas, côte, 4 humérus, 2 radius, 2 ulna G, 2 coxaux, fémur, 2 tibia G, carpe, 2 métacarpes, phalange I (190 g).
 - caprinés : mandibule D, métacarpe (25 g).
 - 9 indét. (33 g).

Ensembles anatomiques

bœuf : tronçon de rachis et côtes (4 thoraciques, 5 lombaires, 11 côtes) ; épaule G (humérus, radius, ulna).



Âges

bœuf : un de 4,5 ans
 porc : un de 12 mois



Sexes

bœuf : une femelle
 porc : trois mâles

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



■ excédant □ moyenne ■ déficit

DÉPÔT 283-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,14 m
 épaisseur du dépôt : 0,11 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 77 NR déterminés : 31
 PR total : 599 g PR déterminés : 446 g




INVENTAIRE

- bœuf : frontal G, éclat de crâne, cervicale, thoracique, sacrée, 3 côtes, scapula D, ulna G, 2 tibia, 2 carpes, métatarse, phalange III (385 g).
- porc : ulna G (2 g).
- caprinés : 3 mandibules, 2 molaires, sacrée, humérus D, radio-ulna D, coxal G, fémur, 2 tibia, métacarpe G, phalange I (99 g).
- 46 indéts. (113 g).

DÉPÔT 283-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,14 m
 épaisseur du dépôt : 0,35 m
 altitude par rapport au fond : 0,76 m
 NR total : 286 NR déterminés : 105
 PR total : 1687 g PR déterminés : 1413 g



INVENTAIRE

- bœuf : prémaxillaire, frontal, 3 frgts de crâne, 2 éclats de crâne, axis, 2 cervicales, 5 thoraciques, lombaire, sacrée, 17 côtes, 3 scapula, 2 humérus, 4 radius, ulna, 2 coxaux, 6 fémurs, tibia, naviculaire, 3 métacarpes, 2 métatarses, 3 phalanges I, phalange III (1027 g).
- porc : 2 mandibules, prémolaire, humérus G (75 g).
- caprinés : 4 mandibules, 2 maxillaires G, 2 incisives, 4 dents, scapula D, 2 humérus, radius D, ulna G, radio-ulna G, 7 fémurs, tibia, 3 métacarpes, 5 phalanges I, 2 phalanges II (246 g).
- cheval : tibia G (64 g).
- chien : talus D (1 g).
- 181 indéts. (274 g).

Âges

caprinés : un de 2,5 ans, un de 7 ans et un de 8 ans
 porc : un de 12 mois

Sexes

bœuf : un châtré et un mâle
 porc : deux mâles





Fosse 283, EM2 (décapage A1)





Fosse 283, EM2 (décapage B2)

Fosse 283-EM2

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



■ excédant □ moyenne ■ déficit

DÉPÔT 284-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,28 m
 épaisseur du dépôt : 0,39 m
 altitude par rapport au fond : 1,22 m
 NR total : 83 NR déterminés : 40
 PR total : 3618 g PR déterminés : 3548 g

**INVENTAIRE**

- bœuf : mandibule, dent, crâne, 2 frontaux, 2 temporaux, 2 chevilles, atlas, cervicale, 3 thoraciques, 4 lombaires, sacrée, coccygienne, 2 côtes, 3 scapula, humérus, 2 radius, fémur, tibia (1777 g).
- porc : molaire, coxal (44 g).
- caprinés : frgt de crâne, atlas, fémur (165 g).
- cheval : crâne entier (étalon, 5 ans), prémaxillaire, 2 côtes (1042 g).
- 43 indét. (70 g).

Ensemble anatomique

bœuf : 3 lombaire et sacrum (520 g)

Âges



caprinés : une femelle
 cheval : un mâle

Sexes

bœuf : un de 2 ans
 cheval : deux de 5 ans



Fosse 284, EM1 (décapage B2)

Choix des parties de bœufs

excédant moyenne déficit

DÉPÔT 284-VRAC (2006)

NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 250 g PR déterminés : 250 g

**INVENTAIRE**


- bœuf : mandibule (250 g).

Âge

bœuf : un de 18 mois

DÉPÔT 285-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 2,2 m
 épaisseur du dépôt : 0,50 m
 altitude par rapport au fond : 0,70 m
 NR total : 321 NR déterminés : 164
 PR total : 5184 g PR déterminés : 4839 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, maxillaire, 2 temporaux, 2 chevilles, cervicale, 2 thoraciques, 7 lombaires, 2 sacrum, 14 côtes, 6 scapula, humérus, radius, 3 ulna, 5 coxaux, 4 fémurs, 3 carpes, tarse, 2 métatarses, 2 phalanges I (2318 g).
- porc : 3 mandibules, canine, 2 pariétaux, éclat de crâne, lombaire, 9 côtes, 5 scapula, humérus, coxal, 2 fémurs, tibia, calcanéum, phalange II (230 g).
- caprinés : 3 mandibules, 3 maxillaires, 3 dents, zygomatique, frgt de crâne, 2 atlas, 2 axis, 6 thoraciques, 2 lombaires, 5 côtes, 4 scapula, 3 humérus, 2 radius, 8 coxaux, 6 fémurs, 4 tibia, calcanéum, carpe, 2 métacarpes, 3 métatarses, métapode, phalange II (447 g).
- cheval : crâne, zygomatique, frgt de crâne, éclat de crâne, disque vert., scapula, radio-ulna, coxal, tibia D (1729 g).
- 157 indé. (345 g).

Ensemble anatomique
 cheval : 7 thoraciques en connexion (115 g)

Âges

bœuf : un de 2 ans, un de 4,5 ans,
 caprinés : un de 12 mois, un de 2 ans, un de 3 ans et un de 6 ans
 cheval : un de 2 ans et un de 4,5 ans
 porc : un de 12 mois



Sexes

bœuf : une femelle et un mâle
 porc : un mâle
 cheval : un mâle





Fosse 285, EM1 (décapage A2)

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf





Fosse 285, EM1 (décapage B1)



Fosse 285, EM1 (décapage B2)

DÉPÔT 285-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 2,20 m

épaisseur du dépôt : 0,22 m

altitude par rapport au fond : 1,32 m

NR total : 106 NR déterminés : 40

PR total : 439 g PR déterminés : 317 g



INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules, incisive, 2 lombaires, 2 côtes, 2 radius, 2 fémurs, carpe, métatarse, métapode (179 g).

- porc : mandibule G, maxillaire D, dent, temporal G, côte, humérus G, métapode lat (34 g).

- caprinés : mandibule D, 2 maxillaires, 2 dents, axis, cervicale, thoracique, côte, 2 humérus, 2 coxaux G, tarse, métatarse D, phalange III (86 g).

- cheval : éclat de crâne, 2 radius (18 g).

- 66 indét. (122 g).

Âges

caprinés : un de 2 ans

porc : un de 12 mois

Sexe

caprinés : une femelle

DÉPÔT 285-EM3 (2006)

NR total : 9 NR déterminés : 6

PR total : 237 g PR déterminés : 227 g



INVENTAIRE

bœuf : mandibule D, zygomatique, lombaire, disque vert., côte (207 g)

caprinés : maxillaire G (20 g)

3 indét. (10 g)

DÉPÔT 285-VRAC (2006)

NR total : 2 NR déterminés : 2

PR total : 17 g PR déterminés : 17 g



INVENTAIRE

- bœuf : phalange I (5 g).

- porc : pariétal G (12 g).

DÉPÔT 286-EM1 (2006)

profondeur de la fosse : 1,95 m
 épaisseur du dépôt : 0,10 m
 altitude par rapport au fond : 0,50 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 62 g PR déterminés : 62 g



INVENTAIRE

- cheval : frontal D (62 g).

DÉPÔT 286-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 1,95 m
 épaisseur du dépôt : 0,19 m
 altitude par rapport au fond : 0,68 m
 NR total : 3 NR déterminés : 3
 PR total : 310 g PR déterminés : 310 g



INVENTAIRE

- bœuf : humérus D (215 g).
 - caprinés : humérus G (30 g).
 - cheval : dent jugale sup (65 g).

DÉPÔT 286-EM3 (2006)

profondeur de la fosse : 1,95 m
 épaisseur du dépôt : 0,05 m
 altitude par rapport au fond : 1,31 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 133 g PR déterminés : 133 g



INVENTAIRE

- bœuf : fémur G (42 g).
 - cheval : radius G (91 g).

DÉPÔT 287-EM1 (2007)

profondeur de la fosse : 3,64 m
épaisseur du dépôt : 0,29 m
altitude par rapport au fond : 0,20 m
NR total : 7 NR déterminés : 7
PR total : 459 g PR déterminés : 459 g



INVENTAIRE

- bœuf : cheville, cervicale, 2 coxaux, tibia D, tarse (362 g)
- porc : humérus G (97 g)

DÉPÔT 287-EM2 (2007)

profondeur de la fosse : 3,64 m
épaisseur du dépôt : 0,14 m
altitude par rapport au fond : 2,42 m
NR total : 2 NR déterminés : 2
PR total : 268 g PR déterminés : 268 g



INVENTAIRE

- bœuf : humérus G (158 g).
- cheval : métatarse G (110 g).

DÉPÔT 287-VRAC (2007)

NR total : 2 NR déterminés : 1
PR total : 200 g PR déterminés : 183 g



INVENTAIRE

- cheval : radius D (183 g).
- 1 indét. (17 g).

DÉPÔT 288-EM1 (2007)

profondeur de la fosse : 2,51 m
 épaisseur du dépôt : 0,25 m
 altitude par rapport au fond : 0,01 m
 NR total : 16 NR déterminés : 14
 PR total : 1588 g PR déterminés : 1588 g

**INVENTAIRE**

- bœuf : lombaire, métatarse (27 g).
- porc : 2 fémurs (49 g)
- caprinés : frgt de crâne, fémur (25 g)
- cheval : maxillaire, paire de fémurs, coxal (898 g).

Ensembles anatomiques

caprinés : métacarpe et carpe D (14 g), phal II et 2 phal III (5 g)
 cheval : deux pieds antérieurs en connexion et pied postérieur G (538 g).

Âge

cheval : un de 2 ans



Fosse 288, EM1 (décapage B5)



Fosse 288, EM1 (décapage B6)



Fosse 288, EM1 (décapage B7)

DÉPÔT 288-EM2 (2007)

profondeur de la fosse : 2,51 m
 épaisseur du dépôt : 0,24 m
 altitude par rapport au fond : 0,42 m
 NR total : 12 NR déterminés : 12
 PR total : 385 g PR déterminés : 385 g

**INVENTAIRE**

- bœuf : éclat de crâne, cervicale, radius G, coxal, fémur D, métapode (164 g).
- porc : maxillaire D, occipital, métatarse (32 g).
- caprinés : molaire, scapula G (29 g).
- cheval : scapula D (160 g).

Âge

porc : un de 6 mois

DÉPÔT 288-EM3 (2007)

profondeur de la fosse : 2,51 m
 épaisseur du dépôt : 0,29 m
 altitude par rapport au fond : 0,75 m
 NR total : 27 NR déterminés : 21
 PR total : 6366 g PR déterminés : 6325 g



INVENTAIRE

- bœuf : paire de maxillaires, cheville, axis, thoracique, 2 côtes, naviculaire, métatarse (362 g).
- porc : 2 mandibules, pariétal, éclat de crâne, scapula, coxal (83 g).
- caprinés : scapula (10 g).
- cheval : 2 coxaux, métatarse, phalange I (606 g).
- 6 indét. (41 g).

Ensembles anatomiques

cheval : crâne et mandibules (3019 g) ; 3 thoraciques et 5 lombaires (2245 g)

Âges

bœuf : un de 18 mois
 cheval : un de 7 ans
 porc : un de 12 mois

Sexes

bœuf : un mâle
 cheval : un mâle

DÉPÔT 288-EM4 (2007)

profondeur de la fosse : 2,51 m
 épaisseur du dépôt : 0,46 m
 altitude par rapport au fond : 1,21 m
 NR total : 9 NR déterminés : 9
 PR total : 460 g PR déterminés : 460 g



INVENTAIRE


- bœuf : mandibule G, éclat de crâne, coxal G (274 g).
- porc : radius D (13 g).
- cheval : côte, coxal G, fémur, métacarpe G (169 g).

Âges

bœuf : un de 6 ans
 cheval : un de 7 ans

Sexe

bœuf : un mâle



Fosse 288, EM4 (décapage B1)

DÉPÔT 288-VRAC (2007)

NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 30 g PR déterminés : 30 g



INVENTAIRE

- bœuf : cervicale (30 g).

DÉPÔT 289-EM2 (2006)

profondeur de la fosse : 4,38 m
épaisseur du dépôt : 0,33 m
altitude par rapport au fond : 1,40 m
NR total : 2 NR déterminés : 2
PR total : 100 g PR déterminés : 100 g



INVENTAIRE

- bœuf : atlas, axis (100 g).

DÉPÔT 289-EM4 (2007)

profondeur de la fosse : 4,38 m
épaisseur du dépôt : 0,19 m
altitude par rapport au fond : 2,64 m
NR total : 8 NR déterminés : 5
PR total : 351 g PR déterminés : 317 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, fémur G, tibia D, calcanéum (288 g).
- caprinés : fémur G (29 g).
- 3 indét. (34 g).

DÉPÔT 289-VRAC (2007)

NR total : 3 NR déterminés : 3
PR total : 342 g PR déterminés : 342 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule D, humérus G, tibia D (342 g).

Âge

bœuf : un de 4,5 ans

DÉPÔT 290-EM2 (2007)

profondeur de la fosse : 4,1 m
 épaisseur du dépôt : 0,05 m
 altitude par rapport au fond : 0,77 m
 NR total : 17 NR déterminés : 10
 PR total : 196 g PR déterminés : 176 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule G, thoracique, 4 côtes, ulna G, coxal G, métatarse G (172 g).
- porc : humérus (4 g).
- 7 indét. (20 g).

Âge

bœuf : un de 12 mois

DÉPÔT 290-EM3 (2007)

profondeur de la fosse : 4,1 m
 épaisseur du dépôt : 0,17 m
 altitude par rapport au fond : 0,92 m
 NR total : 12 NR déterminés : 9
 PR total : 304 g PR déterminés : 295 g



INVENTAIRE

- bœuf : scapula D, humérus, patella, 2 tibia, tarse (172 g).
- caprinés : fémur D (6 g).
- cheval : 2 prémolaires (117 g).
- 3 indét. (9 g).

DÉPÔT 290-EM5 (2007)

profondeur de la fosse : 4,10 m
 épaisseur du dépôt : 0,18 m
 altitude par rapport au fond : 1,75 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 20 g PR déterminés : 20 g



INVENTAIRE

- porc : humérus G (20 g).

DÉPÔT 290-EM6 (2007)

profondeur de la fosse : 4,10 m
 épaisseur du dépôt : 0,58 m
 altitude par rapport au fond : 3,12 m
 NR total : 5 NR déterminés : 5
 PR total : 167 g PR déterminés : 167 g




INVENTAIRE

- bœuf : cheville, cervicale, côte (77 g).
- cheval : tibia D (78 g).
- porc : mandibule G (12 g).

DÉPÔT 290-VRAC (2007)

NR total : 5 NR déterminés : 5
PR total : 228 g PR déterminés : 228 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule G, métatarse D (31 g).
- porc : mandibule G (30 g).
- cheval : prémolaire, tibia G (167 g).

Âge

porc : un de 12 mois

DÉPÔT 291-EM4 (2007)

profondeur de la fosse : 4,56 m
 épaisseur du dépôt : 0,12 m
 altitude par rapport au fond : 1,12 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 255 g PR déterminés : 255 g



INVENTAIRE

- porc : crâne adulte sans prémaxillaire (250 g).
 - caprinés : tibia D (5 g).

Âge

porc : un de 5 ans

DÉPÔT 291-EM5 (2007)

profondeur de la fosse : 4,56 m
 épaisseur du dépôt : 0,16 m
 altitude par rapport au fond : 1,25 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 80 g PR déterminés : 80 g



INVENTAIRE

- bœuf : scapula G (80 g).

DÉPÔT 291-EM6 (2007)

profondeur de la fosse : 4,56 m
 épaisseur du dépôt : 0,06 m
 altitude par rapport au fond : 2,18 m
 NR total : 3 NR déterminés : 3
 PR total : 125 g PR déterminés : 125 g



INVENTAIRE

- bœuf : lombaire, thoracique, côte (125 g).

DÉPÔT 291-EM7 (2007)

profondeur de la fosse : 4,56 m
 épaisseur du dépôt : 0,12 m
 altitude par rapport au fond : 4,08 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 50 g PR déterminés : 50 g



INVENTAIRE

- bœuf : métatarse (50 g).

DÉPÔT 291-VRAC (2007)

NR total : 4 NR déterminés : 4
 PR total : 132 g PR déterminés : 132 g



INVENTAIRE

- bœuf : cervicale, coxal G, tibia G, métatarse G (132 g).

DÉPÔT 292-EM1 (2007)

profondeur de la fosse : 3,82 m
 épaisseur du dépôt : 0,02 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 4 NR déterminés : 4
 PR total : 66 g PR déterminés : 66 g



INVENTAIRE

- bœuf : temporal, axis, humérus, naviculaire (66 g).

DÉPÔT 292-EM2 (2007)

profondeur de la fosse : 3,82 m
 épaisseur du dépôt : 0,10 m
 altitude par rapport au fond : 0,89 m
 NR total : 4 NR déterminés : 4
 PR total : 775 g PR déterminés : 775 g



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, scapula D, humérus D (680 g)
 - cheval : cervicale (95 g)

Âge

bœuf : un de 9 ans

DÉPÔT 292-EM3 (2007)

profondeur de la fosse : 3,82 m
 épaisseur du dépôt : 0,21 m
 altitude par rapport au fond : 1,80 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 1000 g PR déterminés : 1000 g



INVENTAIRE

- bœuf : crâne entier (1000 g).

Sexe

bœuf : une femelle



Fosse 292, EM3 (décapage 2)

DÉPÔT 292-EM4 (2007)

profondeur de la fosse : 3,82 m
 épaisseur du dépôt : 0,28 m
 altitude par rapport au fond : 2,57 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 400 g PR déterminés : 400 g



INVENTAIRE

- cheval : mandibule D (400 g).

DÉPÔT 293-EM1 (2007)

profondeur de la fosse : 2,62 m
 épaisseur du dépôt : 0,06 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 1 NR déterminés : 0
 PR total : 2 g

DÉPÔT 293-EM2 (2007)

profondeur de la fosse : 2,62 m
 épaisseur du dépôt : 0,18 m
 altitude par rapport au fond : 0,70 m
 NR total : 25 NR déterminés : 10
 PR total : 238 g PR déterminés : 193 g




INVENTAIRE

- bœuf : cervicale, 2 thoraciques, côte, humérus D, métatarse (133 g).
- porc : atlas (10 g).
- caprinés : atlas, scapula D, fémur G (50 g).
- 15 indét. (45 g).

DÉPÔT 293-EM3 (2007)

profondeur de la fosse : 2,62 m
 épaisseur du dépôt : 0,58 m
 altitude par rapport au fond : 0,95 m
 NR total : 40 NR déterminés : 29
 PR total : 11688 g PR déterminés : 11638 g



INVENTAIRE

- bœuf : molaire, axis, 2 cervicales, thoracique, 7 côtes, 3 scapula, humérus D, carpe, métacarpe (295 g).
- porc : 2 scapula D, radius D, tibia D (47 g).
- caprinés : scapula D, coxal G, fémur (38 g).
- cheval : radius D, métacarpe D, phalange II (50 g).
- 11 indét. (50 g).

ENSEMBLE ANATOMIQUE

cheval : squelette de jument (18 ans, 1,17 m) ; il manque le coxal D, patella G, les talus, le calcanéum D, les naviculaires (5604 g).

Âges

cheval : un de 16 ans et un de 18 ans
 porc : un de 1 mois



Fosse 293, EM3 (décapage A1)



Fosse 293, EM3 (décapage B1)

DÉPÔT 293-VRAC (2007)

NR total : 1 NR déterminés : 1
PR total : 140 g PR déterminés : 140 g



INVENTAIRE

- bœuf : tibia G (140 g).

Sexes

caprinés : une femelle

cheval : une femelle

DÉPÔT 299-EM1 (2007)

profondeur de la fosse : 2,55 m
 épaisseur du dépôt : 0,17 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 5 NR déterminés : 5
 PR total : 105 g PR déterminés : 105 g



INVENTAIRE

- bœuf : 2 cervicales, thoracique, côte, ulna D (105 g)

DÉPÔT 299-EM2 (2007)

profondeur de la fosse : 2,55 m
 épaisseur du dépôt : 0,14 m
 altitude par rapport au fond : 0,41 m
 NR total : 10 NR déterminés : 6
 PR total : 869 g PR déterminés : 851 g



INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules, côte, scapula D, humérus D (844 g).
 - caprinés : molaire (7 g).
 - 4 indét. (18 g).

Âge

bœuf : un de 2,5 ans



Fosse 299, EM2 (décapage A1)

DÉPÔT 299-EM3 (2007)

profondeur de la fosse : 2,55 m
 épaisseur du dépôt : 0,07 m
 altitude par rapport au fond : 0,61 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 78 g PR déterminés : 78 g



INVENTAIRE

- bœuf : côte, tibia (78 g).

DÉPÔT 299-EM4 (2007)

profondeur de la fosse : 2,55 m
 épaisseur du dépôt : 0,13 m
 altitude par rapport au fond : 1,25 m
 NR total : 9 NR déterminés : 9
 PR total : 926 g PR déterminés : 926 g



INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules, sacrum, scapula D, 2 radius, fémur G, tibia G (887 g).
 - cheval : axis (39 g).

Âge

bœuf : un de 2,5 ans

DÉPÔT 301-EM1 (2007)

profondeur de la fosse : 5,14 m
 épaisseur du dépôt : 0,59 m
 altitude par rapport au fond : 1,29 m
 NR total : 4 NR déterminés : 3
 PR total : 42 g PR déterminés : 34 g



INVENTAIRE

- cheval : 2 sternèbres, cart. costal (34 g).
 - 1 indét. (8 g).

DÉPÔT 301-EM2 (2007)

profondeur de la fosse : 5,14 m
 épaisseur du dépôt : 1,25 m
 altitude par rapport au fond : 3,22 m
 NR total : 7 NR déterminés : 7
 PR total : 603 g PR déterminés : 603 g



INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules, cheville, thoracique, scapula D,
 radius G (548 g).
 - cheval : ulna D (55 g).

Âge

bœuf : un de 16 mois



Fosse 301, EM2 (décapage B1)

DÉPÔT 301-VRAC (2007)

NR total : 3 NR déterminés : 2
 PR total : 502 g PR déterminés : 492 g



INVENTAIRE

- bœuf : fémur (12 g).
 - cheval : fémur (480 g).
 - 1 indét. (10 g).

DÉPÔT 304-EM2 (2007)

profondeur de la fosse : 4,51 m
épaisseur du dépôt : 0,43 m
altitude par rapport au fond : 2,55 m
NR total : 12 NR déterminés : 12
PR total : 687 g PR déterminés : 687 g

INVENTAIRE

- bœuf : 1 thoracique, 2 lombaires, côte, humérus, 3 carpes G (264 g).

Ensembles anatomiques

bœuf : 6 cervicales, 8 thoraciques, humérus et radio-ulna D (243 g) ; métacarpe D avec phalanges I et II (180 g)

Sexe

bœuf : une femelle

DÉPÔT 304-EM4 (2007)

profondeur de la fosse : 4,51 m
épaisseur du dépôt : 0,05 m
altitude par rapport au fond : 4,20 m
NR total : 6 NR déterminés : 5
PR total : 339 g PR déterminés : 335 g

INVENTAIRE

- bœuf : mandibule D, côte, scapula, fémur, métacarpe (335 g).
- 1 indét. (4 g).

Âge


bœuf : un de 2,5 ans



Fosse 304, EM4 (décapage B1)

DÉPÔT 306-EM3 (2007)

profondeur de la fosse : 4,85 m
 épaisseur du dépôt : 0,08 m
 altitude par rapport au fond : 2,14 m
 NR total : 4 NR déterminés : 4
 PR total : 115 g PR déterminés : 115 g



INVENTAIRE

- bœuf : radius G, tibia G (89 g).
- porc : mandibule G (8 g).
- caprinés : fémur (18 g).

Âge

porc : un de 5 mois

DÉPÔT 306-EM4 (2007)

profondeur de la fosse : 4,85 m
 épaisseur du dépôt : 0,08 m
 altitude par rapport au fond : 2,5 m
 NR total : 8 NR déterminés : 4
 PR total : 41 g PR déterminés : 29 g



INVENTAIRE

- bœuf : ulna D, métapode, 2 phalanges I (29 g).
- 4 indét. (12 g).

DÉPÔT 309-EM1 (2007)

profondeur de la fosse : 4,70 m
 épaisseur du dépôt : 0,72 m
 altitude par rapport au fond : 0,07 m
 NR total : 2 NR déterminés : 1
 PR total : 110 g PR déterminés : 98 g




INVENTAIRE

- bœuf : tibia D (98 g).
- 1 indét. (12 g).

DÉPÔT 309-EM2 (2007)

profondeur de la fosse : 4,70 m
 épaisseur du dépôt : 0,77 m
 altitude par rapport au fond : 2,41 m
 NR total : 9 NR déterminés : 6
 PR total : 79 g PR déterminés : 76 g




INVENTAIRE

- bœuf : lactéale, cervicale, côte, fémur (43 g).
- porc : métapode (4 g).
- cheval : radius D (29 g).
- 3 indét. (3 g).

DÉPÔT 310-EM2 (2007)

profondeur de la fosse : 4,81 m
épaisseur du dépôt : 0,16 m
altitude par rapport au fond : 1,10 m
NR total : 4 NR déterminés : 4
PR total : 860 g PR déterminés : 860 g



INVENTAIRE

- bœuf : scapula D, 2 humérus D (800 g).
- cheval : tibia D (60 g).

Sexe

bœuf : une femelle

DÉPÔT 310-VRAC (2007)

NR total : 1 NR déterminés : 1
PR total : 1 g PR déterminés : 1 g



INVENTAIRE

- porc : incisive (1 g).

DÉPÔT 311-EM1 (2007)

profondeur de la fosse : 0,97 m
épaisseur du dépôt : 0,43 m
altitude par rapport au fond : 0 m
NR total : 5 NR déterminés : 4
PR total : 29 g PR déterminés : 24 g



INVENTAIRE

- bœuf : cheville, côte, phalange III (21 g).
- caprinés : radius D (3 g).
- 1 indét. (5 g).

DÉPÔT 313-EM2 (2007)

profondeur de la fosse : 4,90 m
 épaisseur du dépôt : 0,35 m
 altitude par rapport au fond : 0,07 m
 NR total : 11 NR déterminés : 10
 PR total : 510 g PR déterminés : 497 g



INVENTAIRE

- bœuf : occipital, cheville, cervicale, thoracique, ulna G, fémur, métatarse D (427 g).
- porc : paire de mandibules, mandibule (25 g).
- cheval : cervicale (45 g).
- 1 indét. (13 g).

Âge

porc : un de 12 mois



Fosse 313, EM1 (décapage A1)

DÉPÔT 313-EM3 (2007)

profondeur de la fosse : 4,90 m
 épaisseur du dépôt : 0,1 m
 altitude par rapport au fond : 1,69 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2
 PR total : 140 g PR déterminés : 140 g



INVENTAIRE

- porc : molaire (10 g).
- caprinés : paire de frontaux (130 g).

Sexe

caprinés : une femelle

DÉPÔT 314-EM2 (2006-7)

profondeur de la fosse : 4,66 m
 épaisseur du dépôt : 0,23 m
 altitude par rapport au fond : 0,74 m
 NR total : 14 NR déterminés : 14
 PR total : 1608 g PR déterminés : 1608 g



INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules, prémaxillaire D, crâne, 3 radius, 2 ulna G, 2 fémurs, métacarpe G, phalange I (1594 g).
 - caprinés : scapula D (14 g).

Âge

bœuf : un de 2,5 ans

Sexes

bœuf : un châtré et une femelle

DÉPÔT 314-EM4 (2006-7)

profondeur de la fosse : 4,66 m
 épaisseur du dépôt : 0,08 m
 altitude par rapport au fond : 4,14 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 17 g PR déterminés : 17 g



INVENTAIRE

- bœuf : métacarpe (17 g).

DÉPÔT 317-EM2 (2007)

profondeur de la fosse : 1,35 m
 épaisseur du dépôt : 0,10 m
 altitude par rapport au fond : 0,57 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1
 PR total : 17 g PR déterminés : 17 g



INVENTAIRE

- bœuf : scapula D, fémur D, calcanéum G, phalange I (291 g).
 - 1 indét. (37 g).

DÉPÔT 320-EM1 (2007)

profondeur de la fosse : 0,74 m
 épaisseur du dépôt : 0,05 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 11 NR déterminés : 8
 PR total : 126 g PR déterminés : 119 g



INVENTAIRE

- bœuf : thoracique, scapula, ulna G, métacarpe D, phalange III (90 g).
 - caprinés : fémur, tibia G, calcanéum G (29 g).
 - 3 indét (7 g).

DÉPÔT 325-EM1 (2007-8)

profondeur de la fosse : 1,78 m
 épaisseur du dépôt : 0,91 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2




INVENTAIRE

- bœuf : côte, disque vertébral.

DÉPÔT 325-EM2 (2007-8)

profondeur de la fosse : 1,78 m
 épaisseur du dépôt : 0,28 m
 altitude par rapport au fond : 0,95 m
 NR total : 241 NR déterminés : 147



INVENTAIRE

- bœuf : 11 mandibules, 8 maxillaires, prémaxillaire, 16 dents, frontal, zygomatique, occipital, cheville, hyoïde, frgt de crâne, éclat de crâne, axis, cervicale, 3 thoraciques, 5 lombaires, sacrée, coccygienne, 23 côtes, 5 scapula, 4 humérus, 3 radius, 3 ulna, 3 coxaux, 2 fémurs, 5 tibia, talus, métacarpe, métatarse, phalange II.
- porc : 2 côtes, scapula, 2 radius, tibia, métatarse IV.
- caprinés : 5 mandibules, 3 maxillaires, crâne, 2 frontaux, zygomatique, 4 côtes, 2 scapula, 2 radius, tibia, talus, tarse, métacarpe, 2 métatarses.
- cheval : mandibule, 2 scapula D, fémur G, 2 tibia.
- 94 indét.

Âges

bœuf : un mâle
 caprinés : deux femelles
 cheval : un mâle



Sexes

bœuf : deux de 2 ans, un de 4,5 ans, un de 6 ans et un de 8 ans
 caprinés : deux de 11 mois et un de 20 mois





Fosse 325, EM2 (décapage AB4)

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



■ excédant ■ moyenne ■ déficit

DÉPÔT 400-EM1 (2008)

profondeur de la fosse : 0,60 m
épaisseur du dépôt : 0,35 m
altitude par rapport au fond : 0,24 m
NR total : 4 NR déterminés : 4



INVENTAIRE

bœuf : maxillaire, paire de mandibules, mandibule, prémolaire

DÉPÔT 407-EM1 (2008)

profondeur de la fosse : 1,26 m
épaisseur du dépôt : 0,16 m
altitude par rapport au fond : 0,03 m
NR total : 1 NR déterminés : 1



INVENTAIRE

- bœuf : **squelette** de veau de moins de six mois, complet, mais très mal conservé reposant sur le fond de la fosse.

Âge

bœuf : un de 5 mois



Fosse 407, EM1 (décapage AB2)

DÉPÔT 407-EM2 (2008)

profondeur de la fosse : 1,26 m
 épaisseur du dépôt : 0,36 m
 altitude par rapport au fond : 0,15 m
 NR total : 43 NR déterminés : 24

**INVENTAIRE**

- bœuf : 5 mandibules, maxillaire, dent, 2 frontaux, éclat de crâne, disque vert., 2 scapula, humérus, 2 tibia, carpe, méta-carpe, métapode, phalange I.
 - caprinés : cheville de chèvre, radius
 - 19 indéts.

Ensembles anatomiques

bœuf : tibia et tarse ; carpes et métacarpes

Âges

bœuf : un de 4,5 ans, un de 6 ans et deux de 8 ans

Sexes

bœuf : un châtré et un mâle



Fosse 407, EM2 (décapage B1)

DÉPÔT 410-EM1 (2008)




profondeur de la fosse : 2,96 m
 épaisseur du dépôt : 0,05 m
 altitude par rapport au fond : 1,41 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1

INVENTAIRE

- bœuf : cheville osseuse et frgt de frontal (coupe éboulée).

DÉPÔT 410-EM2 (2008)



profondeur de la fosse : 2,96 m
 épaisseur du dépôt : 0,36 m
 altitude par rapport au fond : 1,65 m
 NR total : 327 NR déterminés : 315

INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules, 2 maxillaires, molaire, frontal, 3 chevilles, éclat de crâne, axis, 9 cervicales, 24 thoraciques, 16 lombaires, sacrée, 3 sacrum, 2 vertèbres, 64 côtes, 11 scapula, 10 humérus, 2 radius, 2 ulna, radio-ulna, 8 coxaux, 11 fémurs, 2 patella, 6 tibia, talus, 4 calcanéum, 6 carpes, naviculaire, 4 métacarpes, 11 métatarses, métapode, 2 phalanges I, 4 phalanges II, 2 phalanges III, 7 sésamoïdes.
- porc : mandibule G, maxillaire G, temporal G, 6 côtes, 2 humérus, coxal D, fémur D, métapode.
- caprinés : 3 mandibules, 2 maxillaires, 3 dents, frontal, pariétal, lombaire, 2 scapula, humérus, radius, 3 coxaux, fémur, 5 tibia, talus, tarse, 3 métatarses.
- chien : 3 mandibules, maxillaire, molaire, axis, 2 cervicales, 3 thoraciques, lombaire, 2 coccygiennes, 2 côtes, 2 scapula, 2 humérus, 2 radius, coxal, fémur, 2 tibias, calcanéum, métacarpe, 2 métapodes, 4 phalanges I.
- oiseau : radius
- 12 indét.

Ensembles anatomiques

bœuf : 2 lombaires ; 2 corps vertébraux ; fémur et tibia ; tarse, métatarses et phalanges ; phalanges I, II et III ; tarse D
 chien : métapode et phalange I, 2 métapodes et phalanges II, 5 métacarpes et 8 phalanges, 4 métapodes et 9 phalanges.


Âges

bœuf : un de 12 mois, un de 15 mois et un de 2 ans
 porc : un de 6 mois
 caprinés : un de 2,5 ans



Sexes

bœuf : une femelle et deux mâles
 caprinés : une femelle

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



■ excédant □ moyenne ■ déficit



Fosse 410, EM2 (décapage AB2)



Fosse 410, EM2 (décapage AB3)



Fosse 410, EM2 (décapage AB4)



Fosse 410, EM2 (décapage AB5)

DÉPÔT 414-EM2 (2008)

profondeur de la fosse : 2,40 m
épaisseur du dépôt : 0,61 m
altitude par rapport au fond : 0,35 m
NR total : 12 NR déterminés : 12



INVENTAIRE

- bœuf : frontal, éclat de crâne, lombaire, tibia.
- porc : métatarse.
- caprinés : fémur D.
- cheval : humérus D, radio-ulna G, fémur G.
- chien : coxal.

Ensemble anatomique

bœuf : Squelette de vache de 2,5 ans, 1,05 m au garrot.
tibia, talus, calcanéum et naviculaire G

Âges

bœuf : un de 2,5 ans
porc : un de 1 mois
cheval : un de 3,5 ans

Sexe

bœuf : une femelle



Fosse 414, EM2 (décapage AB9)

DÉPÔT 414-EM3 (2008)

profondeur de la fosse : 2,40 m
épaisseur du dépôt : 0,88 m
altitude par rapport au fond : 0,88 m
NR total : 90 NR déterminés : 38



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, occipital, 3 maxillaires G, frontal, hyoïde, 2 cervicales, coccygienne, 4 scapula, humérus, coxal, 2 fémurs, 2 tibia, calcanéum, naviculaire, 4 métatarses.
- porc : maxillaire.
- cheval : 2 cervicales, 2 thoraciques, lombaire, côte, radius G, carpe, phalange II.
- chien : côte.
- oiseau sp. : tibiotarse.
- 52 indét.

Âges

bœuf : un de 12 mois
porc : un de 15 mois

Sexe

bœuf : une femelle

DÉPÔT 414-vrac (2008)

NR total : 9 NR déterminés : 1

INVENTAIRE

- porc : dent
- 8 indét.

DÉPÔT 416-EM1 (2008)

profondeur de la fosse : 1,86 m
 épaisseur du dépôt : 0,10 m
 altitude par rapport au fond : 0,23 m
 NR total : 4 NR déterminés : 4




INVENTAIRE

- bœuf : fémur, naviculaire, phalange II.
 - caprinés : tibia D

DÉPÔT 416-EM2 (2008)

profondeur de la fosse : 1,86 m
 épaisseur du dépôt : 0,84 m
 altitude par rapport au fond : 0,33 m
 NR total : 339 NR déterminés : 268



INVENTAIRE

- bœuf : 7 mandibules, 6 dents, nasal, temporal, pariétal, 3 occipitaux, 2 chevilles, hyoïde, 2 éclats de crâne, 7 cervicales, 23 thoraciques, 8 lombaires, sacrum, 3 coccygiennes, 2 disques vert., 78 côtes, 13 scapula, 11 humérus, 5 radius, 3 ulna, 8 coxaux, 3 fémurs, 14 tibia, talus, 3 calcanéums, 4 carpes, naviculaire, tarse, 4 métacarpes, 2 métatarses, 3 phalanges I, 4 phalanges III.
 - porc : mandibule G, lombaire, 3 côtes, 2 scapula D, humérus G, radius G.
 - caprinés : maxillaire G, prémaxillaire D, prémolaire, crâne fendu, frontal D, temporal, 2 chevilles, axis, cervicale, 3 côtes, 2 humérus, 2 coxaux, 3 tibia, talus G, carpe, 2 métacarpes D, 3 phalanges I.
 - cheval : cervicale, coccygienne.
 - chevreuil : mandibule D, humérus D, radio-ulna D, tibia.
 - 71 indét.

Ensemble anatomique

bœuf : talus, calcanéum et malléolaire G

Âges

bœuf : deux de 4,5 ans

caprinés : un de 11 mois

Sexes



bœuf : un châtré et deux mâles

porc : un mâle



caprinés : une femelle

Fosse 416-EM2

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



Fosse 416, EM2 (décapage AB2)



Fosse 416, EM2 (décapage AB4)

DÉPÔT 417-EM1 (2008)

profondeur de la fosse : 1,65 m
 épaisseur du dépôt : 0,02 m
 altitude par rapport au fond : 0,01 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1



INVENTAIRE

Ensembles anatomiques
 caprinés : métatarse G et 2 phalanges I.

DÉPÔT 417-EM2 (2008)

profondeur de la fosse : 1,65 m
 épaisseur du dépôt : 0,27 m
 altitude par rapport au fond : 0,26 m
 NR total : 21 NR déterminés : 17



INVENTAIRE

- bœuf : paire de mandibules, mandibule, 3 incisives, molaire sup., molaire inf., côte, scapula, radio-ulna D, 2 métatarses, phalange I.
 - porc : mandibule D.
 - caprinés : cheville, métacarpe, phalange I.
 - 4 indét.

Ensemble anatomique

bœuf : paire de mandibules

Âge

bœuf : un de 4,5 ans

DÉPÔT 420-EM1 (2008)

profondeur de la fosse : 0,60 m
 épaisseur du dépôt : 0,30 m
 altitude par rapport au fond : 0,12 m
 NR total : 4 NR déterminés : 4



INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules G, 2 mandibules D

Âges

bœuf : un de 2 ans et un de 2,5 ans



Fosse 420, EM1 (décapage B1)

DÉPÔT 421-EM1 (2008)




profondeur de la fosse : 1,6 m
 épaisseur du dépôt : 0,05 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 12 NR déterminés : 3

INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules, incisive.
- g indé.

DÉPÔT 421-EM2 (2008)



profondeur de la fosse : 1,6 m
 épaisseur du dépôt : 0,31 m
 altitude par rapport au fond : 0,23 m
 NR total : 57 NR déterminés : 44



INVENTAIRE

- bœuf : 12 mandibules, maxillaire, 12 dents, frgt de crâne, radius, 2 coxaux, fémur, 2 torses, 3 métacarpes, 3 métatarses, 2 phalanges II.
- cheval : radius D, fémur G, phalange I, phalange II.
- 13 indé.

Âge

bœuf : un de 9 ans

Choix des parties de bœuf




Fosse 421, EM2 (décapage AB1)



Fosse 421, EM2 (décapage AB2)

DÉPÔT 422-EM1 (2008)

profondeur de la fosse : 1,88 m
 épaisseur du dépôt : 0,28 m
 altitude par rapport au fond : 0,23 m
 NR total : 44 NR déterminés : 35



INVENTAIRE

- bœuf : paire de mandibules, 2 frontaux, occipital, cheville, cervicale, 2 scapula D, 2 scapula G, 2 phalanges I.
- porc : 2 mandibules D, maxillaire D, atlas, tibia G.
- caprinés : moitié D d'un crâne, 3 chevilles, scapula G, 2 radius D, coxal D, 2 fémurs, 3 tibias, talus D, calcanéum D.
- 9 indéts.

Ensembles anatomiques

caprinés : tibia et tarse D ; 2 carpe G

Âges


bœuf : un de plus de 12 ans
 porc : deux de 15 mois et un de 18 mois

Sexe

caprinés : une femelle

DÉPÔT 422-EM2 (2008)

profondeur de la fosse : 1,88 m
 épaisseur du dépôt : 0,13 m
 altitude par rapport au fond : 0,75 m
 NR total : 1 NR déterminés : 1



INVENTAIRE

- cheval : radio-ulna G, main D.

Ensemble anatomique

cheval : radius et main G



Fosse 422, EM2 (décapage AB2)

DÉPÔT 422-VRAC (2008)

NR total : 1 NR déterminés : 1



INVENTAIRE

- bœuf : métacarpe.

DÉPÔT 423-EM1 (2008)

profondeur de la fosse : 0,87 m
épaisseur du dépôt : 0,41 m
altitude par rapport au fond : 0 m
NR total : 7 NR déterminés : 2



INVENTAIRE

- bœuf : côte.
- porc : 2 mandibules.
- 5 indét.



Fosse 423, EM1 (décapage A1)

DÉPÔT 434-EM1 (2008)

profondeur de la fosse : 2,68 m
 épaisseur du dépôt : 0,19 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2



INVENTAIRE

- bœuf : calcanéum.
- caprinés : tibia D.

DÉPÔT 434-EM2 (2008)

profondeur de la fosse : 2,68 m
 épaisseur du dépôt : 0,15 m
 altitude par rapport au fond : 0,73 m
 NR total : 26 NR déterminés : 19



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, maxillaire, cheville, atlas, lombaire, côte, scapula, 3 humérus, radius, fémur, tibia, calcanéum, métacarpe, métatarse.
- porc : mandibule.
- cheval : humérus G, ulna G.
- 7 indét.

Âge

bœuf : un de 2,5 ans

Sexe

porc : une femelle



Fosse 434, EM2 (décapage AB4)

DÉPÔT 434-EM3 (2008)

profondeur de la fosse : 2,68 m
épaisseur du dépôt : 0,11 m
altitude par rapport au fond : 0,96 m
NR total : 10 NR déterminés : 5



INVENTAIRE

- bœuf : cervicale, humérus D, métacarpe D.
- porc : 2 mandibules.
- 5 indét.

Âge

porc : un de 15 mois

DÉPÔT 434-EM4 (2008)

profondeur de la fosse : 2,68 m
épaisseur du dépôt : 0,26 m
altitude par rapport au fond : 1,25 m
NR total : 4 NR déterminés : 2



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule G, molaire sup.
- 2 indét.



Fosse 434, EM4 (décapage A1)

DÉPÔT 436-EM1 (2008)

profondeur de la fosse : 2,69 m
 épaisseur du dépôt : 0,13 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 2 NR déterminés : 2




INVENTAIRE

- bœuf : scapula G.
- cheval : fémur D.

DÉPÔT 436-EM2 (2008)

profondeur de la fosse : 2,69 m
 épaisseur du dépôt : 0,31 m
 altitude par rapport au fond : 0,69 m
 NR total : 28 NR déterminés : 26



INVENTAIRE

- bœuf : 3 mandibules, 2 maxillaires, frontal, cheville, frgt de crâne, 2 thoraciques, 4 scapula, radius, coxal, fémur, phalange II.
- cheval : maxillaire, 2 molaires sup., atlas, côte, humérus, 2 tibia G.
- 2 indéts.

Âge

bœuf : un de 8 ans



Fosse 436, EM2 (décapage B3)

DÉPÔT 436-EM3 (2008)

profondeur de la fosse : 2,69 m
 épaisseur du dépôt : 0,24 m
 altitude par rapport au fond : 1,00 m
 NR total : 2 NR déterminés : 1



INVENTAIRE

- bœuf : scapula D
- 1 indéts.

DÉPÔT 436-EM4 (2008)

profondeur de la fosse : 2,69 m
 épaisseur du dépôt : 0,15 m
 altitude par rapport au fond : 1,35 m
 NR total : 8 NR déterminés : 7




INVENTAIRE

- bœuf : maxillaire G, 4 scapula, fémur, métatarse G.
- 1 indéts.

DÉPÔT 437-EM1 (2008)

profondeur de la fosse : 3,05 m
 épaisseur du dépôt : 0,47 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 502 NR déterminés : 260



INVENTAIRE

- bœuf : 3 mandibules, 2 maxillaires, prémaxillaire, palais, incisive, 2 crânes, frontal, 2 zygomatiques, temporal, 2 occipitaux, cheville, 2 frgt de crâne, éclat de crâne, 4 cervicales, 8 thoraciques, 2 lombaires, sacrée, coccygienne, vertèbre, 4 disques, 38 côtes, 2 sternèbres, 3 cartilages costaux, 4 scapula, 2 humérus, 2 radius, 2 ulna, 2 radio-ulna, 4 coxaux, 11 fémurs, 4 tibias, 3 calcanéum, 3 carpes, naviculaire, métapode, 7 phalanges I, 7 phalanges II, 6 phalanges III, 4 sésamoïdes.
- porc : 10 mandibules, 3 maxillaires, prémaxillaire, 2 dents, 4 frontaux, 2 zygomatiques, sphénoïde, atlas, thoracique, 2 lombaires, 8 côtes, 3 scapula, 2 humérus, radius, ulna, 4 coxaux, patella, 3 tibias, talus, tarse, 2 métacarpes, métapode lat., 2 phalanges II, 3 phalanges III.
- caprinés : maxillaire sup., 4 frontaux, 2 zygomatiques, pariétal, axis, 3 cervicales, 2 lombaires, sacrum, côte, 3 scapula, 2 humérus, radius, 2 ulna, radio-ulna, coxal, fémur, tibia, tarse, calcanéum, naviculaire, métacarpe, 3 métatarses, métapode, phalange I, phalange II, phalange III.
- cheval : mandibule D, maxillaire D, fragment de crâne, pariétal.
- 242 indét.

Ensembles anatomiques

bœuf : série de 3 côtes ; 2 phalanges I, 2 II, 1 III ; main D ; main G ; phalanges I, II et III, sésamoïde.
 porc : squelette complet mâle, 14 mois.
 caprinés : tibia et pied G ; 2 cervicales.


Âges

cheval : 2 mois
 porc : un de 6 mois, trois d'un an et un de 18 mois



Sexes

bœuf : deux femelles et un mâle
 caprinés : quatre femelles
 porc : quatre mâles et deux femelles

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf






Fosse 437, EM1 (décapage AB6)



Fosse 437, EM1 (décapage AB7)

DÉPÔT 437-EM2 (2008)

profondeur de la fosse : 3,05 m
 épaisseur du dépôt : 0,17 m
 altitude par rapport au fond : 0,49 m
 NR total : 10 NR déterminés : 10



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, molaire, cheville, 2 cervicales, radius, coxal, phalange III.
 - porc : crâne (boîte crânienne)

Ensemble anatomique

cheval : fémur et patella D.

DÉPÔT 437-EM3 (2008)

profondeur de la fosse : 3,05 m
 épaisseur du dépôt : 0,23 m
 altitude par rapport au fond : 0,68 m
 NR total : 32 NR déterminés : 27



INVENTAIRE

- bœuf : frontal, 4 chevilles, atlas, 2 cervicales, thoracique, sacrée, 3 côtes, radius, 2 coxaux, 2 fémurs, 2 tibia G, 2 métatarses.
 - porc : 2 mandibules.
 - cheval : pariétal, fémur, tarse.
 - 5 indét.

Âge

cheval : un de 1 mois

Sexes

bœuf : une femelle

porc : une femelle

DÉPÔT 437-EM4 (2008)

profondeur de la fosse : 3,05 m
 épaisseur du dépôt : 0,20 m
 altitude par rapport au fond : 0,85 m
 NR total : 23 NR déterminés : 23



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, cervicale, 2 thoraciques, 4 côtes, 2 scapula, 2 humérus, radio-ulna, tibia, 3 talus, calcaneum, métacarpe, 2 métatarses, phalange II.

Ensemble anatomique

bœuf : paire d'épaules.

Âge

bœuf : un de 3,5 ans

Sexe

bœuf : une femelle



Fosse 437, EM4 (décapage A1)

DÉPÔT 437-EM5 (2008)

profondeur de la fosse : 3,05 m
épaisseur du dépôt : 0,12 m
altitude par rapport au fond : 1,19 m
NR total : 13 NR déterminés : 12



INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules, maxillaire, partie occipitale crâne, cervicale, côte, 2 coxaux D, talus et phalange I.
- caprinés : fémur, tibia.
- 1 indét.

Sexe

bœuf : une femelle

DÉPÔT 459-EM1 (2010)

profondeur de la fosse : 0,30 m
épaisseur du dépôt : 0,30 m
altitude par rapport au fond : 0 m
NR total : 25 NR déterminés : 2



INVENTAIRE

- bœuf : maxillaire G
- porc : dent

DÉPÔT 463-EM1 (2009-10)

profondeur de la fosse : 0,8 m

épaisseur du dépôt : 0,28 m

altitude par rapport au fond : 0,07 m

NR total : 2650 NR déterminés : 70

NR total : 1709 NR déterminés : 309



INVENTAIRE

os calcinés :

- bœuf : 5 éclats de crâne, 9 frgt mandibules, 8 dents, 2 caudales, 3 scapula, humérus, 3 radius, 4 fémurs, 2 talus, 2 métacarpes, 5 métapodes, 1 phal I, 4 phal III.
- porc : 3 crânes, 2 mandibules, 2 dents
- caprinés : crâne, 5 dents, coxal, 2 fémurs, 3 tibia, 2 phal I, 2 phal III

Âge


porc : un de 18 mois





Fosse 463, EM1 (décapage AB3)

Fosse 463-EM1

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



■ excédant □ moyenne ■ déficit



Fosse 463, EM1 (décapage AB4)

DÉPÔT 476-EM1 (2010)


profondeur de la fosse : 1,30 m
 épaisseur du dépôt : 0,65 m
 altitude par rapport au fond : 0,05 m
 NR total : 4 NR déterminés : 2



- INVENTAIRE**
 -bœuf : côte
 -cheval : diaphyse de tibia

DÉPÔT 479-EM2 (2010)

profondeur de la fosse : 2,90 m
 épaisseur du dépôt : 0,31 m
 altitude par rapport au fond : 1,37 m
 NR total : 142 NR déterminés : 133



INVENTAIRE

- bœuf : 14 mandibules, 8 maxillaires, 1 molaire, 23 os de crânes, 6 chevilles, 5 frgts de crânes, 2 éclats de crânes, 1 cervicale, 3 thoraciques, 4 lombaires, 1 sacrée, 6 côtes, 3 scapula, 3 humérus, 2 radius, 1 ulna, 1 coxal, 4 fémurs, 1 patella, 5 tibia, calcanéum, naviculaire, 2 métacarpes, 7 métatarses, 3 phalanges I, phalange II, 2 phalanges III
- porc : 1 lombaire, 2 côtes, scapula, humérus, radius, 3 tibia, talus, métapode, phalange II
- caprinés : 2 mandibules D, radius, métatarse
- cheval : coxal, 2 fémurs, calcanéum
- 9 indét.

Ensemble anatomique

caprinés : naviculaire et cunéiforme

Âge

bœuf : un de 8 ans



Sexes

bœuf : un mâle
 cheval : un mâle





Fosse 479, EM2 (décapage A4)

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



■ excédant ■ moyenne ■ déficit

DÉPÔT 479-EM3 (2010)

profondeur de la fosse : 2,90 m
 épaisseur du dépôt : 0,26 m
 altitude par rapport au fond : 1,53 m
 NR total : 36 NR déterminés : 28



INVENTAIRE

- bœuf : 3 mandibules, 4 os de crâne, 1 molaire sup, 2 éclats de crânes, cervicale, thoracique, côte, humérus, 2 coxaux, calcanéum, 2 métacarpes, métatarse, phalange III
- porc : métapode
- caprinés : crâne fendu, coxal, 2 tibia
- cheval : côte
- 8 indéts.

Ensemble anatomique

bœuf : naviculaire, cunéiforme et métatarse

Âge

porc : un de 1 mois

Sexes

bœuf : deux mâles
 caprinés : une femelle



DÉPÔT 479-EM4 (2010)

profondeur de la fosse : 2,90 m
 épaisseur du dépôt : 0,49 m
 altitude par rapport au fond : 1,61 m
 NR total : 39 NR déterminés : 31



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, 2 maxillaires, 2 molaires, 3 os de crânes, cheville, lombaire, 8 côtes, 3 scapula, 2 humérus, 2 coxaux, fémur, talus, calcanéum, phalange I
- porc : mandibule
- caprinés : métatarse
- 8 indéts.

Choix des parties de bœufs**DÉPÔT 479-EM5 (2010)**

profondeur de la fosse : 2,9 m
 épaisseur du dépôt : 0,17 m
 altitude par rapport au fond : 1,96 m
 NR total : 4 NR déterminés : 2



INVENTAIRE

- bœuf : frontal, scapula
- 2 indéts.

DÉPÔT 480-EM1 (2010)

profondeur de la fosse : 0,92 m
épaisseur du dépôt : 0,17 m
altitude par rapport au fond : 0,23 m
NR total : 18 NR déterminés : 12

**INVENTAIRE**

- bœuf : série de 8 incisives
- 2 mandibules, 3 maxillaires, prémolaire, 2 zygomatiques, côte, tibia
- caprinés : frontal
- 16 indét.

Sexe

caprinés : une femelle



Fosse 480, EM1 (décapage B2)

DÉPÔT 481-EM1 (2010)

profondeur de la fosse : 2,38 m
 épaisseur du dépôt : 0,11 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 3 NR déterminés : 3



INVENTAIRE

- bœuf : côte, cart. costal, phalange II

DÉPÔT 481-EM2 (2010)

profondeur de la fosse : 2,38 m
 épaisseur du dépôt : 0,21 m
 altitude par rapport au fond : 0,09 m
 NR total : 10 NR déterminés : 10



INVENTAIRE

- bœuf : 3 thoraciques, côte, cart. costal, fémur, 2 tibia
 - caprinés : axis

Ensemble anatomique
 bœuf : paire de mandibules

Âge

bœuf : un de 2,5 ans



Fosse 481, EM2 (décapage AB13)

DÉPÔT 481-EM3 (2010)

profondeur de la fosse : 2,38 m
 épaisseur du dépôt : 0,30 m
 altitude par rapport au fond : 0,22 m
 NR total : 60 NR déterminés : 55



INVENTAIRE

- bœuf : 3 maxillaires, frontal, zygomatique, éclat de crâne, 2 cervicales, 2 lombaires, 6 côtes, 2 scapula, 3 humérus, 2 radius, radio-ulna, fémur, métacarpe, phalange I
 - porc : 7 os de crânes, 3 cervicales, thoracique, 2 lombaires, scapula, radius, ulna, 2 coxaux, fémur
 - caprinés : 3 **squelettes** de brebis
 - cheval : mandibule, côte, radius, fémur, phalange III
 - 5 indét.

Ensemble anatomique
 bœuf : humérus G et radio-ulna tranchés

Âges



bœuf : un de 7 mois et un de 15 mois
 caprinés : un de 3 ans et un de 4,5 ans
 porc : un de 11 mois

Sexes



caprinés : trois femelles

Fosse 481-EM3

Fréquence des animaux




Choix des parties de bœuf



Fosse 481, EM3 (décapage B12)

DÉPÔT 481-EM4 (2010)

profondeur de la fosse : 2,38 m
 épaisseur du dépôt : 0,46 m
 altitude par rapport au fond : 0,55 m
 NR total : 82 NR déterminés : 44



INVENTAIRE

- bœuf : 4 mandibules, 6 maxillaires, 5 frontaux, occipital, 5 chevilles, cervicale, 4 scapula, humérus, coxal, fémur, tibia, 2 phalanges I
- porc : coxal
- caprinés : mandibule, côte, scapula, humérus, coxal
- cheval : maxillaire, humérus, radius, 2 fémurs, phalange III
- 38 indét.

Âges

bœuf : un de 15 mois et un de 9 ans
 caprinés : un de 20 mois



Sexe

bœuf : deux châtrés





Fosse 481, EM4 (décapage AB9)

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



■ excédant □ moyenne ■ déficit

DÉPÔT 481-EM5 (2010)

profondeur de la fosse : 2,38 m
 épaisseur du dépôt : 1,28 m
 altitude par rapport au fond : 0,71 m
 NR total : 74 NR déterminés : 57



INVENTAIRE

- bœuf : 4 mandibules, 8 maxillaires, crâne fendu, 11 os de crânes, 4 chevilles, 2 frgts de crânes, 2 thoraciques, côte, 7 scapula, humérus, 2 coxaux, fémur, métacarpe, 2 métatarses, métapode, phalange I, phalange II
- cheval : 2 mandibules, 2 scapula D, coxal D
- 17 indét.

Ensemble anatomique

bœuf : série de 5 incisives, paire de mandibules



Âges

bœuf : deux de 2,5 ans et un de 3 ans
 cheval : un de 12 ans



Sexes

bœuf : un châtré et trois femelles
 cheval : une femelle et un mâle

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



DÉPÔT 482-EM1 (2010)

profondeur de la fosse : 3,33 m
 épaisseur du dépôt : 0,19 m
 altitude par rapport au fond : 0,19 m
 NR total : 19 NR déterminés : 19




INVENTAIRE

- bœuf : cheville, atlas, 3 thoraciques, caudale, 2 scapula, humérus, radius, fémur, tibia
- porc : coxal
- caprinés : côte, 2 fémurs
- cheval : maxillaire juvénile (s'articule avec la mandibule 481, dec 11), talus
- chien : coxal

DÉPÔT 482-EM2 (2010)

profondeur de la fosse : 3,33 m
 épaisseur du dépôt : 0,69 m
 altitude par rapport au fond : 1 m
 NR total : 49 NR déterminés : 48



INVENTAIRE

- bœuf : 4 mandibules, 4 maxillaires, 2 frontaux, 2 chevilles, frgt de crâne, atlas, 5 côtes, 2 scapula, 2 humérus, 5 coxaux, 2 fémurs, 2 tibia, 2 métatarses
- porc : 2 mandibules, temporal, scapula
- caprinés : occipital, cheville chèvre, fémur, 2 tibia, métatarse
- cheval : côte, coxal, fémur, tibia
- 1 indét.



Âge

porc : deux de 12 mois

Sexes

bœuf : une femelle
 caprinés : une femelle
 cheval : un mâle
 porc : deux mâles

Choix des parties de bœuf



DÉPÔT 482-EM3 (2010)

profondeur de la fosse : 3,33 m
 épaisseur du dépôt : 0,19 m
 altitude par rapport au fond : 1,5 m
 NR total : 46 NR déterminés : 42

**INVENTAIRE**

- bœuf : 5 mandibules, 4 maxillaires, 10 os de crânes, 2 molaires, frgt de crâne, 2 côtes, 2 scapula, 3 humérus, coxal, calcaneum, 3 métacarpes, 3 métatarses, métapode vestigial, phalange I
 - caprinés : humérus
 - 4 indéts.

Ensembles anatomiques

porc : paire de mandibules
 chien : paire de prémaxillaires

Âges



bœuf : un de 2,5 ans
 porc : un de 5 ans

Sexe

porc : une femelle



Fosse 482, EM3 (décapage AB4)

Choix des parties de bœuf**DÉPÔT 482-EM4 (2010)**

profondeur de la fosse : 3,33 m
 épaisseur du dépôt : 0,23 m
 altitude par rapport au fond : 1,65 m
 NR total : 16 NR déterminés : 14

**INVENTAIRE**

- bœuf : 2 mandibules, palais, prémolaire, frgt de crâne, lombaire, scapula, coxal, 2 tibia, naviculaire
 - cheval : coxal, fémur, tibia
 - 2 indéts.

Âges

bœuf : un de 6 ans et un de 8 ans

Sexe

bœuf : une femelle



Fosse 482, EM4 (décapage B1)

DÉPÔT 483-EM1 (2010)

profondeur de la fosse : 2,67 m
 épaisseur du dépôt : 0,41 m
 altitude par rapport au fond : 0,14 m
 NR total : 4 NR déterminés : 1




INVENTAIRE

- bœuf : côte
- 3 indéts.

DÉPÔT 483-EM2 (2010)

profondeur de la fosse : 2,67 m
 épaisseur du dépôt : 0,42 m
 altitude par rapport au fond : 0,8 m
 NR total : 96 NR déterminés : 62



INVENTAIRE

- bœuf : 9 mandibules, 7 maxillaires, molaire, 10 os de crânes, 5 chevilles, 3 frgts de crâne, éclat de crâne, axis, 3 côtes, scapula, fémur, tibia, 2 naviculaires, métatarse, phalange III
- porc : mandibule, côte, ulna
- caprinés : pariétal, métatarse
- cheval : 2 mandibules très jeune
- chien : maxillaire, atlas, humérus, radius, 2 ulna, phalange I
- 38 indéts.

Ensemble anatomique

chien : 2 phalanges I, phalange II, phalange III

Âges

bœuf : un de 4,5 ans et un de 7 ans



Sexes

bœuf : un châtré et deux femelles





Fosse 483, EM2 (décapage AB6)

Fréquence des animaux




Choix des parties de bœuf



■ excédant □ moyenne ■ déficit

DÉPÔT 483-EM3 (2010)

profondeur de la fosse : 2,67 m
épaisseur du dépôt : 0,60 m
altitude par rapport au fond : 1,33 m
NR total : 18 NR déterminés : 17



INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules, 4 maxillaires, 2 prémolaires sup., nasal, 2 frontaux, cheville, thoracique, scapula, 2 humérus
- cheval : mandibule
- 1 indét.

Âges

bœuf : un de 18 mois, un de 22 mois et un de 8 ans

DÉPÔT 484-EM1 (2010)

profondeur de la fosse : 1,54 m
 épaisseur du dépôt : 0,31 m
 altitude par rapport au fond : 0,50 m
 NR total : 9 NR déterminés : 9




INVENTAIRE

- bœuf : cervicale, fémur
- porc : côte, 2 fémurs, métatarse, métapode, phalange I
- cerf : frgt de ramure taillé, et poli

DÉPÔT 484-EM2 (2010)

profondeur de la fosse : 1,54 m
 épaisseur du dépôt : 0,39 m
 altitude par rapport au fond : 0,50 m
 NR total : 198 NR déterminés : 128



INVENTAIRE

- bœuf : 4 incisives, sacrée, 10 côtes, cart. costal, scapula, radius, coxal, 2 fémurs, patella, tibia, naviculaire, phalange I, phalange II
- porc : 3 mandibules, frontal, atlas, 2 thoraciques, sacrée, scapula, ulna, tibia, talus, phalange I, 2 phalanges II
- caprinés : 3 mandibules, 4 maxillaires, 3 prémaxillaires, molaire, 2 crânes fendus, hyoïde, 3 cervicales, 6 thoraciques, 2 lombaires, 20 côtes, 4 scapula, 5 radius, coxal, 6 fémurs, 5 tibia, carpe, 2 métacarpes, 6 métatarses, phalange I
- chien : frgt de crâne, thoracique, radius, 2 fémurs
- 54 indét.

Ensembles anatomiques

bœuf : épaule D de l'humérus aux phalanges III
 caprinés : humérus avec radio-ulna G

Âges

caprinés : deux de 20 mois et un de 7 ans

Sexes


bœuf : deux femelles
 caprinés : deux femelles






Fosse 484, EM2 (décapage AB7)

Fosse 484-EM2

Fréquence des animaux




Choix des parties de bœuf



Fosse 484, EM2 (décapage AB8)

DÉPÔT 484-EM3 (2010)

profondeur de la fosse : 1,54 m
 épaisseur du dépôt : 0,31 m
 altitude par rapport au fond : 0,95 m
 NR total : 164 NR déterminés : 106



INVENTAIRE

- bœuf : 6 mandibules, maxillaire, prémolaire inf, temporal, 3 éclats de crânes, 2 cervicales, 3 thoraciques, 6 lombaires, vertèbre, 5 côtes, sternèbre, cart. costal, scapula, humérus, 2 radius, radio-ulna, coxal, fémur, tibia, carpe, naviculaire, 2 métacarpe, 3 métatarses, 3 phalanges I, phalange II, 2 phalanges III
- porc : 2 mandibules, 3 maxillaires, prémaxillaire, zygomatique, 2 côtes, 4 coxaux, 2 tibia, talus, calcanéum, métacarpe, 2 métatarses
- caprinés : 3 mandibules, maxillaire, 2 molaires sup, 4 os de crânes, cervicale, 3 thoraciques, sacrum, 5 côtes, radius, 2 coxaux, 2 fémurs, tibia, métacarpe
- cheval : mandibule
- chien : cervicale, coxal
- 58 indét.

Ensemble anatomique
 porc : talus et calcanéum



Âges

bœuf : deux de 2,5 ans
 porc : un de 10 mois
 caprinés : un de 18 mois et un de 7 ans



Sexe

caprinés : une femelle

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf




DÉPÔT 494-EM1 (2010)

profondeur de la fosse : 1,52 m

épaisseur du dépôt : 0,62 m

altitude par rapport au fond : 0,09 m

NR total : 1948 NR déterminés : 880

**INVENTAIRE**

- bœuf : 59 mandibules, 13 maxillaires, 14 incisifs, 2 palatins, 41 dents, 3 nasaux, lacrymal, 18 frontaux, 36 os de crânes, 7 chevilles, 11 hyoïdes, 27 frgts de crânes, 19 éclats de crânes, 2 atlas, 2 axis, 11 cervicales, 21 thoraciques, 8 lombaires, sacrum, 5 caudales, 4 vertèbres, 83 côtes, cart. costal, 15 scapula, 13 humérus, 11 radius, 5 ulna, 14 coxaux, 20 fémurs, patella, 28 tibia, 4 malléolaires, 6 talus, 3 calcanéum, 15 carpes, 4 naviculaires, tarse, 14 métacarpes, 14 métatarses, métapode, 15 phalanges I, 11 phalanges II, 15 phalanges III, 14 sésamoïdes

- porc : 8 mandibules, 3 dents, crâne, 4 os de crânes, 4 lombaires, 2 sacrées, 18 côtes, 7 scapula, 2 humérus, 6 coxaux, 6 fémurs, 6 tibia, 2 fibula, talus, 2 calcanéums, carpe, tarse, 2 métacarpes, 4 métatarses, 2 métapodes lat, 4 phalanges I, 3 phalanges II, 3 phalanges III

- caprinés : 10 mandibules, 8 maxillaires, 3 dents, 3 crânes fendus, 8 os de crânes, frgt de crâne, éclat de crâne, 6 thoraciques, 3 lombaires, sacrée, 17 côtes, 6 scapula, 4 humérus, radius, 2 ulna, 4 coxaux, 8 fémurs, 5 tibia, talus, 2 carpes, 3 métacarpes, 4 métatarses, 3 phalanges I, phalange II, phalange III

- cheval : maxillaire, 2 dents, thoracique, côte, scapula, 2 radius, tibia, métacarpe, phalange III

- chien : maxillaire, incisif, 3 canines, axis, cervicale, 3 thoraciques, 2 lombaires, côte, 2 scapula, 4 humérus, radius, 3 ulna, coxal, 2 tibia, 2 métacarpes, 3 métatarses, métapode, phalange I

- oiseau indét. : scapula

- 1068 indét.

Ensembles anatomiques

bœuf : talus, malléolaire et calcanéum G

caprinés : série de 2 lombaires

Âges

bœuf : un de 6 mois, un de 18 mois, un de 3 ans et un de plus de 12 ans

caprinés : deux de 5 mois, un de 6 mois et un de 7 ans

porc : un de 6 mois, un de 11 mois et deux de 12 mois

Sexes

bœuf : deux femelles et deux mâles

caprinés : deux femelles


porc : deux femelles





Fosse 494, EM1 (décapage B4)

Fosse 494-EM1

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



Fosse 494, EM1 (décapage B5)



Fosse 494, EM1 (décapage B7)

DÉPÔT 494-EM2 (2010)

profondeur de la fosse : 1,52 m
 épaisseur du dépôt : 0,22 m
 altitude par rapport au fond : 0,66 m
 NR total : 14 NR déterminés : 9



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, prémaxillaire, 2 dents, atlas, côte, scapula, 2 métatarses
 - 5 indéts.

DÉPÔT 494-EM3 (2010)

profondeur de la fosse : 1,52 m
 épaisseur du dépôt : 0,13 m
 altitude par rapport au fond : 1,11 m
 NR total : 4 NR déterminés : 4



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, maxillaire, talus, phalange I

DÉPÔT 499-EM1 (2010)




profondeur de la fosse : 1,44 m
 épaisseur du dépôt : 0,08 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 3 NR déterminés : 3

INVENTAIRE

- bœuf : 2 lombaires, coxal

DÉPÔT 499-EM2 (2010)



profondeur de la fosse : 1,44 m
 épaisseur du dépôt : 0,78 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 406 NR déterminés : 330

INVENTAIRE

- bœuf : 22 mandibules, 9 maxillaires, prémaxillaire, 5 dents, 9 os de crânes, cheville, 2 frgts de crânes, éclat de crâne, 5 atlas, 2 axis, 11 cervicales, 17 thoraciques, 10 lombaires, caudale, 2 vertèbres, 102 côtes, cart. costal, 2 scapula, 8 humérus, radius, ulna, radio-ulna, 5 coxaux, 8 fémurs, 3 tibia, talus, 7 carpes, 5 métacarpes, 6 métatarses, 4 métapodes, 6 phalanges I, 5 phalanges III, 2 sésamoïdes
- porc : 5 mandibules, 3 dents, crâne fendu, 3 frontaux, 3 thoraciques, 5 côtes, scapula, 5 coxaux
- caprinés : mandibule, 4 molaires, crâne, pariétal, 2 chevilles, 2 axis, 2 côtes, 5 scapula, humérus, radius, 2 fémurs, tibia, métacarpe, métatarse, 2 phalanges I
- chien : 2 mandibules D, 3 côtes, ulna, phalange II
- 76 indét.

Ensembles anatomiques

bœuf : naviculaire, cuboïde, moitié prox du métatarse G ; tibia, talus et calcanéum G ; 5 phalanges


Âges

bœuf : un de 8 mois, un de 12 mois, un de 15 mois, un de 2 ans, trois de 2,5 ans, un de 3,5 ans et un de 7 ans
 caprinés : un de 18 mois
 porc : un de 15 mois



Sexes

caprinés : trois femelles
 porc : trois femelles et un mâle

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



■ excédant □ moyenne ■ déficit

DÉPÔT 503-EM1 (2009)



profondeur de la fosse : 0,72 m
 épaisseur du dépôt : 0,14 m
 altitude par rapport au fond : 0,20 m
 NR total : 126 NR déterminés : 48



INVENTAIRE

- bœuf : 3 maxillaires, 4 mandibules, 11 dents, thoracique, radius, fémur, carpe, tarse, métacarpe, métatarse, métapode, 2 phalange I, phalange II, phalange III
- porc : scapula, talus
- caprinés : 2 maxillaires, mandibule, 4 dents, axis, 5 côtes, tibia, calcanéum
- 78 indét.

Choix des parties de bœuf



Fosse 503, EM1 (décapage AB1)


DÉPÔT 515-EM1 (2009)

profondeur de la fosse : 1,50 m

épaisseur du dépôt : 1,14 m

altitude par rapport au fond : 0 m

NR total : 95 NR déterminés : 46

**INVENTAIRE**

- bœuf : 2 mandibules, 5 côtes, humérus, coxal, 5 fémurs, patella, phalange III
- porc : 2 maxillaires, lacrymal, mandibule, 2 dents, 2 humérus, radius, radio-ulna, tibia, phalange I
- caprinés : mandibule G, coxal D, fémur G, paire de métacarpes, 2 métatarses, 5 phalanges I
- cheval : côte
- chien : mandibule D
- 49 indéts.

Ensembles anatomiques

bœuf : paire de maxillaires

caprinés : phalanges I, II et III

Âges

bœuf : un de 5 mois

caprinés : un de 3,5 ans

porc : un de 1 mois, deux de 12 mois et un de 18 mois

Sexes

bœuf : un mâle


porc : une femelle



Fosse 515, EM1 (décapage AB1)

DÉPÔT 542-EM1 (2010)

profondeur de la fosse : 2,09 m
 épaisseur du dépôt : 0,40 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 1674 NR déterminés : 205



INVENTAIRE

- bœuf : 5 mandibules, 3 dents, 9 os de crânes, 2 chevilles, hyoïde, 2 éclats de crânes, 2 atlas, axis, 6 cervicales, 2 thoraciques, 10 lombaires, sacrée, vertèbre, 27 côtes, 5 scapula, 9 humérus, 6 radius, 3 ulna, radio-ulna, 7 coxaux, 6 fémurs, 5 tibia, 3 carpes, naviculaire, 3 métacarpes, 2 métatarses, métapode, métapode lat., 2 phalanges I, 5 phalanges II, 2 phalanges III, sésamoïde
- porc : 7 mandibules, 2 dents, 12 os de crânes, 4 cervicales, thoracique, lombaire, 4 côtes, scapula, 2 humérus, radius, 3 ulna, coxal, 3 fémurs, 2 tibia, métacarpe
- caprinés : 2 mandibules, maxillaire, prémolaire, 2 sacrées, sacrum, 6 côtes, 3 scapula, humérus, ulna, 2 fémurs, 2 carpes, métatarse, phalange I
- chien : cervicale
- 1469 indéterminés



Âges

bœuf : un de 2,5 ans
 caprinés : un de 18 mois



Sexes

bœuf : une femelle et un mâle
 porc : deux femelles

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



■ excédant □ moyenne ■ déficit

DÉPÔT 542-EM2 (2010)

profondeur de la fosse : 2,09 m
épaisseur du dépôt : 0,11 m
altitude par rapport au fond : 0,39 m
NR total : 5 NR déterminés : 5

INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules, nasal, lombaire, humérus

Âges


bœuf : un de 12 mois et un de 9 ans



Fosse 542, EM1 et EM2 (décapage AB25)

DÉPÔT 542-EM3 (2010)

profondeur de la fosse : 2,09 m
 épaisseur du dépôt : 0,56 m
 altitude par rapport au fond : 0,40 m
 NR total : 729 NR déterminés : 655

**INVENTAIRE**

- bœuf : mandibule, 4 maxillaires, 3 dents, 14 os de crânes, 4 chevilles, 2 hyoïdes, 2 éclats de crânes, 2 atlas, axis, 2 cervicales, 4 thoraciques, 3 lombaires, sacrée, caudale, 7 côtes, 2 scapula, humérus, 2 radius, ulna, radio-ulna, 4 coxaux, 2 fémurs, malléolaire, talus, 3 calcanéum, naviculaire, 2 métacarpes, 2 métapodes, 5 phalanges I, 2 phalanges II, 4 phalanges III, 2 sésamoïdes
- porc : mandibule, thoracique, côte, scapula, métatarse
- caprinés : 3 mandibules, 2 maxillaires, 2 dents, 5 crânes fendus, 4 os de crânes, cheville, 5 côtes, scapula, humérus, radius, tibia, 3 métacarpes, métatarse, phalange II, 2 phalanges III
- cheval : tous les os font probablement partie des carcasses, même si certains (une centaine, surtout -80- des côtes, cart. costal et des sternèbres) n'ont pas pu être attribués à l'un ou l'autre individu
- 74 indéterminés

Ensembles anatomiques

- bœuf : carcasse de vache (141 pièces composant des ensembles anatomiques)
- porc : carcasse de porcelet (88 pièces composant des ensembles anatomiques)
- caprinés : deux carcasses de brebis (164 pièces composant des ensembles anatomiques)
- cheval : cinq carcasses de chevaux (508 pièces composant des ensembles anatomiques)

Âges

- bœuf : un de 15 mois
- caprinés : un de 18 mois, deux de 22 mois, un de 3,5 ans, un de 4,5 ans et deux de 7 ans
- cheval : un de 10 mois, un de 3,5 ans et un de 4,5 ans

Sexes

- bœuf : un châtré et sept femelles
- caprinés : six femelles
- porc : une femelle et six mâles





Fosse 542, base de l'EM3 (décapage AB24)





Fosse 542, EM3 (décapage AB22)

Fosse 542-EM3

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



■ excédant □ moyenne ■ déficit



Fosse 542, EM3 (décapage AB20)



Fosse 542, EM3 (décapage AB18)



Fosse 542, EM3 (décapage AB16)



Fosse 542, EM3 (décapage AB14)


DÉPÔT 542-EM4 (2010)

profondeur de la fosse : 2,09 m

épaisseur du dépôt : 0,61 m

altitude par rapport au fond : 0,77 m

NR total : 428 NR déterminés : 303

**INVENTAIRE**

- bœuf : 20 mandibules, maxillaire, 2 prémaxillaires, 17 dents, 21 os de crânes, 5 chevilles, 3 frgts de crânes, 3 éclats de crânes, 3 atlas, 4 cervicales, 10 thoraciques, 17 lombaires, sacrée, vertèbre, disque vert., 36 côtes, 13 scapula, 8 humérus, 6 radius, 2 ulna, 2 radio-ulna, 4 coxaux, 4 fémurs, 8 tibia, 3 talus, carpe, naviculaire, 6 métacarpes, 7 métatarses, métapode, 4 phalanges I, 3 phalanges II, 6 phalanges III, 2 sésamoïdes

- porc : mandibule, 2 dents, 10 côtes, 4 scapula, ulna, 3 coxaux, tibia, fibula, calcanéum

- caprinés : 7 mandibules, 2 maxillaires, 4 dents, atlas, lombaire, 5 côtes, scapula, radius, ulna, 8 coxaux, 2 fémurs, 3 tibia, métacarpe, métatarse

- cheval : mandibule, 4 caudales, tibia, calcanéum, phalange II

- 125 indéts.

Ensembles anatomiques

bœuf : deux corps vertébraux arasés, deux ensembles phalanges II et III

porc : série de deux lombaires

Âges

bœuf : deux de 12 mois, un de 2 ans, deux de 2,5 ans, un de 3,5 ans, deux de 4,5 ans et un de 7 ans

caprinés : un de 5 mois et un de 15 mois, un de 3,5 ans et un de 4,5 ans

porc : deux de 12 mois

Sexes

bœuf : une femelle et trois mâles

caprinés : deux femelles et un mâles

porc : une femelle



Fosse 542, EM4 (décapage AB12)



Fosse 542, EM4 (décapage AB10)




Fosse 542, EM4 (décapage AB8)




Fosse 542, EM4 (décapage AB6)

Fosse 542-EM4

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



DÉPÔT 554-EM2 (2009)

profondeur de la fosse : 3,7 m
 épaisseur du dépôt : 0,45 m
 altitude par rapport au fond : 1,45 m
 NR total : 5 NR déterminés : 4



INVENTAIRE

- bœuf : fémur
- cheval : 2 crânes entiers, mâle et femelle, vers 5 ans
- 1 indét

Ensembles anatomiques

cheval : tibia G avec tarse et métatarse (entre 2 et 3,5 ans)

Âges

cheval : deux de 5 ans et un de 2-3,5 ans

Sexes

cheval : une femelle et un mâle

DÉPÔT 554-EM3 (2009)

profondeur de la fosse : 3,7 m
 épaisseur du dépôt : 0,5 m
 altitude par rapport au fond : 2,2 m
 NR total : 23 NR déterminés : 17



INVENTAIRE

- bœuf : maxillaire, temporal, 3 côtes, 3 scapula, 4 humérus, radius, métacarpe, phalange II
- porc : phalange I
- caprinés : métacarpe chèvre
- 6 indét.




Fosse 554, EM2 (décapage AB3)



Fosse 554, EM2 (décapage AB4)

DÉPÔT 558-EM1 (2009)

profondeur de la fosse : 0,36 m
 épaisseur du dépôt : 0,17 m
 altitude par rapport au fond : 0,11 m
 NR total : 335 NR déterminés : 129



INVENTAIRE

- bœuf : maxillaire D, 5 mandibules D, mandibule, 3 dents, atlas, 2 cervicales, lombaire, sacrée, 16 côtes, 4 scapula, 2 humérus, radius, 2 ulna, 3 coxaux, fémur, tibia, 2 calcanéum D, carpe, 2 métacarpes, 3 métatarses, métapode, 9 phalanges I, 2 phalanges II, sésamoïde
- porc : maxillaire G, frgt de crâne, 2 mandibules, dent, côte, scapula D, humérus D, humérus G, coxal G, métacarpe IV, métapode, phalange II
- caprinés : 2 maxillaires D, 4 mandibules, 5 dents, 3 scapula, 2 humérus G, 3 radius, ulna, radio-ulna, 2 coxaux, 6 fémurs, 6 tibia, talus D, 2 métacarpes, métatarses, 2 phalanges I, 2 phalanges II
- cheval : humérus G, tibia D
- chien : scapula D, ulna D
- 207 indéts.

Ensemble anatomique
 bœuf : tibia, talus et calcanéum D



Âges
 bœuf : un de 5 mois, un de 12 mois, un de 2 ans et un de 4,5 ans
 porc : deux de 12 mois

Sexes
 bœuf : deux femelles
 porc : une femelle





Fosse 558, EM1 (décapage AB1)

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



■ excédant ■ moyenne ■ déficit

DÉPÔT 559-EM1 (2010)

profondeur de la fosse : 4,60 m
 épaisseur du dépôt : 0,30 m
 altitude par rapport au fond : 0,02 m
 NR total : 3 NR déterminés : 2



INVENTAIRE

- bœuf : humérus
 - porc : radius
 - 1 indét.

DÉPÔT 559-EM2 (2010)

profondeur de la fosse : 4,60 m
 épaisseur du dépôt : 0,35 m
 altitude par rapport au fond : 0,62 m
 NR total : 3 NR déterminés : 1



INVENTAIRE

- bœuf : phalange II
 - 2 indét.

DÉPÔT 559-EM3 (2010)

profondeur de la fosse : 4,60 m
 épaisseur du dépôt : 0,12 m
 altitude par rapport au fond : 1,64 m
 NR total : 5 NR déterminés : 4



INVENTAIRE

- bœuf : 2 côtes, radius, coxal
 - 1 indét.

DÉPÔT 559-EM4 (2010)

profondeur de la fosse : 4,60 m
 épaisseur du dépôt : 0,58 m
 altitude par rapport au fond : 1,76 m
 NR total : 14 NR déterminés : 14



INVENTAIRE


- bœuf : cheville, atlas, cervicale, 3 côtes, 2 scapula, ulna, fémur
 - porc : côte
 - caprinés : crâne chèvre,
 - cheval : cervicale, humérus

Sexe

caprinés : une femelle

DÉPÔT 559-EM5 (2010)

profondeur de la fosse : 4,60 m
 épaisseur du dépôt : 0,33 m
 altitude par rapport au fond : 2,63 m
 NR total : 11 NR déterminés : 10



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, frontal, radius, ulna, tibia
- porc : mandibule
- cheval : 2 thoraciques, humérus, fémur
- 1 indét.

Âges

bœuf : un de 8 ans

DÉPÔT 559-EM6 (2010)

profondeur de la fosse : 4,60 m
 épaisseur du dépôt : 0,44 m
 altitude par rapport au fond : 2,9 m
 NR total : 24 NR déterminés : 18



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, thoracique, 2 lombaires, 3 côtes, 2 humérus, radius, 2 coxaux, talus
- caprinés : fémur
- cheval : mandibule, axis, 2 fémurs
- 6 indét.

Sexe

bœuf : une femelle

DÉPÔT 559-EM7 (2010)

profondeur de la fosse : 4,60 m
 épaisseur du dépôt : 0,8 m
 altitude par rapport au fond : 3,31 m
 NR total : 12 NR déterminés : 7



INVENTAIRE

- bœuf : 2 mandibules, côte, scapula, 2 métatarses
- porc : mandibule
- 5 indét.

Âge


porc : un de 12 mois

Sexe

porc : une femelle

DÉPÔT 566-EM2 (2010)

profondeur de la fosse : 3,23 m
 épaisseur du dépôt : 0,35 m
 altitude par rapport au fond : 0,83 m
 NR total : 100 NR déterminés : 65



INVENTAIRE

- bœuf : mandibule, prémolaire inf, 3 crânes, frontal, zygomatique, 2 chevilles, atlas, axis, thoracique, 2 lombaires, 7 côtes, scapula, 3 humérus, radius, 5 coxaux, 3 fémurs, 2 carpes, métacarpe, phalange II
- porc : 2 maxillaires, 3 crânes, nasal, ulna, coxal, calcanéum
- caprinés : 2 mandibules, crâne de brebis, pariétal, thoracique, humérus, fémur, métatarse
- cheval : 2 maxillaires, 2 dents, crâne (boîte crânienne), nasal, occipital, 2 éclats de crâne, atlas
- 35 indéts.


Âges

cheval : un de 3 ans
 porc : un de 15 mois



Sexes

bœuf : un châtré, cinq femelles et un mâle
 caprinés : une femelle
 porc : trois femelles

Fréquence des animaux




Choix des parties de bœuf



DÉPÔT 566-EM3 (2010)

profondeur de la fosse : 3,23 m
 épaisseur du dépôt : 0,65 m
 altitude par rapport au fond : 1,06 m
 NR total : 750 NR déterminés : 391



INVENTAIRE

- bœuf : 11 mandibules, 7 maxillaires, 3 prémaxillaires, 3 molaires sup, 2 crânes, 11 os de crânes, 6 chevilles, 2 hyoïdes, 5 frgts de crânes, 2 éclats de crânes, 4 atlas, 2 axis, 9 cervicales, 10 thoraciques, 12 lombaires, disque vert., 37 côtes, sternèbre, cart. costal, 3 scapula, 4 humérus, 3 radius, 16 coxaux, 4 fémurs, 5 tibia, 2 talus, calcanéum, naviculaire, 3 métacarpes, 5 métatarses, métapode, 2 phalanges I, 3 phalanges II, 3 phalanges III, sésamoïde
- porc : 7 mandibules, 3 maxillaires, prémaxillaire, 3 dents, crâne, 2 frontaux, pariétal, rocher, occipital, 3 thoraciques, lombaire, 13 côtes, 4 scapula, 3 humérus, radius, 5 ulna, 3 coxaux, 2 fémurs, 9 tibia, carpe, talus, calcanéum, métatarse, métapode, 2 mp lat, phalange I, phalange II, phalange II lat
- caprinés : 7 mandibules, 4 maxillaires, 2 dents, crâne, 2 frontaux, 3 pariétaux, occipital, 5 chevilles, cervicale, 7 thoraciques, 3 lombaires, sacrum, 8 côtes, 10 scapula, 2 humérus, 5 radius, coxal, 3 fémurs, 6 tibia, 2 talus, carpe, 6 métacarpes, 6 métatarses, métapode, 2 phalanges I, phalange II, phalange III
- cheval : mandibule, maxillaire, paire de prémaxillaires, prémaxillaire, frontal, pariétal, 2 occipitaux, dent, crâne, cervicale, thoracique, 3 lombaires, sacrée, sacrum, 4 côtes, scapula, humérus, coxal, 2 fémurs, patella, tibia, carpe, métacarpe, 2 métatarses, phalange I, phalange II
- chien : lombaire
- coq : humérus, 2 tibio tarse
- 359 indét.

Ensemble anatomique
 caprinés : phal II et 2 phal III

Âges



bœuf : un de 3 ans
 cheval : un de 6 ans
 porc : un de 1 an et un de 1,5 an

Sexes



bœuf : trois femelles, deux mâles et un châtré
 caprinés : trois femelles
 cheval : deux mâles
 porc : une femelle

Fosse 566-EM3

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



■ excédant □ moyenne ■ déficit


DÉPÔT 566-EM4 (2010)

profondeur de la fosse : 3,23 m

épaisseur du dépôt : 0,65 m

altitude par rapport au fond : 1,06 m

NR total : 19 NR déterminés : 16



INVENTAIRE


- bœuf : mandibule, 2 thoraciques, 3 scapula, 2 humérus, coxal, fémur
- porc : crâne fendu et tranché, axis, côte
- caprinés : 2 radius
- cheval : molaire sup
- 3 indét.

Âges

porc : un de 14 mois

DÉPÔT 566-EM5 (2010)


profondeur de la fosse : 3,23 m
épaisseur du dépôt : 0,80 m
altitude par rapport au fond : 2,43 m
NR total : 25 NR déterminés : 8

**INVENTAIRE**

- bœuf : dent, côte, coxal, phalange I, phalange III
- porc : mandibule, scapula
- cheval : ulna
- 17 indet. (38 g)

DÉPÔT 568-EM1 (2010)

profondeur de la fosse : 1,56 m
 épaisseur du dépôt : 0,41 m
 altitude par rapport au fond : 0 m
 NR total : 402 NR déterminés : 325



INVENTAIRE

- bœuf : 5 incisives, occipital, paire hyoïdes, 5 thoraciques, 3 sacrées, 6 côtes, cart. costal, scapula, 2 fémurs, métacarpe, 2 métapodes
- porc : 2 mandibules, prémaxillaire, occipital, atlas, thoracique, 6 humérus, radius, ulna, coxal, fémur, 4 tibia, talus, calcanéum, métacarpe, phalange II, phalange I lat
- caprinés : 6 mandibules, 3 maxillaires, prémaxillaire, 4 dents, 2 crânes, 7 os de crânes, 2 chevilles, 2 hyoïdes, 14 éclats de crânes, atlas, 3 axis, 12 cervicales, 12 thoraciques, 7 lombaires, 2 sacrées, 4 sacrum, 34 côtes, 2 sternèbres, 5 scapula, 9 humérus, 7 radius, 5 ulna, 14 coxaux, 13 fémurs, 11 tibia, 2 talus, 4 calcanéum, naviculaire, 5 métacarpes, 6 métatarses, métapode, 7 phalanges I, 6 phalanges II, 7 phalanges III, sésamoïde
- chien : canine, partie distale de crâne, crâne entier, 2 zygomatiques, atlas, axis, 2 cervicales, 7 thoraciques, 5 lombaires, 10 côtes, scapula, humérus, 2 radius, ulna, fémur, 2 tibia, fibula (coprolithe)
- 77 indét.

Ensembles anatomiques

bœuf : série de 2 caudales
 caprinés : atlas et axis ; cervicales I à VI ; 3 thoraciques ; 2 thoraciques et une lombaire ; métacarpe avec 4 phalanges I et II
 chien : paire de mandibules, paire de coxaux


Âges

caprinés : un de 6 mois, un de 4,5 ans, un de 7 ans, un de 8 ans et deux de 9 ans
 porc : un de 4 mois et un de 5 mois



Sexe

caprinés : six femelles

Fréquence des animaux



Choix des parties de bœuf



DÉPÔT 568-EM2 (2010)

profondeur de la fosse : 1,56 m
 épaisseur du dépôt : 0,68 m
 altitude par rapport au fond : 0,45 m
 NR total : 42 NR déterminés : 32

**INVENTAIRE**

- bœuf : mandibule, 3 maxillaires, nasal, lacrymal, 4 frontaux, 3 zygomatiques, 3 éclats de crânes, 4 côtes, 2 tibia, méta-carpe, 2 métatarses, phalange I, phalange III
- porc : naviculaire
- caprinés : côte, coxal, tibia
- chien : fibula
- 10 indét.

Âges

bœuf : un de 2,5 ans et un de plus de 12 ans

Choix des parties de bœuf