

**Zeitschrift:** Commentarii Mathematici Helvetici  
**Herausgeber:** Schweizerische Mathematische Gesellschaft  
**Band:** 9 (1936-1937)

**Artikel:** Les substitutions qui sont des transformées réciproques.  
**Autor:** Piccard, Sophie  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-10173>

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 12.12.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Les substitutions qui sont des transformées réciproques<sup>1)</sup>

Par SOPHIE PICCARD, Neuchâtel

1<sup>o</sup> Soient  $S$  et  $T$  deux substitutions telles que  $STS^{-1} = TST^{-1}$ , les substitutions successives de la composition étant effectuées de droite à gauche. Nous appelons  $S$  et  $T$  des transformées réciproques. On voit immédiatement que deux substitutions qui sont des transformées réciproques sont semblables.

Il n'existe pas pour chaque substitution  $S$  une substitution  $T \neq S$ , telle que  $T$  et  $S$  soient des transformées réciproques. Par exemple, si  $S$  est une substitution circulaire d'ordre  $t$  et si  $t$  est un nombre premier, il n'existe aucune substitution  $T \neq S$ , telle que  $STS^{-1} = TST^{-1}$ .

Dans une première note<sup>2)</sup>, nous avons établi la condition nécessaire et suffisante pour que deux substitutions *circulaires* soient des transformées réciproques. Ici nous établirons la condition nécessaire et suffisante pour que deux substitutions quelconques soient des transformées réciproques.

**Notations.** Quelle que soit la substitution  $R$  et quel que soit l'élément  $a$  de  $R$ , convenons de désigner par  $[a]^R$  l'élément que  $R$  substitue à  $a$ .

Si  $S$  et  $T$  sont deux substitutions, telles que  $STS^{-1} = TST^{-1}$ , on a

$$T = S^{-1} TST^{-1} S.$$

Donc  $T$  est la transformée de  $S$  par  $S^{-1} T$ . Or, on sait que pour obtenir la transformée de  $S$  par  $S^{-1} T$ , il suffit d'effectuer la substitution  $S^{-1} T$  sur les éléments de chaque cycle de  $S$ . Donc quel que soit le cycle  $(a_1 a_2 \dots a_k)$  de  $S$ ,  $T$  contient le cycle

$$([a_1]^{S^{-1}T} [a_2]^{S^{-1}T} \dots [a_k]^{S^{-1}T}).$$

On en déduit immédiatement la

**Proposition 1.** Soient  $S$  et  $T$  deux transformées réciproques. Quel que soit l'élément  $a_1$  de  $S$ , si  $\alpha_1$  est l'élément de  $T$ , tel que  $[a_1]^T = [\alpha_1]^S$ ,

<sup>1)</sup> Une partie des résultats exposés dans cette note ont été présentés au Congrès international des mathématiciens, à Oslo.

<sup>2)</sup> Bulletin de la Société neuchâteloise des Sciences naturelles, tome 61, 1936.

le cycle  $C_1$  de  $S$  qui contient  $a_1$  et le cycle  $C_2$  de  $T$  qui contient  $\alpha_1$  sont de même ordre et si l'on pose

$$C_1 = (a_1 a_2 \dots a_k), \quad C_2 = (\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_k), \quad \text{on a } [a_i]^S = [\alpha_i]^T \quad (i = 2, 3, \dots, k).$$

**Proposition 2.** Soient  $S$  et  $T$  deux transformées réciproques portant sur les éléments d'un ensemble  $E$ . Soit  $a_1$  un élément quelconque de  $E$ . Désignons par  $C_1$  le cycle de  $S$  et par  $C_2$  le cycle de  $T$  qui comprennent cet élément. Si l'on a  $C_1 \neq C_2$ , on a également  $[a_1]^S \neq [a_1]^T$ .

*Démonstration.* Posons  $[a_1]^S = a_2$ ,  $[a_1]^T = b_2$  et soit

$$\begin{aligned} C_1 &= (a_1 a_2 a_3 \dots a_l) \\ C_2 &= (a_1 b_2 b_3 \dots b_m). \end{aligned}$$

Supposons, contrairement à notre proposition, que  $a_2 = b_2$ .

On en déduit que

$$[b_2]^{STS^{-1}} = a_3, \quad [a_2]^{TST^{-1}} = b_3.$$

Donc  $a_3 = b_3$ , puisque  $S$  et  $T$  sont des transformées réciproques. On en déduit de la même façon que  $a_4 = b_4$  et ainsi de suite.

Finalement, il vient

$$a_k = b_k \quad [k = \min. (l; m)] \text{ et } [b_k]^{STS^{-1}} = [a_k]^{TST^{-1}} = a_1.$$

Il en résulte que  $C_1 = C_2$ , ce qui est contraire à notre hypothèse. On ne saurait donc avoir  $a_2 = b_2$ , c. q. f. d.

**Proposition 3.** Si  $S$  et  $T$  sont des transformées réciproques, quelle que soit la substitution  $U$  des mêmes éléments, les substitutions  $S_1 = USU^{-1}$  et  $T_1 = UTU^{-1}$  sont également des transformées réciproques.

*Démonstration.* En effet, on a

$$\begin{aligned} S_1 T_1 S_1^{-1} &= USU^{-1} UTU^{-1} US^{-1} U^{-1} = USTS^{-1} U^{-1} \\ T_1 S_1 T_1^{-1} &= UTU^{-1} USU^{-1} UT^{-1} U^{-1} = UTST^{-1} U^{-1} \end{aligned}$$

Et comme, par hypothèse,  $STS^{-1} = TST^{-1}$ , on a également

$$S_1 T_1 S_1^{-1} = T_1 S_1 T_1^{-1}, \quad \text{c. q. f. d.}$$

**Corollaire 1.** Soient  $S$  et  $T$  deux substitutions semblables. On peut toujours disposer des notations de façon à les écrire

$$S = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_{i_1} & a_{i_2} & \dots & a_{i_n} \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \dots & b_n \\ b_{i_1} & b_{i_2} & \dots & b_{i_n} \end{pmatrix}.$$

Soit  $S_1$  une substitution quelconque des éléments  $a_1, a_2, \dots, a_n$ :

$$S_1 = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_{j_1} & a_{j_2} & \dots & a_{j_n} \end{pmatrix} \quad \text{et soit} \quad T_1 = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \dots & b_n \\ b_{j_1} & b_{j_2} & \dots & b_{j_n} \end{pmatrix}.$$

Nous dirons que les couples de substitutions  $S, S_1$  et  $T, T_1$  sont symétriques.

Montrons que si  $S$  et  $S_1$  sont des transformées réciproques,  $T$  et  $T_1$  le sont aussi.

En effet, soit

$$U = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ b_1 & b_2 & \dots & b_n \end{pmatrix}.$$

On a:

$$T = USU^{-1}, \quad T_1 = US_1 U^{-1}.$$

Donc, en vertu de la proposition 3, si  $S$  et  $S_1$  sont des transformées réciproques,  $T$  et  $T_1$  le sont aussi, c. q. f. d.

**Corollaire 2.** Soient  $S$  et  $T$  deux transformées réciproques et soit  $U$  une substitution *permutable* avec  $S$ . Les substitutions  $S$  et  $T_1 = UTU^{-1}$  sont alors également des transformées réciproques.

C'est une conséquence immédiate de la proposition 3, car la transformée de  $S$  par  $U$  coïncide, dans ce cas, avec  $S$ .

**3<sup>e</sup> Definition.** Nous dirons que deux substitutions  $S$  et  $T$  composées des mêmes éléments formant un ensemble fini  $E$  sont *connexes*, s'il n'existe aucun sousensemble propre  $E_1$  de  $E$  dont les éléments forment un système fini de cycles aussi bien dans  $S$  que dans  $T$ .

Si les substitutions  $S$  et  $T$  portant sur les mêmes éléments formant un ensemble  $E$  ne sont pas connexes, on peut évidemment toujours décomposer ces substitutions en un système de substitutions connexes.

**Exemples.** 1<sup>o</sup> Soit  $S = (12)(3)$  et  $T = (13)(2)$ . Ces deux substitutions sont connexes.

2<sup>o</sup> Soit  $S = (123)(45)(67)(89)$   
 $T = (12)(345)(6789)$ .

Les substitutions  $S$  et  $T$  ne sont pas connexes, mais on peut décomposer  $S$  en deux substitutions  $S_1 = (123)(45)$ ,  $S_2 = (67)(89)$  et  $T$  en deux substitutions  $T_1 = (12)(345)$ ,  $T_2 = (6789)$ , telles que les substitutions  $S_1$  et  $T_1$  sont connexes de même que les substitutions  $S_2$  et  $T_2$ .

**Proposition 4.** La condition nécessaire et suffisante pour que deux substitutions  $S$  et  $T$ , portant sur les mêmes éléments formant un ensemble  $E$ , soient des transformées réciproques est que quelles que soient les substitutions connexes  $S_1$  et  $T_1$ , telles que  $S \circ S_1$  et  $T \circ T_1$ , les deux substitutions  $S_1$  et  $T_1$  soient des transformées réciproques.

*Démonstration. La condition est nécessaire.*

En effet, soit

$$STS^{-1} = TST^{-1}. \quad (\text{I})$$

Soient  $S_1$  et  $T_1$  deux substitutions connexes quelconques, telles que  $S \circ S_1$  et  $T \circ T_1$ . Appelons  $E_1$  l'ensemble des éléments de chacune des substitutions  $S_1$  et  $T_1$ ;  $E_1$  est un sous-ensemble de  $E$ .

Comme on sait, pour obtenir la transformée de la substitution  $T(S)$  par  $S(T)$ , il suffit d'effectuer la substitution  $S(T)$  sur les éléments de chaque cycle de  $T(S)$ . Or, comme les substitutions  $S_1$  et  $T_1$  sont connexes, lorsqu'on effectuera cette opération sur les cycles de  $T_1(S_1)$ , on obtiendra un système composé d'un nombre égal de cycles de mêmes ordres et composés uniquement d'éléments de  $E_1$ . Si donc l'égalité I) a lieu, on doit avoir

$$S_1 T_1 S_1^{-1} = T_1 S_1 T_1^{-1}. \quad (\text{II})$$

La condition énoncée est donc bien nécessaire.

*La condition est suffisante.*

En effet, supposons qu'elle est satisfaite. Comme on voit sans peine, deux substitutions du même degré  $S$  et  $T$ , portant sur les mêmes éléments, peuvent toujours être décomposées, et cela de façon unique, en un nombre fini de substitutions

$$\begin{aligned} S &= S_1 + S_2 + \cdots + S_k, \\ T &= T_1 + T_2 + \cdots + T_k, \end{aligned}$$

de telle manière que les substitutions  $S_1, S_2, \dots, S_k$  soient sans éléments communs deux à deux, de même que les substitutions  $T_1, T_2, \dots, T_k$ , et que les substitutions  $S_i$  et  $T_i$  soient connexes, quel que soit  $i=1, 2, \dots, k$ .

En vertu de notre hypothèse,  $S_i T_i S_i^{-1} = T_i S_i T_i^{-1}$ , quel que soit  $i = 1, 2, \dots, k$ . Il s'agit de montrer que  $STS^{-1} = TST^{-1}$ .

Or, on voit immédiatement que

$$STS^{-1} = S_1 T_1 S_1^{-1} + S_2 T_2 S_2^{-1} + \cdots + S_k T_k S_k^{-1}$$

et

$$TST^{-1} = T_1 S_1 T_1^{-1} + T_2 S_2 T_2^{-1} + \cdots + T_k S_k T_k^{-1}.$$

On a donc bien  $STS^{-1} = TST^{-1}$ , de sorte que la condition énoncée est suffisante, c. q. f. d.

**Corollaire.** Il résulte de la proposition 4 que l'étude des conditions nécessaires et suffisantes pour que deux substitutions  $S$  et  $T$  soient des transformées réciproques peut être limitée au cas où  $S$  et  $T$  sont connexes. C'est ce que nous supposerons toujours dans la suite.

**Proposition 5<sup>1)</sup>.** La condition nécessaire et suffisante pour que deux substitutions connexes  $S$  et  $T$  de degré  $n$ , dont les éléments constituent un ensemble  $E$ , soient des transformées réciproques est qu'il existe un nombre impair  $\alpha$ , tel que  $n = k\alpha$  ( $k = \text{entier } \geq 1$ ) et  $k$  suites  $a_1^{(i)}, a_2^{(i)}, \dots, a_\alpha^{(i)}$  comprenant tous les éléments de  $E$ , ainsi qu'un nombre entier fixe  $i_0$  compris au sens large entre 1 et  $\alpha$ , tels que dans les cycles de  $T$  figurent les successions d'éléments

$$\left. \begin{array}{c} a_1^{(1)} a_1^{(2)} \dots a_1^{(k)} \\ a_2^{(1)} a_2^{(2)} \dots a_2^{(k)} \\ \dots \dots \dots \\ a_\alpha^{(1)} a_\alpha^{(2)} \dots a_\alpha^{(k)} \end{array} \right\} \quad (1)$$

et

$$a_{1+l \cdot 2^k}^{(k)} \ a_{i_0+l}^{(1)} \quad (l = 0, 1, 2, \dots, \alpha-1) \quad (2)$$

et que dans les cycles de  $S$  figurent les successions d'éléments

$$\left. \begin{array}{c} a_1^{(1)} a_\alpha^{(2)} \dots a_{2-2^q}^{(q+1)} \dots a_{2-2^{k-1}}^{(k)} \\ a_2^{(1)} a_1^{(2)} \dots a_{3-2^q}^{(q+1)} \dots a_{3-2^{k-1}}^{(k)} \\ \dots \dots \dots \\ a_\alpha^{(1)} a_{\alpha-1}^{(2)} \dots a_{\alpha+1-2^q}^{(q+1)} \dots a_{\alpha+1-2^{k-1}}^{(k)} \end{array} \right\} \quad (3)$$

et

$$a_{1+2^{k-1}+l \cdot 2^k}^{(k)} \ a_{i_0+l}^{(1)} \quad (l = 0, 1, 2, \dots, \alpha-1), \quad (4)$$

<sup>1)</sup> Les notations employées dans l'énoncé de ce théorème de même que les démonstrations des propositions 1, 2 et des corollaires de la proposition 3 ont été simplifiées d'après des remarques de M. B. L. van der Waerden.

les indices devant être réduits selon le module  $\alpha$  de façon à être toujours compris au sens large entre 1 et  $\alpha$ .

**Démonstration.** *La condition est nécessaire.*

Soient  $S$  et  $T$  deux substitutions connexes de degré  $n$  portant sur les éléments d'un ensemble  $E$  et soit I)  $STS^{-1}=TST^{-1}$ .

Soit  $(a_1^{(1)} a_2^{(1)} \dots a_\alpha^{(1)})$  un cycle quelconque de la substitution  $S^{-1}T$ .

Comme  $a_1^{(1)}, a_2^{(1)}, \dots, a_\alpha^{(1)}$  sont des éléments, distincts deux à deux, de l'ensemble  $E$ , on a  $1 \leq \alpha \leq n$  et comme les éléments en question constituent un cycle de  $S^{-1}T$ , on a

$$[a_i^{(1)}]^T = [a_{i+1}^{(1)}]^S, \quad (5)$$

quel que soit  $i = 1, 2, \dots, \alpha$ , l'indice  $i+1$  devant être remplacé par 1, si  $i = \alpha$ .

Je dis que les suites  $[a_1^{(1)}]^T, [a_2^{(1)}]^T, \dots, [a_\alpha^{(1)}]^T$  et  $a_1^{(1)}, a_2^{(1)}, \dots, a_\alpha^{(1)}$  sont disjointes ou sont composées des mêmes éléments.

En effet, supposons que ces suites ont un élément commun et soit, par exemple,

$$[a_i^{(1)}]^T = a_j^{(1)} (1 \leq i \leq \alpha, 1 \leq j \leq \alpha).$$

On a donc aussi, en vertu de (5),  $[a_{i+1}^{(1)}]^S = a_j^{(1)}$ .

Par conséquent,  $S$  contient dans un de ses cycles la succession d'éléments  $a_{i+1}^{(1)} a_j^{(1)}$ . Effectuons sur ces éléments la substitution  $T$ . Il vient  $[a_{i+1}^{(1)}]^T [a_j^{(1)}]^T$ , ou encore, en vertu de (5),  $[a_{i+2}^{(1)}]^S [a_{j+1}^{(1)}]^S$ .

Or, comme par hypothèse, l'égalité I) a lieu, la proposition 1 implique que  $T$  doit contenir dans un de ses cycles la succession d'éléments  $a_{i+2}^{(1)} a_{j+1}^{(1)}$ . Donc  $[a_{i+2}^{(1)}]^T = a_{j+1}^{(1)}$ .

Supposons à présent que pour un nombre entier  $g$  quelconque compris au sens large entre 1 et  $\alpha$ , on a  $[a_g^{(1)}]^T = a_r^{(1)}$ . Montrons que  $[a_{g+2}^{(1)}]^T = a_{r+1}^{(1)}$ . Comme  $[a_g^{(1)}]^T = a_r^{(1)}$ , on a aussi, en vertu de (5),  $[a_{g+1}^{(1)}]^S = a_r^{(1)}$ . Donc  $S$  contient dans un de ses cycles la succession d'éléments  $a_{g+1}^{(1)} a_r^{(1)}$ . Effectuons sur ces éléments la substitution  $T$ . Il vient  $[a_{g+1}^{(1)}]^T [a_r^{(1)}]^T$ , ou encore, en vertu de (5),  $[a_{g+2}^{(1)}]^S [a_{r+1}^{(1)}]^S$ . Comme I) a lieu par hypothèse, il en résulte en vertu de la proposition 1, que  $T$  doit contenir dans un de ses cycles la succession d'éléments  $a_{g+2}^{(1)} a_{r+1}^{(1)}$ . On a donc bien  $[a_{g+2}^{(1)}]^T = a_{r+1}^{(1)}$ , c. q. f. d.

Par conséquent, si  $[a_i^{(1)}]^T = a_j^{(1)}$ , on a  $[a_{i+2g}^{(1)}]^T = a_{j+g}^{(1)}$ , quel que soit  $g = 1, 2, \dots, \alpha - 1$ , les indices devant être réduits mod.  $\alpha$  de façon à être compris au sens large entre 1 et  $\alpha$ .

La suite  $a_j^{(1)}, a_{j+1}^{(1)}, \dots, a_\alpha^{(1)}, a_1^{(1)}, a_2^{(1)}, \dots, a_{j-1}^{(1)}$  étant composée de  $\alpha$  termes distincts, il doit en être de même de la suite  $[a_i^{(1)}]^T, [a_{i+2}^{(1)}]^T, [a_{i+2\cdot 2}^{(1)}]^T, \dots, [a_{i+2(\alpha-1)}^{(1)}]^T$ . Il en résulte, d'une part, que les suites  $[a_1^{(1)}]^T, [a_2^{(1)}]^T, \dots, [a_\alpha^{(1)}]^T$  et  $a_1^{(1)}, a_2^{(1)}, \dots, a_\alpha^{(1)}$ , si elles ne sont pas disjointes, sont bien composées des mêmes éléments et, d'autre part, que la suite des nombres  $i, i + 2, i + 2 \cdot 2, \dots, i + 2(\alpha - 1)$ , réduits mod.  $\alpha$  de façon à être compris au sens large entre 1 et  $\alpha$ , est composée de  $\alpha$  nombres distincts :  $1, 2, \dots, \alpha$ . Donc la suite des nombres  $2, 2 \cdot 2, \dots, 2(\alpha - 1)$ , réduits mod.  $\alpha$ , doit contenir  $\alpha - 1$  termes distincts :  $1, 2, \dots, \alpha - 1$ . Il en découle que  $\alpha$  est un nombre *impair* (puisque tous les nombres  $2, 2 \cdot 2, \dots, 2(\alpha - 1)$  sont pairs).

En posant  $[a_1^{(1)}]^T = a_{i_0}^{(1)}$ , on voit que la condition énoncée est bien nécessaire dans notre cas particulier.

Si les suites  $[a_1^{(1)}]^T, [a_2^{(1)}]^T, \dots, [a_\alpha^{(1)}]^T$  et  $a_1^{(1)}, a_2^{(1)}, \dots, a_\alpha^{(1)}$  sont disjointes, posons  $[a_i^{(1)}]^T = a_i^{(2)}$  ( $i = 1, 2, 3, \dots, \alpha$ ) .

En vertu des égalités 5), on a donc aussi

$$[a_{i+1}^{(1)}]^S = a_i^{(2)} \quad (i = 1, 2, \dots, \alpha) ,$$

l'indice  $i + 1$  devant être remplacé par 1, si  $i = \alpha$ .

Ainsi  $T$  comprend dans ses cycles les successions d'éléments

$$\begin{array}{c} a_1^{(1)} a_1^{(2)} \\ a_2^{(1)} a_2^{(2)} \\ \dots \\ a_\alpha^{(1)} a_\alpha^{(2)} \end{array}$$

et  $S$  comprend dans ses cycles les successions d'éléments

$$\begin{array}{c} a_1^{(1)} a_\alpha^{(2)} \\ a_2^{(1)} a_1^{(2)} \\ \dots \\ a_\alpha^{(1)} a_{\alpha-1}^{(2)} \end{array}$$

Quel que soit le nombre entier  $i$ , compris au sens large entre 1 et  $\alpha$ , si l'on effectue sur la succession  $a_{i+1}^{(1)} a_i^{(2)}$  d'éléments de  $S$  (l'indice  $i + 1$  devant être remplacé par 1 si  $i = \alpha$ ) la substitution  $T$ , il vient  $a_{i+1}^{(2)} [a_i^{(2)}]^T$ . Or,  $S$  substitue l'élément  $a_{i+1}^{(2)}$  à  $a_{i+2}^{(1)}$ . Donc, comme  $T$  contient la suc-

cession d'éléments  $a_{i+2}^{(1)} a_{i+2}^{(2)}$ , en vertu de l'égalité I) et de la proposition 1, on doit avoir

$$[a_{i+2}^{(2)}]^S = [a_i^{(2)}]^T \quad (i = 1, 2, \dots, \alpha), \quad (6)$$

les indices  $i + 2$  devant être réduits mod.  $\alpha$  de façon à être compris au sens large entre 1 et  $\alpha$ .

Soit à présent  $q$  un nombre entier quelconque  $\geq 1$  et  $< \frac{n}{\alpha}$ , soit  $a_1^{(i)}, a_2^{(i)}, \dots, a_\alpha^{(i)} (i = 1, 2, \dots, q+1)$   $q+1$  suites comprenant ensemble  $(q+1)\alpha$  éléments, distincts deux à deux, de l'ensemble  $E$  et supposons que  $T$  contient dans ses cycles les successions d'éléments

$$\left. \begin{array}{c} a_1^{(1)} a_1^{(2)} \dots a_1^{(q+1)} \\ a_2^{(1)} a_2^{(2)} \dots a_2^{(q+1)} \\ \dots \dots \dots \\ a_\alpha^{(1)} a_\alpha^{(2)} \dots a_\alpha^{(q+1)} \end{array} \right\} \quad (1')$$

que  $S$  contient dans ses cycles les successions d'éléments

$$\left. \begin{array}{c} a_1^{(1)} a_\alpha^{(2)} \dots a_{2-2^q}^{(q+1)} \\ a_2^{(1)} a_1^{(2)} \dots a_{3-2^q}^{(q+1)} \\ \dots \dots \dots \\ a_\alpha^{(1)} a_{\alpha-1}^{(2)} \dots a_{\alpha+1-2^q}^{(q+1)} \end{array} \right\} \quad (3')$$

et que l'on a (7)  $[a_j^{(q+1)}]^T = [a_{j+2^q}^{(q+1)}]^S$ , quel que soit  $j = 1, 2, \dots, \alpha$ , les indices  $j + 2^q$  devant être réduits mod.  $\alpha$  de façon à être compris au sens large entre 1 et  $\alpha$ .

Montrons que la suite \*)  $[a_1^{(q+1)}]^T, [a_2^{(q+1)}]^T, \dots, [a_\alpha^{(q+1)}]^T$  est soit composée des mêmes éléments que la suite  $a_1^{(1)}, a_2^{(1)}, \dots, a_\alpha^{(1)}$ , soit ne possède aucun élément des suites \*\*)  $a_1^{(i)}, a_2^{(i)}, \dots, a_\alpha^{(i)} (i = 1, 2, \dots, q+1)$ .

En effet, supposons d'abord que la suite \*) possède au moins un élément commun avec l'une des suites \*\*) et soit, par exemple,

$$[a_{i'}^{(q+1)}]^T = a_{i''}^{(r)} \quad (1 \leq i' \leq \alpha, 1 \leq i'' \leq \alpha, 1 \leq r \leq q+1).$$

Je dis que  $r = 1$ . En effet, supposons le contraire et soit  $r > 1$ .

Mais alors, comme  $T$  substitue, en vertu de nos supposition,  $a_{i''}^{(r)}$  à  $a_{i''}^{(r-1)}$ , on doit avoir  $a_{i'}^{(q+1)} = a_{i''}^{(r-1)}$ . Or, c'est impossible car  $r-1 \leq q$  et, par suite, les deux éléments  $a_{i''}^{(r-1)}$  et  $a_{i'}^{(q+1)}$  appartiennent à deux suites distinctes du système \*\*). Or, d'après nos hypothèses, deux telles suites n'ont aucun élément commun. On a donc bien  $r=1$ .

Comme  $[a_{i'}^{(q+1)}]^T = a_{i''}^{(1)}$ , on a, en vertu de 7),  $[a_{i'+2^q}^{(q+1)}]^S = a_{i''}^{(1)}$ .

Soit  $i_1$  ( $1 \leq i_1 \leq \alpha$ ) le rang de la ligne du système 3') qui comprend l'élément  $a_{i'+2^q}^{(q+1)}$ . Le nombre  $i_1$  est défini par l'égalité

$$i_1 + 1 - 2^q = i' + 2^q,$$

d'où l'on déduit

$$i_1 = i' - 1 + 2^{q+1},$$

ce nombre devant être réduit mod.  $\alpha$  de façon à être compris au sens large entre 1 et  $\alpha$ .

La substitution  $S$  contient donc dans un de ses cycles la succession d'éléments

$$a_{i_1}^{(1)} a_{i_1-1}^{(2)} \dots a_{i'+2^q}^{(q+1)} a_{i''}^{(1)} a_{i''-1}^{(2)} \dots a_{i''+1-2^q}^{(q+1)}.$$

En effectuant sur cette suite la substitution  $T$ , on trouve

$$a_{i_1}^{(2)} a_{i_1-1}^{(2)} \dots [a_{i'+2^q}^{(q+1)}]^T a_{i''}^{(2)} a_{i''-1}^{(3)} \dots [a_{i''+1-2^q}^{(q+1)}]^T.$$

Or,  $S$  substitue  $a_{i_1}^{(2)}$  à  $a_{i_1+1}^{(1)}$  et  $a_{i''}^{(2)}$  à  $a_{i''+1}^{(1)}$ . Donc, puisque I) a lieu, en vertu de la proposition 1,  $T$  doit contenir la succession d'éléments

$$a_{i_1+1}^{(1)} a_{i_1+1}^{(2)} \dots a_{i_1+1}^{(q+1)} a_{i''+1}^{(1)} a_{i''+1}^{(2)} \dots a_{i''+1}^{(q+1)}$$

et, par conséquent,  $T$  substitue  $a_{i''+1}^{(1)}$  à  $a_{i_1+1}^{(q+1)} = a_{i'+2^{q+1}}^{(q+1)}$ .

Donc, en vertu de 7),  $S$  substitue  $a_{i''+1}^{(1)}$  à  $a_{i'+2^q+2^{q+1}}^{(q+1)}$ , les indices  $i'+2^{q+1}$  et  $i'+2^q+2^{q+1}$  devant être réduits mod.  $\alpha$ , de façon à être compris au sens large entre 1 et  $\alpha$ .

Soit à présent  $l$  un nombre entier quelconque  $\geq 1$  et  $< \alpha - 1$ , et supposons que  $[a_{i'+l \cdot 2^{q+1}}^{(q+1)}]^T = a_{i''+l}^{(1)}$ , donc aussi  $[a_{i'+2^q+l \cdot 2^{q+1}}^{(q+1)}]^S = a_{i''+l}^{(1)}$ . Montrons que  $[a_{i'+(l+1)2^{q+1}}^{(q+1)}]^T = a_{i''+l+1}^{(1)}$ , donc aussi  $[a_{i'+2^q+(l+1)2^{q+1}}^{(q+1)}]^S = a_{i''+l+1}^{(1)}$ .

Soit  $i_{l+1}$  ( $1 \leq i_{l+1} \leq \alpha$ ) le rang de la ligne du système 3') à laquelle appartient l'élément  $[a_{i'+l \cdot 2^{q+1}}^{(q+1)}]^S$ .

Le nombre  $i_{l+1}$  est défini par l'égalité

$$i_{l+1} + 1 - 2^q = i' + 2^q + l \cdot 2^{q+1},$$

d'où l'on déduit

$$i_{l+1} = i' - 1 + (l + 1) 2^{q+1},$$

ce nombre devant être réduit mod.  $\alpha$  de façon à être compris au sens large entre 1 et  $\alpha$ .

Il en résulte que  $S$  contient dans un de ses cycles la succession d'éléments

$$a_{i_{l+1}}^{(1)} \ a_{i_{l+1}-1}^{(2)} \ \dots \ a_{i'+2^q+l \cdot 2^{q+1}}^{(q+1)} \ a_{i''+l}^{(1)} \ a_{i''+l-1}^{(2)} \ \dots \ a_{i''+l+1-2^q}^{(q+1)}.$$

Effectuons sur cette suite la substitution  $T$ . Il vient

$$a_{i_{l+1}}^{(2)} \ a_{i_{l+1}-1}^{(3)} \ \dots \ [a_{i'+2^q+l \cdot 2^{q+1}}^{(q+1)}]^T \ a_{i''+l}^{(2)} \ a_{i''+l-1}^{(3)} \ \dots \ [a_{i''+l+1-2^q}^{(q+1)}]^T.$$

Or,  $S$  substitue

$$a_{i_{l+1}}^{(2)} \ \text{à} \ a_{i_{l+1}+1}^{(1)} \ \text{et} \ a_{i''+l}^{(2)} \ \text{à} \ a_{i''+l+1}^{(1)}.$$

Donc comme I) a lieu,  $T$  doit contenir dans un de ses cycles, en vertu de la proposition 1, la succession d'éléments

$$a_{i_{l+1}+1}^{(1)} \ a_{i_{l+1}+1}^{(2)} \ \dots \ a_{i_{l+1}+1}^{(q+1)} \ a_{i''+l+1}^{(1)} \ a_{i''+l+1}^{(2)} \ \dots \ a_{i''+l+1}^{(q+1)}.$$

Donc  $T$  substitue

$$a_{i''+l+1}^{(1)} \ \text{à} \ a_{i_{l+1}+1}^{(q+1)} = a_{i'+(l+1)2^{q+1}}^{(q+1)}.$$

On a donc bien

$$[a_{i'+(l+1)2^{q+1}}^{(q+1)}]^T = a_{i''+l+1}^{(1)}$$

et, par conséquent aussi, en vertu de 7),

$$[a_{i'+(l+1)2^{q+1}}^{(q+1)}]^S = a_{i''+l+1}^{(1)}, \text{ c. q. f. d.}$$

La suite  $a_{i''}^{(1)}, a_{i''+1}^{(1)}, \dots, a_{i''+\alpha-1}^{(1)}$  étant composée de  $\alpha$  éléments distincts (à savoir  $a_1^{(1)}, a_2^{(1)}, a_\alpha^{(1)}$ ), il doit en être de même de la suite

$$[a_{i'}^{(q+1)}]^T, [a_{i'+2^q+1}^{(q+1)}]^T, [a_{i'+2 \cdot 2^q+1}^{(q+1)}]^T, \dots, [a_{i'+(\alpha-1)2^{q+1}}^{(q+1)}]^T,$$

donc aussi de la suite

$$i', i' + 2^{q+1}, i' + 2 \cdot 2^{q+1}, \dots, i' + (\alpha - 1) 2^{q+1},$$

les nombres de cette dernière suite devant être réduits mod.  $\alpha$ , de façon à être compris au sens large entre 1 et  $\alpha$ . Par conséquent, la suite des nombres  $2^{q+1}, 2 \cdot 2^{q+1}, \dots, (\alpha - 1) 2^{q+1}$ , réduits selon le mod.  $\alpha$ , doit contenir  $\alpha - 1$  nombres distincts, à savoir 1, 2, ...,  $\alpha - 1$ .

Or, ceci n'est possible que si le nombre  $\alpha$  est impair.

Posons

$$[a_1^{(q+1)}]^T = a_{i_0}^{(1)}.$$

Il vient

$$[a_{1+l \cdot 2^q+1}^{(q+1)}]^T = [a_{1+2^q+l \cdot 2^{q+1}}^{(q+1)}]^S = a_{i_0+l}^{(1)}, \quad (8)$$

quel que soit  $l = 1, 2, \dots, \alpha - 1$ .

Il ressort de ces considérations qu'effectivement la suite \*) soit ne contient aucun élément des suites \*\*), soit est composée des éléments de la suite  $a_1^{(1)}, a_2^{(1)}, \dots, a_\alpha^{(1)}$  et que dans ce dernier cas la condition énoncée est bien nécessaire.

Si les suites \*) et \*\*) sont disjointes, posons

$$[a_i^{(q+1)}]^T = a_i^{(q+2)} \quad (i = 1, 2, \dots, \alpha).$$

On a donc aussi, en vertu de (7) :

$$[a_{i+2^q}^{(q+1)}]^S = a_i^{(q+2)} \quad (i = 1, 2, \dots, \alpha).$$

Montrons que quel que soit le nombre entier  $i$  compris au sens large entre 1 et  $\alpha$ , on a

$$[a_i^{(q+2)}]^T = [a_{i+2^q+1}^{(q+2)}]^S. \quad (9)$$

Comme nous venons de le voir,  $S$  contient dans un de ses cycles la succession d'éléments  $a_{i+2^q}^{(q+1)}, a_i^{(q+2)}$ . Effectuons sur ces éléments la substitution  $T$ .

Il vient  $a_{i+2^q}^{(q+2)} [a_i^{(q+2)}]^T$ .

Or,  $S$  substitue  $a_{i+2^q}^{(q+2)}$  à  $a_{i+2^q+2^q}^{(q+1)} = a_{i+2^{q+1}}^{(q+1)}$ .

Donc puisque I) a lieu, comme  $T$  contient dans un de ses cycles la succession d'éléments

$$a_{i+2^{q+1}}^{(q+1)}, a_{i+2^{q+1}}^{(q+2)},$$

on doit avoir, en vertu de la proposition 1,  $[a_{i+2^{q+1}}^{(q+2)}]^S = [a_i^{(q+2)}]^T$ , c. q. f. d.

Montrons que  $[a_{i+1-2^q}^{(q+1)}]^S = a_{i+1-2^{q+1}}^{(q+2)}$ , quel que soit  $i = 1, 2, \dots, \alpha$ . En effet, nous avons  $[a_{i+2^q}^{(q+1)}]^S = a_i^{(q+2)}$ , quel que soit  $i = 1, 2, \dots, \alpha$ . Soit  $\varrho$  le nombre entier compris au sens large entre 1 et  $\alpha$  et tel que

$$\varrho + 2^q = i + 1 - 2^q, \text{ ou encore } \varrho = i + 1 - 2^{q+1} (\text{mod. } \alpha).$$

On a donc

$$[a_{i+1-2^q}^{(q+1)}]^S = [a_{\varrho+2^q}^{(q+1)}]^S = a_\varrho^{(q+2)} = a_{i+1-2^{q+1}}^{(q+2)}, \text{ c. q. f. d.}$$

Cela étant quel que soit le nombre entier  $q = 1, 2, 3, \dots$ , il en résulte que le nombre  $n$  (degré des substitutions  $S$  et  $T$ ) est un multiple de  $\alpha$ . Soit  $n = k\alpha$ . ( $k = \text{entier } \geq 1$ .)

Donc les cycles de  $T$  contiennent bien les successions d'éléments du système 1) et les cycles de  $S$  les successions d'éléments du système 3).

D'autre part, les deux suites d'éléments

$$[a_1^{(k)}]^T, [a_2^{(k)}]^T, \dots, [a_\alpha^{(k)}]^T$$

et

$$[a_{2-2^{k-1}}^{(k)}]^S, [a_{3-2^{k-1}}^{(k)}]^S, \dots, [a_{\alpha+1-2^{k-1}}^{(k)}]^S$$

doivent, en vertu de ce qui précède, être composées des éléments  $a_1^{(1)}, a_2^{(1)}, \dots, a_\alpha^{(1)}$ . Notamment, si l'on désigne par  $i_0$  le nombre entier compris au sens large entre 1 et  $\alpha$  et tel que  $[a_1^{(k)}]^T = a_{i_0}^{(1)}$ , il vient, en vertu de 8), où l'on pose  $q = k - 1$ ,

$$[a_{1+l \cdot 2^k}^{(k)}]^T = [a_{1+2^{k-1}+l \cdot 2^k}^{(k)}]^S = a_{i_0+l}^{(1)} \quad (l = 0, 1, 2, \dots, \alpha - 1),$$

et le nombre  $\alpha$  doit être impair.

La condition énoncée est donc bien nécessaire.

### La condition est suffisante.

Soient  $S$  et  $T$  deux substitutions connexes de degré  $n = k\alpha$ , où  $\alpha$  est un nombre entier impair et  $k$  un entier  $\geq 1$ , portant sur les éléments d'un ensemble  $E$ , et supposons qu'il existe  $k$  suites  $a_1^{(i)}, a_2^{(i)}, \dots, a_\alpha^{(i)}$  ( $i = 1, 2, \dots, k$ ), comprenant tous les éléments de  $E$ , et un nombre entier  $i_0$  compris au sens large entre 1 et  $\alpha$ , tels que dans les cycles de  $T$  figurent les successions d'éléments 1) et 2) et que dans les cycles de  $S$  figurent les successions d'éléments 3) et 4). Montrons que dans ce cas on a I)  $STS^{-1} = TST^{-1}$ .

On obtient, comme on sait, la transformée d'une substitution  $T(S)$  par  $S(T)$  en effectuant sur les éléments de chaque cycle de  $T(S)$  la substitution  $S(T)$ .

Notre proposition sera établie si nous prouvons qu'à toute suite

$$a_i^{(1)} a_{i-1}^{(2)} \dots a_{i-2}^{(q+1)} \dots a_i^{(k)} \quad (i)$$

$(1 \leq i \leq \alpha)$  du système (1) correspond une suite déterminée du système 3), à savoir

$$a_{i-1}^{(1)} a_{i-2}^{(2)} \dots a_{i-2^q}^{(q+1)} \dots a_{i-2^{k-1}}^{(k)} \quad (i')$$

(le nombre  $i - 1$  devant être remplacé par  $\alpha$ , si  $i = 1$ ), telle que si l'on effectue sur la suite  $i)$  la substitution  $S$  et sur la suite  $i')$  la substitution  $T$ , on obtient dans les deux cas la même suite d'éléments de  $E$ , quel que soit  $i = 1, 2, \dots, \alpha$ .

En effet, quel que soit le nombre entier  $q$  compris au sens large entre 1 et  $k - 2$ , il existe (par définition des systèmes 1) et 3)) un nombre entier  $u$  compris au sens large entre 1 et  $\alpha$ , et tel que

$$i = u + 1 - 2^q \pmod{\alpha}.$$

Donc

$$i - u - 1 + 2^q \equiv 0 \pmod{\alpha}. \quad (10)$$

D'autre part, il existe un nombre entier  $l'$  ( $0 \leq l' \leq \alpha - 1$ ), tel que

$$i = 1 + 2^{k-1} + l' \cdot 2^k \pmod{\alpha}.$$

D'où

$$i - 1 - 2^{k-1} - l' \cdot 2^k \equiv 0 \pmod{\alpha}. \quad (11)$$

Il ressort de ces remarques et de la définition de  $S$  que  $S$  remplace

$$\begin{aligned} a_i^{(1)} &\text{ par } a_{i-1}^{(2)} \\ a_i^{(q+1)} &\text{ par } a_{u+1-2^{q+1}}^{(q+2)} \quad (1 \leq q \leq k-2) \\ a_i^{(k)} &\text{ par } a_{i_0+l'}^{(1)} \end{aligned}$$

D'autre part, il existe un nombre entier  $l''$  ( $0 \leq l'' \leq \alpha - 1$ ), tel que

$$i - 2^{k-1} = 1 + l'' \cdot 2^k \pmod{\alpha}.$$

D'où on déduit

$$i - 1 - 2^{k-1} - l'' \cdot 2^k \equiv 0 \pmod{\alpha}. \quad (12)$$

De 11) et 12), il ressort que  $l'' = l'$ .

Il résulte de ces remarques et de la définition de  $T$  que  $T$  remplace

$$\begin{aligned} a_{i-1}^{(1)} &\text{ par } a_{i-1}^{(2)} \\ a_{i-2^q}^{(q+1)} &\text{ par } a_{i-2^q}^{(q+2)} \quad (1 \leq q \leq k-2) \\ a_{i-2^{k-1}}^{(k)} &\text{ par } a_{i_0+l'}^{(1)} . \end{aligned}$$

Or

$$i - 2^q - [u + 1 - 2^{q+1}] \equiv 0 \pmod{\alpha} .$$

En effet, on en déduit  $i - u - 1 + 2^q \equiv 0 \pmod{\alpha}$ , ce qui est bien vrai en vertu de 10).

Ainsi si l'on effectue sur la suite  $i$ ) la substitution  $S$  et sur la suite  $i''$ ) la substitution  $T$ , on obtient dans les deux cas la même suite d'éléments de  $E$ .

Cela étant quel que soit  $i = 1, 2, \dots, \alpha$ , on a donc bien I)  $STS^{-1} = TST^{-1}$  et la condition énoncée est suffisante, c. q. f. d.

### Corollaires.

1° Soient  $S$  et  $T$  deux substitutions connexes portant sur les mêmes éléments formant un ensemble  $E$ .

Si  $S$  et  $T$  sont des transformées réciproques, il résulte de ce qui précède, les notations étant les mêmes que ci-dessus, que la substitution  $S^{-1}T$  est régulière d'ordre  $\alpha$  *impair*, et qu'elle comprend les  $k$  cycles suivants:

$$(a_1^{(i)} a_{1+2^{i-1}}^{(i)} a_{1+2\cdot2^{i-1}}^{(i)} \dots a_{1+(\alpha-1)2^{i-1}}^{(i)}) \quad (i = 1, 2, \dots, k),$$

les indices devant être réduits mod.  $\alpha$ , de façon à être compris au sens large entre 1 et  $\alpha$ .

La condition que  $S^{-1}T$  soit régulière d'ordre impair est nécessaire mais pas suffisante pour que les substitutions  $T$  et  $S$  soient des transformées réciproques.

2° Soit  $k = 1$ . Dans ce cas  $n = \alpha$  et la substitution  $S^{-1}T$  est circulaire:

$$S^{-1}T = (a_1^{(1)} a_2^{(1)} \dots a_\alpha^{(1)}) .$$

Quel que soit le nombre entier  $q$  compris au sens large entre 0 et  $\alpha-1$ , on a alors

$$[a_{1+2\cdot q}^{(1)}]^T = [a_{2+2q}^{(1)}]^S = a_{i_0+q}^{(1)},$$

$i_0$  ayant la signification définie plus haut.

Comme  $1 + 2(i_0 - 1) = i_0 + i_0 - 1$ , on voit que  $T$  contient un cycle de premier ordre et un seul, à savoir  $(a_{2i_0-1}^{(1)})$ , de même que  $S$ , dont l'unique cycle de premier ordre est  $(a_{2i_0-2}^{(1)})$ .

Il ressort de la proposition 5 et de ces remarques que si les substitutions connexes  $S$  et  $T$  sont des transformées réciproques et si la substitution  $S^{-1}T$  est circulaire, les substitutions  $S$  et  $T$  contiennent chacune un et un seul cycle de premier ordre, et inversément si les substitutions connexes  $S$  et  $T$  sont des transformées réciproques et contiennent chacune un et un seul cycle de premier ordre, la substitution  $S^{-1}T$  est circulaire. Par contre, si la substitution  $S^{-1}T$  est de degré  $k \cdot \alpha$ , où  $k > 1$ ,  $\alpha$  étant l'ordre de cette substitution, tous les cycles des transformées réciproques connexes  $S$  et  $T$  sont d'ordre  $\geq k$ , ces ordres ne pouvant être que des multiples de  $k$ , et inversément si l'ordre de chacun des cycles des substitutions  $S$  et  $T$  qui sont des transformées réciproques connexes, est  $> 1$ , la substitution  $S^{-1}T$  n'est pas circulaire.

3<sup>e</sup> Si les transformées réciproques  $S$  et  $T$  sont régulières, elles sont composées chacune d'un nombre impair de cycles.

En effet, si les substitutions  $S$  et  $T$  sont des transformées réciproques, elles satisfont à la proposition 5. Soit  $m$  le nombre de cycles de  $S(T)$  et  $r$  l'ordre de cette substitution. On a donc  $n = mr$ ,  $n$  étant le degré de la substitution  $S(T)$ . De la proposition 5 on conclut, en employant les mêmes notations que ci-dessus, que  $n = k \cdot \alpha$  et  $r = r_1 k$ ,  $r_1$  désignant un nombre entier  $\geq 1$ .

Donc  $mr = mr_1k = k\alpha.$

On en déduit  $\alpha = m r_1.$

Or,  $\alpha$  étant un nombre impair, il doit en être de même de  $m$  et de  $r_1$ . Par conséquent le nombre de cycles de chacune des substitutions  $S$  et  $T$  est bien impair, c. q. f. d.

(Reçu le 1<sup>er</sup> octobre 1936.)