

Zeitschrift: Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz = Matériaux pour la flore cryptogamique suisse = Contributi per lo studio della flora crittogama svizzera

Herausgeber: Schweizerische Naturforschende Gesellschaft

Band: 5 (1915)

Heft: 4

Artikel: Beiträge zu einer Monographie der Gattung Peronospora Corda

Autor: Gäumann, Ernst

Kapitel: II: Schlüssel zur Bestimmung der schweizerischen Peronosporaarten

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-821085>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

satz zu Alfred Fischer vorgenommenen Dislokationen von Formen der Effusae in die Gruppe der Parasiticae erfolgte im allgemeinen gestützt auf die mehrfach zitierten Untersuchungen Berleses.

II. Schlüssel zur Bestimmung der schweizerischen Peronosporaarten.

Zugleich eine Übersicht über das System der Gattung Peronospora.

Epispor der Oosporen glatt oder in einige unregelmässige Falten ausgezogen und dann unregelmässig eckig, niemals regelmässig netzig oder warzig.

Wand des Oogons dick, zweischichtig, nach der Sporenreife nicht zusammenfallend.

Wand des Oogons dünn, nach der Sporenreife zusammenfallend.

Epispor der Oosporen mit warzenförmigen oder mit leistenförmigen, zu regelmässigen Maschen verschmolzenen Verdickungen gleichmässig bedeckt.

Oosporen mit mehr oder weniger kugeligen Warzen oder mit kurzen, nicht netzig verschmolzenen Leisten besetzt.

Oosporen mit einem regelmässigen Maschwerk von netzig verschmolzenen Leisten besetzt.

A. Untergattung der *Leiothecae* Schröter.

a) Gruppe der *Parasiticae* De By.

b) Gruppe der *Effusae* De By.

B. Untergattung der *Calothecae* De By.

c) Gruppe der *Verrucosae* A. Fischer.

d) Gruppe der *Reticulatae* A. Fischer.

A. Untergattung der *Leiothecae* Schröter.

a. Gruppe der *Parasiticae* De By.

Auf Cannabaceen

Conidien im Mittel 25 μ lang, 18 μ breit

Auf Urticaceen

Conidien im Mittel 30 μ lang, 22 μ breit

Auf Euphorbiaceen

Conidien im Mittel 16 μ lang, 14 μ breit

Conidien im Mittel 21 μ lang, 16 μ breit

Conidien im Mittel 22 μ lang, 19 μ breit

Auf Papaveraceen

Conidien im Mittel 21—22 μ l., 21 μ b.

I. Formenkreis der *P. cannabina* Otth.

1. *P. cannabina* Otth.

II. Formenkreis der *P. Urticae* (Lib.) De By.

2. *P. Urticae* (Lib.) De By.

III. Formenkreis der *P. Euphorbiae* Fuckel.

3. *P. Euphorbiae* Fuckel.

4. *P. Cyparissiae* De By.

5. *P. valesiaca* Gäum.

IV. Formenkreis der *P. Corydalis* De By.

6. *P. Bulbocapni* Beck.

- Auf Cruciferen
- Auf *Alliaria*
Conidien im Mittel 24 μ lang, 18 μ breit
- Auf *Alyssum*
Conidien im Mittel 26 μ lang, 19 μ breit
- Auf *Arabid*
Conidien im Mittel 16 μ lang, 14 μ breit
Conidien im Mittel 20 μ lang, 19 μ breit
Conidien im Mittel 24 μ lang, 21 μ breit
- Auf *Barbarea*
Conidien im Mittel 16 μ lang, 14 μ breit
- Auf *Biscutella*
Conidien im Mittel 17 μ lang, 16 μ breit
- Auf *Brassica* (incl. *Sinapis* und *Raphanus*)
Conidien im Mittel 19 μ lang, 17 μ breit
- Auf *Camelina*
Conidien im Mittel 22 μ lang, 20 μ breit
- Auf *Capsella*
Conidien im Mittel 22 μ lang, 19 μ breit
- Auf *Cardamine*
Conidien im Mittel 16 μ lang, 13 μ breit
- Auf *Cheiranthus*
Conidien im Mittel 24 μ lang, 18 μ breit
- Auf *Diplotaxis*
Conidien im Mittel 19 μ lang, 16 μ breit
- Auf *Erophila*
Conidien im Mittel 16 μ lang, 13 μ breit
- Auf *Erucastrum*
Conidien im Mittel 22 μ lang, 18 μ breit
- Auf *Isatis*
Conidien im Mittel 22 μ lang, 19 μ breit
- Auf *Lepidium*
Conidien im Mittel 24 μ lang, 19 μ breit
- Auf *Lunaria*
Conidien im Mittel 26 μ lang, 22 μ breit
- Auf *Sisymbrium*
Conidien im Mittel 21 μ lang, 18 μ breit
Conidien im Mittel 27 μ lang, 19 μ breit
Conidien im Mittel 30 μ lang, 24 μ breit
- Auf *Stenophragma*
Conidien im Mittel 16 μ lang, 14 μ breit
- Auf *Thlaspi*
Conidien im Mittel 19 μ lang, 17 μ breit
Conidien im Mittel 21 μ lang, 19 μ breit
Conidien im Mittel 27 μ lang, 21 μ breit
- Auf Resedaceen
Conidien im Mittel 21 μ lang, 18 μ breit
- V. Formenkreis der *P. parasitica* (Pers.) Fries.
7. *P. Niessleana* Berlese.
 8. *P. Alyssi calycini* G ä u m.
 9. *P. Arabidis hirsutae* G ä u m.
 10. *P. Arabidis Turritae* G ä u m.
 11. *P. Arabidis alpinae* G ä u m.
 12. *P. Barbaraeae* G ä u m.
 13. *P. Biscutellae* G ä u m.
 14. *P. Brassicae* G ä u m.
 15. *P. Camelinae* G ä u m.
 16. *P. parasitica* (Pers.) Fries.
 17. *P. Dentariae* Rabh.
 18. *P. Cheiranthi* G ä u m.
 19. *P. Diplotaxidis* G ä u m.
 20. *P. Erophilae* G ä u m.
 21. *P. Erucastri* G ä u m.
 22. *P. Isatidis* G ä u m.
 23. *P. Lepidii sativi* G ä u m.
 24. *P. Lunariae* G ä u m.
 25. *P. Sisymbrii officinalis* G ä u m.
 26. *P. Sisymbrii Sophiae* G ä u m.
 27. *P. rhaetica* G ä u m.
 28. *P. Arabidopsidis* G ä u m.
 29. *P. Thlaspeos perfoliati* G ä u m.
 30. *P. Thlaspeos alpestris* G ä u m.
 31. *P. Thlaspeos arvensis* G ä u m.
- VI. Formenkreis der *P. crispula* F u c k e l.
32. *P. crispula* F u c k e l.

Auf Cistaceen

Conidien im Mittel 25 μ lang, 19 μ breitConidien im Mittel 27 μ lang, 24 μ breit

Auf Campanulaceen

Conidien im Mittel 21 μ lang, 14 μ breit

Auf Dipsaceen

Conidien im Mittel 35 μ lang, 19 μ breitVII. Formenkreis der *P. leptoclada* Sacc.33. *P. leptoclada* Sacc.34. *P. alpestris* Gäum.VIII. Formenkreis der *P. Phyteumatis* Fuckel.35. *P. Phyteumatis* Fuckel.IX. Formenkreis der *P. violacea* Berkeley.36. *P. violacea* Berkeley.

b. Gruppe der Effusae De By.

Auf Santalaceen

Conidien im Mittel 19 μ lang, 16 μ breit

Auf Polygonaceen

Conidien im Mittel 27 μ lang, 21 μ breitConidien im Mittel 30 μ lang, 19 μ breitConidien im Mittel 30 μ lang, 21 μ breit

Auf Chenopodiaceen

Auf Amaranthus

Conidien im Mittel 19 μ lang, 16 μ breit

Auf Atriplex

Conidien im Mittel 22 μ lang, 17 μ breitConidien im Mittel 30 μ lang, 22 μ breit

Auf Beta

Conidien im Mittel 27 μ lang, 21 μ breit

Auf Chenopodium

Conidien im Mittel 22 μ lang, 16 μ breitConidien im Mittel 25 μ lang, 18 μ breitConidien im Mittel 25 μ lang, 22 μ breitConidien im Mittel 27 μ lang, 24 μ breitConidien im Mittel 29 μ lang, 18 μ breit

Auf Spinacia

Conidien im Mittel 25 μ lang, 19 μ breit

Auf Caryophyllaceen

Conidien im Mittel 30 μ lang, 16 μ breit

Auf Ranunculaceen

Auf Eranthis

Conidien im Mittel 40 μ lang, 19 μ breit

Auf Helleborus

Conidien im Mittel 30 μ lang, 24 μ breitX. Formenkreis der *P. Thesii* Lagerh.37. *P. Thesii* Lagerheim.XI. Formenkreis der *P. Rumicis* Corda.38. *P. Rumicis* Corda.39. *P. Polygoni* (Halsted)

A. Fischer.

40. *P. Jaapiana* Magnus.XII. Formenkreis der *P. effusa* (Grev.) Tul.41. *P. Amaranthi* Gäum.42. *P. minor* (Casp.) Gäum.43. *P. litoralis* Gäum.44. *P. Schachtii* Fuckel.45. *P. Chenopodii polyspermi*
Gäum.46. *P. Chenopodii* Schlecht.47. *P. muralis* Gäum.48. *P. Boni Henrici* Gäum.49. *P. variabilis* Gäum.50. *P. Spinaciae* Laubert.XIII. Formenkreis der *P. obovata* Bonorden.51. *P. obovata* BonordenXIV. Formenkreis der *P. Ficariae* (N.v.Es.) Tul.52. *P. Eranthidis* (Pass.) A. Fischer.53. *P. pulveracea* Fuckel.

- Auf *Ranunculus*
 Conidien im Mittel 24 μ lang, 17 μ breit
 Conidien im Mittel 25 μ lang, 21 μ breit
 Conidien im Mittel 27 μ lang, 22 μ breit
 Conidien im Mittel 32 μ lang, 24 μ breit
 Conidien im Mittel 33 μ lang, 21 μ breit
- Auf *Papaveraceen*
 Conidien im Mittel 16 μ lang, 15 μ breit
 Conidien im Mittel 24 μ lang, 16 μ breit
- Auf *Violaceen*
 Conidien im Mittel 24 μ lang, 17 μ breit
- Auf *Geraniaceen*
 Conidien im Mittel 25 μ lang, 24 μ breit
- Auf *Linaceen*
 Conidien im Mittel 24 μ lang, 18 μ breit
- Auf *Saxifragaceen*
 Conidien im Mittel 24 μ lang, 20 μ breit
- Auf *Rosaceen*
 Auf *Alchemilla*
 Conidien im Mittel 21 μ lang, 17 μ breit
- Auf *Fragaria*
 Conidien im Mittel 26 μ lang, 16 μ breit
- Auf *Potentilla*
 Conidien im Mittel 19 μ lang, 16 μ breit
 Conidien im Mittel 22 μ lang, 19 μ breit
 Conidien im Mittel 27 μ lang, 18 μ breit
- Auf *Papilionaceen*
 Auf *Coronilla*
 Conidien im Mittel 22 μ lang, 18 μ breit
- Auf *Lotus*
 Conidien im Mittel 28 μ lang, 20 μ breit
- Auf *Medicago*
 Conidien im Mittel 29 μ lang, 22 μ breit
- Auf *Melilotus*
 Conidien im Mittel 27 μ lang, 22 μ breit
- Auf *Onobrychis*
 Conidien im Mittel 27 μ lang, 20 μ breit
- Auf *Oxytropis*
 Conidien im Mittel 32 μ lang, 24 μ breit
- Auf *Phaca*
 Conidien im Mittel 27 μ lang, 21 μ breit
- Auf *Tetragonolobus*
 Conidien im Mittel 24 μ lang, 22 μ breit
54. *P. hiemalis* Gäum.
 55. *P. Ranunculi* Gäum.
 56. *P. Ficariae* (N. v. Es.) Tul.
 57. *P. alpicola* Gäum.
 58. *P. glacialis* (Blytt) Gäum.
- XV. Formenkreis der *P. arborescens* (Berk.) De By.
 59. *P. arborescens* (Berk.) De By.
 60. *P. affinis* Rossm.
- XVI. Formenkreis der *P. Violae* De By.
 61. *P. Violae* De By.
- XVII. Formenkreis der *P. conglomerata* Fuckel.
 62. *P. conglomerata* Fuckel.
- XVIII. Formenkreis der *P. Lini* Schröter.
 63. *P. Lini* Schröter.
- XIX. Formenkreis der *P. Chrysosplenii* Fuckel.
 64. *P. Chrysosplenii* Fuckel.
- XX. Formenkreis der *P. Potentillae* De By.
 65. *P. Alchemillae* Otth.
66. *P. Fragariae* Roze et Cornu.
67. *P. Potentillae reptantis* Gäum.
 68. *P. Potentillae sterilis* Gäum.
 69. *P. Potentillae* De By.
- XXI. Formenkreis der *P. trifoliorum* De By.
 70. *P. Coronillae* Gäum.
71. *P. Lotorum* Sydow.
 72. *P. aestivalis* Sydow.
 73. *P. Meliloti* Sydow.
 74. *P. Ruegeriae* Gäum.
 75. *P. Oxytropidis* Gäum.
 76. *P. Phacae* Gäum.
 77. *P. Tetragonolobi* Gäum.

Auf *Trifolium*

- Conidien im Mittel 19 μ lang, 18 μ breit
 Conidien im Mittel 21 μ lang, 19 μ breit
 Conidien im Mittel 22 μ lang, 21 μ breit
 Conidien im Mittel 25 μ lang, 20 μ breit
 Conidien im Mittel 27 μ lang, 24 μ breit
 Conidien im Mittel 28 μ lang, 22 μ breit

Auf *Primulaceen*

- Conidien im Mittel 19 μ lang, 16 μ breit
 Conidien im Mittel 24 μ lang, 19 μ breit

Auf *Labiaten*

- Conidien im Mittel 21 μ lang, 16 μ breit
 Conidien im Mittel 22 μ lang, 19 μ breit
 Conidien im Mittel 27 μ lang, 21 μ breit

Auf *Scrophulariaceen*Auf *Antirrhinum*

- Conidien im Mittel 25 μ lang, 21 μ breit

Auf *Linaria*

- Conidien im Mittel 24 μ lang, 18 μ breit
 Conidien im Mittel 31 μ lang, 24 μ breit

Auf *Scrophularia*

- Conidien im Mittel 21 μ lang, 16 μ breit

Auf *Verbascum*

- Conidien im Mittel 21 μ lang, 16 μ breit

Auf *Veronica*

- Conidien im Mittel 19 μ lang, 16 μ breit
 Conidien im Mittel 21 μ lang, 18 μ breit
 Conidien im Mittel 24 μ lang, 16 μ breit
 Conidien im Mittel 24 μ lang, 22 μ breit
 Conidien im Mittel 30 μ lang, 21 μ breit
 Conidien im Mittel 32 μ lang, 19 μ breit
 Conidien im Mittel 35 μ lang, 24 μ breit

Auf *Plantaginaceen*

- Conidien im Mittel 28 μ lang, 24 μ breit

Auf *Valerianaceen*

- Conidien im Mittel 25 μ lang, 19 μ breit

Auf *Dipsaceen*Auf *Dipsacus*

- Conidien im Mittel 27 μ lang, 22 μ breit

Auf *Knautia*

- Conidien im Mittel 27 μ lang, 19 μ breit

Auf *Compositen*

- Conidien im Mittel 32 μ lang, 18 μ breit
 Conidien im Mittel 35 μ lang, 24 μ breit
 Conidien im Mittel 35 μ lang, 19 μ breit

78. *P. Trifolii arvensis* Sydow.

79. *P. Trifolii minoris* Gäum.

80. *P. Trifolii hybridi* Gäum.

81. *P. Trifolii alpini* Gäum.

82. *P. Trifolii repentis* Sydow.

83. *P. pratensis* Sydow.

XXII. Formenkreis der *P. candida* Fuckel.

84. *P. candida* Fuckel.

85. *P. Oerteliana* Kühn.

XXIII. Formenkreis der *P. Lamii* A. Br.

86. *P. Calaminthae* Fuckel.

87. *P. Stachydis* Sydow.

88. *P. Lamii* A. Braun.

XXIV. Formenkreis der *P. Linariae* Fuckel.

89. *P. Antirrhini* Schröter.

90. *P. Linariae* Fuckel.

91. *P. flava* Gäum.

92. *P. sordida* Berk. et Br.

93. *P. Verbasci* Gäum.

94. *P. agrestis* Gäum.

95. *P. verna* Gäum.

96. *P. grisea* Unger.

97. *P. arvensis* Gäum.

98. *P. saxatilis* Gäum.

99. *P. silvestris* Gäum.

100. *P. aquatica* Gäum.

XXV. Formenkreis der *P. alta* Fuckel.

101. *P. alta* Fuckel.

XXVI. Formenkreis der *P. Valerianellae* Fuckel.

102. *P. Valerianellae* Fuckel.

XXVII. Formenkreis der *P. Dipsaci* (Nees, v. Es.) Tul.

103. *P. Dipsaci* (Nees, v. Es.) Tul.

104. *P. Knautiae* Fuckel.

XXVIII. Formenkreis der *P. leptosperma* De By.

105. *P. Rarii* De By.

106. *P. Tanaceti* Gäum.

107. *P. leptosperma* (De By.) Gäum.

Auf Liliaceen

XXIX. Formenkreis der *P.**Schleideni* Unger.Conidien im Mittel 51 μ lang, 29 μ breit108. *P. Schleideni* Unger.

B. Untergattung der Calothecae De By.

c. Gruppe der Verrucosae Alfred Fischer.

Auf Caryophyllaceen

XXX, Formenkreis der *P. Dianthi* De By.Conidien im Mittel 16 μ lang, 13 μ breit109. *P. Arenariae* (Berk.) Tul.Conidien im Mittel 20 μ lang, 17 μ breit110. *P. campestris* Gäum.Conidien im Mittel 24 μ lang, 19 μ breit111. *P. vexans* Gäum.Con. im Mittel 25—26 μ lang, 20 μ breit112. *P. Agrostemmatidis* Gäum.

Auf Papilionaceen

XXXI. Formenkreis der *P. Ononidis* Wilson.Conidien im Mittel 29 μ lang, 24 μ breit113. *P. Ononidis* Wilson.

Auf Borraginaceen

XXXII. Formenkreis der *P. Asperuginis* Schröter.Conidien im Mittel 27 μ lang, 22 μ breit114. *P. Asperuginis* Schröter.

d. Gruppe der Reticulatae Alfred Fischer.

Auf Caryophyllaceen

XXXIII. Formenkreis der *P. Alsinearum* Casp.

Auf Cerastium

Conidien im Mittel 19 μ lang, 16 μ breit115. *P. tomentosa* F u c k e l.Conidien im Mittel 26 μ lang, 20 μ breit116. *P. trivialis* Gäum.Conidien im Mittel 29 μ lang, 21 μ breit117. *P. conferta* (Ung.) Gäum.Conidien im Mittel 30 μ lang, 17 μ breit118. *P. septentrionalis* Gäum.Conidien im Mittel 32 μ lang, 24 μ breit119. *P. helvetica* Gäum.

Auf Scleranthus

Conidien im Mittel 19 μ lang, 15 μ breit120. *P. Scleranthi* R a b h.

Auf Stellaria

Conidien im Mittel 16 μ lang, 14 μ breit121. *P. parva* Gäum.Conidien im Mittel 27 μ lang, 22 μ breit122. *P. media* Gäum.

Auf Papilionaceen

XXXIV. Formenkreis der *P. Viciae* De By.

Auf Lathyrus

Conidien im Mittel 24 μ lang, 17 μ breit123. *P. Orobi* Gäum.Conidien im Mittel 25 μ lang, 19 μ breit124. *P. fulva* S y d o w.Conidien im Mittel 28 μ lang, 21 μ breit125. *P. Lathyri palustris* Gäum.Conidien im Mittel 35 μ lang, 19 μ breit126. *P. Senneniana* S a c c.

Auf Pisum

Conidien im Mittel 24 μ lang, 20 μ breit127. *P. Pisi* S y d o w.

Auf Vicia

Conidien im Mittel 21 μ lang, 16 μ breit128. *P. Viciae* (Berk.) Gäum.Conidien im Mittel 24 μ lang, 22 μ breit129. *P. sepium* Gäum.Conidien im Mittel 24 μ lang, 18 μ breit130. *P. Mayorii* Gäum.Conidien im Mittel 27 μ lang, 21 μ breit131. *P. Viciae sativae* Gäum.

Auf <i>Gentianaceen</i>	XXXV. Formenkreis der <i>P. Chlorae</i> De By.
Conidien im Mittel 24 μ lang, 16 μ breit	132. <i>P. Erythraeae</i> (Kühn) Gäum.
Auf <i>Borraginaceen</i>	XXXVI. Formenkreis der <i>P. Myosotidis</i> De By.
Conidien im Mittel 21 μ lang, 16 μ breit	133. <i>P. Myosotidis</i> De By.
Conidien im Mittel 30 μ lang, 22 μ breit	134. <i>P. Lithospermi</i> Gäum.
Auf <i>Rubiaceen</i>	XXXVII. Formenkreis der <i>P. calotheca</i> De By.
Auf <i>Asperula</i>	135. <i>P. calotheca</i> De By.
Conidien im Mittel 26 μ lang, 16 μ breit	
Auf <i>Galium</i>	136. <i>P. insubrica</i> Gäum.
Conidien im Mittel 22 μ lang, 14 μ breit	137. <i>P. silvatica</i> Gäum.
Conidien im Mittel 22 μ lang, 17 μ breit	138. <i>P. borealis</i> Gäum.
Conidien im Mittel 27 μ lang, 17 μ breit	139. <i>P. Galii</i> F u c k e l.
Conidien im Mittel 27 μ lang, 16 μ breit	140. <i>P. Galii veri</i> Gäum.
Conidien im Mittel 29 μ lang, 18 μ breit	141. <i>P. Aparines</i> Gäum.
Conidien im Mittel 32 μ lang, 23 μ breit	
Auf <i>Sherardia</i>	142. <i>P. Sherardiae</i> F u c k e l.
Conidien im Mittel 24 μ lang, 18 μ breit	

III. Materialien, welche für die vorliegende Arbeit benutzt wurden.

Verfasser hat während einiger Jahre selbst Peronosporeen gesammelt, besonders in dem westlichen und südwestlichen Teil der Schweiz.

Im fernern waren ihm folgende Herbarien ganz oder teilweise zugänglich:

- Herbarium J. C. Arthur, Lafayette, Ind.
- Herbarium des Botanischen Museums Dahlem bei Berlin.
- Herbarium des Botanischen Instituts in Bern.
- Herbarium Boissier im Botanischen Institut in Genf.
- Herbarium Fr. Bubák in Prag.
- Herbarium des Botanischen Museums Christiania.
- Herbarium D. Cruchet in Montagny bei Yverdon.
- Herbarium P. Cruchet in Morges.
- Herbarium Delessert im Conservatoire Botanique in Genf.
- Herbarium O. Jaap in Hamburg.
- Herbarium A. Jacewsky in Petrograd.
- Herbarium H. O. Juel in Upsala.
- Herbarium des Botanischen Museums in Kopenhagen.
- Herbarium du Muséum d'histoire naturelle de Paris.
- Herbarium G. Lagerheim in Stockholm.
- Herbarium des Botanischen Institutes der Universität Lausanne.