

Zeitschrift:	Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz = Matériaux pour la flore cryptogamique suisse = Contributi per lo studio della flora crittogama svizzera
Herausgeber:	Schweizerische Naturforschende Gesellschaft
Band:	6 (1924)
Heft:	2
Artikel:	Bryogéographie de la Suisse
Autor:	Amann, J.
Kapitel:	Bryogéographie floristique et génétique : éléments de la flore
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-821079

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 26.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

II^{ME} PARTIE

Bryogéographie floristique et génétique (Chorologie)

Eléments de la flore

a) Eléments géographiques

Notre territoire, compris entre 2 degrés de latitude sur 5 degrés de longitude, est trop peu étendu pour qu'il soit possible d'y distinguer des secteurs géographiques à flore différente. Mais, grâce aux différences considérables d'altitude et de climat qu'il présente, les flores des différentes zones et des différentes régions sont bien distinctes.

La répansion des mousses dans l'espace étant plus générale et plus uniforme que celle des phanérogames, les groupes géographiques et leurs subdivisions peuvent être réduits ici aux principaux.

Nous étudierons les mousses de la Flore suisse d'après la répartition actuelle des espèces: 1° en Europe, 2° sur la Terre (répartition mondiale).

I. Répartition européenne des mousses suisses

Nous pouvons répartir les composants de la Flore des Mousses de notre pays dans les groupes suivants:

- 1° Groupe ubiquiste européen
- 2° » central-européen
- 3° » atlantique européen et atlantique-méditerranéen
- 4° » méditerranéen proprement dit
- 5° » méridional-européen
- 6° » boréal et subarctique-alpin
- 7° » alpin proprement dit
- 8° » endémique suisse.

1° Le *groupe ubiquiste européen*, comprenant les espèces répandues dans toute l'Europe (à l'exception de l'Europe arctique), est relativement peu nombreux; ce qui correspond au fait que les mousses ont des aires de répansion en général bien délimitées.

<i>Sphagnum cymbifolium</i>	<i>Bryum pendulum</i>
— <i>papillosum</i>	— <i>turbinatum</i>
— <i>compactum</i>	— <i>argenteum</i>
— <i>squarrosum</i>	— <i>caespiticium</i>
— <i>medium</i>	— <i>alpinum</i>
— <i>cuspidatum</i>	— <i>capillare</i>
— <i>recurvum</i>	— <i>ventricosum</i>
— <i>acutifolium</i>	
— <i>fuscum</i>	<i>Mnium rostratum</i>
— <i>rubellum</i>	— <i>cuspidatum</i>
— <i>subsecundum</i>	<i>Bartramia pomiformis</i>
<i>Phascum cuspidatum</i>	<i>Philonotis fontana</i>
<i>Pleuridium alternifolium</i>	<i>Aulacomnium palustre</i>
<i>Weisia viridula</i>	<i>Pogonatum urnigerum</i>
<i>Dicranum scoparium</i>	— <i>nanum</i>
<i>Fissidens bryoides</i>	— <i>aloides</i>
— <i>taxifolius</i>	<i>Polytrichum commune</i>
— <i>adiantoides</i>	— <i>juniperinum</i>
<i>Pottia lanceolata</i>	— <i>piliferum</i>
— <i>intermedia</i>	<i>Fontinalis antipyretica</i>
— <i>truncata</i>	<i>Leucodon sciurooides</i>
— <i>minutula</i>	<i>Neckera crispa</i>
— <i>complanata</i>	— <i>Leskeia polycarpa</i>
<i>Pterygoneurum cavifolium</i>	<i>Anomodon viticulosus</i>
<i>Barbula fallax</i>	<i>Thuidium abietinum</i>
— <i>convoluta</i>	— <i>tamariscinum</i>
— <i>inguiculata</i>	<i>Isothecium myurum</i>
<i>Didymodon rubellus</i>	<i>Homalothecium sericeum</i>
<i>Tortula muralis</i>	<i>Camptothecium lutescens</i>
<i>Syntrichia ruralis</i>	<i>Brachythecium populeum</i>
<i>Tortella tortuosa</i>	— <i>velutinum</i>
<i>Ceratodon purpureus</i>	— <i>salebrosum</i>
<i>Grimmia pulvinata</i>	— <i>rivulare</i>
<i>Schistidium apocarpum</i>	— <i>rutabulum</i>
<i>Rhacomitrium canescens</i>	<i>Amblystegium serpens</i>
— <i>lanuginosum</i>	— <i>irriguum</i>
<i>Hedwigia</i>	— <i>filicinum</i>
<i>Amphidium Mousseoti</i>	<i>Hypnum chrysophyllum</i>
<i>Orthotrichum anomalum</i>	— <i>exannulatum</i>
— <i>leiocarpum</i>	— <i>fluitans</i>
— <i>pumilum</i>	— <i>molluscum</i>
— <i>affine</i>	— <i>cupressiforme</i>
<i>Encalypta vulgaris</i>	— <i>palustre</i>
— <i>ciliata</i>	— <i>giganteum</i>
— <i>rhabdocarpa</i>	— <i>cuspidatum</i>
<i>Funaria hygrometrica</i>	<i>Hylocomium Schreberi</i>
<i>Physcomitrium piriforme</i>	— <i>splendens</i>
<i>Pohlia nutans</i>	— <i>squarrosum</i>
— <i>cruda</i>	<i>Rhytidium</i>
<i>Mniobryum albicans</i>	
<i>Leptobryum</i>	

2° *Groupe central-européen.* Ce groupe, qui représente le gros de la flore de notre pays, comprend les nombreuses espèces répandues dans toute l'Europe moyenne; il embrasse l'élément silvatique de la subdivision central-européenne du territoire nordique, de DRUDE.

Ces espèces, dont beaucoup peuvent être qualifiées de *panboréales*, sont trop nombreuses pour pouvoir être énumérées ici.

3° *Groupe atlantique européen et atlantique-méditerranéen.* Espèces hygrothermiques dont le centre de dispersion se trouve sur les côtés occidentales de l'Europe; elles sont caractéristiques pour le climat océanique.

Avec BRAUN-BLANQUET (P ALLORGE, 1924, p. 1183) on peut distinguer, dans le groupe atlantique européen, des espèces:

a) *eualantiques* (Eu.), qui se rencontrent dans tout le domaine atlantique européen, ou dans un de ses secteurs, sans en dépasser les limites ou en restant très rares au delà;

b) *subatlantiques*, qui, tout en ayant leur maximum de fréquence dans le domaine atlantique, dépassent plus ou moins largement ses limites et s'avancent dans le bassin de la Méditerranée (m), ou dans l'Europe centrale, devenant de plus en plus rares à mesure qu'elles s'éloignent de leur aire principale actuelle;

c) *euryatlantique*, qui se rencontrent à la fois dans le domaine atlantique européen et dans le domaine atlantique nord-américain (*Orthotrichum rivulare* p. ex.).

<i>Sphagnum auriculatum</i>	<i>Fissidens taxifolius</i>
<i>Andreaea Huntii</i>	— <i>adiantoides</i>
— <i>molle</i>	— <i>cristatus</i>
<i>Archidium</i> (m)	<i>Pottia Heimii</i>
<i>Ephemerum sessile</i>	<i>Leptodontium flexifolium</i> (Eu)
<i>Hymenostomum squarrosum</i>	<i>Trichostomum cylindricum</i>
<i>Oreoweisia Bruntonii</i>	— <i>caespitosum</i> (m)
<i>Dicranum strictum</i>	— <i>mutable</i> (m)
— <i>viride</i>	— <i>litorale</i> (Eu)
— <i>fulvum</i>	<i>Barbula sinuosa</i> (m)
— <i>spurium</i>	— <i>Hornschuchiana</i>
— <i>Sauteri</i>	— <i>paludosa</i>
<i>Camplopus turfaceus</i>	<i>Tortula cuneifolia</i> (m)
— <i>subulatus</i>	— <i>canescens</i> (m)
— <i>atrovirens</i> (m)	<i>Syntrichia subulata</i> (m)
— <i>flexuosus</i>	— <i>papillosa</i>
— <i>fragilis</i>	— <i>laevipila</i> (m)
— <i>polytrichoides</i> (m)	— <i>ruraliformis</i>
— <i>brevipilus</i> (m)	<i>Dialytrichia</i> (m)
<i>Leucobryum albidum</i>	<i>Seligeria calcarea</i> (Eu)
<i>Fissidens incurvus</i>	— <i>acutifolia</i>
— <i>rivularis</i> (Eu)	— <i>recurvata</i>
— <i>crassipes</i>	<i>Brachydodus</i>
— <i>rufulus</i>	<i>Campylosteleum</i>
— <i>bryoides</i>	<i>Ceratodon conicus</i> (m)




Fig. 3

Répansion d'espèces de l'élément atlantique (I)

- A *Campylopus atrovirens*: **Europe:** Portugal, Espagne, Pyrénées, Bretagne, Grande-Bretagne, Irlande, Norvège (jusqu'à 65° 6), Suède, Alpes suisses et tyroliennes, Tirol et Tessin insubriens.
Suisse: Alpes, Tessin.
Afrique: Cameroun.
- C *Campylopus polytrichoides*: **Europe:** occidentale et méridionale, presqu'île ibérique, Angleterre, Irlande, Belgique, Tyrol italien, Tessin.
Suisse: région insubrienne.
Afrique: Madère, Açores, Algérie.
Amérique méridionale: Brésil.

- F *Fissidens grandifrons*: **Europe:** Espagne, Pyrénées, France occidentale et centrale, Vallée du Rhin.
Suisse: Rhin et ses affluents jusqu'au lac de Neuchâtel.

Afrique: Algérie, Abyssinie.
Amérique septentrionale.

R *Fissidens rivularis*: **Europe:** Pyrénées, Grande-Bretagne, Argonne, Suisse.
Suisse: Rheinfelden, Tessin.

P *Ptychomitrium polyphyllum*: **Europe:** Portugal, Espagne septentrionale, Baléares, Pyrénées, France occidentale, Grande-Bretagne, Irlande, Norvège (jusqu'à 62°), Suède, Allemagne, Suisse, Tyrol, Italie, Corse, Sardaigne, Sicile.
Suisse: Valais, Berne, Zurich, St-Gall (Vallées à fœhn), région insubrienne.

Grimmia decipiens
 — *Mühlenbeckii*
 — *montana*
Dryptodon patens
Rhacomitrium protensum
 — *affine*
 — *heterostichum*
Brachysteicum polypyllum
Zygodon viridissimus (m)
 — *rupestris*
 — *gracilis*
 — *Forsteri*
Ulota americana
 — *Drummondii*
Orthotrichum cupulatum
 — *diaphanum*
 — *Sturmii*
 — *stramineum*
 — *tenellum*
 — *rivulare*
 — *Shawii*
 — *Lyellii*
Schistostega
Tetraphontium Brownianum
Funaria dentata (m)
Anomobryum juliforme (m)
Epipterygium Tozeri (m)
Bryum bicolor (m)
 — *versicolor* (m)
 — *Klinggraeffii* (m)
 — *alpinum* (m)
 — *Stirtoni*
Bryum Barnesi
Mnium hornum
 — *undulatum*
Aulacomnium androgynum
Breutelia (Eu)
Philonotis rigida (m)
 — *caespitosa*
Catharinea tenella
 — *crispa*
Pogonatum nanum (m)
Diphyscium
Buxbaumia indusiata
Fontinalis squamosa
Cryphaea (m)
Neckera pumila
 — *crispa*
 — *Besseri*
Homalia trichomanoides
Pterygophyllum lucens
Pterogonium (m)
Heterocladium heteropterum
Platygryrium
Isothecium myosuroides
Homalothecium Philippeanum (m)
Camptothecium lutescens (m)
Brachythecium laetum (m)
Eurynchium speciosum
 — *Stokesii*
 — *striatum*
 — *striatulum* (m)
 — *pallidirostrum* (m)
Rhynchostegiella Teesdalei (m)




Fig. 4
Répansion d'espèces de l'élément atlantique (II)

- D *Dialytrichia Brebissoni*: Europe méridionale et centrale: Portugal, Baléares, France occidentale et méridionale, Angleterre, Irlande, Belgique, Hollande, Luxembourg, Province rhénane, Vallée du Rhin, Suisse, Tyrol, Italie, Sardaigne, Sicile, Trieste, Istrie, Macédoine.
Suisse: régions insubrienne, rhodanienne, rhénane.
Afrique: Algérie.
- Z *Zygodon gracilis*: Europe: Angleterre, Irlande, Suisse, Alpes de Bavière et du Tyrol, Algau.
Suisse: Préalpes (Rigi-Kaltbad).
- B *Breutelia arcuata*: Europe: Grande-Bretagne, Far Öer, Norvège (jusqu'à 60° 44'), Westfalie, Suisse, Pyrénées, Corse.
Suisse: lac des Quatre Cantons, lac de Thoune.

S *Sematophyllum demissum*: Europe: Grande-Bretagne, Irlande, Norvège méridionale, Lorraine, Alsace, Vosges, Tessin, Italie supérieure.

Suisse: région insubrienne.

<i>Rhynchostegiella curviseta</i> (m)	<i>Hypnum ericetorum</i>
<i>Sematophyllum demissum</i>	— <i>resupinatum</i>
<i>Thamnium alopecurum</i>	— <i>eugyrium</i>
<i>Plagiothecium undulatum</i>	— <i>Haldanianum</i> (m)
— <i>latebricola</i>	<i>Hylocomium brevirostre</i>
<i>Isopterygium elegans</i>	— <i>loreum</i>
— <i>silesiacum</i>	<i>Plagiochila spinulosa</i>
— <i>depressum</i>	<i>Calypogeia arguta</i>
<i>Hypnum polygamum</i>	<i>Lepidozia pinnata</i>
— <i>imponens</i>	<i>Scapania compacta</i>

4° Groupe méditerranéen. Les espèces ayant leur centre de dispersion européen dans la région méditerranéenne, et qui se retrouvent en Suisse, sont les xérothermiques suivantes, pour la plupart calcicoles-basiphiles ou indifférentes.

La Flore des Mousses de la Suisse ne comprend que deux espèces rentrant dans le groupe des éléments exclusifs de la région méditerranéenne: *Timmiella Barbula* et *Entosthodon Templetoni*.

<i>Acaulon piligerum</i>	<i>Syntrichia inermis</i>
<i>Phascum curvicollum</i>	<i>Grimmia crinita</i>
— <i>rectum</i>	— <i>tergestina</i>
<i>Aschisma carniolicum</i>	— <i>tergestinooides</i>
<i>Hymenostomum tortile</i>	— <i>Lisae</i>
<i>Gymnostomum calcareum</i>	<i>Orthotrichum microcarpum</i>
<i>Weisia crispata</i>	<i>Brachysteleum incurvum</i>
— <i>rutilans</i>	• <i>Entosthodon Templetoni</i>
— <i>Ganderi</i>	<i>Funaria mediterranea</i>
<i>Fissidens Arnoldii</i>	<i>Bryum torquescens</i>
— <i>cyprius</i>	— <i>gemmae</i>
<i>Trochobryum</i>	— <i>murale</i>
<i>Pottia Starkeana</i>	<i>Bartramia stricta</i>
— <i>mutica</i>	<i>Neckera turgida</i>
<i>Didymodon ligulifolius</i>	<i>Leucodon moreensis</i>
<i>Trichostomum pallidisetum</i>	<i>Antitrichia</i>
— <i>cuspidatum</i>	<i>Habrodon</i>
— <i>nilidum</i>	<i>Leptodon</i>
— <i>Ehrenbergii</i>	<i>Fabronia pusilla</i>
<i>Barbula revolvens</i>	— <i>octoblepharis</i>
<i>Hyophila riparia</i>	<i>Thuidium pulchellum</i>
<i>Pleurochaete</i>	<i>Brachythecium Rotae</i>
<i>Timmiella anomala</i>	<i>Rhynchostegiella tenella</i>
— <i>Barbula</i>	<i>Rhynchostegium rotundifolium</i>
<i>Crossidium squamiferum</i>	<i>Eurychia meridionale</i>
— <i>griseum</i>	— <i>circinatum</i>

Riella Reuteri
Targionia
Tesselina

Grimaldia fragrans
Sphaerocarpus texanus




Fig. 5

Répansion d'espèces de l'élément méditerranéen

- E *Trichostomum Ehrenbergii*: **Europe** méridionale: Portugal, Provence, Ligurie, Province de Côme, Emilie, Sicile.
Suisse: région des lacs: Léman (Lavaux), région rhénane (Rümlikon).
Afrique méditerranéenne.
Asie mineure.
- T *Timmiella anomala*:
Europe: Espagne, France méridionale, Suisse et Italie (région insubrienne).
Suisse: Tessin et Ilot insubrien de Mazembroz (Valais).
Asie: Himalaya, Punjab.
Amérique septentrionale: Californie, Floride.
- B *Braunia alopecura*:
Europe: Pyrénées, Tessin, Tirol, Italie méridionale.
Suisse: région insubrienne.
- F *Fabronia octoblepharis*:
Europe: Algarve, Alpes maritimes, Var, Calvados, Tessin, Tyrol.
Suisse: région insubrienne.
- N *Neckera turgida*:
Europe: Baléares, Provence, Alpes, Jura, Rhön, Fichtelgebirge, Thuringe, Italie, Macédoine, Céphalonie, Leucate.
Suisse: Jura vaudois et neuchâtelois, Valais (Chaîne des Aiguilles-Rouges et Chaîne helvétique).

5° Groupe méridional-européen. Espèces propres à la partie méridionale du continent européen, s'avancant, pour la plupart, jusqu'à la région boréale, mais y devenant rares et souvent stériles.

<i>Acaulon triquetrum</i>	<i>Grimmia trichophylla</i>
<i>Pleuridium nitidum</i>	— <i>leucophaea</i>
— <i>subulatum</i>	<i>Cinclidotus</i> sp.
<i>Dicranoweisia cirrata</i>	<i>Orthotrichum Sardagnanum</i>
<i>Dicranum flagellare</i>	— <i>patens</i>
<i>Fissidens pusillus</i>	<i>Braunia</i>
— <i>Mildeanus</i>	<i>Entosthodon ericetorum</i>
— <i>Bambergeri</i>	<i>Funaria microstoma</i>
<i>Pachyfissidens grandifrons</i>	<i>Physcomitrium acuminatum</i>
<i>Octodiceras</i>	<i>Mniobryum carneum</i>
<i>Eucladium verticillatum</i>	<i>Bryum atropurpureum</i>
<i>Pottia minutula</i>	— <i>arenarium</i>
<i>Pterygoneurum subsessile</i>	— <i>Mildeanum</i>
— <i>cavifolium</i>	— <i>obconicum</i>
— <i>lamellatum</i>	<i>Philonotis marchica</i>
<i>Didymodon tophaceus</i>	— <i>laxa</i>
— <i>luridus</i>	<i>Fontinalis Kindbergii</i>
— <i>cordatus</i>	— <i>arvernica</i>
<i>Trichostomum crispulum</i>	<i>Anacamptodon</i>
— <i>viridulum</i>	<i>Anomodon rostratus</i>
— <i>Bambergeri</i>	— <i>tristis</i>
<i>Barbula vinealis</i>	<i>Homalothecium sericeum</i>
— <i>gracilis</i>	<i>Cylindrothecium concinnum</i>
— <i>Hornschuchiana</i>	— <i>Schleicheri</i>
— <i>revoluta</i>	— <i>cladorrhizans</i>
<i>Aloina aloides</i>	<i>Leskea tectorum</i>
— <i>ambigua</i>	<i>Pseudoleskea Artariaei</i>
<i>Tortella inclinata</i>	<i>Thuidium punctulatum</i>
— <i>caespitosa</i>	<i>Brachythecium campestre</i>
<i>Tortula atrovirens</i>	<i>Rhynchostegium confertum</i>
<i>Syntrichia pulvinata</i>	— <i>megalopolitanum</i>
— <i>montana</i>	<i>Eurychium Schleicheri</i>
— <i>alpina</i>	— <i>Vaucheris</i>
— <i>spuria</i>	— <i>crassinervium</i>
— <i>Fiorii</i>	<i>Amblystegium varium</i>
<i>Schistidium brunnescens</i>	— <i>fluviale</i>
<i>Grimmia orbicularis</i>	<i>Drepanium lacunosum</i>

6° Groupe boréal-alpin et subarctique-alpin. Espèces communes à la chaîne des Alpes, ainsi qu'aux montagnes de l'Europe boréale: Alpes scandinaves, montagnes britanniques, et aux zones subarctique et arctique.

Les espèces désignées par (A) ont leur centre de répansion européenne dans la chaîne des Alpes; celles désignées par (a), appartiennent à l'élément arctique-alpin.




Fig. 6

Répansion d'espèces de l'élément méridional

T *Trochobryum carniolicum*: Europe: Carniole, Suisse (Stäfa au lac de Zurich).

P *Pleurochaete squarrosa*: Europe: fréquent dans l'Europe méridionale, du Portugal en Macédoine, rare et stérile dans l'Europe centrale.

Suisse: régions insubrienne, rhénane, des lacs Léman et Neuchâtel.

Afrique: Açores, Canaries, Algérie.

Asie: Caucase, Perse, Himalaya occidental, Yunnan.

Amérique septentrional: Tennessee et Texas (RR).

H *Haplohyumenium triste*: Europe: Suisse et Italie; région insubrienne.

Asie: Himalaya, Nepal, Tibet occidental, Chine occidentale.

Amérique septentrionale: Canada.

U *Thuidium pulchellum*: Europe: Région insubrienne suisse et italienne, Dalmatie.

- Andreaea petrophila*
 — *Rothii*
 — *crassinervia*
 — *nivalis* (A)
Stylostegium (A)
Blindia acuta
Anoectangium compactum
Weisia Wimmeriana (a)
Dicranoweisia crispula (a)
 — *compacta* (A)
Rhabdoweisia fugax
Aongstroemia (A)
Cynodontium schisti
 — *alpestre*
 — *gracilescens*
 — *torquescens*
 — *polycarpum*
Oncophorus virens
 — *Wahlenbergii* (a)
Diobelon
Trematodon brevicollis (A)
Dicranella Grevilleana
Dicranum fulvellum (a)
 — *Starkei* (A)
 — *falcatum* (A)
 — *Blyttii*
 — *Muehlenbeckii*
 — *brevifolium*
 — *groenlandicum*
 — *neglectum* (a)
 — *elongatum* (a)
 — *Bergeri*
 — *congestum*
 — *fuscescens*
 — *longifolium*
 — *albicans* (A)
Campylopus Schwarzii (A)
 — *Schimperi* (A)
 — *alpinus*
Dicranodontium aristatum
 — *circinatum*
Metzleria
Ditrichum glaucescens
 — *nivale*
Pottia latifolia (a)
Didymodon alpigenus (a)
 — *giganteus*
Desmatodon latifolius (a)
 — *systilius* (a)
 — *obliquus* (a)
- Lesmatodon Laureri*
Aloina brevirostris (a)
Barbula icmadophila (A)
Tortula obtusifolia (A)
Syntrichia mucronifolia (a)
Schistidium lineare
 — *alpicola* (A)
 — *gracile* (a)
Grimmia Doniana
 — *unicolor*
 — *apiculata* (A)
 — *contorta*
 — *elongata*
 — *funalis* (A)
 — *torquata* (a)
 — *caespiticia*
 — *sessilana* (A)
 — *subsulcata* (A)
 — *alpestris* (A)
 — *mollis* (a)
Dryptodon atratus
Rhacomitrium sudeticum
 — *fasciculare*
 — *affine*
 — *microcarpum*
Amphidium lapponicum
Ulota curvifolia
Orthotrichum Schubartianum
 — *perforatum*
 — *alpestre* (a)
 — *Arnelli* (a)
 — *Killiasii* (a)
Encalypta commutata
 — *ciliata*
 — *rhabdocarpa* (a)
 — *apophysata* (A)
Dissodon Froehlichianus (a)
 — *splachnoides* (a)
Tayloria splachnoides
 — *acuminata*
 — *tenuis*
Tetraplodon urceolatus (a)
 — *mnioides* (a)
Mielichhoferia nitida
 — *elongata*
Anomobryum filiforme
Plagiobryum Zierii
 — *demissum*
Pohlia acuminata
 — *commutata*

- Pohlia polymorpha*
- *elongata*
 - *longicolla*
 - *cucullata* (a)
 - *Ludwigii*
 - *sphagnicola* (a)
 - *pulchella* (a)
- Mniobryum vexans* (A)
- Bryum arcticum*
- *inflatum*
 - *Kindbergii*
 - *archangelicum*
 - *Graefianum*
 - *Kaurinianum*
 - *mamillatum*
 - *cernuum*
 - *fallax*
 - *sagittaefolium*
 - *oeneum*
 - *versisporum*
 - *acutum*
 - *claviger*
 - *Dixoni*
 - *limosum*
 - *Blindii* (A)
 - *oblongum*
 - *pycnodermum*
 - *microstegium*
 - *arctogaeum*
 - *cirratum*
 - *clathratum*
 - *Culmannii* (A)
 - *Lindbergii*
 - *arduum*
 - *pseudo-Kunzei* (A)
 - *Jackii* (A)
 - *pallescens*
 - *subrotundum*
 - *Sauteri* (A)
 - *Muehlenbeckii*
 - *elegans*
 - *obtusifolium*
 - *Duvalii*
 - *Schleicheri* (A)
- Mnium lycopodioides*
- *orthorrhynchum*
 - *hymenophylloides*
 - *subglobosum* (a)
- Cinclidium stygium* (a)
- Paludella* (a)
- Amblyodon*
- Meesea triquetra* (a)
- *trichodes* (a)
- Catoscopium* (a)
- Bartramia ithyphylla* (a)
- Plagiopus*
- Conostomum* (a)
- Philonotis seriata* (A)
- *alpicola* (a)
- Timmia bavarica*
- *austriaca* (a)
 - *norvegica* (a)
 - *comata*
- Oligotrichum*
- Polytrichum sexangulare* (a)
- *alpinum*
- Myurella julacea* (a)
- *apiculata* (a)
- Leskea catenulata*
- Pseudoleskeia patens*
- *filamentosa*
 - *radicosa*
 - *tectorum*
- Heterocladium squarrosum*
- Helodium Blandowii* (a)
- Lesquereuxia saxicola*
- *striata*
- Orthothecium intricatum*
- *chrysseum* (a)
 - *strictum* (a)
- Ptychodium* spp. (A)
- Camptothecium Geheebii* (a)
- Brachythecium turgidum* (a)
- *collinum* (a)
 - *plumosum*
 - *trachypodium*
 - *Starkii*
 - *glaciale* (a)
 - *gelidum* (a)
 - *reflexum*
 - *Thedenii*
 - *erythrorhizon*
 - *latifolium* (a)
- Eurychium diversifolium*
- *cirrosum* (a)
- Isopterygium pulchellum*
- *Muelleri*
- Plagiothecium striatum*
- Amblystegium Sprucei*
- Cratoneurum curvicaule*




Fig. 7

Répansion d'espèces de l'élément boréal (reliquats glaciaires)

- C *Timmia comata*:
- Europe:** Scandinavie, Lapponie, Suisse.
 - Suisse:** Jura vaudois.
 - Asie:** Jenissei.
- P *Paludella squarrosa*:
- Europe:** Grande-Bretagne, Scandinavie, Iles des Ours, Spitzberg, Russie septentrionale, Suisse, Italie, Chaîne des Alpes.
 - Suisse:** Jura, Plateau, Alpes.
 - Asie:** Péninsule Tschutschica, Jenissei moyen et inférieur, Ochotsk.
 - Afrique:** Cap de Bonne-Espérance.
 - Amérique septentrional:** du Groenland à l'Etat de New-York.

- H *Helodium Blandowii*: Europe: Angleterre, Scandinavie (jusqu'à 70° 30), Russie orientale, Danemark, Hollande, Allemagne septentrionale, Suisse.
 Suisse: Saas-Fee.
 Amérique septentrionale: du Groenland au Colorado.
- T *Hypnum (Scorpidium) turgescens*: Europe: Spitzberg, Iles des Ours, Laponie, Suède (fr. Oland!), Ecosse, Baden, Bavière, Suisse, Tyrol, Salzburg, Styrie, Carinthie.
 Suisse: Tourbières du Jura et du Plateau.
 Asie: Terski-Alatau, Sibérie arctique.
 Amérique arctique.
- R *Hypnum (Drepanium) recurvatum*: Europe: Norvège, Finlande, Laponie.
 Suisse: Saas-Fee.
 Asie: Jenissei.
-

<i>Cratoneurum sulcatum</i>	<i>Drepanium callichroum</i> (a)
<i>Chrysosypnum Halleri</i>	— <i>pallescens</i>
<i>Drepanocladus uncinatus</i>	<i>Calliergon Richardsoni</i> (a)
— <i>revolvens</i> (a)	— <i>sarmentosum</i> (a)
— <i>purpurascens</i>	<i>Hygrohypnum arcticum</i>
<i>Drepanium fastigiatum</i>	— <i>cochlearifolium</i>
— <i>hamulosum</i> (a)	— <i>alpinum</i>
— <i>recurvatum</i>	— <i>molle</i> (a)
— <i>Sauteri</i> (A)	— <i>dilatatum</i>
— <i>procerrimum</i> (a)	— <i>norvegicum</i>
— <i>Bambergeri</i> (a)	— <i>ochraceum</i>
— <i>Vaucheri</i> (a)	<i>Hylocomium Oakesii</i>
— <i>revolutum</i> (a)	— <i>umbratum</i>

7° *Groupe alpin*: espèces alpines proprement dites (oréophytes): (Alpes, Pyrénées, Carpathes, Caucase, etc.), et qui font défaut aux Alpes scandinaves.

<i>Andreaea angustata</i>	<i>Barbula bicolor</i>
— <i>frigida</i>	— <i>flavipes</i>
<i>Voitia nivalis</i>	<i>Schistidium atrofuscum</i>
<i>Pleuroweisia</i>	— <i>papillosum</i>
<i>Molendoa Hornschuchiana</i>	— <i>tarentasiense</i>
— <i>Sendtneriana</i>	— <i>teretinerve</i>
— <i>tenuinervis</i>	<i>Grimmia triformis</i>
<i>Oreoweisia serrulata</i>	— <i>Hollerii</i>
<i>Oreas Martiana</i>	— <i>andreaeoides</i>
<i>Dicranum pumilum</i>	— <i>Limprichtii</i>
<i>Ditrichum zonatum</i>	<i>Dryptodon anomalus</i>
<i>Didymodon ruber</i>	<i>Orthotrichum paradoxum</i>
— <i>rufus</i>	<i>Enealypta longicolla</i>
<i>Leptodontium styriacum</i>	<i>Merceya ligulata</i>

<i>Tayloria Rudolphiana</i>	<i>Bartramia subulata</i>
<i>Pohlia ambigua</i>	<i>Plagiothecium neckeroideum</i>
<i>Bryum helveticum</i>	<i>Brachythecium Payotianum</i>
— <i>subglobosum</i>	— <i>taurisorum</i>
— <i>pseudo-Kunzei</i>	<i>Drepanium contiguum</i>
— <i>Harrimani</i>	— <i>dolomiticum</i>
— <i>confertum</i>	— <i>aemulans</i>
— <i>Pfefferi</i>	

Il est probable que bon nombre des nouvelles espèces de *Bryum* des Alpes, décrites dans ces dernières années, représentent des formes endémiques alpines.

9° *Groupe endémique suisse*. L'endémisme s'observe pour des régions relativement étendues: empires floraux, provinces, îles, etc. Chez les mousses européennes, l'endémisme est un fait exceptionnel en tant qu'il se rapporte à un territoire réduit, tel que celui de notre petit pays.

Je ne puis citer, comme probablement endémique, que *Orthotrichum callistomum* v. Fischer-Ooster (zone montane des environs de Thun et de la vallée de Lauterbrunnen), connu depuis longtemps et non retrouvé ailleurs.¹

Puis *Bryum Geheebei* et *B. Gerwigii* qui, jusqu'ici, paraissent être exclusifs aux rives du Rhin et de ses affluents.²

D'autres exemples d'endémismes probables sont ceux de la région insubrienne suisse et tyrolienne: *Eucladium verbanum* et *Campylopus Mildei*.

Des espèces nouvellement décrites des Alpes suisses, et qui rentrent dans le groupe des espèces alpines, quelques-unes représentent peut-être des endémismes alpins; telles sont, par exemple:

<i>Hymenostomum Meylani</i> Amann	<i>Barbula poenina</i> Am.
<i>Dicranoweisia intermedia</i> Am.	<i>Desmatodon spelaeus</i> Am.
<i>Fissidens Sanctae Crucis</i> Meylan	— <i>Wilczekii</i> Meylan
<i>Dicranum latifolium</i> Am.	<i>Trichostomum Fleischeri</i> Bauer
<i>Ceratodon mollis</i> Am.	<i>Syntrichia gelida</i> Am.
— <i>crassinervis</i> Am.	<i>Orthotrichum juranum</i> Meylan
<i>Barbula Kneuckeri</i> Loeske et Ost.	<i>Pohlia Berninae</i> Herzog

¹ Apparenté à un type de la Chine Sud-Orientale *O. callistomoides* Broth. (N. Malta 1928).

Le *Thamnium Lemani* Schnetzler, que l'on pouvait croire endémique, a été retrouvé dans un lac du Japon. (Okamura Sh., Botan. Magazin, Tokyo 1914, p. 407, d'après Hedwigia 1921, p. 31). *Bryum Haistii* Schimp a été indiqué en Portugal (Algarve) par DIXON et NICHOLSON.

² J'ai vu, dans l'herbier du prof. R. NAVÉAU, à Anvers, un expl. étiquetté: «*Bryum Gerwigii* C. M., Giessen, Hessen-Darmstadt. Felsblöcken am unteren Felsrande der Lumda, leg. F. Hespe». Mais, à la vérification, cet expl. s'est montré appartenir au *B. argenteum* L.

<i>Bryum opsicarpum</i> Am.		<i>Bryum oxycarpum</i> Am.	
— <i>stygium</i> Am.		— <i>percomatum</i> Am.	
— <i>appendiculatum</i> Am.		— <i>pallidecuspidatum</i> Am.	
— <i>callicarpum</i> Am.		— <i>Britanniae</i> Am.	
— <i>deciduum</i> Am.		— <i>perlimbatum</i> Am.	
— <i>Colombi</i> Meylan		<i>Mnium nivale</i> Am.	
— <i>Killiasii</i> Am.		— <i>amblystegium</i> Am.	
— <i>albulanum</i> Am.		<i>Diphyscium alpinum</i> Am. (<i>pro var.</i>)	
— <i>languardicum</i> Winter et Janzen		<i>Neckera jurassica</i> Am.	
— <i>bernense</i> Hagen		<i>Pseudoleskeella ambiguia</i> Am.	
— <i>pseudo-Graefianum</i> Am.		<i>Lesquerexia glacialis</i> Am.	
— <i>Baurii</i> Am.		<i>Ptychodium trisulcatum</i> Am.	
— <i>Ruedianum</i> Am.		— <i>pallescens</i> Am.	
— <i>juranum</i> Am.		<i>Brachythecium Rübelii</i> Herzog	
— <i>microlacustre</i> Am.		<i>Eurynchium nivium</i> Am.	
— <i>microcaespiticium</i> Am.		<i>Serpoleskia ursorum</i> Am.	
— <i>valesiacum</i> Am.		<i>Drepanium orthocarpum</i> Am.	

Bon nombre de ces espèces doivent être considérées comme des oréomorphoses, néoendémismes alpins, dérivés de types plus ou moins répandus. En ce qui concerne le genre *Bryum*, dont les mutations sont fréquentes et variées, on peut considérer un certain nombre de ces nouveautés comme des espèces ou races alpines vicariantes de types boréaux-subarctiques et arctiques.

Comme le remarque HERZOG (1926, p. 223), les conditions qui rendent possible la persistance de ces mutations et leur fixation, sont particulièrement favorables dans la haute zone alpine, comme dans la région arctique et sur le littoral maritime, du fait que, grâce aux conditions climatiques, la concurrence vitale est diminuée et les surfaces de terrain libre sont plus fréquentes.

En fait d'espèces adventices, je ne puis citer qu'une hépatique, le *Lunularia cruciata* (L), espèce méditerranéenne introduite dans les serres et les jardins avec des plantes étrangères, et qui s'y maintient à l'état stérile.

Le *Hypopterygium Ballantii* C. M., croissant sur le tronc des fougères arborescentes dans les jardins botaniques de Charlottenburg et de Paris, n'a pas été constaté chez nous. Il est accompagné, à Charlottenburg, par l'*Hepaticina Ballantii* K. Müller, espèce exotique elle aussi.

Statistique

(Chiffres approximatifs)

Groupe ubiquiste européen, environ 100 esp.	11	%
central-européen	252	28
atlantique	112	12,5
méditerranéen	54	6
méridional	70	7,5
boréal-alpin	222	25
alpin	90	10

Les espèces des groupes ubiquiste et central-européen représentent ensemble le 39 % environ des mousses suisses.

Celles des groupes atlantique, méditerranéen et méridional, le 26 % environ.

Les groupes boréal-alpin et alpin, le 35 % environ.

Cette répartition peut être considérée comme caractéristique pour la Suisse.

A titre de comparaison, voici les chiffres donnés par C. Meylan pour les hépatiques suisses:

Ubiquistes	37 %
Central-européennes et européennes	6
Boréales et boréales-orientales	17
Atlantiques et boréales-atlantiques	22
Méditerranéennes	2
Méridionales	4
Boréales-alpines	6
Alpines	2

Il est intéressant de constater que la composition des Flores bryologique et hépaticologique, en Suisse, diffère notablement. L'élément ubiquiste européen est plus fortement représenté, chez les hépatiques, ainsi que l'élément atlantique. Par contre, les proportions des éléments méditerranéen, boréal-alpin et alpin sont plus fortes chez les mousses que chez les hépatiques.

La discussion de ces résultats serait intéressante au point de vue biologique; mais elle nous entraînerait trop loin. Il paraît probable *a priori* qu'il faut chercher la raison de ces différences dans la prédominance, chez les hépatiques, des espèces hygrophiles et calcifuges, et la rareté des xérophiles.

II. Répartition mondiale des mousses suisses

Nous pouvons, à cet égard, distinguer les groupes suivants:

- 1° Groupe cosmopolite mondial (ou à aire s'étendant aux deux hémisphères)
- 2° » holoarctique (eurosibérien-américain) et panboréal
- 3° » européen-nordaméricain
- 4° » eurosibérien
- 5° » européen-oriental
- 6° » européen-africain
- 7° » européen proprement dit.

1° *Groupe cosmopolite mondial*: Ce groupe comprend les espèces suivantes:

<i>Sphagnum cymbifolium</i>	<i>Sphagnum fimbriatum</i>
— <i>magellanicum</i>	<i>Phascum cuspidatum</i>
— <i>cuspidatum</i>	<i>Hymenostomum tortile</i>
— <i>recurvum</i>	<i>Gymnostomum rupestre</i>

<i>Gymnostomum calcareum</i>	<i>Bryum caespiticium</i>
<i>Anoectangium compactum</i>	— <i>argenteum</i> *
<i>Weisia viridula</i>	— <i>bicolor</i>
<i>Dicranoweisia crispula</i>	— <i>alpinum</i>
<i>Eucladium verticillatum</i>	— <i>torquescens</i>
<i>Dicranella Schreberi</i>	— <i>capillare</i>
<i>Dicranum scoparium</i>	<i>Mnium undulatum</i>
<i>Fissidens bryoides</i>	— <i>rostratum</i>
— <i>incurvus</i>	<i>Paludella</i>
— <i>adiantoides</i>	<i>Bartramia Halleriana</i>
<i>Ceratodon purpureus</i> *	<i>Pogonatum urnigerum</i>
<i>Distichium capillaceum</i> *	<i>Aulacomnium palustre</i> *
<i>Didymodon tophaceus</i>	<i>Polytrichum alpinum</i> *
<i>Trichostomum mutabile</i>	— <i>gracile</i> *
<i>Tortella caespitosa</i>	— <i>piliferum</i> *
<i>Tortula atrovirens</i>	— <i>juniperinum</i>
— <i>muralis</i>	— <i>strictum</i> *
<i>Syntrichia papillosa</i>	— <i>commune</i>
— <i>montana</i>	<i>Leptodon</i>
— <i>ruralis</i>	<i>Neckera pennata</i>
<i>Schistidium apocarpum</i>	— <i>crispa</i>
<i>Grimmia leucophaea</i>	<i>Antitrichia curtipendula</i>
— <i>pulvinata</i>	<i>Brachythecium campestre</i>
— <i>trichophylla</i>	— <i>rutabulum</i>
— <i>funalis</i>	— <i>plumosum</i>
— <i>Doniana</i> *	— <i>populeum</i>
<i>Rhacomitrium protensum</i>	— <i>salebrosum</i>
— <i>heterostichum</i>	— <i>rivulare</i> *
— <i>lanuginosum</i>	<i>Eurynchium praelongum</i>
<i>Hedwigia</i>	<i>Plagiothecium denticulatum</i>
<i>Ulota crispa</i>	<i>Isopterygium pulchellum</i>
<i>Encalypta vulgaris</i>	— <i>Muellerianum</i>
— <i>ciliata</i>	<i>Amblystegium serpens</i>
<i>Physcomitrium piriforme</i>	— <i>riparium</i> *
<i>Funaria hygrometrica</i>	<i>Hygroamblystegium filicinum</i> *
<i>Leptobryum</i> *	<i>Chrysophyllum polygamum</i>
<i>Pohlia elongata</i>	<i>Drepanocladus revolvens</i>
— <i>cruda</i> *	— <i>uncinatus</i> *
— <i>nutans</i> *	— <i>fluitans</i>
<i>Mniobryum albicans</i> *	<i>Drepanium cupressiforme</i> *
<i>Bryum bimum</i>	<i>Calliergon sarmentosum</i> *
— <i>intermedium</i>	<i>Acrocladium cuspidatum</i> *
— <i>Schleicheri</i> *	<i>Hylocomium Schreberi</i> *

(Les espèces * ont été observées dans la zone antarctique (CARDOT J. Rev. bryol. 1911, p. 124, Mousses de l'expédition Charcot).

Le 2^{me} groupe embrasse les espèces pouvant être désignées comme holoarctiques ou panboréales, c.-à-d., dont l'aire de dispersion se trouve dans les contrées septentrionales et moyennes de l'hémis-

phère nord: Eurosibérie, et Amérique septentrionale. Elles sont trop nombreuses (265 env.) pour pouvoir être énumérées ici. Je me contenterai d'indiquer comme exemples:

<i>Sphagnum fimbriatum</i>	<i>Isothecium myurum</i>
— <i>imbricatum</i>	<i>Lesquereuxia</i>
— <i>Aongstroemii</i>	<i>Scleropodium purum</i>
— <i>plumulosum</i>	<i>Cirriphyllum</i> spp.
<i>Oncophorus</i>	<i>Isopterygium pulchellum</i>
<i>Dicranum fulvellum</i>	— <i>elegans</i>
— <i>elongatum</i>	— <i>silesiacum</i>
— <i>neglectum</i>	<i>Plagiothecium latebricola</i>
<i>Distichium inclinatum</i>	— <i>piliferum</i>
<i>Pottia latifolia</i>	— <i>silvaticum</i>
<i>Desmatodon latifolius</i>	— <i>denticulatum</i>
— <i>systylus</i>	— <i>Roeseanum</i>
— <i>suberectus</i>	<i>Amblystegiella</i> spp.
<i>Aloina brevirostris</i>	<i>Amblystegium</i> sp.
<i>Syntrichia mucronifolia</i>	<i>Leptodyction</i> sp.
<i>Grimmia anodon</i>	<i>Chrysosypnum Halleri</i>
<i>Ulota</i> spp.	— <i>elodes</i>
<i>Orthotrichum obtusifolium</i>	<i>Drepanocladus</i> sp.
<i>Catharinea undulata</i>	<i>Cratoneurum</i> sp.
<i>Pogonatum aloides</i>	<i>Drepanium arcuatum</i>
<i>Diphyscium</i>	— <i>pratense</i>
<i>Buxbaumia aphylla</i>	— <i>pallescens</i>
<i>Neckera pumila</i>	— <i>reptile</i>
— <i>complanata</i>	<i>Ctenidium molluscum</i>
<i>Leskeella</i> sp.	<i>Homomallium</i>
<i>Pseudoleskeella tectorum</i>	<i>Hygrohypnum</i> sp.
<i>Thuidium abietinum</i>	<i>Hylocomium loreum</i>
<i>Platygyrium</i>	— <i>calvescens</i>
<i>Pterygynandrum</i>	— <i>umbratum</i>
<i>Orthothecium rufescens</i>	<i>Rhytidium</i> etc.
— <i>intricatum</i>	

Il en est de même des espèces du 3^{me} groupe, dont l'aire de dispersion est européenne et nord-américaine, mais qui, jusqu'ici, paraissent faire défaut à l'Asie septentrionale.

Parmi ces espèces, un nombre restreint, que l'on pourrait appeler orientales-pacifiques, telles p. ex. que: *Tortella caespitosa*, *Hypothelia riparia*, *Brachysteleum pusillum*, *Neckera turgida*, *Anomodon tristis*, *A. rostratus*, présentent, dans leur aire géographique, une disjonction caractéristique et remarquable: Nord-Amérique (Etats pacifiques)-Japon-territoire méditerranéen, qui peut être mise en relation avec la théorie de WEGENER de la formation des continents actuels par disjonction à l'époque tertiaire: ce sont des reliques arcto-tertiaires.

Dans le 4^{me} groupe eurosibérien (eurasien-silvestre) se trouvent les espèces répandues en Europe et en Asie septentrionale, telles que:

<i>Phascum piliferum</i>	<i>Anomodon longifolius</i>
<i>Cynodontium torquescens</i>	<i>Thuidium delicatulum</i>
<i>Dicranum undulatum</i>	— <i>recognitum</i>
— <i>majus</i>	<i>Pseudoleskeella catenulata</i>
— <i>congestum</i>	<i>Lesquerellia saxicola</i>
— <i>flagellare</i>	<i>Brachythecium velutinum</i>
— <i>montanum</i>	— <i>Mildeanum</i>
— <i>longifolium</i>	— <i>curtum</i>
<i>Pottia lanceolata</i>	<i>Rhynchostegium megapolitanum</i>
<i>Didymodon alpinus</i>	— <i>rotundifolium</i>
<i>Trichostomum crispulum</i>	<i>Eurynchium velutinoides</i>
<i>Physcomitrium crispulum</i>	<i>Plagiothecium silesiacum</i>
<i>Bryum Funckii</i>	<i>Chrysophyllum elodes</i>
<i>Rhodobryum</i>	<i>Drepanocladus uncinatus</i>
<i>Mnium punctatum</i>	— <i>purpurascens</i>
— <i>affine</i>	<i>Ptilium</i>
<i>Tetraphis</i>	<i>Drepanium recurvatum</i>
<i>Timmia comata</i>	<i>Hylocomium proliferum</i>
<i>Pogonatum nanum</i>	— <i>triquetrum</i>
— <i>aloides</i>	— <i>squarrosum</i>
<i>Polytrichum formosum</i>	— <i>Schreberi</i>
<i>Homalia</i>	

Le 5^{me} groupe européen-oriental (pontique et sarmatique) comprend les espèces dont l'aire de dispersion se trouve en Europe et dans les parties adjacentes de l'Asie occidentale et centrale: Caucase, Asie mineure, Turkestan, et *pro parte* jusque dans l'Himalaya et le Tibet:

<i>Molendoa Sendtneriana</i>	<i>Epipterygium Tozeri</i>
<i>Pleuroweisia</i>	<i>Mielichhoferia nitida</i>
<i>Weisia Wimmeriana</i>	— <i>elongata</i>
<i>Dicranum spurium</i>	<i>Mnium lycopodioides</i>
<i>Campylopus turfaceus</i>	<i>Bartramia subulata</i>
— <i>fragilis</i>	<i>Neckera Besseri</i>
<i>Fissidens grandifrons</i>	<i>Cylindrothecium Schleicheri</i>
<i>Trichostomum Ehrenbergii</i>	<i>Eurynchium crassinervium</i>
<i>Timmiella Barbula</i>	— <i>Vaucheris</i>
<i>Barbula gigantea</i>	— <i>relutinoides</i>
— <i>revoluta</i>	— <i>striatum</i>
<i>Crossidium griseum</i>	<i>Ctenidium procerrimum</i>
<i>Grimmia tergestina</i>	<i>Drepanium revolutum</i>
— <i>orbicularis</i>	

Le 6^{me} groupe est formé par les espèces répandues en Europe et dans l'Afrique méditerranéenne, les îles du Cap-vert, Madère, Canaries, Açores, etc.

<i>Ephemerella</i>	<i>Philonotis rigida</i>
<i>Astomum crispum</i>	<i>Fontinalis squamosa</i>
<i>Pleuridium nitidum</i>	<i>Cryphaea</i>
<i>Weisia rutilans</i>	<i>Neckera turgida</i>
<i>Gyroweisia tenuis</i>	— <i>pumila</i>
<i>Campylopus atrovirens</i>	<i>Lesquereuxia striata</i>
— <i>polytrichoides</i>	<i>Isothecium myurum</i>
— <i>brevipilus</i>	<i>Homalothecium Philippeanum</i>
<i>Fissidens crassipes</i>	<i>Eurynchium speciosum</i>
<i>Leptodontium flexifolium</i>	— <i>striatum</i>
<i>Trichostomum triumphans</i>	— <i>meridionale</i>
<i>Barbula Hornschuchiana</i>	<i>Rhynchostegiella tenella</i>
<i>Grimmia decipiens</i>	— <i>curviseta</i>
<i>Brachysteleum polyphyllum</i>	— <i>pallidirostris</i>
<i>Anomobryum juliforme</i>	<i>Rhynchostegium confertum</i>
<i>Bryum murale</i>	— <i>murale</i>
— <i>gemmae</i>	— <i>neckeroides</i>

Le 7^{me} groupe, enfin, européen proprement dit, comprend les espèces dont l'aire de dispersion paraît ne pas dépasser les limites de l'Europe. Au nombre d'environ 240, ces espèces ne peuvent être énumérées ici.

Statistique

(Chiffres approximatifs)

Groupe 1.	Cosmopolite mondial	environ	84	10 %
2.	Holoarctique	»	269	30
3.	Européen-nordaméricain	»	203	23
4.	Eurosibérien	»	23	3
5.	Européen oriental	»	25	3
6.	Européen-africain	»	34	4
7.	Européen	»	236	27

Espèces manquant à la flore suisse

Les principales espèces européennes qui manquent jusqu'ici à la Flore suisse, peuvent être classées comme suit:

(Celles dont la présence ne paraît pas improbable sont désignées par *. Là encore l'étude plus complète de notre flore nous réserve sans doute des surprises pour l'avenir.)

1° Espèces méridionales-méditerranéennes:

<i>Astomum Levieri</i>	<i>Fissidens serrulatus</i>
<i>Acaulon pellucidum</i>	— <i>tamarindifolius</i>
<i>Gyroweisia reflexa</i>	<i>Leptobarbula</i>
<i>Ceratodon chloropus</i>	<i>Trichostomum flavovirens</i>
— <i>corsicus</i>	<i>Barbula Vahliana</i>

<i>Tortula marginata*</i>	<i>Homalia lusitanica</i>
<i>Crossidium chloronotos</i>	<i>Antitrichia californica*</i>
<i>Syntrichia Muellieri</i>	<i>Homalothecium aureum</i>
<i>Orthotrichum acuminatum*</i>	<i>Eurynchium circinatum*</i>
<i>Entosthodon curvisetus</i>	<i>Scleropodium illecebrum*</i>
— <i>pallescens</i>	— <i>caespitosum</i>
<i>Anacolia</i>	<i>Thuidium minutulum*</i>
<i>Bartramia stricta</i>	

2° Espèces atlantiques et pyrénéennes:

<i>Astomum Mittenii</i>	<i>Disclerium</i>
<i>Systemium multicapsulare</i>	<i>Dryptodon ellipticus</i>
<i>Hymenostomum rostellatum</i>	<i>Ulota calvescens</i>
— <i>crispatum</i>	<i>Catharinea crispa</i>
<i>Dicranum scottianum</i>	<i>Orthodontium</i>
<i>Fissidens polypillus</i>	<i>Bartramidula</i>
<i>Campylostelum strictum</i>	<i>Hookeria</i>
<i>Schistidium pruinatum</i>	<i>Daltonia</i>
<i>Orthotrichum pulchellum</i>	<i>Claopodium lusitanicum</i>
— <i>Sprucei</i>	<i>Myurum</i>
— <i>Winteri</i>	<i>Hyocomium*</i>
<i>Ptychomitrium nigricans</i>	<i>Sphagnum Gravetii*</i>
<i>Hedwigidium</i>	— <i>Pylaisei</i> , etc.

3° Espèces maritimes:

<i>Schistidium maritimum</i>	<i>Glyphomitrium</i>
<i>Ulota maritima</i>	<i>Bryum</i> spp.

4° Espèces du système cambrien et espèces atlantiques du horst hercynien-rhénan:

<i>Bruchia vogesiaca</i>	<i>Hygrohypnum eugyrium*</i>
<i>Rhabdoweisia crenulata</i>	— <i>Mackayi*</i>
<i>Oedipodium</i>	— <i>micans*</i>

5° Espèces américaines sporadiques en Europe:

<i>Bryoxiphium</i>	<i>Mnium Drummondii</i>
<i>Timmiella flexipes</i>	<i>Clasmatodon parvulus</i>
<i>Orthotrichum pulchellum</i>	<i>Trematodon longicollis</i>

6° Espèces de l'Europe centrale:

<i>Bruchia trobasiana*</i>	<i>Meesea Albertini</i>
<i>Cynodontium laxirete</i>	<i>Timmia megapolitana</i>
<i>Zygodon conoidens</i>	<i>Brotherella Lorentziana*</i>
<i>Orthotrichum gymnostomum*</i>	

7° Espèces boréales et arctiques:

<i>Andreaea</i> sp.	<i>Dicranum hyperboreum</i>
<i>Cynodontium suecicum</i>	— <i>elatum</i>
<i>Oncophorus riparius</i>	— <i>fragilifolium</i>

<i>Orthotrichum Blyttii</i>	<i>Mnium ciliare</i>
— <i>laevigatum</i>	<i>Aulacomnium turgidum*</i>
— <i>microblephare</i>	<i>Polygonatum capillare</i>
— <i>Sommerfeltii</i>	<i>Psilotum</i>
<i>Encalypta brevicolla</i>	<i>Dichelyma</i>
— <i>procera</i>	<i>Thedelia</i>
<i>Pohlia erecta</i>	<i>Myrinia*</i>
— <i>crassidens</i>	<i>Thuidium pallens</i>
— <i>Schimperi</i>	<i>Plagiothecium turfaceum</i>
<i>Bryum</i> spp.	<i>Hypnum badium</i> , etc.

ainsi que les Sphaignes suivants appartenant à l'élément boréal et central-européen:

<i>S. imbricatum</i>	<i>S. propinquum</i>
— <i>affine</i>	— <i>obtusum</i>
— <i>Aongstroemii</i>	— <i>molle*</i>
— <i>Wulfianum</i>	— <i>rufescens</i>
— <i>Lindbergii*</i>	— <i>turgidulum</i>
— <i>Torreyanum*</i>	— <i>crassicladum</i>
— <i>fallax</i>	
-- <i>Jensenii</i>	

b) Eléments génétiques

Nous avons maintenant à étudier la Flore des Mousses suisse au point de vue génétique et historique; c'est-à-dire en cherchant à déterminer l'origine des éléments divers dont elle est composée, leurs voies d'immigration, leur histoire dans les temps géologiques, pré-historiques et historiques: l'histoire de la flore se confondant naturellement avec l'histoire géologique et climatologique.

Les données sur lesquelles doit s'appuyer cette étude, sont de trois ordres: 1° documents paléontologiques relatifs aux flores des âges géologiques antérieurs; 2° documents historiques; 3° données tirées par induction, ou déduction, de la répartition actuelle des genres et des espèces.

Pour être complète, cette étude devrait comprendre aussi la phlogénèse des espèces, c.-à-d. l'histoire de leur évolution dans le temps, à partir des types ancestraux.

Il suffit de dresser ce programme pour se rendre compte que, dans l'état actuel de nos connaissances, l'étude projetée ne peut être que rudimentaire: ses résultats seront imparfaits et, pour la plupart, incertains.