

<b>Zeitschrift:</b>	Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz = Matériaux pour la flore cryptogamique suisse = Contributi per lo studio della flora crittogama svizzera
<b>Herausgeber:</b>	Schweizerische Naturforschende Gesellschaft
<b>Band:</b>	7 (1933)
<b>Heft:</b>	2
<b>Artikel:</b>	Flores des mousses de la Suisse : Vol. III : revision et additions
<b>Autor:</b>	Amann, Jules
<b>Kapitel:</b>	Ordre : Andreaeaceae
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-821066">https://doi.org/10.5169/seals-821066</a>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 22.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Ordre ANDREAEACEAE

Genre: **Andreaea** Ehrh.

On peut distinguer, parmi les Eu-Andreaea de notre flore, trois types spécifiques principaux: *A. petrophila*, *A. Rothii* et *A. crassinervia*. Les *A. alpestris* et *A. sparsifolia* peuvent être considérés comme types accessoires du *A. petrophila*; *A. frigida* comme type accessoire de *A. Rothii*; *A. Huntii* comme type accessoire de *A. crassinervia*.

**A. petrophila** Ehrh. var. *pygmaea* Bryol. eur. Très petite forme à feuilles brièvement acuminées.

Uri: Guferen im Maderanertal, 1400 m. (AMANN) (B. H. 16).

**A. sparsifolia** Zett. — Les exemplaires suisses indiqués sous ce nom, diffèrent des exemplaires scandinaves et doivent être regardés comme des formes grêles, appauvries de *A. petrophila*.

Selon LOESKE (1913 p. 66), *A. sparsifolia* n'est qu'une cryptomorphose (Höhlenform) de *A. petrophila*.

**A. crassinervia** Bruch.

Uri: St. Gotthard (GISLER). Graubünden: San Bernardino, 2000 m. (HOLLER et PFEFFER).

**A. Huntii** Limpr. — (Fl. M. S. II, p. 19 et 370).

Bern: Schwarzsee bei Grindelwald, 2520 m. (CULMANN).

**A. Rothii** Web. et Mohr.

Valais: Alpe de Fully, 2030 m. (GAMS). Graubünden: Morteratschgletscher (FILLON); Muottas Muragl (DEGEN). Ces exemplaires des Grisons appartiennent probablement à *A. frigida*.

*A. Rothii* doit être ajouté aux espèces euryatlantiques mentionnées dans ma «Bryogéographie» p. 302.

**A. frigida** Hüben. — Elément oréo-subatlantique (et non pas arctique-alpin).

Valais: Orny, 2800 m.; Les Grands, vallée du Trient, 2200 m. (var. *sudetica* Limpr.) (B. H. 22) (M. eur. exs. n° 2002); Gd. St-Bernard, 2500 m. (B. H. 18); Furka-Galenstock, 2500—2800 m. (B. H. 10) (AMANN). Bern: Grindelwald, vers le Wetterhorn, 2350—2400 m. (CULMANN). Uri: Ob dem Sellasee am St. Gotthard; Lucendrotal und -See (GISLER).

*A. frigida*, fréquent et abondant dans tout le massif des Aiguilles Rouges, paraît devenir plus rare à mesure que l'on s'éloigne à l'Est de ce centre de dispersion.

**A. nivalis** Hook. — Certains exemplaires des Alpes se rapprochent fort de la var. *fuscescens* Hook, caractérisée par sa teinte brunâtre et les feuilles fortement circinées (exemplaires B. H. 30 du Simplon et B. H. 33 du Beloiseau).