**Zeitschrift:** Cryptogamica Helvetica

Herausgeber: Schweizerische Vereinigung für Bryologie und Lichenologie Bryolich

**Band:** 20 (2005)

**Artikel:** Les Oïdiums de Suisse (Erysiphacées)

Autor: Bolay, Adrien

**Kapitel:** La systématique des Erysiphacées **DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-821127

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

### 3. La systématique des Erysiphacées

### 3.1 Classification générique et supragénérique

D'après Braun (1995), l'ordre des Erysiphales ne comprend que la famille des Erysiphaceae. Pour la Suisse, Jaczewski (1896) réunit dans cette famille les 6 genres suivants: Erysiphe, Microsphaera, Phyllactinia, Podosphaera, Sphaerotheca et Uncinula. Mayor (1909) y ajoute le genre Oidium. Puis, avec Blumer (1933) et Mayor (1958), leur nombre passe à 8, par l'addition du genre Leveillula. Enfin Braun (1995) constate la présence en Suisse des 11 genres suivants: Arthrocladiella, Blumeria, Erysiphe, Leveillula, Microsphaera, Oidium, Phyllactinia, Podosphaera, Sawadaea, Sphaerotheca et Uncinula. En fait, l'augmentation de 3 genres est due à la séparation des genres Blumeria d'Erysiphe, d'Arthrocladiella de Microsphaera et de Sawadaea d'Uncinula.

Jusqu'en 1999, la systématique des Erysiphacées était uniquement basée sur des critères morphologiques observables au microscope optique (Blumer, 1933, 1967; Braun, 1995). Elle tenait compte, chez le téléomorphe, du nombre des asques dans le cleistothèce, de la forme des fulcres et, chez l'anamorphe, du type de conidiophore et de la présence de corpuscules de fibrosine dans les conidies (tab. 3).

A la fin du XX<sup>e</sup> siècle, les nouvelles techniques d'investigation offertes par le microscope à balayage (Scanning Electron Microscopy, SEM) et par les analyses génétiques (séquençage des acides nucléiques) ont fait de très grands progrès. Les travaux anglais de Cook et al. (1997) et de Inman et al. (2000) au microscope à balayage et les analyses génétiques de Saenz & Taylor (1999) ainsi que celles de l'école japonaise de Takamatsu

et al. (1998, 1999), Mori et al. (2000) ont démontré que la forme des fulcres ornant les cleistothèces n'est pas un caractère phylogénétique fiable chez les Erysiphacées. Ces découvertes ont amenés Braun & Takamatsu (2000) à incorporer au genre *Erysiphe* les espèces des genres *Microsphaera* et *Uncinula* et de rattacher au genre *Podosphaera* les espèces du genre *Sphaerotheca*. En outre, le genre *Erysiphe*, très hétérogène, est révisé par Braun (1999) et par Braun & Takamatsu (2000) qui le séparent en 3 nouveaux genres (fig. 4, tab. 4 & 5).

#### Erysiphe DC. emend. U.Braun et S.Takam.

Anamorphe: Oidium subgen. Pseudoidium Jacz.

Conidies isolées; appressoria lobés. Il comprend les espèces d'*Erysiphe* dont l'anamorphe est de type Pseudoidium, ainsi que les anciens genres *Microsphaera* et *Uncinula*.

Téléomorphe : cleistothèce subglobuleux ± dépressé; fulcres simples, irréguliers, se terminant en divisions dichotomiques ou en crosses; plusieurs asques à (2-) 3-8 ascospores.

#### Neoerysiphe U.Braun

Anamorphe: Oidium subgen. Striatoidium R.T.A.Cook, A.J.Inman & C.Billings

Conidies en chaîne, paroi externe striée, non réticulée; appressoria lobés.

15

Téléomorphe : semblable à *Erysiphe*; fulcres simples; asques à 2-8 ascospores, ne se formant qu'après l'hivernage.

Tableau 3 - Critères d'identification des genres d'Erysiphacées de Suisse jusqu'en 1999, avant les travaux utilisant le séquençage d'ADN. F : corpuscules de fibrosine dans les conidies [tiré de Bolay (2003)].

	Fulcres	Nombre d'asques	Types de conidiophores	
Sphaerotheca	simples	un	Euoidium, F	
Podosphaera	à divisions dichotomiques	un	Euoidium, F	
Erysiphe	simples	plusieurs	Euoidium et Pseudoidium	
Microsphaera	à divisions dichotomiques	plusieurs	Pseudoidium	
Uncinula	à terminaisons en crosses	plusieurs	Pseudoidium	
Arthrocladiella	à divisions dichotomiques	plusieurs	Euoidium	
Sawadaea	à terminaisons en crosses	plusieurs	Euoidium, F + microconidies	
Blumeria	simples formant une sorte de stroma	plusieurs	Euoidium, bulbeux à la base	
Leveillula	simples	plusieurs	Oidiopsis	
Phyllactinia	en alênes, bulbeux à la base	plusieurs	Ovulariopsis	

#### Golovinomyces (U.Braun) V. P.Gelyuta

Anamorphe : Oidium subgen. Reticuloidium R.T.A.Cook, A.J.Inman & C.Billings

Conidies en chaîne; paroi externe réticulée; appressoria mamelonnés.

Téléomorphe : semblable à *Erysiphe*; asques à 2 ascospores, arrivant à maturité durant la même saison.

Quant à l'anamorphe du genre *Oidium*, lui aussi très hétérogène, il est séparé par Cook et al. (1997) en 8 sousgenres (fig. 4, 5), soit :

## **Oidium** subgen. **Fibroidium** R.T.A.Cook, A.J.Inman & C.Billings

Conidies en chaîne contenant des corpuscules de fibrosine; appressoria indistincts ou mamelonnés.

Téléomorphe : *Podosphaera* Kunze emend. U.Braun & S.Takam.

### **Oidium** subgen. **Graciloidium** R.T.A.Cook, A.J.Inman & C.Billings

Conidiophores ± arqués; conidies en chaîne, à paroi externe lisse (SEM); appressoria mamelonnés.

Téléomorphe: Arthrocladiella Vassilkov

## **Oidium** subgen. **Octagoidium** R.T.A.Cook, A.J.Inman & C.Billings

Conidies en chaîne, ± octogonales; présence de microconidies et de corpuscules de fibrosine; appressoria variables, mamelonnés ou lobés.

Téléomorphe: Sawadaea Miyabe

# **Oidium** subgen. **Oidium** (Link) R.T.A.Cook, A.J.Inman & C.Billings

Conidiophores bulbeux à leur base; conidies en chaîne; appressoria indistincts.

Téléomorphe : Blumeria Golovin ex Speer

### Oidium subgen. Pseudoidium Jacz.

Conidie isolée; appressoria lobés

Téléomorphe: Erysiphe DC. emend. U.Braun & S.Takam.

## **Oidium** subgen. **Reticuloidium** R.T.A.Cook, A.J.Inman & C.Billings

Conidies en chaîne; paroi externe réticulée (SEM); appressoria mamelonnés

Téléomorphe: Golovinomyces (U.Braun) V.P.Gelyuta.

## **Oidium** subgen. **Setoidium** R.T.A.Cook, A.J.Inman & C.Billings

Conidies en chaîne avec corpuscules de fibrosine; mycélium aérien (poils); appressoria mamelonnés.

Téléomorphe: Cystotheca Berk. & M.A.Curtis

## **Oidium** subgen. **Striatoidium** R.T.A.Cook, A.J.Inman & C.Billings

Conidies en chaîne, paroi externe striée (SEM): appressoria lobés.

Téléomorphe: Neoerysiphe U.Braun

Tenant compte des importantes modifications intervenues durant ces dernières années dans la sytématique des Erysiphacées, Braun et al. (2002) proposent une nouvelle classification de ce groupe de champignons. La famille des *Erysiphaceae* Tul. & C.Tul. est divisée en 5 tribus :

### **Tribu Erysipheae**

**Genres** *Brasiliomyces* Viégas, *Erysiphe* DC. emend. U.Braun et S.Takam. et *Typhulochaeta* Ito & Hara.

# **Tribu Golovinomyceteae** (U.Braun) U.Braun & S.Takam. (2000)

Subtribu Golovinomycetinae (U.Braun) U.Braun & S.Takam. (2000)

Genre Golovinomyces (U.Braun) V.P.Gelyuta

**Subtribu** Neoerysiphinae (U.Braun) U.Braun & S.Takam. (2000)

Genre Neoerysiphe U.Braun

**Subtribu** Arthrocladiellinae (R.T.A.Cook et al.) U.Braun & S.Takam. (2000)

Genre Arthrocladiella Vassilkov

#### Tribu Cystotheceae (Katum.) U.Braun (1987)

Subtribu Cystothecinae

**Genres** *Cystotheca* Berk. & M.A. Curtis et *Podosphaera* Kunze emend. U.Braun & S.Takam. (2000).

**Subtribu** Sawadaeinae (U.Braun) U.Braun & S.Takam. (2000)

Genre Sawadaea Miyabe

### **Tribu Phyllactinieae** (Palla) R.T.A.Cook et al., in Braun (1999)

**Genres** Leveillula Arnaud, Phyllactinia Lév. et Pleochaeta Sacc. & Speg.

### **Tribu Blumerieae** R.T.A.Cook et al. (1997) **Genre** *Blumeria* Golovin ex Speer

Aux 13 genres retenus par Braun et al. (2002), il convient d'ajouter encore le genre *Oidium* Link. En effet, les Erysiphacées dont on ne connaît que l'anamorphe sont regroupées dans le genre *Oidium* lorsque leurs conidiophores sont de type Euoidium ou Pseudoidium. Celles dont les conidiophores sont de type Oidiopsis sont considérées comme faisant partie du genre *Leveillula* alors que celles qui ont un conidiophore de type Ovulariopsis sont placées dans le genre *Phyllactinia*.

Les progrès récents réalisés en systématique permettent maintenant d'identifier le téléomorphe d'une Erysiphacée sur les seuls caractères morphologiques de son anamorphe. Dans ces conditions, on peut valablement se demander s'il est encore nécessaire de maintenir le genre *Oidium*. Prenons le cas de l'oïdium du charme, *Oidium carpini* Foitzik, espèce identifiée en Suisse depuis 1975 et qui est actuellement très répandue sur le charme (*Carpinus betulus*). Ses conidiophores, de type Pseudoidium et ses appressoria lobés indiquent

clairement que son téléomorphe appartient au genre Erysiphe DC. emend. U.Braun & S.Takam. On ne peut toutefois pas transférer Oidium carpini dans un taxon. qui pourrait être Erysiphe carpini, tant qu'on n'aura pas apporté la preuve que l'oïdium du charme est bien une espèce nouvelle, distincte de celles déjà décrites sur des Bétulacées, telles Erysiphe carpinicola (Hara) U.Braun & S.Takam. au Japon, E. ellisii (U.Braun) U.Braun & S.Takam. aux USA et E. wuyiensis (Z.X.Chen & R.X.Gao) U.Braun & S.Takam. en Chine. Cette preuve ne pourra être apportée que par l'apparition spontanée du téléomorphe en Europe ou, plus vraisemblablement, par les résultats d'analyses génétiques. Par conséquent, le genre Oidium doit encore être maintenu, ce qui fait que les Erysiphacées de Suisse se répartissent dans les 10 genres suivants dont les caractères morphologiques sont schématisés dans le tableau 5 : Arthrocladiella Vassilkov, Blumeria Golovin ex Speer, Erysiphe DC. emend. U.Braun & S.Takam., Golovinomyces (U.Braun) V.P.Gelyuta, Leveillula Arnaud, Neoerysiphe U.Braun, Oidium Link, Phyllactinia Lév., Podosphaera Kunze emend. U.Braun & S.Takam. et Sawadaea Miyabe.

Vol. 20, 2005

Tableau 4 - Modification du concept générique chez les Erysiphacées à la suite des travaux utilisant le séquençage d'ADN. Cl : cleistothèces à un ou plusieurs asques; F : forme des fulcres; Co : type de condidiophore; A : type d'appressorium [tiré de Bolay (2003)].

GENRES1999	Cl	F	Со	A	GENRES 2000
MICROSPHAERA		ET SE		25	
UNCINUL A				5/2	ERYSIPHE
ERYSIPHE		ASS		3/2	
ERYSIPHE				202	NEOERYSIPHE
ERYSIPHE		A S A		<u> </u>	GOLOVINOMYCES
PODOSPHAERA		577		4	PODOSPHAERA
SPHAEROTHECA		A SA		4	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tableau 5 - Récapitulation des caractères morphologiques permettant de caractériser les genres actuels d'Erysiphacées de Suisse. A : appressoria; C : condidiophores; F : corpuscules de fibrosine dans les conidies; M : microconidies; SEM : Structure de la paroi externe de la conidie visible seulement au microscope à balayage [tiré de Bolay (2003)].

TELEOMORPHE Anamorphe	Cleistothèces Asques	Fulcres	C.	A.	Conidies
ERYSIPHE Oidium subgen. Pseudoidium				250	SEM .
NEOERYSIPHE Oidium subgen. Striatoidium			2	50	SEM
GOLOVINOMYCES Oidium subgen. Reticuloidium		133		심	SEM
PODOSPHAERA Oidium subgen. Fibroidium		355年 年月月		심	F
SAWADAEA Oidium subgen. Octagoidium			M V	5	F
ARTHROCLADIELLA Oidium subgen. Graciloidium		XX		<u>~</u>	SEM
BLUMERIA Oidium subgen. Oidium			00000	스	SEM
LEVEILLULA  Oidiopsis		THE STATE OF THE S		35	SEM
PHYLLACTINIA  Ovulariopsis				소오	SEM

Vol. 20, 2005

### 3.2 Clés de détermination des genres

3.2.	1 Avec cleistothèce (téléomorphe)	3.2.	2 Sans cleistothèce (anamorphe)
1a	Mycélium développé à l'intérieur et à la surface des organes de l'hôte; genres endo- et ectoparasites 2	1a	Mycélium développé à l'intérieur et à la surface des organes de l'hôte; genres endo- et ectoparasites <b>2</b>
1b	Mycélium développé à la surface des organes de l'hôte; genres ectoparasites	1b	Mycélium développé à la surface des organes de l'hôte; genres ectoparasites
2a	Fulcres en alênes, ampullacés à la base, disposés comme les rayons d'une roue (fig. 3h);	2a	Mycélium endo- et ectoparasite; conidiophores de type Ovulariopsis (fig. 1c)
2b	conidiophores de type Ovulariopsis (fig. 1c)	2b	Mycélium nettement endoparasite, conidiophores sortant par les stomates, souvent ramifiés, de type Oidiopsis (fig. 1d) Leveillula
	Leveillula	3a	Conidiophores ne portant qu'une, très rarement 2-3 conidies, de type Pseudoidium (fig. 1a) <b>Erysiphe</b>
3a	Cleistothèces ne contenant qu'un asque; conidiophores de type Euoidium (fig. 1b); conidies contenant des corpuscules de fibrosine	3b	Conidiophores avec conidies en chaîne, de type Euoidium (fig. 1b)
3b	Cleistothèces contenant plusieurs asques 4	4a 4b	Conidies contenant des corpuscules de fibrosine <b>5</b> Conidies sans corpuscules de fibrosine <b>6</b>
4a	Conidiophores de type Pseudoidium (fig. 1a); conidie isolée; appressoria lobés <b>Erysiphe</b>	5a	Conidies ± octogonales; formation de microconidies; sur le genre <i>Acer</i> <b>Sawadaea</b>
4b	Conidiophores de type Euoidium (fig. 1b); conidies en chaîne	5b	Conidies ellipsoïdales, ovoïdes ou doliiformes  Podosphaera
5a	Conidies contenant des corpuscules de fibrosine; fulcres se terminant par une ou plusieurs crosses .	6a	Conidiophores bulbeux à la base; suçoirs digités (fig. 1g2), sur Poacées
5b	Conidies sans corpuscules de fibrosine 6	6b	Conidiophores non bulbeux à la base; suçoirs globulaires (fig. 1g1); sur d'autres hôtes <b>7</b>
6a	Cellule basale du conidiophore bulbeuse à la base; suçoirs digités (fig. 1g2); sur Poacées . <i>Blumeria</i>	7a 7b	Appressoria en majorité lobés <b>Neoerysiphe</b> Appressoria mamelonnés ou indistincts <b>8</b>
6b	Cellule basale du conidiophore non bulbeuse à la		
	base; suçoirs globulaires (fig. 1g1)	8a	Conidiophores ± arqués; sur le genre <i>Lycium</i>
7a	Fulcres à divisions dichotomiques; sur <i>Lycium</i> Arthrocladiella	8b	Conidiophores droits; sur d'autres hôtes
7b	Fulcres simples, d'aspect mycélien avec parfois quelques ramifications irrégulières		
8a	Appressoria lobés; paroi externe des conidies striée (observable au microscope à balayage, SEM)		
8b	Appressoria mamelonnés ou indistincts; paroi externe des conidies réticulée (SEM)		
	Golovinomyces		