

**Zeitschrift:** Elemente der Mathematik  
**Herausgeber:** Schweizerische Mathematische Gesellschaft  
**Band:** 19 (1964)  
**Heft:** 4

**Artikel:** Sur les nombres pseudopremiers triangulaires  
**Autor:** Rotkiewicz, A.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-23303>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 04.12.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Sur les nombres pseudopremiers triangulaires

*Théorème : Il existe une infinité des nombres triangulaires qui sont pseudopremiers.*

*Lemme : Si  $n$  est un nombre naturel tel que*

$$n(2n-1) \mid 2^{n-1} - 1 \quad \text{et} \quad 3 \nmid n(2n-1), \quad (1)$$

alors pour  $M = (2^{2n-1} + 1)/3$ , on a

$$M(2M-1) \mid 2^{M-1} - 1 \quad \text{et} \quad 3 \nmid M(2M-1). \quad (2)$$

*Démonstration du lemme.* Supposons qu'on a les formules (1). Soit  $M = (2^{2n-1} + 1)/3$ . On a alors  $2M-1 = (2^{2n} - 1)/3$ ,  $M-1 = 2(2^{2n-1} - 1)/3$  et d'après (1) on a  $2n(2n-1) \mid M-1$ , d'où on trouve

$$M = \frac{(2^{2n-1} + 1)}{3} \mid (2^{2n-1} + 1)(2^{2n-1} - 1) \mid 2^{2n(2n-1)} - 1 \mid 2^{M-1} - 1 \quad (3)$$

et

$$2M-1 = \frac{(2^{2n} - 1)}{3} \mid 2^{2n(2n-1)} - 1 \mid 2^{M-1} - 1. \quad (4)$$

Comme  $(M, 2M-1) = 1$ , il résulte de (3) et (4) que  $M(2M-1) \mid 2^{M-1} - 1$ .

D'après  $3 \nmid 2n-1$  on a  $2n-1 = 6k+r$ , où  $k$  est un entier  $\geq 0$  et  $r = 1$  ou  $5$ , d'où il résulte que  $2^{2n-1} + 1 = 2^{6k+r} + 1 \equiv 2^r + 1 \not\equiv 0 \pmod{9}$ , d'où :  $3 \nmid (2^{2n-1} + 1)/3 = M$ . Pareillement, vu que  $3 \nmid 2n$ , on a  $2n = 6u+r$ , où  $u$  est un entier  $\geq 0$  et  $r = 2$  ou  $4$ , d'où  $2^{2n} - 1 = 2^{6u+r} - 1 \equiv 2^r - 1 \not\equiv 0 \pmod{9}$ , d'où  $3 \nmid (2^{2n} - 1)/3 = 2M-1$ . On a donc  $3 \nmid M(2M-1)$  et le lemme se trouve démontré.

*Démonstration du théorème.* Pour  $n = 37$  on a  $n(2n-1) \mid 2^{n-1} - 1$  et  $3 \nmid n(2n-1)$ , puisque  $37 \mid 2^{36} - 1$ ,  $2n-1 = 73 \mid 2^9 - 1 \mid 2^{36} - 1$ . Comme  $M = (2^{2n-1} + 1)/3 > n$  pour  $n > 1$ , il résulte de notre lemme que de tout nombre naturel  $n > 1$  satisfaisant aux conditions (1) on peut obtenir un plus grand nombre naturel  $n$  satisfaisant aux mêmes conditions. Il existe donc une infinité de nombres naturels  $n$ , tels que  $n(2n-1) \mid 2^{n-1} - 1$ . Mais alors on a

$$\begin{aligned} t_{2n-1} &= \frac{(2n-1)2n}{2} = \\ &= n(2n-1) \mid 2^{n-1} - 1 \mid 2^{(n-1)(2n+1)} - 1 \mid 2^{n(2n-1)-1} - 1 \mid 2^{n(2n-1)} - 2 = 2^{t_{2n-1}} - 2, \end{aligned}$$

ce qui prouve que le nombre triangulaire  $t_{2n-1}$  est pseudopremier. Notre théorème est ainsi démontré.

Il est facile à vérifier que le plus petit nombre pseudopremier qui est triangulaire est le nombre  $t_{33} = 561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$ .

Il est à remarquer qu'il existe des nombres pseudopremiers carrés. Deux tels nombres sont  $1093^2$  et  $3511^2$ . On ne sait pas s'il en existe une infinité.

Or, on peut démontrer qu'il existe une infinité des nombres pseudopremiers divisibles par  $1093^2$ , respectivement par  $3511^2$ .\*).

A. ROTKIEWICZ (Varsovie)

## Kleine Mitteilungen

### Über ein Tetraederproblem

In Aufgabe 458 der «Elemente» [1]<sup>1)</sup> ist gezeigt worden, dass die Summe der Quadrate der Kantenprojektionen auf eine Ebene dann und nur dann von der Lage der Ebene nicht abhängt, wenn das Tetraeder regulär ist. In dieser Arbeit behandeln wir für den Fall der Nichtregularität das allgemeine Problem der Abhängigkeit von der Lage der Ebene.

Wir verlegen eine Ecke des Tetraeders in den Nullpunkt  $\mathfrak{o}$  des der Betrachtung zugrunde liegenden Koordinatensystems, auf den wir auch die vorkommenden Vektoren beziehen.  $\mathfrak{p}^{(1)}$ ,  $\mathfrak{p}^{(2)}$ ,  $\mathfrak{p}^{(3)}$  seien die drei anderen Ecken des Tetraeders, genauer ihre auf  $\mathfrak{o}$  bezogenen Ortsvektoren. Die Projektionsebene  $\mathfrak{E}$  denken wir uns durch  $\mathfrak{o}$  gelegt, sie ist durch ihren Stellungsvektor  $\mathfrak{x}$  charakterisiert, der zugleich ein Einheitsvektor ist, so dass

$$\mathfrak{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1.$$

Ist nun  $\mathfrak{a}$  ein beliebiger Vektor mit der Länge  $a = |\mathfrak{a}|$ ,  $q$  die Länge der Projektion von  $\mathfrak{a}$  auf  $\mathfrak{E}$  und  $f$  die Länge der Projektion von  $\mathfrak{a}$  auf  $\mathfrak{x}$ , so ist

$$q^2 = a^2 - f^2, \quad f^2 = \langle \mathfrak{a} \mathfrak{x} \rangle^2,$$

wo  $\langle \mathfrak{a} \mathfrak{x} \rangle$  das innere Produkt der beiden Vektoren  $\mathfrak{a}$  und  $\mathfrak{x}$  bedeutet; somit ist

$$q^2 = a^2 - \langle \mathfrak{a} \mathfrak{x} \rangle^2 \quad (1)$$

Wenden wir diese Formel auf die Tetraederkanten an, die durch die Vektoren  $\mathfrak{p}^{(1)}$ ,  $\mathfrak{p}^{(2)}$ ,  $\mathfrak{p}^{(3)}$ ,  $\mathfrak{p}^{(1)} - \mathfrak{p}^{(2)}$ ,  $\mathfrak{p}^{(2)} - \mathfrak{p}^{(3)}$ ,  $\mathfrak{p}^{(1)} - \mathfrak{p}^{(3)}$  gegeben sind, und bezeichnen mit  $S(\mathfrak{x})$  die Quadratsumme der Kantenprojektionen auf  $\mathfrak{E}$ , die ja eine Funktion des Stellungsvektors  $\mathfrak{x}$  ist, mit  $K$  die Summe der Kantenquadrate, so ist

$$S(\mathfrak{x}) = K - \sum_{\lambda} \langle \mathfrak{p}^{(\lambda)} \mathfrak{x} \rangle^2 - \sum_{\mu < \nu} \langle (\mathfrak{p}^{(\mu)} - \mathfrak{p}^{(\nu)}) \mathfrak{x} \rangle^2, \quad \lambda, \mu, \nu = 1, 2, 3. \quad (2)$$

Für  $S(\mathfrak{x})$  gilt

$$0 < S(\mathfrak{x}) < K.$$

$S(\mathfrak{x})$  ist eine Funktion von  $x_1, x_2, x_3$  mit der Bedingung  $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 1 = 0$ .

\*) Voir, par exemple, A. ROTKIEWICZ: *Sur les nombres composés tels que  $n \mid 2^n - 2$  et  $n \nmid 3^n - 3$* , Bulletin de la Société des mathématiciens et physiciens de la R. S. de Serbie XV, Beograd 1963, p. 7-11.

<sup>1)</sup> Die Ziffern in eckigen Klammern verweisen auf das Literaturverzeichnis, Seite 87.