

Zeitschrift: Elemente der Mathematik
Herausgeber: Schweizerische Mathematische Gesellschaft
Band: 38 (1983)
Heft: 4

Artikel: On the successive remainders of the exponential series
Autor: Brezinski, Claude
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-37189>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 01.05.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

orientierten Grundriss \vec{s}_2' von \vec{s}_2 in den orientierten Grundriss \vec{s}' des Sehstrahls \vec{s} bringt, positiv, daher geht in der Einschneidesituation der orientierte Aufriss \vec{s}'' aus \vec{s}' durch eine positive Drehung hervor; da weiters laut Angabe $\angle \vec{s}_2', \vec{s}' < 90^\circ$ und $\angle \vec{s}_1'', \vec{s}'' < 90^\circ$ gilt, ist das Mass $\angle \vec{s}', \vec{s}''$ des Drehwinkels grösser als 90° . Mit dem orientierten Aufriss \vec{s}'' von \vec{s} ist, bis auf Schiebungen parallel s'' , die Lage des Einschneideauftrisses auf dem Zeichenblatt bestimmt.

W. Kickingger, TU Wien

LITERATURVERZEICHNIS

- 1 H. Brauner und W. Kickingger: Baugeometrie I. Bauverlag, Wiesbaden, Berlin 1977.
- 2 H. Brauner: Darstellende Geometrie im Schulunterricht. Der Mathematikunterricht 27, Heft 3, 5-68 (1981).
- 3 L. Eckhart: Ein neues Schrägrissverfahren. Österreichs höhere Schule, Päd.-fachwiss. Beiblatt zum «Mittelschullehrer», 6. Jg., Oktober 1937.
- 4 L. Eckhart: Affine Abbildung und Axonometrie. S.-Ber. Akad. Wiss. Wien 146, 51-56 (1937).
- 5 W. Kickingger: Konstruktion von Normalrissen durch Einschneiden. Der Mathematikunterricht 28, Heft 2 (1982).
- 6 E.J. Nyström: Zur praktischen Axonometrie. Soc. scient. Fenn., Commentationes Physico-Mathem. XI 11, 1-25 (1942).
- 7 F. Reutter: Darstellende Geometrie, Bd. I. Verlag G. Braun, Karlsruhe 1961.
- 8 E. Stiefel: Lehrbuch der Darstellenden Geometrie. Verlag Birkhäuser, Basel 1947.
- 9 K. Strubecker: Vorlesungen über Darstellende Geometrie, 2. Aufl. Verlag Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1967.

© 1983 Birkhäuser Verlag, Basel

0013-6018/83/040081-06\$1.50 + 0.20/0

On the successive remainders of the exponential series

In [3], Gautschi proved some results on the successive remainders of the exponential series and he made two conjectures.

The aim of this note is to complete Gautschi's results and to prove his second conjecture.

Let us recall that a sequence (a_n) is called totally monotone if, $\forall n, k \geq 0$

$$(-1)^k \Delta^k a_n \geq 0$$

where Δ is the forward difference operator: $\Delta a_n = a_{n+1} - a_n$.

A characterization of totally monotone sequences is due to Markov who showed that a necessary and sufficient condition for (a_n) to be totally monotone is that

$$a_n = \int_0^1 t^n dg(t) \quad n=0, 1, \dots$$

where g is bounded and non decreasing in $[0, 1]$. We shall write $(a_n) \in TM$.

We have

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \phi_n(x)$$

where $\phi_n(x) = e^{x\theta_n(x)}$, $0 < \theta_n(x) < 1$.

Gautschi proved some results on the sequences (ϕ_n) and (θ_n) which are collected in the following theorem.

Theorem 1. $\forall x > 0, (\phi_n - 1) \in TM. \forall x < 0, (1 - \phi_n) \in TM. \forall x \neq 0$ then $\forall n, (-1)^k \Delta^k \theta_n > 0$ for $k = 0, 1$ and 2 and $\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_n = 0$.

The problem which now arises is to know whether or not (θ_n) is totally monotone. Gautschi gives a numerical example showing that for $x > 0, (\theta_n)$ is not totally monotone and he makes the conjecture that (θ_n) is totally monotone for $x < 0$. We shall prove this conjecture for $x < 0$ and complete Gautschi's results for $x > 0$.

The core of the proof is a theorem due to Brezinski [1, 2].

Theorem 2. Let $c(t) = \sum_{i=0}^{\infty} c_i t^i$ be a power series with a radius of convergence R and such that $\forall i, c_i \geq 0$. Let $(x_n) \in TM$ with $x_0 < R$. Then $(c(x_n)) \in TM$.

We now can prove

Theorem 3. $\forall x < 0, (\theta_n) \in TM$.

Proof: We have

$$-\text{Log}(1-t) = t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + \dots$$

This series converges for $-1 \leq t \leq 1$.

For $x < 0, 0 < \phi_n < 1$. Thus $0 < 1 - \phi_0 < 1$ and, by theorem 2, $(-\text{Log}(1 - (1 - \phi_n))) \in TM$. That is $(-\text{Log} \phi_n = -x \theta_n) \in TM$ and the result follows since $x < 0$. ■

Let us now look at the case $x > 0$.

Theorem 4. $\forall x > 0, \exists N(x): \forall n \geq N(x)$

$$\theta_n = \int_0^1 t^{n-N(x)} d\theta(t)$$

where θ is a normalized function of bounded variation in $[0, 1]$.

Proof: For $x > 0, (\phi_n - 1) \in TM$. Thus $\forall n, \phi_n > 1$. Since $\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_n = 0$ we have $\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n = 1$. Thus $\forall x > 0, \exists N \equiv N(x)$ such that $\forall n \geq N, \phi_n < 2$.

We have

$$\text{Log} \left(\frac{1+t}{1-t} \right) = 2 \left(t + \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5} + \dots \right)$$

which converges for $|t| < 1$.

Since $0 < \phi_n - 1 < 1$ for $n \geq N$ it follows from theorem 2 that $(a_n)_{n \geq N} \in TM$ where

$$a_n = \text{Log} \frac{1 + (\phi_n - 1)}{1 - (\phi_n - 1)} = \text{Log} \frac{\phi_n}{2 - \phi_n}.$$

But

$$a_n = \text{Log} \phi_n - \text{Log} (2 - \phi_n)$$

or

$$\text{Log} \phi_n = x \theta_n = a_n - b_n$$

with

$$b_n = -\text{Log} (1 - (\phi_n - 1)).$$

From theorem 2, $(b_n)_{n \geq N} \in TM$ which shows that $(\theta_n)_{n \geq N}$ is the difference of two totally monotone sequences. The result stated in the theorem follows from a known result originally due to Jordan (see, for example, [4], theorem 2 b, p.103, and theorem 4 b, p. 109). ■

Let us now characterize the index $N(x)$ of the previous theorem.

We have

$$\phi_n(x) = 1 + \frac{x}{n+2} + \frac{x^2}{(n+2)(n+3)} + \dots$$

$$\phi_n < 1 + \frac{x}{n+2} + \left(\frac{x}{n+2} \right)^2 + \dots = \frac{1}{1 - x/(n+2)} \quad \text{if} \quad \frac{x}{n+2} < 1.$$

Let N be the smallest index such that $x/(N+2) < 1$ and $\forall n \geq N$

$$\phi_n \leq \phi_N < \frac{1}{1 - x/(N+2)} \leq 2.$$

We find $N \geq 2(x-1)$. Thus $N(x)$ is the smallest integer greater or equal to $2(x-1)$. As shown by the numerical examples this value of N can be over-estimated by one. Numerical examples suggest that the sequence $(\theta_n)_{n \geq N}$ is totally monotone.

Claude Brezinski, Université de Lille I, Villeneuve-d'Ascq, France

REFERENCES

- 1 C. Brezinski: Génération de suites totalement monotones et oscillantes. C.R. Acad. Sci. Paris 280A, 729–731 (1975).
- 2 C. Brezinski: Padé-type approximation and general orthogonal polynomials. ISNM, Vol.50, Birkhäuser-Verlag, Basel 1980.
- 3 W. Gautschi: A note on the successive remainders of the exponential series. El. Math. 37, 46–49 (1982).
- 4 D.V. Widder: The Laplace transform. Princeton University Press, Princeton, N.J., 1946.

© 1983 Birkhäuser Verlag, Basel

0013-6018/83/040086-04\$1.50 + 0.20/0

Rechnen in endlichen Körpern

(Beispiele elementarer Zahlentheorie)

Einleitung

Wir gehen von einem Restklassenkörper \mathbf{K} ungerader Ordnung aus. Dann gilt also $|\mathbf{K}| = p$ mit p Primzahl und $p \neq 2$.

Bekanntlich lässt sich jede Primzahl $p \neq 2$ entweder in der Form $p = 4a + 1$ oder aber in der Form $p = 4a - 1$ mit $a \in \mathbf{N}$ darstellen. Im ersten Fall ist -1 Quadrat in \mathbf{K} , im zweiten dagegen nicht. Mit $\mathbf{K}^* = \mathbf{K} \setminus \{0\}$ schreiben wir $-1 \in \mathbf{K}^{*2}$ bzw. $-1 \notin \mathbf{K}^2$ [1], [3].

Das Problem

Wie viele Lösungen (x^2, y^2) mit $x, y \in \mathbf{K}^*$ besitzt die Gleichung

$$x^2 - y^2 = 1. \tag{1}$$

Die Lösung des Problems

Die Gleichung (1) besitzt genau $a - 1$ Lösungen der genannten Art.

Mit den bei der Behandlung diophantischer Gleichungen in \mathbf{N} üblichen Verfahren [2] schreiben wir $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y) = 1$ und setzen $x - y = v$ und $x + y = w$. Es gilt $v, w \in \mathbf{K}^*$. Weiter erhalten wir

$$w = \frac{1}{v}, \quad x = \frac{1 + v^2}{2v}, \quad y = \frac{1 - v^2}{2v}.$$

a) Sei v ein beliebiges Element aus \mathbf{K}^* . Dann folgt mit $x = (1 + v^2)/(2v)$ und $y = (1 - v^2)/(2v)$ durch Einsetzen und Ausrechnen sofort $x^2 - y^2 = 1$.

b) Seien nun umgekehrt $x, y \in \mathbf{K}^*$ mit $x^2 - y^2 = 1$ gegeben. Dann existiert mindestens ein $v \in \mathbf{K}^*$ so, dass $x = (1 + v^2)/(2v)$, $y = (1 - v^2)/(2v)$.