

Zeitschrift: Elemente der Mathematik
Herausgeber: Schweizerische Mathematische Gesellschaft
Band: 39 (1984)
Heft: 3

Rubrik: Aufgaben

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Aufgaben

Aufgabe 896. If a_1, a_2, a_3 are the sides of a triangle $A_1A_2A_3$ and R_1, R_2, R_3 are the distances from an arbitrary point P in the plane of the triangle to the vertices A_1, A_2, A_3 , prove that

$$\sum_{i=1}^3 a_i R_i (a_i^4 + R_i^4) \geq 10 \prod_{i=1}^3 a_i R_i.$$

M.S. Klamkin, Edmonton, CDN

Solution: We use complex numbers. Take P to be the origin of the complex plane and let A_1, A_2, A_3 be represented by the complex numbers u, v, w , respectively. The following identity is easily verified:

$$\sum \{u(v-w)^5 + u^5(v-w)\} = 10uvw \prod (v-w).$$

Hence, using the triangle inequality we get

$$\sum |v-w| |u| \{|v-w|^4 + |u|^4\} \geq 10 \prod |u| \prod |v-w|.$$

This is the desired result, since $|v-w| = a_1, |u| = R_1$, etc.

L. Kuipers, Sierre

Comment by the proposer. It is easily seen that equality holds if the triangle is equilateral and it is conjectured that this is the only case for equality (assuming the triangle is non-degenerate).

Aufgabe 897. Für positive reelle x und natürliche n sei

$$S_n(x) := \sum_{\substack{1 \leq k \leq x \\ (k,n)=1}} \mu(k) [x/k]$$

(μ : Möbiusfunktion, $[]$: Ganzzteilfunktion). Man zeige: $S_n(x)$ ist gleich der Anzahl der Teiler t von $n^{\lceil \log_2 x \rceil}$ mit $t \leq x$.

K. Szabo, Miskolc, Ungarn

Lösung: Für $n \in \mathbf{N}, y \in \mathbf{R}_+$ sei $T_n(y) := \sum_{\substack{1 \leq t \leq y \\ t|n^{\lceil \log_2 y \rceil}}} 1$. Sei m eine beliebige natürliche Zahl $\leq x$.

Dann kann m eindeutig geschrieben werden in der Form $m = j \cdot t$ mit $(j, n) = 1$ und t enthält genau die Primfaktoren von m , die auch in n vorkommen. Ist $p^\lambda \parallel t$, so $2^\lambda \leq p^\lambda \leq x/j$ und damit $\lambda \leq \lceil \log_2 x/j \rceil$ und also $t|n^{\lceil \log_2 x/j \rceil}$. Daraus folgt

$$[x] = \sum_{m \leq x} 1 = \sum_{\substack{j \leq x \\ (j,n)=1}} \sum_{\substack{t \leq x/j \\ t|n^{\lceil \log_2 x/j \rceil}}} 1 = \sum_{\substack{j \leq x \\ (j,n)=1}} T_n(x/j) = \sum_{j \leq x} \chi_n(j) T_n(x/j),$$

wo χ_n den Hauptcharakter modulo n bezeichnet. Nach Definition von $S_n(x)$ in der Aufgabenstellung folgt daraus unter Berücksichtigung der vollständigen Multiplikatивität von χ_n

$$\begin{aligned}
 S_n(x) &= \sum_{k \leq x} \mu(k) \chi_n(k) [x/k] = \sum_{k \leq x} \sum_{j \leq x/k} \mu(k) \chi_n(k) \chi_n(j) T_n(x/jk) \\
 &= \sum_{l \leq x} \chi_n(l) T_n(x/l) \sum_{k|l} \mu(k) = \sum_{l \leq x} \chi_n(l) T_n(x/l) \delta_{1,l} = T_n(x)
 \end{aligned}$$

mit den Kroneckerschen δ , was die Behauptung beweist.

P. Bundschuh, Köln, BRD

Weitere Lösungen sandten L. Kuipers (Sierre), Kee-wai Leu (Hongkong), I. Merényi (Cluj, Rumänien), L. Cseh (Cluj, Rumänien).

Neue Aufgaben

Die Lösungen sind getrennt nach den einzelnen Aufgaben in Maschinschrift erbeten bis 10. Dezember 1984 an Dr. H. Kappus. Dagegen ist die Einsendung von Lösungen zu den mit *Problem ... A, B* bezeichneten Aufgaben an keinen Termin gebunden.

Bei Redaktionsschluss dieses Heftes sind noch ungelöst: Problem 601A (Band 25, S. 67), Problem 625 B (Band 25, S. 68), Problem 645 A (Band 26, S. 46), Problem 672 A (Band 27, S. 68), Aufgabe 680 (Band 27, S. 116), Problem 724 A (Band 30, S. 91), Problem 764 A (Band 31, S. 44), Problem 862 A (Band 36, S. 68). Problem 872 A (Band 36, S. 175), Aufgabe 880 (Band 37, S. 93).

Aufgabe 908. Show that the length of a side of the Morley triangle of a given triangle T is less than one third the length of the smallest side of T . (The Morley triangle of T is the equilateral triangle formed by the intersection in pairs of the angle trisectors of T .)

M. S. Klamkin, Alberta, CDN
R. Spira, Ashland, Oregon, USA

Aufgabe 909. Welche zahlentheoretische Funktion wird durch

$$f(n) := [2\sqrt{n}] - [\sqrt{n-1} + \sqrt{n+1}]; \quad n \in \mathbf{N}$$

dargestellt?

H. Kappus, Rodersdorf

Literaturüberschau

J. Fresnel, M. van der Put: Géométrie Analytique Rigide et Applications. Progress in Mathematics, Band 18. XII und 215 Seiten. Fr. 30.-. Birkhäuser, Boston, Basel, Stuttgart 1981.

Ce livre a pour origine un cours de troisième cycle. Dans la première partie, les auteurs introduisent de façon très claire les bases de la théorie des fonctions analytiques et des espaces analytiques sur un corps valué complet pour une valuation nonarchimédienne. La deuxième partie est consacrée à quelques applications importantes. La première application, qui donne la représentation analytique d'une courbe algébrique sur un corps valué complet, est aussi la motivation historique de cette théorie. M.-A. Knus