

Zeitschrift: Elemente der Mathematik
Herausgeber: Schweizerische Mathematische Gesellschaft
Band: 43 (1988)
Heft: 3

Artikel: On some inequalities connected with Fermat's equation
Autor: Bialek, Krystyna
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-40804>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 25.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Now, from ((10); (iii)) we have

$$\{\csc^2 \omega\}^2 = \left\{ \sum_{i=1}^3 \csc^2 \alpha_i \right\}^2 \leq 3 \sum_{i=1}^3 \csc^4 \alpha_i. \quad (15)$$

Thus the right-hand side of (14) is positive; it is zero if and only if $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3$. It follows that the right-hand in (9) is greater than or equal to $3/\omega$ with equality if and only if $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3$. This finishes the proof of Theorem 1.

We end this note by remarking that a straightforward application of Holder's inequality on (7) gives

$$\frac{3}{\omega^\lambda} \leq \sum_{i=1}^3 \frac{1}{(\alpha_i - \omega)^\lambda} \quad (16)$$

for every $\lambda \geq 1$.

Faruk Abi-Khuzam
American University of Beirut, Lebanon

REFERENCES

- 1 Abi-Khuzam F.: Proof of Yff's Conjecture on the Brocard Angle of a Triangle. *El. Math.* 29, 141–142 (1974).
- 2 Abi-Khuzam F.: Inequalities of Yff-type in the Triangle. *El. Math.* 35, 80–81 (1980).
- 3 Abi-Khuzam F. and Boghossian A.: On Some Geometric Inequalities, to appear.
- 4 Johnson R.: *Advanced Euclidean Geometry*. Dover Pbl., N.Y. (1960).
- 5 Mascioni V.: Zur Abschätzung des Brocardschen Winkels. *El. Math.* 41, 98–101 (1986).

© 1988 Birkhäuser Verlag, Basel

0013-6018/88/030078-04\$1.50 + 0.20/0

On some inequalities connected with Fermat's equation

1. Introduction

In 1856 I. A. Grünert ([3], see also [6] p. 226) proved that if n is an integer, $n \geq 2$ and $0 < x < y < z$ are real numbers satisfying the equation

$$x^n + y^n = z^n \quad (1)$$

then

$$z - y < \frac{x}{n}. \quad (2)$$

This result was rediscovered by G. Towses [7], and then by D. Zeitlin [8].

In 1979 L. Meres [4] improved the result of Grünert, replacing (2) by

$$z - y < \frac{x}{a}, \quad \text{for } a = n + 1 - n^{2-n}, \quad n \geq 2. \quad (3)$$

In [1] we improved the result of Meres, replacing (3) by

$$z - y < \frac{x}{n + 1}, \quad \text{for } n \geq 4. \quad (4)$$

Fell, Graz and Paasche [2] have proved that, if equation (1) has a solution in positive integers $x < y < z$, where $n \geq 2$, then

$$x^2 > 2y + 1. \quad (5)$$

We mention also the result of Perisastri (1969): $z < x^2$ ([5]; [6] p. 226).

In this paper we establish the following theorems, which improve (4) and (5).

Theorem 1. *Let k be a positive integer. If*

$$n > [(2k + 1)C_1], \quad C_1 = \frac{\log 2}{2(1 - \log 2)}$$

and if equation (1) has a solution in real numbers $0 < x < y < z$, then

$$z - y < \frac{x}{n + k}. \quad (6)$$

Theorem 2. *If n is an integer, $n \geq 2$ and if equation (1) has a solution in real numbers $0 < x < y < z$, then*

$$z - y < \frac{x}{n} C(n), \quad \text{where } C(n) = \log 2 \left(1 + \frac{C_2}{n} \right), \quad \frac{\log 2}{2} < C_2 < \frac{\log 2}{\sqrt{2}}. \quad (7)$$

Theorem 3. *If equation (1) has a solution in positive integers $x < y < z$ for some $n > 2$, then*

$$x^2 > 2z + 1. \quad (8)$$

2. Proof of the Theorems

Proof of Theorem 1. If x, y, z are real numbers satisfying (1) for some positive integer n , and such that $0 < x < y < z$, write

$$x = \delta y \quad \text{with } 0 < \delta < 1.$$

Hence by (1) we obtain

$$z = (\delta^n + 1)^{\frac{1}{n}} \cdot y$$

and

$$z - y = \frac{(\delta^n + 1)^{\frac{1}{n}} - 1}{\delta} \cdot x. \quad (9)$$

Since the function

$$t \mapsto \frac{(t^n + 1)^{\frac{1}{n}} - 1}{t}$$

is increasing for $0 < t < 1$, (9) implies

$$z - y < (2^{\frac{1}{n}} - 1) \cdot x. \quad (10)$$

For each $k > 0$ there is an $n_0(k)$ such that

$$(2^{\frac{1}{n}} - 1) < \frac{1}{n + k} \quad \text{for } n \geq n_0(k), \quad (11)$$

since

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n + k}\right)^n = e.$$

We now show that (11) holds with

$$n_0(k) = \frac{\log 2}{2(1 - \log 2)} \cdot (2k + 1). \quad (12)$$

The inequality

$$2 < \left(1 + \frac{1}{n + k}\right)^n \quad (13)$$

is equivalent to

$$\log 2 < n \log \left(1 + \frac{1}{n + k}\right). \quad (14)$$

Since

$$\log\left(1 + \frac{1}{n+k}\right) > \frac{2}{2(n+k)+1} \quad \text{for } (n+k) > 0, \quad (14) \text{ is true if}$$

$$\log 2 < \frac{2n}{2(n+k)+1}.$$

Thus (11) is true if $n_0(k)$ is as in (12), and also if

$$n_0(k) = [(2k + 1)C_1], \tag{15}$$

where $[u]$ denotes the integral part of u . The proof is complete. We have for example

$$n_0(1) = 3, \quad n_0(2) = 5, \quad n_0(3) = 7, \dots \tag{16}$$

Proof of Theorem 2. From the proof of Theorem 1 it follows that

$$z - y < (2^{\frac{1}{n}} - 1) \cdot x.$$

We have

$$2^{\frac{1}{n}} = 1 + \frac{\log 2}{n} + \frac{(\log 2)^2}{n^2 \cdot 2!} \xi,$$

$$2^{\frac{1}{n}} - 1 = \frac{\log 2}{n} \left(1 + \frac{\log 2}{2n} \xi\right), \quad \text{with } 1 < \xi < 2^{\frac{1}{n}} \leq \sqrt{2}.$$

Thus

$$2^{\frac{1}{n}} - 1 = \frac{\log 2}{n} \left(1 + \frac{C_2}{n}\right), \quad \text{where } \frac{\log 2}{2} < C_2 < \frac{\log 2}{\sqrt{2}}. \tag{17}$$

From (10) and (17) we obtain

$$z - y < \frac{x}{n} \cdot C(n), \quad \text{where } C(n) = \log 2 \left(1 + \frac{C_2}{n}\right) \tag{18}$$

and

$$\frac{\log 2}{2} < C_2 < \frac{\log 2}{\sqrt{2}}.$$

The proof is complete.

Proof of Theorem 3. We may assume that x, y, z are relatively prime. Indeed, if the theorem is true in this case, and if x, y, z are positive integers such that

$$x^n + y^n = z^n \text{ (some } n > 2) \text{ and } (x, y, z) = d \text{ with } d > 1,$$

set $x = dx', y = dy', z = dz'$. Then $(x', y', z') = 1$, so that

$$(x')^2 \geq 2z' + 1; \text{ on multiplying by } d \text{ we get}$$

$$2z + 1 < 2z + d = d(2z' + 1) \leq d(x')^2 < x^2.$$

Now if $x < y < z$ are positive real numbers such that

$$x^2 + y^2 \leq z^2,$$

then

$$x^n + y^n < z^n \text{ for } n > 2,$$

since

$$z^n \geq z^{n-2}(x^2 + y^2) > x^{n-2} \cdot x^2 + y^{n-2} \cdot y^2 = x^n + y^n.$$

It follows that if equation (1) has a solution in positive integers $x < y < z$ for some $n > 2$, then

$$(*) \quad x^2 + y^2 > z^2.$$

Now if $z > y$ and y, z are integers, then $z \geq y + 1$ and by (*),

$$x^2 > z^2 - y^2 \geq z^2 - (z - 1)^2 = 2z - 1,$$

whence

$$x^2 \geq 2z.$$

Now $x^2 = 2z$ is impossible if $x^n + y^n = z^n$ and $(x, y, z) = 1$.

Therefore $x^2 > 2z + 1$.

The proof is complete.

Krystyna Białek
Department of Mathematics
Pedagogical University
Zielona Góra, Poland

REFERENCES

- 1 Białek K.: Remark on Fermat's equation. *Discuss. Math. T. VII*, 1985, 119–122.
- 2 Fell A. und Paasche I.: P 66 (Fermatproblem). *Praxis der Math. 3*, 80 (1961).

- 3 Grünert I. A.: Wenn $n > 1$, so gibt es unter den ganzen Zahlen von 1 bis n nicht zwei Werte von x und y , für welche wenn z einen ganzen Wert bezeichnet, $x^n + y^n = z^n$ ist. *Archiv. Math. Phys.* 27, 119–120 (1856).
- 4 Meres L.: About certain inequalities connected with the great theorem of Fermat. *Zeszyt. Nauk. Polit. Śląskiej* 560 *Mat.-Fiz.* 30, 215–218 (1979).
- 5 Perisastri M.: On Fermat's last theorem. *Amer. Math. Monthly* 76, 671–675 (1969).
- 6 Ribenboim P.: 13 lectures on Fermat's last theorem. Springer-Verlag, New York, Heidelberg, Berlin 1980.
- 7 Towses G.: On Fermat's last theorem. *Amer. Math. Monthly* 41, 419–424 (1934).
- 8 Zeitlin D.: A note on Fermat's last theorem. *Fibonacci Quart.* 12, 368–402 (1974).

© 1988 Birkhäuser Verlag, Basel

0013-6018/88/030078-06\$1.50 + 0.20/0

Fastpythagoräische Quadrupel

1. In [1] beschreibt O. Frink Methoden, alle Lösungen der diophantischen Gleichungen $x^2 + y^2 = z^2 + 1$ und $x^2 + y^2 = z^2 - 1$ zu finden. Wir lösen mit anderen Methoden das analoge Problem für vier Variable. Ein Quadrupel (x, y, z, w) natürlicher Zahlen heiße *fastpythagoräisch* (FPQ), wenn es eine der beiden Gleichungen

$$x^2 + y^2 + z^2 = w^2 + 1 \quad (1)$$

oder

$$x^2 + y^2 + z^2 = w^2 - 1 \quad (2)$$

erfüllt. Gesucht ist ein Verfahren zur Bestimmung aller FPQ. Wir betrachten Lösungen, die nur durch Vertauschung von Komponenten auseinander hervorgehen, als nicht wesentlich verschieden.

2. Wir lösen zuerst (1). Rechnet man modulo 4, so erkennt man, dass x, y, z nicht alle gerade und nicht alle ungerade sein können.

Fall 1: x, y, w gerade, z ungerade. Der Ansatz $(x, y, z, w) = (2a, 2b, 2c - 1, 2c + 2r)$ führt auf

$$c = \frac{a^2 + b^2 - r^2}{2r + 1}.$$

Für jede Wahl von a, b, r mit den Nebenbedingungen $a \leq b, r \geq 0, r^2 < a^2 + b^2$ und $2r + 1 \mid a^2 + b^2 - r^2$ erhält man genau ein FPQ, wie man durch Einsetzen in (1) bestätigt. Für $r = 0$ ergibt sich so die Schar $(2a, 2b, 2a^2 + 2b^2 - 1, 2a^2 + 2b^2)$. $(2, 6, 5, 8)$ ist das FPQ mit kleinstem w , das nicht zu dieser Schar gehört. Ist $(a, b, r + 1)$ ein pythagoräisches Tripel, so entsteht das triviale FPQ $(2a, 2b, 1, 2r + 2)$. Weitere FPQ finden sich in Tabelle 1 am Schluss dieser Note.