

Zeitschrift: Elemente der Mathematik
Herausgeber: Schweizerische Mathematische Gesellschaft
Band: 48 (1993)

Artikel: In memoriam Peter Hess, 1941-1992
Autor: Amann, Herbert
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-44632>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)


Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

In memoriam Peter Hess, 1941–1992



Im Herbst des Jahres 1992 verbrachte Peter Hess einen Teil eines Forschungssemesters an der Brigham Young University in Utah, wo er im Rahmen eines 'special year' mit Fachkollegen aus den USA und Australien wissenschaftlich zusammenarbeitete. Während eines Wochenendausflugs in das südliche Utah rutschte er im Canyonlands National Park auf einem verschneiten Wegstück aus und stürzte über einen Felshang zu Tode. So wurde er im Alter von 51 Jahren jäh aus einem aktiven und erfüllten Leben gerissen, im Zenith seiner wissenschaftlichen Laufbahn, voller Pläne und Ideen für seine nähere persönliche und mathematische Zukunft.

Peter Hess wurde am 1. September 1941 in Zürich geboren, wo er auch seine Kinder- und Jugendjahre verbrachte. Im Jahre 1960 legte er an der kantonalen Oberrealschule

die Maturitätsprüfung ab und entschied sich für das Studium der Mathematik, das er im gleichen Jahr an der ETH Zürich aufnahm. Dieser Entschluss ist ihm nicht ganz leicht gefallen, da seine Liebe, neben der Mathematik, der Musik gehörte und er sich längere Zeit mit dem Gedanken trug, sich hauptberuflich dem Cello zu widmen. Nach dem ersten Semester seines Mathematikstudiums war ihm jedoch klar, dass er die richtige Wahl getroffen hatte. Dies bestätigte sich im Frühjahr 1965, als er mit einer unter der Leitung von Heinz Hopf angefertigten Arbeit das Diplom erwarb und ihm für seine Noten eine Auszeichnung verliehen wurde.

Der Liebe zur Musik blieb er Zeit seines Lebens treu. Während seines Studiums nahm er Cellounterricht am Konservatorium und erreichte auf diesem Instrument ein hohes technisches und künstlerisches Niveau. Für viele seiner Freunde und Kollegen sind die schönen Hauskonzerte, zu denen er und seine Frau Annalea, eine hervorragende und begeisterte Amateurviolinistin, in späteren Jahren regelmässig einluden, unvergesslich schöne Erlebnisse.

Da Hopf zu jener Zeit kurz vor seinem Rücktritt stand und keine Schüler mehr zur Promotion führte, wandte sich Peter Hess nach dem Diplom von der Geometrie der Analysis zu. Als Assistent am Lehrstuhl für höhere Mathematik an der ETH beschäftigte er sich mit Fragen der Lösbarkeit nicht-selbstadjungierter linearer elliptischer Differentialgleichungen und mit Abbildungs- und Spektraleigenschaften unbeschränkter linearer Operatoren in Banach- und Hilberträumen. Das Zusammenspiel zwischen Funktionalanalysis und partiellen Differentialgleichungen zieht sich wie ein Leitmotiv durch sein gesamtes wissenschaftliches Werk, wobei er immer wieder die mit abstrakten Methoden gewonnenen Resultate auf elliptische und parabolische partielle Differentialgleichungen anwandte. Hierbei galt sein Interesse in erster Linie nicht-selbstadjungierten Problemen. Während anfänglich das Schwergewicht seiner Publikationen im Bereich der abstrakten Funktionalanalysis lag, verschob es sich in späteren Jahren mehr und mehr in das Gebiet der elliptischen und parabolischen Randwertprobleme.

Ein klassisches Problem der Theorie der partiellen Differentialgleichungen stellt die Frage nach der Existenz von Funktionen u dar, welche den Gleichungen

$$\mathcal{A}u = f \text{ in } \Omega, \quad u = 0 \text{ auf } \partial\Omega \quad (1)$$

genügen. Hierbei sind Ω ein beschränktes Gebiet des \mathbb{R}^n und \mathcal{A} ein Differentialoperator der Form

$$\mathcal{A}u := - \sum_{j,k=1}^n \partial_j(a_{jk} \partial_k u) + \sum_{j=1}^n a_j \partial_j u + a_0 u, \quad (2)$$

wobei a_{jk} , a_j , a_0 und f gegebene (glatte) Funktionen auf $\bar{\Omega}$ sind. Ausserdem sei \mathcal{A} "elliptisch", d.h. die Matrix $[a_{jk}]$ sei symmetrisch und positiv definit (gleichmässig in $x \in \bar{\Omega}$). Es ist bekannt, dass das "Randwertproblem" (1) bei gegebenem stetigem f im allgemeinen keine "klassische", d.h. zweimal stetig differenzierbare Lösung u besitzt. Es ist aber auch bekannt, dass man aus (1) ein "wohlgestelltes" Randwertproblem erhält, wenn man den Lösungsbegriff dahingehend abschwächt, dass man von u nur verlangt, dass es in einem geeignet verallgemeinerten Sinn — im Sinn der Distributionen —

differenzierbar sei. Eine genauere Analyse führt dazu, dem Differentialoperator \mathcal{A} eine Bilinearform, nämlich die ‘Dirichletform’

$$a(u, v) := \int_{\Omega} \left(\sum_{j,k=1}^n a_{jk} \partial_j u \partial_k v + \sum_{j=1}^n a_j \partial_j uv + a_0 uv \right) dx, \tag{3}$$

zuzuordnen. Setzt man zur Abkürzung noch

$$(f, v) := \int_{\Omega} f v dx,$$

so wird man durch Überlegungen, die ihre Wurzeln in der klassischen Variationsrechnung haben, dazu geführt, dem Randwertproblem (1) die folgende Aufgabe zuzuordnen:

Man bestimme u in H_1 so, dass gilt:

$$a(u, v) = (f, v) \quad \text{für alle } v \in H_1. \tag{4}$$

Hierbei ist H_1 ein geeigneter Hilbertraum von Funktionen auf Ω , die so beschaffen sind, dass a auf H_1 eine wohldefinierte stetige Bilinearform darstellt, d.h. ein geeigneter Sobolevraum von Distributionen über Ω . Ausserdem sollen die Elemente v von H_1 auf $\partial\Omega$ verschwinden.

Ist der Differentialoperator \mathcal{A} ‘selbstadjungiert’, d.h. gilt $a_1 = \dots = a_n = 0$, so stellt (4) die Eulersche Gleichung eines Variationsproblems dar. In diesem Fall kann die Existenz einer Lösung von (4) — und damit einer ‘schwachen’, d.h. verallgemeinerten Lösung von (1) — relativ einfach durch Minimieren eines Integrals bewiesen werden. Ist \mathcal{A} nicht selbstadjungiert, versagt dieser Zugang. Unter geeigneten Wachstumsvoraussetzungen an die Bilinearform a , unter ‘Koerzitivitätsvoraussetzungen’, gelingt es jedoch auch in dieser Situation, die Lösbarkeit der Gleichung (4), und damit einer schwachen Lösung von (1), zu zeigen. In diesem Fall führen einfache Hilbertraummethode, nämlich das Lemma von Lax und Milgram, zum Ziel.

Die Bilinearform (3) ist naturgemäss in einem Sobolevraum von quadratisch integrierbaren Funktionen definiert, deren erste (distributionelle) Ableitungen ebenfalls quadratisch integrierbar sind. Dieser Raum H_1 ist ein Unterraum des Hilbertraums H , der aus allen quadratintegrierbaren Funktionen auf Ω besteht. Diese Beobachtung führt in natürlicher Weise dazu, der auf H_1 stetigen Bilinearform a einen unbeschränkten linearen Operator A in H so zuzuordnen, dass das Problem (4) zu der abstrakten linearen Gleichung

$$Au = f \tag{5}$$

in H äquivalent ist. Auf diese Weise erhält man eine neue abstrakte Formulierung des ursprünglichen Randwertproblems, welche den gut ausgebauten Methoden der Theorie der unbeschränkten linearen Operatoren in Hilbert- und Banachräumen zugänglich ist.

Die obigen Betrachtungen illustrieren die engen Zusammenhänge zwischen der Theorie der linearen elliptischen Randwertprobleme, der Theorie der beschränkten Bilinearformen und der Theorie der unbeschränkten linearen Operatoren in Hilberträumen. Mit

diesen Zusammenhängen beschäftigte sich Peter Hess während seiner Assistentenzeit an der ETH, angeregt durch einen Kolloquiumsvortrag des finnischen Mathematikers I.S. Louhivaara. Neben abstrakten Resultaten zur Theorie linearer Operatoren, welche bezüglich einer indefiniten Bilinearform selbstadjungiert sind, und neben Störungssätzen für unbeschränkte lineare Operatoren in Banachräumen untersuchte er Abbildungseigenschaften linearer Operatoren, die, ähnlich wie A in (5), durch elliptische Randwertprobleme beliebiger Ordnung induziert werden. Er promovierte im Frühjahr 1968 mit einer Arbeit über das verallgemeinerte Dirichletproblem ([3] seines Schriftenverzeichnisses), die mit der silbernen Medaille ausgezeichnet wurde. Im Gegensatz zur oben skizzierten "klassischen" Theorie der schwachen Lösungen betrachtete er in seiner Dissertation lineare elliptische Randwertprobleme beliebiger gerader Ordnung mit Koeffizienten, die nur lokal quadratisch integrierbar sind. In diesem Fall ist die A entsprechende Bilinearform nicht mehr stetig und der Satz von Lax-Milgram nicht mehr anwendbar. Dennoch konnte er — durch Studium der (5) entsprechenden Operatorgleichung — die Gültigkeit der Fredholmschen Alternative für derartige Randwertprobleme nachweisen.

In den frühen sechziger Jahren nahm ein neues Teilgebiet der Analysis, die nichtlineare Funktionalanalysis, einen mächtigen Aufschwung. In jener Zeit entstand die Theorie der monotonen Operatoren, die von G. Minty begründet und insbesondere von F. Browder ausgebaut und popularisiert wurde. Bei der Theorie der monotonen Operatoren handelt es sich um eine Verallgemeinerung der Theorie der Eulerschen Gleichungen konvexer nichtquadratischer Funktionale, die aber, ähnlich wie die oben skizzierte schwache Theorie der nicht-selbstadjungierten elliptischen Randwertprobleme, ohne Funktionale auskommt. In dieser Theorie werden die lineare Gleichung (5) durch das nichtlineare Problem

$$A(u) = f, \quad (6)$$

der Hilbertraum H durch einen reflexiven Banachraum E und die Bilinearform a im wesentlichen durch die nichtlineare Form

$$\langle A(u), v \rangle, \quad u, v \in E,$$

ersetzt, wobei $\langle w, v \rangle$ den Wert der stetigen Linearform $w \in E'$ an der Stelle $v \in E$ bedeutet. Eine Abbildung

$$A : E \rightarrow E'$$

heisst dann "monoton", wenn gilt

$$\langle A(u) - A(v), u - v \rangle \geq 0, \quad u, v \in E,$$

da diese Ungleichung im eindimensionalen Fall besagt, dass die Funktion A monoton wachsend ist.

Ein fundamentaler, aus dem Jahr 1963 stammender Satz von Minty und Browder sagt, dass die nichtlineare Gleichung (6) für jedes $f \in E$ lösbar ist, falls A ein stetiger monotoner Operator ist, der einer geeigneten Koerzitivitätsbedingung genügt. Dieses Theorem besitzt zahlreiche Anwendungen auf quasilineare elliptische und parabolische

Randwertprobleme und auf nichtlineare Integralgleichungen. Da A nicht Ableitung eines Funktionals sein muss, können damit insbesondere auch nicht-selbstadjungierte Probleme behandelt werden, welche nicht Eulersche Gleichungen von Variationsproblemen sind.

Da die Theorie der monotonen Operatoren in gewissem Sinne eine Verallgemeinerung der Theorie der nichtsymmetrischen Bilinearformen darstellt, ist es nicht verwunderlich, dass Peter Hess nach seiner Promotion von diesem neuen Gebiet angezogen wurde. Im Herbst 1969 ging er — zuerst als Instructor for Mathematics, später als Nationalfondsstipendiat — für zwei Jahre zu F. Browder an die University of Chicago. Das Nationalfondsstipendium erlaubte ihm nach dieser Zeit den Wechsel an die University of California in Berkeley zu T. Kato, einem weiteren Exponenten der Theorie der monotonen Operatoren in jenen Jahren.

Während seiner Aufenthalte in Chicago und Berkeley beschäftigte er sich intensiv mit der Theorie der monotonen Operatoren. Konkrete Anwendungen auf partielle Differentialgleichungen zeigten bald, dass der Satz von Minty und Browder für viele Anwendungen nicht ausreichte, unter anderem, weil er restriktive Wachstumsbeschränkungen an die Nichtlinearitäten implizierte. Dies führte zu zahlreichen Verallgemeinerungen der abstrakten Theorie und zu Untersuchungen allgemeinerer Klassen von Operatoren. An dieser Entwicklung beteiligte sich Peter Hess mit wichtigen Beiträgen. Insbesondere schuf er eine Theorie von “Operatoren monotonen Typs bezüglich zweier Banachräume” [21], welche ihm erlaubte, nichtlineare elliptische Randwertprobleme mit “starken Nichtlinearitäten” zu behandeln.

Zum Wintersemester 1972 folgte Peter Hess einem Ruf auf ein Extraordinariat an das Mathematische Institut der Universität Zürich, wo er 1978 zum Ordinarius befördert wurde. An seiner neuen Wirkungsstätte entwickelte er eine fruchtbare Lehr- und Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der nichtlinearen Analysis. Als beliebter Lehrer gelang es ihm, die Begeisterung, mit der er selber Mathematik betrieb, an seine Schüler weiterzugeben.

Während der ersten Jahre an der Universität Zürich galt sein wissenschaftliches Interesse in erster Linie der Anwendung der Theorie der monotonen Operatoren auf nichtlineare elliptische Randwertprobleme. Hierbei standen Gleichungen mit starken Nichtlinearitäten und nichtkoerzive Aufgaben im Vordergrund. Später wandte er sich mehr und mehr nichtlinearen elliptischen Eigenwertproblemen zu.

Um die Theorie der monotonen Operatoren auf das (parameterabhängige) nichtlineare Randwertproblem

$$\mathcal{A}u = \lambda f(u) \text{ in } \Omega, \quad u = 0 \text{ auf } \partial\Omega, \quad (7)$$

wobei λ eine positive reelle Zahl ist, anwenden zu können, muss man im wesentlichen voraussetzen, dass f eine fallende Funktion sei. Dann kann die eindeutige Lösbarkeit von (7) garantiert werden. Erfüllt f diese Voraussetzung nicht, ist f zum Beispiel wachsend, so ist bekannt, dass (7) im allgemeinen mehrere Lösungen besitzt. In diesem Fall versagt die Theorie der monotonen Operatoren.

Weitreichende Aussagen über die Lösungsmenge des Problems (7) können — insbesondere auch im nicht-selbstadjungierten Fall — mit Hilfe des Maximumprinzips hergeleitet werden. Dieses Prinzip erweist sich als äusserst flexibles und fruchtbares Hilfsmittel zum Studium “nichtmonotoner” nichtlinearer Eigenwertprobleme der Form (7).

Im Laufe seiner Forschungstätigkeit an der Universität Zürich wandte sich Peter Hess mehr und mehr Problemen zu, in welchen topologische und — insbesondere — auf dem Maximumprinzip beruhende ordnungstheoretische Methoden eine wichtige Rolle spielen. Beim Studium der Existenz und Vielzahl positiver Lösungen von (7) kommt der Linearisierung dieses Problems, welches ein lineares Eigenwertproblem der Form

$$\mathcal{A}u = \lambda mu \quad \text{in } \Omega, \quad u = 0 \quad \text{auf } \partial\Omega \quad (8)$$

darstellt, grosse Bedeutung zu. Insbesondere ist es wichtig zu wissen, dass (8) einen positiven Eigenwert mit einer zugehörigen positiven Eigenfunktion besitzt. Ist die Gewichtsfunktion m positiv, folgt dies aus dem Maximumprinzip und einem abstrakten Theorem von Krein und Rutmann. Wechselt m das Vorzeichen, ist der Satz von Krein und Rutmann nicht mehr direkt anwendbar. Zusammen mit T. Kato gelang es Peter Hess in [55] zu zeigen, dass auch im Falle einer indefiniten Gewichtsfunktion m das Problem (8) einen positiven Eigenwert und eine positive Eigenfunktion besitzt. Dieses “Hess-Kato-Theorem” ist fundamental für das Studium positiver Lösungen des nichtlinearen Eigenwertproblems (7), falls f nicht überall positiv ist.

Den Maximumprinzipien und positiven Lösungen von Randwertproblemen gehörten das wissenschaftliche Interesse von Peter Hess in späteren Jahren. Neben elliptischen Randwertproblemen untersuchte er in zunehmendem Mass “periodisch-parabolische Probleme” der Gestalt

$$\partial_t u + \mathcal{A}(t)u = f(t, u) \quad \text{in } \Omega, \quad u = 0 \quad \text{auf } \partial\Omega, \quad u(\cdot, 0) = u(\cdot, T), \quad (9)$$

wo $\mathcal{A}(t)$ für jedes $t \in \mathbb{R}$ ein elliptischer Operator der Form (2) ist, dessen Koeffizienten, ebenso wie die Nichtlinearität f , in der Zeitvariablen T -periodisch sind. Einerseits handelt es sich bei (9) um ein nicht-selbstadjungiertes Randwertproblem, welches Maximumprinzipentechniken zugänglich ist. Andererseits stellt (9) ein Evolutionsproblem dar und erzeugt ein “diskretes monotonen dynamisches System”. Aus diesem Grund hat er — teilweise in Zusammenarbeit mit N. Dancer und P. Poláčik — die Theorie der diskreten monotonen dynamischen Systeme vorangetrieben, wobei abschliessende Resultate erzielt wurden. Einen grossen Teil seiner Beiträge zur Theorie der periodisch-parabolischen Probleme — die wohl immer mit seinem Namen verbunden sein wird — hat er in der schönen Monographie [86] zusammenfassend dargestellt.

Durch seine rege Forschungstätigkeit hat Peter Hess weit über die Universität Zürich hinaus gewirkt. Er hatte viele Freunde und Kollegen in aller Welt, zu denen er wissenschaftliche Beziehungen unterhielt. Viele von ihnen sind im Laufe der letzten Jahre für kürzere oder längere Aufenthalte nach Zürich gekommen, was wesentlich zum wissenschaftlichen Leben am Mathematischen Institut der Universität beitrug.

Peter Hess leistete zahlreichen Einladungen zur Teilnahme an wissenschaftlichen Konferenzen und zu längeren und kürzeren Forschungsaufenthalten Folge, bei denen er stets einem grösseren Publikum seine neuesten Resultate vorstellen konnte. Darüber hinaus fand er internationale Anerkennung durch seine Wahl in die Herausbergremien mehrerer Fachzeitschriften. Insbesondere gehörte er während einiger Jahre dem Redaktionskomitee der *Commentarii Mathematici Helvetici* an.

Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit war er stets bereit, die weiteren Aufgaben zu übernehmen, welche die vielfältigen Pflichten eines Hochschullehrers mit sich bringen. Dabei hatte er stets das Interesse der Sache im Auge und war bestrebt, auch in schwierigen Situationen gute Lösungen zu finden. Neben seinem Einsatz im Fachbereich Mathematik hat er auch Aufgaben übernommen, die dem Interesse der Wissenschaft im allgemeinen dienen. So nahm er z.B. im Frühjahr 1991 das Amt des Sekretärs der Schweizerischen Mathematischen Gesellschaft an und wurde damit ihr designierter Präsident.

Mit dem tragischen Tod von Peter Hess haben seine engeren Bekannten einen guten Freund und zuverlässigen Kollegen, die Universität Zürich einen engagierten Lehrer und Forscher und die mathematische Gemeinschaft ein aktives und angesehenes Mitglied verloren.

Herbert Amann,
 Mathematisches Institut
 Universität Zürich
 Rämistrasse 74
 CH-8001 Zürich

Publikationsliste von Peter Hess

- 1 Zur Theorie linearer Operatoren eines J -Raumes: Operatoren, die von kanonischen Zerlegungen reduziert werden. *Math. Z.* 106 (1968), 88–96
- 2 Ueber die wesentliche Maximalität gleichmässig stark elliptischer Operatoren in $L^2(\mathbb{R}^n)$. *Math. Z.* 107 (1968), 67–70
- 3 Ueber das verallgemeinerte Dirichletproblem für lineare partielle Differentialgleichungen. *Ann. Acad. Sci. Fenn. A I*, 434 (1969) (28 p.)
- 4 Zur Störungstheorie linearer Operatoren: Relative Beschränktheit und relative Kompaktheit von Operatoren in Banachräumen. *Comment. Math. Helv.* 44 (1969), 245–248
- 5 *R. Beals*: Correction to “Classes of compact operators and eigenvalue distributions for elliptic operators”. Addendum by *P. Hess*, *Amer. J. Math.* 91 (1969), 200–202
- 6 Zur Störungstheorie linearer Operatoren in Banachräumen. *Comment. Math. Helv.* 45 (1970), 229–235
- 7 Über Polynome J -symmetrischer Operatoren in J -Räumen. *Math. Z.* 114 (1970), 271–277
- 8 with *T. Kato*: Perturbation of closed operators and their adjoints. *Comment. Math. Helv.* 45 (1970), 524–529
- 9 A remark on the cosine of linear operators. *Acta Sci. Math. (Szeged)* 32 (1971), 267–269
- 10 A variational approach to a class of nonlinear eigenvalue problems. *Proc. Amer. Math. Soc.* 29 (1971), 272–276
- 11 On nonlinear equations of Hammerstein type in Banach spaces. *Proc. Amer. Math. Soc.* 30 (1971), 308–312
- 12 Nonlinear functional equations and eigenvalue problems in nonseparable Banach spaces. *Comment. Math. Helv.* 46 (1971), 314–323
- 13 Nonlinear functional equations in Banach spaces and homotopy arguments. *Bull. Amer. Math. Soc.* 77 (1971), 211–215
- 14 On a method of singular perturbation type for proving the solvability of nonlinear functional equations in Banach spaces. *Math. Z.* 122 (1971), 355–362
- 15 On the Fredholm alternative for nonlinear functional equations in Banach spaces. *Proc. Amer. Math. Soc.* 33 (1972), 55–61
- 16 A remark on a class of linear monotone operators. *Math. Z.* 125 (1972), 104–106

- 17 with *P.M. Fitzpatrick* and *T. Kato*: Local boundedness of monotone type operators. Proc. Japan Acad. 48 (1972), 275–277
- 18 On nonlinear mappings of monotone type homotopic to odd operators. J. Functional Analysis 11 (1972), 138–167
- 19 with *F.E. Browder*: Nonlinear mappings of monotone type in Banach spaces. J. Functional Analysis 11 (1972), 251–294
- 20 Théorème d'existence pour des perturbations d'opérateurs maximaux monotones. C.R. Acad. Sc. Paris 275 (1972), 1171–1173
- 21 On nonlinear mappings of monotone type with respect to two Banach spaces. J. Math. Pures et Appl. 52 (1973), 13–26
- 22 Variational inequalities for strongly nonlinear elliptic operators. J. Math. Pures et Appl. 52 (1973), 285–297
- 23 A strongly nonlinear elliptic boundary value problem. J. Math. Anal. Appl. 43 (1973), 241–249
- 24 On a unilateral problem associated with elliptic operators. Proc. Amer. Math. Soc. 39 (1973), 94–100
- 25 On some nonlinear elliptic boundary value problems. Proc. Conference on Functional Analysis and its Applications, Madras (India) 1973. Springer Lecture Notes in Math. 399 (1974), 235–247
- 26 On semi-coercive nonlinear problems. Indiana Univ. Math. J. 23 (1974), 645–654
- 27 On a theorem by Landesman and Lazer. Indiana Univ. Math. J. 23 (1974), 827–829
- 28 A homotopy argument for mappings of monotone type in Banach spaces. Math. Ann. 207 (1974), 63–65
- 29 with *J.-P. Gossez*: Sur certains problèmes aux limites elliptiques fortement non linéaires. C.R. Acad. Sc. Paris 278 (1974), 343–345
- 30 Nonlinear perturbations of linear elliptic operators. Proc. Conference on Ordinary and Partial Differential Equations, Dundee (England) 1974. Springer Lecture Notes in Math. 415 (1974), 167–172
- 31 On a class of strongly nonlinear elliptic variational inequalities. Math. Ann. 211 (1974), 289–297
- 32 On the solvability of nonlinear elliptic boundary value problems. Indiana Univ. Math. J. 25 (1976), 461–466
- 33 On strongly nonlinear elliptic problems. Proc. Conference on Functional Analysis, Campinas (Brasil) 1974; M. Dekker Lecture Notes vol. 18 (1976), 91–109
- 34 with *J. Deuel*: Inéquations variationnelles elliptiques non coercives. C.R. Acad. Sc. Paris 279 (1974), 719–722
- 35 with *J. Deuel*: A criterion for the existence of solutions of nonlinear elliptic boundary value problems. Proc. Royal Soc. Edinburgh 74 (1975), 49–54
- 36 Perturbations non linéaires d'opérateurs de Schrödinger. C.R. Acad. Sc. Paris 281 (1975), 369–371
- 37 Problèmes aux limites non linéaires dans des domaines non bornés. C.R. Acad. Sc. Paris 281 (1975), 555–557
- 38 Nonlinear elliptic problems in unbounded domains. Int. summer school on nonlinear operators, Berlin (GDR) 1975. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften der DDR, Abt. Mathematik, IN (1977), 105–110
- 39 with *C.P. Gupta*: Existence theorems for nonlinear noncoercive operator equations and nonlinear elliptic boundary value problems. J. Differential Equations 22 (1976), 305–313
- 40 On a second order nonlinear elliptic boundary value problem. in: Nonlinear analysis, ed. Cesari/Kannan/Weinberger, Academic Press 1978, 99–107
- 41 with *J. Deuel*: Nonlinear parabolic boundary value problems with upper and lower solutions. Israel J. Math. 29 (1978), 92–104
- 42 A remark on the preceding paper of Fučík and Krbeč. Math. Z. 155 (1977), 139–141
- 44 Nonlinear perturbations of linear elliptic and parabolic problems at resonance: existence of multiple solutions. Annali Scuola Norm. Sup. Pisa 5 (1978), 527–537
- 45 On uniqueness of positive solutions of nonlinear elliptic boundary value problems. Math. Z. 154 (1977), 17–18
- 46 with *B. Ruf*: On a superlinear elliptic boundary value problem. Math. Z. 164 (1978), 9–14

- 47 with *S. Fučík*: Nonlinear perturbations of linear operators having nullspace with strong unique continuation property. *Nonlinear Analysis* 3 (1979), 271–277
- 48 Perturbations non linéaires de problèmes linéaires à la résonance: existence de multiples solutions. *Proc. Besançon*, Springer Lecture Notes 665 (1978), 108–120
- 49 Multiple solutions of some asymptotically linear elliptic boundary value problems. *Proc. Equadiff IV, Prag*, Springer Lecture Notes 703 (1979), 145–151
- 50 with *A. Ambrosetti*: Pairs of solutions for some nonlinear elliptic equations. *Boll. U.M.I.* 161 (1979), 588–592
- 51 with *A. Ambrosetti*: Positive solutions of asymptotically linear elliptic eigenvalue problems. I. *Math. Anal. Appl.* 73 (1980), 411–422
- 52 with *H. Amann*: A multiplicity result for a class of elliptic boundary value problems. *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 84 (1979) 145–151
- 53 On a nonlinear elliptic boundary value problem of the Ambrosetti-Prodi type. *Boll. U.M.I.* 17 (1980), 187–192
- 54 On nontrivial solutions of a nonlinear elliptic boundary value problem. *Conferenze del Sem. Mat., Univ. di Bari*, 173 (1980)
- 55 with *T. Kato*: On some linear and nonlinear eigenvalue problems with an indefinite weight function. *Comm. Partial Diff. Equations* 5 (1980), 999–1030
- 56 On bifurcation from infinity for positive solutions of second order elliptic eigenvalue problems. “Nonlinear Phenomena in Mathematical Sciences”, *Acad. Press* 1982, 537–544
- 57 An anti-maximum principle for linear elliptic equations with an indefinite weight function. *J. Differential Equations* 41 (1981) 369–374
- 58 On the eigenvalue problem for weakly coupled elliptic systems. *Arch. Rat. Mech. Anal.* 81 (1983), 151–159
- 59 On multiple positive solutions of nonlinear elliptic eigenvalue problems. *Comm. Partial Diff. Equations* 6 (1981), 951–961
- 60 On bifurcation and stability of positive solutions of nonlinear elliptic eigenvalue problems. *Dynamical Systems II, Proceedings of a University of Florida Int. Symposium on Dynamical Systems*. Academic Press (1982), 103–119
- 61 On the principal eigenvalue of a second order linear elliptic problem with an indefinite weight function. *Math. Z.* 179 (1982), 237–239
- 62 On positive solutions of nonlinear elliptic eigenvalue problems. *Proc. Conference in l’Aquila (Italy)*, June 1981, 167–180
- 63 with *St. Senn*: On positive solutions of a linear elliptic eigenvalue problem with Neumann boundary conditions. *Math. Ann.* 258 (1982), 459–470
- 64 On a class of linear elliptic eigenvalue problems with respect to an indefinite weight function. *Delft Progress Report*, 6 (1981), 244–252
- 65 with *St. Senn*: Another approach to elliptic eigenvalue problems with respect to indefinite weight functions. *Proc. Conference on “Nonlinear Analysis and Optimization”*, Bologna, May 1982, Springer Lecture Notes 1107, 106–114
- 66 with *A. Beltramo*: On the principal eigenvalue of a periodic parabolic operator. *Comm. Partial Diff. Equations* 9. (1984), 919–941
- 67 On positive solutions of semilinear periodic-parabolic problems. *Proc. Conference on “Operator Semigroups and Applications”*, Graz, June 1983. *Lecture Notes in Mathematics*, 1076 (1984), 101–114
- 68 On the relative completeness of the generalized eigenvectors of elliptic eigenvalue problems with indefinite weight functions. *Math. Ann.* 270 (1985), 467–475
- 69 On the asymptotic distribution of eigenvalues of some nonselfadjoint problems. *Bull. London Math. Soc.* 18 (1986), 181–184
- 70 Spatial homogeneity of stable solutions of some periodic-parabolic problems with Neumann boundary conditions. *J. Diff. Equations* 68 (1987), 320–331

- 71 On the spectrum of elliptic operators with respect to indefinite weights. *Linear Algebra Appl.* 84 (1986), 99–109 (Proc. Conference Athens, 1985)
- 72 with *E.N. Dancer*: On stable solutions of quasilinear periodic-parabolic problems. *Annali di Pisa* 14 (1987), 123–141
- 73 An isoperimetric inequality for the principal eigenvalue of a periodic-parabolic problem. *Math. Z.* 194 (1987), 121–125
- 74 with *N.D. Alikakos*: On stabilization of discrete monotone dynamical systems. *Israel J. of Mathematics* 59 (1987), 185–194
- 75 On periodic-parabolic boundary value problems. Proc. Equadiff Conference, Xanthi 1987. Ed. Dafermos, Dekker. *Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics* 118 (1989), 311–317
- 76 On stabilization of discrete strongly order-preserving semigroups and dynamical processes. In “Semigroup Theory and Applications”, Proc. Conference Trieste, 1987. Ed. Clément et al., Dekker. *Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics* 116 (1989), 231–240
- 77 with *N.D. Alikakos* and *H. Matano*: Discrete order preserving semigroups and stability for periodic parabolic differential equations. *J. Diff. Equations* 82 (1989), 322–341
- 78 with *H. Weinberger*: Convergence to spatial-temporal clines in the Fisher equation with time-periodic fitnesses. *J. Math. Biology*, 28 (1990), 83–98
- 79 with *K.J. Brown*: Stability and uniqueness of positive solutions for a semi-linear elliptic boundary value problem. *Differential and Integral Equations* 3 (1990), 201–207
- 80 with *N. Alikakos*: On a singularly perturbed semilinear periodic-parabolic problem. (Unpublished preprint)
- 81 with *E.N. Dancer*: Behaviour of a semilinear periodic-parabolic problem when a parameter is small. Proc. Conference on Functional Analysis and its Applications, Tokyo, 1989. Springer Lecture Notes 1450 (eds. Fujita/Ikebe/Kuroda), 12–19
- 82 with *E.N. Dancer*: Stability of fixed points for order-preserving discrete-time dynamical systems. *J. Reine Angew. Math.* 419 (1991), 125–139
- 83 with *A.C. Lazer*: On an abstract competition model and applications. *Nonlinear Analysis TMA* 16 (1991), 917–940
- 84 with *K.J. Brown*: Positive periodic solutions of predator-prey reaction-diffusion systems. *Nonlinear Analysis* 16 (1991), 1147–1158
- 85 On the asymptotic behaviour of solutions of periodic-parabolic problems. Proceedings Voronezh winter school, 1990
- 86 Periodic-parabolic boundary value problems and positivity. Pitman Research Notes in Mathematics Series. Vol. 247 Longman Scientific & Technical, 1991
- 87 with *N. Alikakos*: Ljapunov operators and stabilization in strongly order preserving dynamical systems. *Differential and Integral Equations* 4 (1991), 15–24
- 88 Asymptotics in semilinear periodic diffusion equations with Dirichlet or Robin boundary conditions. *Arch. Rat. Mech. Anal.* 116 (1991), 91–99
- 89 On the asymptotically periodic Fisher equation. In C. Bandle et al. (eds.): *Progress in Partial Differential Equations: Elliptic and Parabolic Problems*, Pitman Research Notes, vol. 266, 24–33 (1992).
- 90 with *P. Poláčik*: Boundedness of prime periods of stable cycles and convergence to fixed points in discrete monotone dynamical systems. *Siam J. Math. Anal.*, to appear.
- 91 with *E.N. Dancer*: Stable subharmonic solutions in periodic reaction-diffusion equations. *Journal Diff. Equations*, to appear.
- 92 with *E.N. Dancer*: The symmetry of positive solutions of periodic-parabolic problems. In A. Lazar and J. McKenna (eds.): *Nonlinear Oscillations*, to appear.
- 93 with *P. Poláčik*: Symmetry and convergence properties for nonnegative solutions of nonautonomous reaction-diffusion problems. (Submitted to Proc. Roy. Soc. Edinburgh)