

**Zeitschrift:** Elemente der Mathematik  
**Herausgeber:** Schweizerische Mathematische Gesellschaft  
**Band:** 74 (2019)  
**Heft:** 2

**Artikel:** Les problèmes de Fermat et Lemoine  
**Autor:** Sigrist, François  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-869234>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 14.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

---

---

## Short note Les problèmes de Fermat et Lemoine

---

---

François Sigrist

### 1 Le problème de Fermat


Il s'agit ici d'un problème posé par Fermat, peu connu, mais qui offre de spectaculaires développements dans la géométrie plane, une discipline souvent abandonnée par manque d'intérêt (Cf Dieudonné : A bas Euclide ! Mort aux triangles !).

Trouver, dans un triangle  $ABC$ , le point  $F$  qui minimise  $FA + FB + FC$ , la somme des distances aux sommets. Pour un ingénieur, cela consiste à construire le réseau routier de longueur minimale entre trois villes. Pour que le problème soit réaliste, il faut supposer que les angles du triangle sont inférieurs à  $120^\circ$ .

La solution expérimentale (image de gauche) fait appel aux lois de la mécanique, et le calcul différentiel donne la solution théorique :

Le gradient de la distance à un point est un vecteur-unité (la dérivée directionnelle est 1). Pour que la somme des trois distances soit minimale, il est nécessaire de trouver trois vecteurs-unité de somme nulle. Il est alors presque immédiat de montrer qu'il n'y a qu'une seule configuration : trois vecteurs formant des angles de  $120^\circ$  entre eux.


Le point de Fermat est donc celui d'où l'on voit les trois côtés du triangle sous un angle de  $120^\circ$  degrés.



Pour construire le point  $F$ , il suffit donc de tracer les trois *arcs capables* de  $120^\circ$  : points d'où l'on voit les côtés sous un angle de 120 degrés. La construction est élémentaire et est basée sur le *théorème de l'angle inscrit*.

## 2 Le problème de Fermat revisité

Voici le même dessin que précédemment où l'on a simplement complété les ingrédients nécessaires à la construction des arcs capables, et ajouté les triangles équilatéraux sur chaque côté du triangle  $ABC$ .



Les deux observations suivantes :

- Les angles  $CFA'$  et  $CBA'$  sont égaux ( $60^\circ$ ) (théorème de l'angle inscrit)
- Les triangles  $A'CA$  et  $BCB'$  sont égaux (rotation de  $60^\circ$ )

permettent de tirer une impressionnante cascade de conséquences :

- Tous les angles en  $F$  valent  $60^\circ$ .
- Les points  $A'FA$ ,  $B'FB$  et  $C'FC$  sont alignés. Conséquence : Pour construire le point de Fermat, il suffit de dessiner les trois triangles équilatéraux.
- Les longueurs  $AA'$ ,  $BB'$ ,  $CC'$  sont égales.
- Le triangle formé par les centres des cercles est équilatéral (il a trois angles de  $60^\circ$  !)

Pour relier la longueur  $AA'$  au triangle de départ, il reste à montrer que la longueur  $FA'$  est égale à  $FB + FC$ , montrant ainsi que les trois longueurs égales  $AA'$ ,  $BB'$ , et  $CC'$  sont égales à  $FA + FB + FC$  (longueur du réseau routier !). Ceci s'obtient grâce au petit lemme de Ptolémée, que nous démontrerons au paragraphe suivant.

La propriété du triangle des centres est connue sous le nom de *Théorème de Napoléon*. Il n'est pas certain que Napoléon l'ait démontré, mais le contexte historique montre que Napoléon n'était pas étranger au résultat.

Tout d'abord, Napoléon connaissait d'assez près les mathématiciens prestigieux de l'époque (Poncelet, Fourier, Monge, Lagrange, ...). On a ensuite (malheureusement sans autre commentaire) une citation dans un journal italien de 1911, disant que Napoléon aurait parlé du problème à Lagrange.


D'après Henri Lebesgue, Lagrange lui aurait dit : «Mon Général, nous nous attendions à tout de vous, sauf à des leçons de géométrie».

On sait par ailleurs qu'à Ste-Hélène, Napoléon aurait donné des leçons de mathématiques aux enfants de Las Cases.

### 3 Le petit lemme de Ptolémée

Reprenons le quadrilatère  $A'CFB$ , auquel on ajoute la parallèle par  $C$  à  $A'F$ , obtenant ainsi encore les points  $G$  et  $D$ . Il est presque immédiat de constater que tous les angles marqués sur la figure valent 60 degrés (symétrie ou théorème de l'angle inscrit). Les triangles  $A'GD$  et  $FBD$  sont donc équilatéraux, et on en déduit que  $FA' = FD + DA' = FB + DG = FB + FC$ , comme prévu.

Remarque : Le lemme de Ptolémée lui-même est une version plus générale : Si un quadrilatère est inscrit dans un cercle, le produit des diagonales est égal à la somme des produits des côtés opposés. Voir [2] pour une élégante démonstration.




### 4 Le problème de Lemoine

Ce problème est en quelque sorte la réciproque de problème de Fermat : reconstituer le triangle  $ABC$  à partir du triangle  $A'B'C'$ . La solution est spectaculaire, il suffit d'itérer la construction du point de Fermat, en l'appliquant au triangle  $A'B'C'$ . L'image en haut de la page suivante donne la solution.


Comme tous les angles en  $F$  sont égaux à  $60^\circ$ , le point  $F$  est point de Fermat commun aux trois triangles  $ABC$ ,  $A'B'C'$  et  $A''B''C''$ . Pour retrouver le triangle  $ABC$ , il suffit donc de localiser les sommets  $A$ ,  $B$ , et  $C$  sur les droites  $A'A''$ , resp.  $B'B''$ , resp.  $C'C''$ . Le résultat, spectaculaire, est à nouveau donné par le petit lemme de Ptolémée :

$$\begin{aligned} FA'' &= FB' + FC' = (FA + FC) + (FA + FB) \\ FB'' &= FA' + FC' = (FB + FC) + (FA + FB) \\ FC'' &= FA' + FB' = (FB + FC) + (FA + FC) \\ FA'' + FB'' + FC'' &= B'B'' = 2(FA + FB + FC) = 2B'B \end{aligned}$$

L'extraordinaire résultat est donc que les points  $A$ ,  $B$ , et  $C$  sont les milieux de  $A'A''$ ,  $B'B''$ ,  $C'C''$ .



## 5 Remarques finales



Pour les puristes de la géométrie, voici une solution du problème de Fermat ne nécessitant ni calcul différentiel, ni lemme de Ptolémée. Voir [1].

Le croquis parle de lui-même : pour tout point  $P$  du triangle  $ABC$ , la somme  $PA + PB + PC$  peut se représenter par une ligne brisée de  $A$  à  $A'$ . C'est donc la ligne droite  $AA'$  qui contient le point de Fermat.

On doit à Kiepert une solution détaillée du problème de Lemoine [3, 4], suivie de plusieurs articles sur une généralisation du problème de Fermat.

## Références

- [1] Coxeter, H.S.M., Introduction to geometry, John Wiley & Sons (1961)
- [2] Paunić, D., Wanner, G., On the proof of Ptolemy's lemma, *El. Math.* **72** (2017)
- [3] Lemoine, É, "Question 864", *Nouv. Ann. Math.*, **7** (1868)
- [4] Kiepert, L., "Solution de Question 864", *Nouv. Ann. Math.* **8** (1869)