Zeitschrift: Eclogae Geologicae Helvetiae

Herausgeber: Schweizerische Geologische Gesellschaft

Band: 8 (1903-1905)

Heft: 6

Artikel: IVe partie, Stratographie et paléontologie

Autor: [s.n.]
Kapitel: Trias

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-156303

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 11.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

IVe PARTIE — STRATIGRAPHIE ET PALÉONTOLOGIE

CARBONIFÉRIEN

Le service géologique italien a fait entreprendre une étude d'ensemble sur les gisements de charbon inclus dans les dépôts carbonifériens des Alpes occidentales. Une partie importante du travail, élaborée par MM. S. Franchi et A. Stella (77) est consacrée spécialement au Carboniférien de la région de la Vallée d'Aoste et du Col de Fenêtre. Je ne puis du reste pas entrer dans le détail de cette publication, qui ne se rapporte qu'indirectement à notre pays.

TRIAS

Dans la IIIº partie de cette Revue j'ai résumé déjà une série de données d'ordre stratigraphique fournies par différents auteurs. Je me contente donc de rappeler ici que M. A. v. Bistram a établi le profil exact des dépôts triasiques dans les environs du lac de Lugano (voir p. 636), que M. W. Schiller a décrit le Trias austro-alpin des Alpes calcaires à l'E de la vallée de l'Inn (voir p. 641), que M. W. Paulke a défini les caractères des lambeaux de recouvrement triasiques, qui chevauchent sur les schistes de la Basse-Engadine (voir p. 648). Quelques renseignements concernant la stratigraphie du Trias se trouve dans l'étude de M. L. Collet sur la chaîne de la Tour Saillère (voir p. 652), dans celle de M. G. Ræssinger sur la région de Lauenen (voir p. 673) et dans celle M. Fr. Jaccard sur la Brèche de la Hornfluh (voir p. 677).

En ce qui concerne le Jura, le seul travail d'ordre stratigraphique qui soit consacré au Trias est l'étude de la flore keuperienne de la Neuewelt dont M. F. Leuthardt (82) vient de publier la II^e partie. Les espèces envisagées spécialement se répartissent comme suit:

Filicinées:

Famille des Dictyoptéridées: Clathropteris reticulata Kurr, Camptopteris serrata Kurr.

Famille des Tæniopteridées: Tæniopt. angustifolia Schenck:

Famille des Marattiacées: Danæopsis marantacea Presl.,

Asterocarpus Meriani Brongn.

Famille des Pécoptéridées: Merianopteris augusta Heer, Pecopt. Rütimeyeri Heer, Pecopt. latespinnata nov. sp., Pec. Steinmülleri Heer, Pec. reticulata nov. sp., Bernouilla helvetica Heer.

Famille des Gleicheniacées: Gleich. gracilis Heer.

Equisetinées:

Equisetum arenaceum Jæger, Eq. platyodon Brong., Schi-

zoneura paradoxa Schimper.

Pecopteris latespinnata est une espèce nouvelle voisine de Pec. Rütimeyeri, mais avec des segments plus espacés, arrondis à l'extrémité et pourvus d'une nervature plus simple.

Pecopteris reticulata, également nouvelle, se rapproche

plus spécialement des Lonchopteris de Brongniart.

JURASSIQUE

Alpes. — Je rappelle ici la partie de l'étude de M. W. Paulke (voir p. 648) sur la Basse-Engadine, qui se rapporte à la stratigraphie du Jurassique et qui montre en particulier l'âge crétacique et tertiaire du complexe schisteux assimilé par la plupart des auteurs aux Schistes lustrés.

Dans son étude générale du massif de la Tour Saillère-Pic de Tanneverge, M. L. Collet a repris en détail l'examen des

terrains jurassiques (voir p. 652).

En outre il a consacré un chapitre spécial à l'étude de quelques espèces d'ammonites récoltées dans les schistes argileux de l'Oxfordien inférieur. Les formes envisagées ici sont: Hecticoceras delmontanum Opp., Hecticoceras svevum Bonar. et deux espèces nouvelles: 1 Oppelia voisine de Opp. Richei de Lor., et Oppelia glabra nov. sp. voisine de Opp. trimarginata.

La notice récente que M. M. Lugeon a consacrée à la région comprise entre le Sanetsch et la Kander dans les Hautes Alpes calcaires et qui est résumée dans son entier plus haut (voir p. 656) a apporté une contribution très importante à nos connaissances sur les terrains jurassiques de ce territoire.

Dans les régions préalpines, M. G. Rœssinger a cherché à préciser les caractères stratigraphiques très peu clairs du Jurassique compris dans les différentes écailles laminées de