

Zeitschrift:	Eclogae Geologicae Helvetiae
Herausgeber:	Schweizerische Geologische Gesellschaft
Band:	63 (1970)
Heft:	2
Artikel:	Mikropaläontologische und stratigraphische Untersuchungen der obereozänen-oligozänen Scaglia im zentralen Appenin (Italien)
Autor:	Baumann, Paul
Kapitel:	Zusammenfassung = Summary = Riassunto
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-163879

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 20.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Mikropaläontologische und stratigraphische Untersuchungen der obereozänen-oligozänen Scaglia im zentralen Apennin (Italien)

von PAUL BAUMANN (Zürich)¹⁾

INHALTSVERZEICHNIS

Zusammenfassung, Summary, Riassunto	1133
Vorwort	1136
Einleitung	1137
I. Geologischer Teil	1141
1. Geologische Übersicht	1141
2. Die Ausbildung des Obereozäns und Oligozäns im Untersuchungsgebiet	1144
3. Historischer Überblick der Scaglia cinerea	1147
4. Profilbeschreibung	1148
Monte Cagnero	1148
Gola del Bottaccione	1153
Scalette	1156
Massignano (Ancona)	1158
Assisi	1161
Visso	1164
Restliche Profile	1167
II. Biostratigraphischer Teil	1172
1. Planktonische Foraminiferen	1172
Biozonen	1172
Datumsflächen	1179
2. Nannoplankton	1181
Biozonen	1181
Datumsflächen	1181
III. Systematik	1182
1. Planktonische Foraminiferen	1182
2. Nannoplankton	1198
Literaturverzeichnis	1204
Tafeln	I-VII

ZUSAMMENFASSUNG

Aus dem umbrisch-markesanischen Apennin (Zentralapennin) werden planktonische Foraminiferen und Nannoplankton aus Sedimentabfolgen beschrieben, die ohne Unterbruch und Fazieswechsel vom Eozän ins Oligozän reichen.

In diesen Profilen wird die stratigraphische Verbreitung der planktonischen Foraminiferen (Fig. 26) und des Nannoplanktons (Fig. 14) und ihre Verwendbarkeit für eine Zonengliederung untersucht. 14 Zonen, die zusammenhängend vom oberen Untereozän bis an die Basis des Miozäns reichen, werden zum Teil besprochen und mit anderen bekannten Zonenabfolgen verglichen.

In einem systematischen Teil werden die planktonischen Foraminiferen- und Nannoplanktonarten beschrieben.

¹⁾ Geologisches Institut der ETH, Sonneggstrasse 5, 8006 Zürich.
zur Zeit: I. F. P. Djakarta, Indonesia

SUMMARY

Planktonic foraminifera and calcareous nannoplankton are described from the upper Eocene and Oligocene of the Umbrian-Marche Apennines (Italy). There this interval is developed in a continuous, pelagic facies.

Such continuous sections are in the upper Eocene-Oligocene rare throughout the world, because facies changes and stratigraphic gaps, or both, occur frequently at the Eocene/Oligocene boundary. This has affected the biostratigraphic subdivision of this interval in papers by SUBBOTINA (1953), BOLLI (1957), BLOW & BANNER (1962).

The sequences in the Central Apennines of Italy are an exception to this and thus particularly suitable for a biostratigraphic study of planktonic foraminifera and nannoplankton. The upper Eocene-Oligocene "Scaglia cinerea" Formation, which is the uppermost part of the Scaglia complex, consists there of 80–250 m of gray calcareous shales. To the South of this area lies the shelf platform of the Abruzzian mountains with thick neritic limestone sequences. This shelf was the source of organo-clastic material transported by turbidity currents into the deep basin to the N and present in the southernmost sections investigated here. RENZ (1936), who studied the stratigraphy and micro-paleontology of the Scaglia in the Central Apennines in detail, distinguished from N to S the following types of paleogeographic facies:

1. North Umbrian facies: pelagic, deepest part of the basin.
2. South Umbrian facies: pelagic, deposits interbedded with turbidites.
3. Abruzzian facies: neritic limestones, shelf region.

Later, LUTERBACHER (1964) investigated the Globorotalia species of the Paleocene-lower Eocene part of the Scaglia in this region. The present paper supplements the earlier micropaleontological studies of the Scaglia in that it covers its middle Eocene to Oligocene part. Eighteen sections were sampled of which six are described in detail. Fourteen planktonic foraminiferal zones are established for the middle Eocene to lower Miocene (Fig. 1). Most of these can also be found outside the Central Apennines but some are of a more local significance, such as the *Globigerina angiporoides angiporoides* Zone and the *Globigerina euapertura* Zone. The proposed zonal scheme is compared in Fig. 25 with those of other authors. The Eocene/Oligocene boundary is defined in this paper by the last occurrence of the genus *Hantkenina*. It lies between the *Globorotalia cerroazulensis* Zone and the *Globigerina gortanii* *gortanii* Zone.

The nannoplankton was studied in the Scalette section by the author, in the Monte Cagnero section by ROTH (in BAUMANN & ROTH, 1969) and in the Assisi section by VERA BERTOLINO (manuscript).

63 planktonic foraminifera and 27 nannoplankton species, none of them new, are described and most of them illustrated.

RIASSUNTO

Il presente lavoro riguarda lo studio dei Foraminiferi planctonici e del Nannoplancton – e la loro distribuzione stratigrafica – rinvenuti in serie pelagiche continue e complete, di età compresa tra l'Eocene e l'Oligocene, provenienti dall'Appennino umbromarchigiano.

Il limite Eocene-Oligocene è generalmente caratterizzato da variazioni di facies o da lacune nella sedimentazione, o da entrambi i fenomeni contemporaneamente. È facilmente intuibile che gli studi biostratigrafici riguardanti questo periodo risentano di queste complicazioni, come risulta chiaramente dai lavori fondamentali di SUBBOTINA (1953), BOLLI (1957), BLOW & BANNER (1962).

A dimostrazione della rarità di sequenze continue e complete di questa età, nella parte introduttiva viene fatta una breve rassegna delle serie studiate in altre regioni dell'Europa, in Africa, negli Stati Uniti meridionali e nella regione caraibica.

Particolarmente favorevole invece, per lo studio delle successioni sia a Foraminiferi planctonici sia a Nannoplancton in questo intervallo di tempo, si è rilevata la regione appenninica umbromarchigiana dove la sedimentazione è rimasta constantemente di natura pelagica, quindi senza cambiamenti di facies, e soprattutto continua, senza alcuna interruzione nella sedimentazione.

Dal punto di vista litologico, i sedimenti considerati sono costituiti da marne calcaree grigie, o Scaglia cinerea, di spessore variabile tra 80 e 200 m, a cui è stratigraficamente sovrapposta un'alternanza di calcaro e marne calcaree, o Bisciaro, databili al Miocene inferiore.

AGE	BIO ZONE	DEFINITION OF ZONE
Mioz.		
Olig.	<i>Globorotalia kugleri</i>	Interval with zonal marker, from its first occurrence to first occurrence of <i>Globigerinoides</i>
	<i>Globigerina ciperoensis ciperoensis</i>	Interval with zonal marker, from last occurrence of <i>Globorotalia opima opima</i> to first occurrence of <i>Globorotalia kugleri</i>
	<i>Globorotalia opima opima</i>	Interval with zonal marker, from first occurrence of <i>Globigerina ciperoensis angulisuturalis</i> to last occurrence of zonal marker
	<i>Globigerina euapertura</i>	Interval with zonal marker, from first occurrence of <i>Globigerina ciperoensis ciperoensis</i> to first occurrence of <i>G. ciperoensis angulisuturalis</i>
	<i>Globigerina angiporoides angiporoides</i>	Interval with zonal marker, from first occurrence of <i>Globorotalia opima opima</i> to first occurrence of <i>Globigerina ciperoensis ciperoensis</i>
	<i>Globigerina sellii</i>	Interval with zonal marker, from its first occurrence to first occurrence of <i>Globorotalia opima opima</i>
	<i>Globigerina gortanii gortanii</i>	Interval from last occurrence of <i>Hantkenina</i> to first occurrence of <i>Globigerina sellii</i>
U. Eoc.	<i>Globorotalia cerroazulensis</i>	Interval from last occurrence of <i>Globigerapsis mexicana</i> to last occurrence of <i>Hantkenina</i>
	<i>Globigerapsis mexicana</i>	Range of zonal marker
M. Eoc.	<i>Truncorotaloides rohri</i>	Interval with zonal marker, from last occurrence of <i>Orbulinoides beckmanni</i> to first occurrence of <i>Globigerapsis mexicana</i>
	<i>Orbulinoides beckmanni</i>	Range of zonal marker
	<i>Globorotalia centralis</i>	Interval with zonal marker, from its first occurrence to first occurrence of <i>Orbulinoides beckmanni</i>
	<i>Globigerapsis subconglobata</i>	Interval with zonal marker, from its first occurrence to first occurrence of <i>Globorotalia centralis</i>
	<i>Hantkenina aragonensis</i>	Interval with zonal marker, from its first occurrence to first occurrence of <i>Globigerapsis subconglobata</i>
L. Eoc.	<i>Globorotalia pentacamerata</i>	

Fig. 1.

Verso sud, i sedimenti pelagici vengono a contatto con le potenti serie calcaree neritiche della regione abruzzese, donde provengono i materiali clastici prevalentemente organogeni, che talvolta si intercalano nella serie pelagica: correnti di torbida ne avrebbero causato il trasporto nelle zone più profonde del bacino, ossia verso nord.

RENZ (1919-36), che precedentemente studiò questa regione sia da un punto di vista stratigrafico che micropaleontologico, distinse infatti tre zone caratterizzate da differenti condizioni di sedimentazione (Fig. 3):

1. facies umbro-settentrionale, pelagica, lungo l'asse del bacino;
2. facies umbro-meridionale, pelagica con intercalazioni di materiali clastici, provenienti dalla zona neritica;
3. facies abruzzese, neritica.

A tale fondamentale studio, LUTERBACHER (1964) fece seguito con un contributo sulla successione delle Globorotalie rinvenute nella parte paleocenica-eocenica inferiore della Scaglia umbro-marchigiana, del quale contributo il presente studio, in particolare, può essere considerato la continuazione per la parte più recente, ovvero per l'intervallo Eocene medio-Oligocene.

Le sezioni studiate sono 18, di cui sei vengono discusse in modo approfondito.

Sulla base della distribuzione verticale dei Foraminiferi planctonici in esse contenuti, è stato possibile riconoscere 14 zone, di età compresa tra l'Eocene medio-Miocene inferiore (Fig. 1), gran parte delle quali sono rinvenibili anche fuori della regione appenninica; alcune hanno invece carattere più locale come la zona a *Globigerina angiporoides angiporoides* e quella a *Globigerina euapertura*.

Nello schema di Fig. 25, la successione delle zone a Foraminiferi planctonici qui utilizzata viene correlata con quelle già note da altre località.

Il limite Eocene-Oligocene viene definito, in questo lavoro, con la presenza delle ultime forme di Hantkenina, si trova quindi tra le zone di *Globorotalia cerroazulensis* e *Globigerina gortanii*. La transizione dall'Eocene all'Oligocene avviene nella serie uniforme di calcari marnosi della Scaglia cinerea senza alcun cambiamento di fazies (Fig. 4).

Lo studio del Nannoplancton è stato limitato alla sezione di Scalette, ma due altre sezioni, e precisamente Monte Cagnero ed Assisi, sono state oggetto di studio da parte di due altri autori (ROTH in BAUMANN & ROTH (1969) e BERTOLINO (in stampa)), i cui risultati vengono qui tenuti presenti.

63 specie e sottospecie di Foraminiferi planctonici e 27 forme di Nannoplancton, tutte già note dalla letteratura, sono discusse nella parte sistematica.

Vorwort

Die vorliegende Arbeit ist auf Anregung meines verehrten Lehrers Herrn Prof. Dr. H. M. BOLLI, entstanden. Ihm schulde ich grossen Dank für das rege Interesse, das er meinen Untersuchungen entgegenbrachte.

Die Feldaufnahmen wurden im Herbst 1967 begonnen und im Frühjahr 1969 abgeschlossen. Die Auswertung derselben geschah am geologischen Institut der ETH in Zürich, wo auch das Belegmaterial deponiert wurde. Die abgebildeten Hypotypen der planktonischen Foraminiferen befinden sich im Naturhistorischen Museum Basel unter den Nummern C 26 425-C 26 488.

Viele haben zu meinen Untersuchungen beigetragen. Herrn Dr. J. P. BECKMANN möchte ich für die wertvollen Ratschläge hinsichtlich der Zonierung und Taxonomie, die gründliche Durchsicht des Manuskriptes und das Bestimmen der Grossforaminiferen recht herzlich danken. Den Herren Prof. Dr. R. TRÜMPY und Dr. H. P. LUTERBACHER verdanke ich wertvolle Ratschläge zur Auffassung meines Manuskriptes. Die Herren Prof. Dr. F. ALLEMANN und PD Dr. R. HERB führten mich ins Untersuchungsgebiet ein. Frau Prof. CAMILLA PIRINI und Frau Prof. Dr. MARIA BIANCA CITA gaben mir wertvolle Hinweise hinsichtlich günstiger Profile im Zentralapennin. Fräulein Dr. ISABELLA PREMOLI SILVA und Herr P. SÜSSLI übersetzten die italienische Zusam-