Zeitschrift: Eclogae Geologicae Helvetiae

Herausgeber: Schweizerische Geologische Gesellschaft

Band: 70 (1977)

Heft: 3

Artikel: Description du nouveau genre Krassavinella (Charophytes, Characeae)

et répartitionde K. lagenalis (Straub) dans l'Oligocène supérieur de la

molasse suisse

Autor: Feist-Castel, Monique

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-164641

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Description du nouveau genre *Krassavinella* (Charophytes, Characeae) et répartition de *K. lagenalis* (STRAUB) dans l'Oligocène supérieur de la molasse suisse

Par Monique Feist-Castel¹)

RÉSUMÉ

Le nouveau genre Krassavinella, qui groupe deux espèces, K. lagenalis (STRAUB) et K. blayaci FEIST, s'étend de la base de l'Oligocène moyen (Stampien inférieur) au Miocène supérieur (Tortonien). Il est établi que K. lagenalis figure dès l'Oligocène supérieur.

Introduction

Parmi les quatre espèces créées par STRAUB (1952), qui les attribuait globalement au genre *Chara*, figure *C. lagenalis*. L'étude d'un abondant matériel nouveau, provenant des récoltes du D^r D. Kissling dans l'Oligocène supérieur de la molasse suisse, montre que cette espèce ne peut s'intégrer dans les nouvelles unités créées avec le développement de la systématique depuis une vingtaine d'années; elle ne peut non plus être rattachée à *Chara* et *Tectochara*, auxquels elle a été successivement attribuée, ces genres ayant acquis, dans leur conception actuelle (GRAMBAST 1962), une signification nettement plus précise que celle accordée par STRAUB (1952) et MÄDLER (1955).

Il semble donc justifié de créer un nouveau genre, Krassavinella, dont K. lagenalis est l'espèce-type et qui inclut, dans l'état actuel des connaissances, une deuxième espèce, K. blayaci, figurant dans l'Oligocène d'Aquitaine (SW de la France). Le nouveau genre est dédié au D^r L. K. Krassavina, en hommage à ses travaux sur les Charophytes.

Etude descriptive

Embranchement Charophyta

Famille Characeae RICHARD 1815

Genre Krassavinella nov. gen.

Diagnose. - Gyrogonite de dimensions généralement peu élevées, dont la base est typiquement étirée en une colonne distincte. Sommet obtus, arrondi ou étiré en

¹) Laboratoire de Paléobotanique et évolution des végétaux, Equipe de Recherche associée au C.N.R.S., Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Place E. Bataillon, 34060 Montpellier, France.

772 M. Feist-Castel

pointe, nodules apicaux non ou faiblement développés. Région périapicale montrant un amincissement variable des cellules, sans diminution marquée de leur largeur. Gyrogonites le plus souvent dépourvues d'ornementation. Plaque basale très mince.

Espèce-type. - Krassavinella lagenalis (STRAUB).

Rapports et différences. – Parmi les genres connus, c'est de Microchara Grambast que se rapprocherait le plus Krassavinella; les deux genres ont en effet en commun les caractères du sommet, peu différencié, la plaque basale, extrêmement mince, la taille peu élevée. Le nouveau genre s'en éloigne toutefois par les particularités de son sommet, dont le centre est généralement bombé, la présence d'une colonne basale et, semble-t-il, l'absence d'ornementation. Microchara tigellaris FEIST-CASTEL, qui présente un prolongement basal comparable à la colonne de Krassavinella, se distingue en effet par la présence de tubercules, non encore observés chez ce dernier. D'autre part, bien que ses dimensions soient peu élevées, les longueurs restant comprises entre 450 et 700 μ , la taille de Krassavinella est toutefois supérieure à celle des Microchara, qui n'excède pas 500 μ . Enfin, leur répartition éloigne encore Microchara, connu du Crétacé supérieur au Lutétien (Grambast 1959, 1971) et Krassavinella, nettement plus récent puisqu'il s'étend de la base de l'Oligocène moyen, avec K. blayaci FEIST (FEIST & RINGEADE, sous presse), jusqu'au Tortonien, où persiste K. lagenalis.

Krassavinella lagenalis (STRAUB) n. comb.

Planche

- 1952 Chara lagenalis STRAUB, p. 471, pl. A, fig. 6-7.
- 1955 Tectochara conica var. lagenalis, MÄDLER, p. 294, pl. 26, fig. 12.
- 1961 Chara lagenalis, WANG, pl. 5, fig. 6

Description. – Gyrogonite ovoïde à ellipsoïde, apex arrondi ou faiblement étiré en pointe, région basale prolongée par une colonne saillante. Cellules spiralées concaves, lisses; sutures simples, en relief. Région périapicale non différenciée, ou faiblement amincie; extrémités apicales des cellules redressées au centre de l'apex; dans certains cas, présence d'épaississements apicaux ne constituant toutefois pas de véritables nodules. Extrémités basales des cellules délimitant un entonnoir largement ouvert, entourant le pore basal. Dimensions: $400-525 \mu$ de long, sur $325-400 \mu$ de large. Rapport longueur/largeur variant de 1,1 à 1,5. 7-9 tours de spire visibles latéralement, hauts de 50 à 70μ .

Remarque. - Chez K. lagenalis, la plaque basale n'a pu encore être isolée, alors qu'elle l'est aisément chez K. blayaci, où elle s'est révélée extrêmement mince. Ces difficultés d'observation semblent bien indiquer qu'il doit en être de même chez K. lagenalis, la plaque ne pouvant être que faiblement calcifiée.

Attribution générique et affinités. – Par l'ensemble de ses caractères, forme générale, particularités du sommet et de la base, l'espèce étudiée s'éloigne incontestablement des genres Chara et Tectochara auxquels elle a été attribuée avec les premiers essais de systématique des Characées. Son sommet peu différencié, la

région basale étirée en une colonne saillante, la taille réduite et l'absence d'ornementation conduisent à la rattacher au genre *Krassavinella*, dont elle est l'espèce la plus anciennement décrite.

En ce qui concerne les rapports taxonomiques de K. lagenalis et de T. conica, si l'on se réfère au principe de priorité de publication, l'espèce de STRAUB (1952) ne peut être traitée comme variété de l'espèce conica MÄDLER 1955. D'autre part, ces deux formes se distinguent nettement de par leurs caractères morphologiques et ne peuvent être confondues en une seule et même espèce. Il semble donc justifié de considérer comme distincte l'espèce conica MÄDLER, que HORN AF RANTZIEN (1959) attribue au genre Grambastichara, en excluant la «variété» lagenalis.

Répartition. – K. lagenalis n'était connue, par les travaux de STRAUB (1952) et de MÄDLER (1955), que du Tortonien du sud de l'Allemagne. Or elle figure déjà à l'Oligocène supérieur, notamment dans celui de l'extrémité occidentale suisse d'où provient le matériel ici étudié. Son extension verticale est donc beaucoup plus vaste qu'elle n'apparaissait précédemment. Quant à sa répartition géographique, elle paraît assez restreinte puisqu'elle est limitée, selon les données actuelles, aux deux régions voisines citées.

Matériel présent. – 200 échantillons, récoltés par le D^r D. Kissling dans divers gisements des formations d'âge Oligocène supérieur de la Suisse occidentale. Des plus anciens aux plus récents, ces gisements se répartissent de la façon suivante; les noms des localités et des formations sont extraits des coupes de référence données par KISSLING (1974).

- 1. Morges, versant E de la vallée de même nom, 300 m à l'E de Chigny. Formation: Marnes bariolées.
- 2. Valeyres-sur-Rance, versant E de la vallée d'un affluent de la Vua, 600 m au NW de Valeyres. Formation: Marnes bariolées et Calcaires d'eau douce.
- 3. Essertines-sur-Yverdon, versant W de la vallée du Buron, 500 m à l'W d'Essertines. Formation: Calcaires d'eau douce et dolomie.
- 4. Morges, versant W de la vallée de même nom, 600 m au N de Chigny. Formation: Grès et marnes gris à gypse.
- 5. Boudry (La Fabrique), versant W de la vallée de l'Areuse, 600 m au NW de Boudry. Formation: Grès et marnes gris à gypse.
- 6. Essertines-sur-Yverdon, versant E de la vallée du Buron, 900 m au NNE d'Essertines. Formation: Grès et marnes gris à gypse.

BIBLIOGRAPHIE

- Feist, M., & Ringeade, M. (sous presse): Etude biostratigraphique et paléobotanique (Charophytes) des formations continentales d'Aquitaine, de l'Eocène supérieur au Miocène inférieur. Bull. Soc. géol. France
- GRAMBAST, L. (1959): Extension chronologique des genres chez les Charoideae. Edit. Technip.
- (1962): Classification de l'embranchement des Charophytes. Naturalia Monspeliensia, Bot. 14, 63-86.
- (1971): Remarques phylogénétiques et biochronologiques sur les Septorella du Crétacé terminal de Provence et les Charophytes associées. - Paléobiol. cont. (2) 2, Montpellier.

- HORN AF RANTZIEN, H. (1959): Morphological types and organ genera of Tertiary Charophyte fructifications. Stockholm Contr. Geol. 4, 45-197.
- KISSLING D, (1974): L'Oligocène de l'extrémité occidentale du bassin molassique suisse. Stratigraphie et aperçu sédimentologique. Thèse, nº 1648, Genève.
- MÄDLER, K. (1955): Zur Taxionomie der tertiären Charophyten. Geol. Jb. 70, 265-328.
- STRAUB, W. (1952): Mikropaläontologische Untersuchungen im Tertiär zwischen Ehingen und Ulm a.d. Donau. Geol. Jb. 66, 433-524.
- WANG, S. (1961): Tertiary Charophyta from Chaidamu (Tsaidam) Basin, Qinghai (Chingai) Province. Acta paleont. sinica (9), 3, 183-219.

Planche

Krassavinella lagenalis (STRAUB), Oligocène supérieur du Vaud (Suisse), × 100.

Fig. 1-4	Profils. 1, 2: Morges; 3, 4: Valeyres-sur-Rance.

Fig. 5 Sommet. Essertines-sur-Yverdon.

Fig. 6 Base. Valeyres-sur-Rance.

