

Zeitschrift: Eclogae Geologicae Helvetiae
Herausgeber: Schweizerische Geologische Gesellschaft
Band: 82 (1989)
Heft: 2

Artikel: L'autochtérie en pays de nappes : réponse à G. Fuchs
Autor: Baud, Aymon
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-166397>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 28.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

L'autochtonie en pays de nappes: réponse à G. Fuchs

Par AYMON BAUD¹⁾

RÉSUMÉ

A partir de l'examen de quatre régions clés du Ladakh et du Zanskar (NW Himalaya), la théorie de l'autochtonie de la zone tibétaine est réfutée. La tectonique de nappes est une réalité aussi bien au Zanskar que dans les autres régions au N de l'Himalaya.

ABSTRACT

From the detailed examination of four key areas of Ladakh and Zanskar (NW Himalaya), the autochtonist hypothesis of the Tibetan zone is absolutely refuted. The nappes and thrusts are reality in Zanskar as well as in other areas to the N of the main Himalayan Range.

1. Introduction

Dans une série de travaux récents, G. FUCHS (1982, 1984 à 1987) s'en est pris de manière systématique et acharnée aux travaux sur le Ladakh et le Zanskar publiés par BAUD et al. (1982 à 1985) ainsi que par GAETANI et al. (1985) et enfin par STUTZ & STECK (1986) dans le but de dénier envers et contre tout l'existence des nappes observées par ces auteurs. Dans ses arguments pour l'autochtonie de la zone tibétaine, G. FUCHS (ce volume) se base sur l'absence de successions stratigraphiques anormales, sur l'absence de fenêtres tectoniques et sur des juxtapositions de domaines paléogéographiques dans un bon ordre apparent. Cet auteur se réfère aux cartes et coupes en couleurs et aux panoramas qu'il a publiés au Service géologique d'Autriche (FUCHS 1982, 1984 et 1987). Ces documents, qui devraient apporter la lumière sur la thèse de l'autochtonie défendue par leur auteur, montrent des erreurs autant du point de vue de l'observation que de l'interprétation. Nous en avons dénoncé quelques-unes ailleurs (BAUD, 1988). Cependant, riche de nos propres observations, nous avons eu la curiosité d'examiner ce que montraient les cartes géologiques le long des deux grandes coupes naturelles profondes qu'offrent les vallées de la Suru et du Zanskar dans la partie Sud-Nord de leur parcours au travers de la zone tibétaine.

2. La vallée de la Suru

Dans la première de ces vallées, en cherchant le repos tranquille des sédiments téthysien sur leur socle autochtone, nous avons trouvé (FUCHS 1982, pl. 1 et 1985, pl 1)

¹⁾ Musée géologique, UNIL-BFSH2, CH-1015 Lausanne, Switzerland.

un substratum d'accueil formé de séries d'arc volcanique (arc de Dras) en partie d'âge crétacé surmonté par une molasse Miocène. Par-dessus, avec un contact plat, faiblement incliné vers le S viennent les flyschs et volcanoclastiques de Nindam puis des écailles à métamorphisme en partie schistes bleus de schistes à blocs, de mélanges ophiolitiques et de conglomérats (HONEGGER et al. 1988). Ces écailles sont surmontées par une unité lithologique à sédiments de bassin d'âge triasique à crétacé faiblement métamorphique sur laquelle sont charriés les sédiments de plate-forme de la zone tibétaine, ici d'âge permien à crétacé tardif. A partir de la carte, on peut déduire un déplacement latéral de ces derniers d'au moins 20 km. La vallée de la Suru nous montre donc, sur son versant oriental, un exemple magnifique de nappes superposées, ici à vergence NW à W.

3. L'entrée des gorges du Zanskar

Dans la partie centrale du synclinorium, environ 100 km plus à l'E, le fleuve Zanskar s'est taillé une gorge profonde dont le dénivelé atteint près de 3 km des crêtes jusqu'au fleuve. Trouverons-nous là un autochtone sédimentaire, une succession stratigraphique normale? Non, la réalité est tout autre comme l'indiquent d'ailleurs partiellement les cartes de FUCHS (1982, pl. 1 et 1985, pl. 1), DE KELEMEN et al. (1983) et comme nous avons pu l'observer dans le détail (BAUD et al. 1985, GARZANTI et al. 1987, fig. 2). A l'aplomb de la klippe ophiolitique de Spongong, nous avons du NE vers le SW et de bas en haut tout d'abord l'unité de la Shillakong qui repose au niveau du fleuve sur son flanc inverse à fort plongement NE formé de shales de Spiti (Jurassique tardif). Ceux-ci enveloppent une cascade de plis couchés visibles dans les calcaires de Kioto sur plus de 2 km de dénivelé. Directement au SW, au niveau du fleuve apparaît un grand pli couché (unité de Nerak) dont la flèche visible est d'au moins 6 km, à cœur de calcaire de Laptal (Dogger) et enveloppe de calcaire et marne à microfaune planctique du Crétacé tardif (Fatu La, Kangi). Sur le flanc normal, on observe le passage aux couches du Paléocène précoce en faciès peu profond avec niveaux à stromatolites. Ces couches sont directement en contact avec celles de Spiti (Jurassique tardif) de l'unité de la Shillakong. Il y a là déjà de toute évidence un contact anormal. Par-dessus vient une unité d'écailles tectoniques de calcaire planctiques du Crétacé tardif prises dans une matrice de slates du Maestrichtien (slates de Goma). Cette zone d'écailles sépare l'unité inférieure de Nerak de l'unité supérieure de Lingshed (Maestrichtien terminal à Eocène précoce) dont elle souligne le contact anormal plat (chevauchement). Les faciès profonds de calcaires à silex à microfaunes planctiques (Formation de Shinge La, Paléocène précoce, GARZANTI et al. 1987, fig. 5) de cette dernière unité sont tout à fait différents de ceux des calcaires stromatolitiques de même âge de l'unité inférieure et le style tectonique de ces 2 unités superposées montre un contraste frappant. Par-dessus repose la klippe ophiolitique de Spongong avec son coussinet de mélange dont les éléments les plus jeunes sont Eocène précoce (REUBER et al. 1987). C'est dans cette coupe naturelle du Zanskar que GARZANTI et al. (ce volume) ont mis en évidence l'existence d'un métamorphisme inverse, transporté, caractéristique d'un pays de nappes. Nous constatons donc qu'à nouveau, ici, nous n'avons pas de succession stratigraphique normale. Mais nous avons mis en évidence de grands contacts anormaux, chevauchants séparant des nappes à vergence cette fois SW.




Fig. 1. Coupe géologique à travers le Zanskar oriental depuis le fleuve Doda jusqu'à l'Indus dans la région d'Hémis, modifié d'après BAUD et al. (1982) et STURZ (1989). 1. molasse autochtone, 2. chevauchement d'Hémis, 3-4. flysch et molasses charriés, 3. flysch et molasse marine éocènes, 4. molasse continentale post-Eocène, 5. mélange ophiolitique, 6. slates et grès turbiditiques de la Markha (Permien à Crétacé tardif), 7. Cristallin de Nyimaling, 8-9. quartzite et dolomite du Cambrien, 10. schistes chloriteux et marbres du Carbonifère, 11. shales et calcaires (Permien tardif-Trias tardif), 12. calcaires de Kioto (Trias tardif-Jurassique moyen), 13. shales, grès, silts et calcaires marneux (Jurassique tardif à Crétacé tardif), 14. Panjal Traps (Permien), 15. slates et quartzites (Infracambrien-Cambrien précoce), 16. faille normale.

Fig. 1. Geologic cross section of Eastern Zanskar from the lower Doda River to the Indus River near Hemis, modified after BAUD et al. (1982) and STURZ (1989). 1. autochthonous molasse, 2. Hemis thrust, 3-4. displaced Indus flysch and molasse, 3. Eocene flysch and marine molasse, 4. post-Eocene continental molasse, 5. ophiolitic mélange, 6. Markha basinal deposits (Permian to late Cretaceous, STURZ, 1989), 7. Nyimaling Crystalline, 8-9. Cambrian quartzite and dolomite, 10. Carboniferous slates and marble, 11. Permo-Triassic shales and limestone, 12. Kioto limestone (Jurassic p.p.), 13. late Jurassic-Cretaceous shales, sandstone and marls, 14. Permian Panjal Traps, 15. Infracambrian-Cambrian slates and quartzites, 16. Zanskar shear zone (HERREN, 1987).

4. Région de Nyimaling

Une soixantaine de km plus à l'E, le dôme cristallin de Nyimaling devrait enfin nous faire constater le repos d'un autochtone normalement installé sur son vieux socle cristallin comme le montrent les cartes de FUCHS (1984, fig. 1 et 1985 pl. 2). Or les travaux de stratigraphie et de tectonique détaillés de STUTZ & STECK (1986) et de STUTZ (1989), accompagnés d'une cartographie minutieuse ont mis en évidence de vastes superpositions anormales à l'intérieur des métasédiments paléozoïques ainsi que la présence d'un pli couché de grande extension: la nappe de Langtang. Cette nappe s'enracine dans la vallée de la Markha le long d'un grand couloir coulissant dextre. Ce couloir suit en partie la zone de suture de l'Indus. Les couches du Paléozoïque précoce, avec leur intrusion granitique, qui se trouvent sous la nappe sont-elles autochtones? Ce n'est même pas sûr si l'on en croit le profil figuré par STUTZ (1989, fig. 36) et que nous avons légèrement modifié (fig. 1).

5. Le flanc N du Haut-Himalaya: la faille normale

Que se passe-t-il enfin vers le SW, du côté de la Haute-Chaîne? Le néocristallin du Haut-Himalaya est séparé de sa soi-disant couverture autochtone (zone tibétaine) telle qu'elle figure dans FUCHS (1985, pl. 2) par une faille normale à plongement NE mise en évidence par HERREN (1987). Ce dernier auteur indique un déplacement par abaissement relatif du compartiment NE de l'ordre de 18 km dans la région de Padum. Cette faille ne figure que dans dernière carte de FUCHS (1987, pl. 1) parue en 1988. Nous signalerons aussi que le néocristallin est lui-même composé de plusieurs unités tectonométamorphiques comme l'indiquent POGNANTE et al. (1988) et KÜNDIG (1988).

6. Conclusions

Non seulement nous n'avons pas trouvé d'autochtone, mais nous pouvons dire que contrairement aux affirmations de G. Fuchs, les nappes sont une réalité dans la zone tibétaine (téthysienne) de l'Himalaya, aussi bien au Zanskar que dans les autres régions au N de l'Himalaya (voir par exemple le travail de BURG (1983) dans la région de Kangmar du S Tibet). Nous préciserons que pour la clareté du discours nous avons toujours pris le terme de nappe dans son sens alpin (ou jurassien) qui implique le déplacement ou la translation d'une unité géologique d'au moins 10 km par rapport à son origine.

Partout où ils peuvent être estimés dans cette région, l'ordre de grandeur des déplacements est nettement supérieur à ces 10 km. Ainsi, en plus de la quantification précise de ces déplacements, l'une des tâches futures sera la reconnaissance de la géométrie des nappes ainsi que les modalités, séquences et dates de mise en place. Quant à l'hypothèse strictement autochtoniste elle subira le même sort qu'elle a reçu dans les Alpes helvétiques, penniques ou dans le Jura.

Remerciements:

L'auteur remercie J. Ramsay et A. Gansser pour leurs critiques constructives.

BIBLIOGRAPHIE

- BAUD, A. 1988: The Nappe and Thrust Tectonics in Zanskar Area (NW Himalaya), Review of the socalled "Autochtony" of the Tethys-Tibetan Zone. Abstracts, Himalayan-Karakoram-Tibet Workshop Meeting, Lausanne
- BAUD, A., GAETANI, M., FOIS, E., GARZANTI, E., NICORA, A. & TINTORI, A. 1982a: Les séries tibétaines de l'Himalaya sont-elles allochtones: nouvelles observations dans le Zanskar oriental (Inde du Nord). Soc. géol. France, IXe RAST (Paris), 33.
- BAUD, A., ARN, B., BUGNON, P., CRISINEL, A., DOLIVO, E., ESCHER, A., HAMMERSCHLAG, J. G., MARTHALER, M., MASSON, H., STECK, A. & TIÈCHE J.-C. 1982b: Le contact Gondwana-péri Gondwana dans le Zanskar oriental (Ladakh, Himalaya). Bull. Soc. géol. France 24/2, 341-361.
- 1983: Geological observations in the Eastern Zanskar Area, Ladakh (Himalaya). In GUPTA, V.J. (Ed.): Contribution to Himalayan Geology, Vol. 2, 130-142, Hindustan, Delhi.
- BAUD, A., GAETANI, M., GARZANTI, E., FOIS, E., NICORA, A. & TINTORI, A. 1984: Geological observations in south-eastern Zanskar and adjacent Lahul area (northwestern Himalaya). Eclogae geol. Helv. 77/1, 171-197.
- BAUD, A., GARZANTI, E. & MASCLE, G., 1985: Latest marine sediments (Early Paleogene), geological events and nappe structure in the central Zanskar area (NW Himalaya). Himalayan workshop, abstract book, Leicester.
- BURG, J.P., 1983: Tectogenèse comparée de deux segments de chaîne de collision: — le Sud du Tibet (suture du Tsangpo), — la chaîne hercynienne en Europe (sutures du massif central). Thèse, USTL, Montpellier.
- FUCHS, G. 1982a: The Geology of Western Zanskar. Jb. geol. Bundesanst. (Wien) 125/1, 1-50.
- 1984a: Note on the Geology of the Markha - Nyimaling Area in Ladakh (India). Jb. Geol. B.-A., 127/1, 5-12.
- 1984b: The Tibetan (Tethys) zone - is it allochthonous? Contr. Himal. Geol. 3, (Gupta et al. ed.), 67-77.
- 1986: The geology of the Markha-Khurnak region in Ladakh (India). Jb. Geol. B.-A., 128/3-4, 403-437.
- 1987: The geology of Southern Zanskar (Ladakh) — Evidence for the autochtony of the Tethys zone of the Himalaya, Jb. Geol. B.-A., 130/4, 465-491.
- 1988: Arguments for the autochtony of the Tibetan Zone. Abstract, Himalayan-Karakoram-Tibet workshop meeting, Lausanne.
- 1989: Arguments for the autochtony of the Tibetan Zone. Eclogae geol. Helv. 82/2, 685-692.
- GAETANI, M., GARZANTI, E. & JADOUF, F., 1985: Main structural elements of Zanskar (NW Himalaya). Rend. Soc. Geol. It., 8, 3-8.
- GARZANTI, E., BAUD, A. & MASCLE, G., 1987: Sedimentary record of the northward flight of India and its collision with Eurasia (Ladakh Himalaya, India). Geodinamica acta, 1/4-5, 297-312.
- GARZANTI, E. & BRIGNOLI, G., 1989: Metamorphism in the Zanskar sedimentary Nappes (NW Himalaya, India). Eclogae geol. Helv. 82/2, 669-684.
- HERREN, E., 1987: Zanskar shear zone: Northeast-southwest extension within the Higher Himalayas (Ladakh, India). Geology, 15, 409-413.
- HONEGGER, K., LE FORT, P., MASCLE, G. & ZIMMERMANN, J.L. 1989: The blueschists along the Indus suture zone in Ladakh (NW Himalaya). J. of Metamorphic Geology, 7, 57-72.
- KELEMEN, P.B. & SONNEFELD, M.D., 1983: Stratigraphy, Structure , Petrology and local Tectonics, Central Ladakh, NW Himalaya. Schweiz. mineral. petrogr. Mitt., 63, 267-287.
- KÜNDIG, R., 1988: Kristallisation und Deformation in Higher Himalaya, Zanskar, NW India, Thesis 8681, ETH, Zürich.
- POGNANTE, U., CASTELLI, D., GENOVESE, G. & BENNA, P., 1988: The Cristalline Units of the High Himalayan Belt in the Lahul - Zanskar Region. Abstract, Himalayan-Karakoram-Tibet workshop meeting, Lausanne.
- REUBER, I., COLCHEN, M. & MEVEL, C., 1987: The geodynamic evolution of the S.Tethyan margin in Zanskar, NW Himalaya, as revealed by the Spongtag ophiolitic melanges.-Geodinamica Acta 1, 4/5, 283-296.
- STUTZ, E., 1988: Evolution paléogéographique et tectonique d'un segment de la marge nord-indienne: géologie de la chaîne de Nyimaling aux confins du Ladakh et du Rupshu (NW- Himalaya, Inde). Mem. Geol. Lausanne, 3.
- STUTZ, E. & STECK, A., 1986: La terminaison occidentale du Cristallin du Tso Morari (Haut-Himalaya, Ladakh méridional, Inde): subdivision et tectonique de nappe. Eclogae geol. Helv. 79/2, 253-269.

Manuscrit reçu le 12 janvier 1989

Révision acceptée le 18 avril 1989

