

**Zeitschrift:** Eclogae Geologicae Helvetiae  
**Herausgeber:** Schweizerische Geologische Gesellschaft  
**Band:** 86 (1993)  
**Heft:** 3

**Artikel:** Late Aptian-Early Albian radiolaria of the Windalia radiolarite (type section), Carnarvon Basin, Western Australia  
**Autor:** Ellis, Glynn  
**Anhang:** Plates  
**Autor:** [s.n.]  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-167268>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 18.03.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**


**Plate 1**

- Figs. 1, 6 *Angulobracchia crassa* OZVOLDOVA  
(1: WIND8, C-37095, 1004UWA91, sc. = 130 µm; 6: WIND15, C-37096, 196LAUS91, sc. = 110 µm)
- Fig. 2 *Paronaella* sp.  
(WIND8, C-37097, 1016UWA91, sc. = 100 µm)
- Fig. 3 *Paronaella* (?) sp.  
(WIND8, C-37098, 1013UWA91, sc. = 100 µm)
- Figs. 4, 8 *Patulibracchium* sp.  
(4: WIND15, C-37108, 185LAUS91, sc. = 100 µm; 8: WIND15, C-37109, 969UWA91, sc. = 90 µm)
- Figs. 5, 10, 13 *Paronaella* spp.  
(5: WIND4, C-37102, 1747UWA87, sc. = 90 µm; 10: WIND8, C-37103, 1017UWA92, sc. = 100 µm; 13: WIND4, C-37104, 1748UWA87, sc. = 100 µm)
- Figs. 7, 12, 16, 17 *Patulibracchium* (?) sp.  
Note the distinctive raised triangular portion on both sides of the test.  
(7: WIND15, C-37105, 941UWA91, sc. = 100 µm; 12, 17: WIND15, C-37106, 226LAUS91, sc. = 100 µm & 75 µm, 16: WIND4, C-37107, 955UWA87, sc. = 100 µm)
- Figs. 9, 11, 15 *Paronaella diastimusphere* n. sp.  
(9: holotype WIND15, C-37099, 943UWA91, sc. = 115 µm; 11: paratype WIND15, C-37100, 198LAUS91, sc. = 115 µm; 14: paratype WIND4, C-37101, 245LAUS91, sc. = 115 µm)
- Figs. 14, 18 *Spongodiscus renillaeformis* CAMPBELL & CLARK  
(14: WIND4, C-37110, 1274LAUS93, sc. = 100; 18: WIND15, C-37111, 1273LAUS93, sc. = 100 µm)
- Figs. 19 *Orbiculiforma* sp.  
(WIND5, C-37112, 988UWA87, sc. = 120 µm)
- Fig. 20 *Orbiculiforma mclaughlini* PESSAGNO  
(WIND8, C-37113, 1006UWA91, sc. = 110 µm)
- Fig. 21 *Orbiculiforma depressa* WU  
(WIND15, C-37203, 1258LAUS93, sc. = 100 µm)




**Plate 2**

- Figs. 1–4 *Crucella messinae* PESSAGNO  
 Note increase in growth of patagium with increasing test size.  
 (1: WIND15, C-37114, 224LAUS91, sc. = 120 µm; 2: WIND15, C-37115, 258LAUS91,  
 sc. = 140 µm; 3: WIND15, C-37116, 192LAUS91, sc. = 180 µm; 4: WIND15, C-37117,  
 190LAUS91, sc. = 120 µm)
- Figs. 5, 6 *Napora dimitricai* PESSAGNO  
 (5: WIND15, C-37119, 1532UWA87, sc. = 80 µm; 6: WIND15, C-37120, 161LAUS91,  
 sc. = 100 µm)
- Fig. 7 *Napora* sp. cf. *N. durhami* Pessagno  
 (WIND15, C-37121, 1526UWA87, sc. = 80 µm)
- Fig. 8 *Crucella* sp.  
 (WIND4, C-37122, 93LAUS91, sc. = 120 µm)
- Fig. 9 *Acaeniotyle* (?) sp. A  
 (WIND8, C-37123, 1071UWA91, sc. = 115 µm)
- Figs. 10, 13 *Haliomma* sp.  
 (10: WIND15, C-37126, 197LAUS91, sc. = 95 µm; 13: WIND15, C-37127, 253LAUS91,  
 sc. = 85 µm)
- Fig. 11 *Spongopyle stauromorphos* RENZ  
 (WIND5, C-37118, 1247LAUS93, sc. = 95 µm)
- Figs. 12, 15 *Triactoma* sp.  
 (12: WIND15, C-37128, 263LAUS91, sc. = 100 µm; 15: WIND4, C-37129, 1744UWA87,  
 sc. = 105 µm)
- Figs. 14, 16 *Archaeocenosphaera euganea* (SQUINABOL)  
 (14: WIND4, C-37130, 96LAUS91, sc. = 100 µm; 16: WIND8, C-37131, 1123UWA91,  
 sc. = 100 µm)
- Fig. 17 *Alievium* (?) sp. A  
 (WIND8, C-37124, 1126UWA91, sc. = 80 µm)
- Fig. 18 *Praeconocaryomma lipmanae* PESSAGNO  
 (WIND8, C-37125, 1014UWA91, sc. = 80 µm)
- Fig. 19 *Acaeniotyle* (?) sp. B  
 (WIND19, C-37132, 313LAUS91, sc. = 130 µm)
- Fig. 20 *Spongopyle* sp. cf. *S. insolita* KOZLOVA  
 (WIND4, C-37204, 1246LAUS93, sc. = 95 µm)
- Fig. 21 *Spongopyle ecleptos* RENZ  
 (WIND4, C-37205, 1242LAUS93, sc. = 95 µm)




**Plate 3**

- Fig. 1 *Protoxiphotractus* (?) *rugosa* TAN  
(WIND15, C-37133, 261LAUS91, sc. = 85 µm)
- Fig. 2 *Archaeospongoprunum* sp.  
(WIND8, C-37134, 1002UWA91, sc. = 95 µm)
- Figs. 3, 4 *Archaeospongoprunum carrierensis* PESSAGNO  
(3: WIND15, C-37135, 246LAUS91, sc. = 105 µm; 4: WIND15, C-37136, 949UWA91, sc. = 105 µm)
- Fig. 5 *Archaeospongoprunum* sp. cf. *A. tehamaensis* PESSAGNO  
(WIND15, C-37138, 150LAUS91, sc. = 90 µm)
- Fig. 6 *Archaeospongoprunum* sp. cf. *A. praelongum* PESSAGNO  
(WIND19, C-37139, 344LAUS91, sc. = 100 µm)
- Fig. 7 *Archaeospongoprunum klingi* PESSAGNO  
(WIND15, C-37137, 264LAUS91, sc. = 100 µm)
- Figs. 8, 9 *Acaeniotyle longispina* (SQUINABOL)  
(8: WIND15, C-37140, 218LAUS91, sc. = 105 µm; 9: WIND4, C-37141, 1743UWA87, sc. = 100 µm)
- Fig. 10 *Acaeniotyle diaphorogona* FOREMAN  
(WIND15, C-37142, 1740UWA87, sc. = 100 µm)
- Fig. 15 *Alievium* (?) sp. B  
(WIND15, C-37143, 1997UWA91, sc. = 85 µm)
- Fig. 11 *Archaeospongoprunum diversispina* SQUINABOL  
(WIND8, C-37144, 980UWA91, sc. = 105 µm)
- Fig. 12 *Mesosaturninus hueyi* group (PESSAGNO)  
(WIND8, C-37145, 1000UWA91, sc. = 100 µm)
- Fig. 13 *Stylosphaera pusillus* CAMPBELL & CLARK emend. Foreman  
(WIND4, C-37146, 1753UWA87, sc. = 75 µm)
- Fig. 14 *Stylosphaera* sp. cf. *S. hastatus* (CAMPBELL & CLARK)  
(WIND8, C-37147, 1137UWA91, sc. = 115 µm)
- Figs. 16, 17 *Praeconocaryomma prisca* PESSAGNO  
(16: WIND19, C-37148, 347LAUS91, sc. = 110 µm; 17: WIND19, C-37149, 353LAUS91, sc. = 115 µm)
- Fig. 18 aff. *Staurocycilia martini* RÜST  
(WIND8, C-37150, 1011UWA91, sc. = 175 µm)
- Fig. 19 *Spongotropus* sp. cf. *Tripodictya triacummata* LIPMAN  
(WIND15, C-37151, 1533UWA87, sc. = 100 µm)
- Fig. 20 *Patellua* sp.  
(WIND19, C-37152, 290LAUS91, sc. = 125 µm)
- Fig. 21 *Histastrum aster* LIPMAN  
(WIND15, C-37153, 1738UWA87, sc. = 85 µm)
- Figs. 22–24 *Praeconocaryomma excelsa* n. sp.  
(22: WIND4, C-37154, 847UWA87, sc. = 110 µm; 23: WIND4, C-37155, 840UWA87, sc. = 120 µm; 24: WIND4, C-37156, 851UWA87, sc. = 100 µm)
- Fig. 25 *Acaeniotyle* sp. cf. *A. diaphorogona* FOREMAN  
(WIND15, C-37157, 1735UWA87, sc. = 95 µm)



**Plate 4**

- Figs. 1–3 *Arachnosphaera exilis* (HINDE)  
(1: WIND19, C-37158, 351LAUS91, sc. = 105 µm; 2: WIND4, C-37159, 975UWA87, sc. = 60 µm; 3: WIND4, C-37160, 1670UWA87, sc. = 105 µm)
- Fig. 4 Actinommid gen. and sp. indet  
(WIND4, C-37161, 1384UWA87, sc. = 100 µm)
- Figs. 5–7 *Actinomma* (?) *pleiadesensis* n. sp.  
(5: WIND15, C-37162, 234LAUS91, sc. = 115 µm; 6: WIND15, C-37163, 214LAUS91, sc. = 125 µm; 7: WIND15, C-37164, 1529UWA87, sc. = 125 µm)
- Fig. 8 *Spongopyle galeata* RENZ  
(WIND4, C-37206, 1244LAUS93, sc. = 85 µm)
- Fig. 9 *Spongoatractus biconstrictus* RÜST  
(WIND8, C-37165, 1133UWA91, sc. = 100 µm)
- Fig. 10 *Spongoatractus* sp. cf. *S. biconstrictus* RÜST  
(WIND19, C-37166, 358LAUS91, sc. = 110 µm)
- Fig. 11 *Tricolocapsa* sp.  
(WIND15, C-37162, 1530UWA87, sc. = 70 µm)
- Fig. 12 *Stichocapsa* sp.  
(WIND15, C-37170, 1265LAUS93, sc. = 100 µm)
- Fig. 13 *Xitus vermiculatus* (RENZ)  
(WIND15, C-37171, 174LAUS91, sc. = 78 µm)
- Figs. 14, 15 *Artocapsa ultima* (TAN)  
(14: WIND4, C-37173, 969UWA87, sc. = 100 µm; 15: WIND4, C-37174, 1742UWA87, sc. = 110 µm)
- Fig. 16 *Gongylothorax cephalocrypta* (TAN)  
(WIND15, C-37172, 177LAUS91, sc. = 50 µm)
- Figs. 17, 22 *Tricolocapsa antiqua* (SQUINABOL)  
(17: WIND19, C-37168, 340LAUS91, sc. = 75 µm; 22: WIND4, C-37169, 60LAUS91, sc. = 85 µm)
- Fig. 18 *Pseudodictyomitra lodogaensis* PESSAGNO  
(WIND4, C-37175, 17LAUS91, sc. = 85 µm)
- Fig. 19 *Amphipyndax stocki* (CAMPBELL & CLARK)  
(WIND15, C-37176, 1263LAUS93, sc. = 100 µm)
- Fig. 20 Nassellarian gen. and sp. indet  
(WIND4, C-37177, 78LAUS91, sc. = 88 µm)
- Figs. 21, 23 *Hemicryptocapsa* sp. cf. *H. simplex* DUMITRICA  
(21: WIND4, C-37178, 9LAUS91, sc. = 56 µm; 23: WIND4, C-37179, 70LAUS91, sc. = 74 µm)
- Fig. 24 *Holocryptocanium barbui barbui* DUMITRICA  
(WIND4, C-37180, 66LAUS91, sc. = 95 µm)



**Plate 5**

Figs. 1–3, 5, 21, 26 *Windalia pyrgodes* (RENZ)

(1: WIND15, C-37181, 956UWA91, sc. = 120 µm; 2: WIND8, C-37182, 1138UWA91, sc. = 110 µm; 3: WIND19, C-37183, 332LAUS91, sc. = 95 µm; 21: WIND15, C-37184, 981UWA91, sc. = 45 µm, note septal partition with wide aperture; 26: WIND15, C-37185, 960UWA91, sc. = 55 µm, note short terminal extension and constricted aperture)

Figs. 4, 6, 11 *Windalia* sp. B

(4: WIND15, C-37186, 125LAUS91, sc. = 105 µm; 6: WIND15, C-37187, 133LAUS91, sc. = 120 µm; 11: WIND4, C-37188, 970UWA87, sc. = 110 µm)

Figs. 7, 14 *Archaeodictyomitra vulgaris* (PESSAGNO)

(7: WIND4, C-37189, 58LAUS91, sc. = 80 µm; 14: WIND4, C-37190, 71LAUS91, sc. = 65 µm)

Figs. 8–10, 12 *Windalia* sp. A

(8: WIND19, C-37192, 311LAUS91, sc. = 95 µm; 9, 12: WIND14, C-37193, 1707UWA87, sc. = 110 µm & 55 µm; 10: WIND8, C-37194, 1129UWA91, sc. = 125 µm)

Fig. 13 *Mita* sp.

(WIND15, C-37195, 138LAUS91, sc. = 45 µm)

Fig. 15 *Archaeodictyomitra sliteri* PESSAGNO

(WIND4, C-37191, 1749UWA87, sc. = 80 µm)

Figs. 16, 18 *Windalia* sp. D

(16: WIND8, C-37196, 1101UWA91, sc. = 95 µm; 18: WIND4, C-37197, 95LAUS91, sc. = 50 µm, note arrangement of ridges and pores characteristic for the genus *Windalia*)

Fig. 17 *Windalia* sp. C

(WIND15, C-37199, 130LAUS91, sc. = 90 µm)

Figs. 19, 25 *Cyrtocalpia operosa* Tan

(19: WIND15, C-37198, 1255LAUS93, sc. = 60 µm; 25: WIND5, C-37207, 1254LAUS93, sc. = 60 µm)

Fig. 20 *Dicanthocapsa* sp. cf. *D. ancus* (FOREMAN)

(WIND15, C-208, 1262LAUS93, sc. = 60 µm)

Figs. 22–24 *Windalia epiplatys* (RENZ)

(22: WIND4, C-37200, 1753UWA87, sc. = 105 µm; 23: WIND19, C-37201, 304LAUS91, sc. = 107 µm; 24: WIND19, C-37202, 308LAUS91, sc. = 95 µm)

