

Réponse à plusieurs communications de M. A. Jayet sur les dépôts glaciaires

Autor(en): **Cailleux, André**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Eclogae Geologicae Helvetiae**

Band (Jahr): **47 (1954)**

Heft 2

PDF erstellt am: **23.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-161835>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Réponse à plusieurs communications de M. A. Jayet sur les dépôts glaciaires

Par **André Cailleux** (Paris)

Les travaux de M. A. JAYET, par la justesse des observations et la hardiesse des interprétations, retiennent l'attention. Aussi, ayant été cité dans l'un d'eux (JAYET 1952), je suis heureux de saisir l'occasion qu'il m'a très aimablement offerte de lui répondre.

Galets très arrondis dans le Glaciaire. A côté des classiques galets cassés, striés, et en tout cas peu émoussés, le glaciaire renferme parfois des galets extrêmement arrondis et globuleux, sortes de boules ou d'ellipsoïdes. M. JAYET a donné, des uns et des autres, de très belles images. D'accord avec J. TRICART (1952, 1953) et MARC BOYÉ, j'ai interprété les galets arrondis comme façonnés dans les courants d'eau de fonte intraglaciaires et sous-glaciaires. A. JAYET écrit: « Cette explication paraît insuffisante; nous avons constaté la présence de galets arrondis en place, en pleine moraine de fond active sous le glacier du Valsorey; d'autres sont emprisonnés en lits dans la glace. Enfin, la distribution de ces galets d'une crête morainique à l'autre indique qu'il n'y a pas de localisation suivant un réseau particulier. » Ces observations me paraissent excellentes; mais à mon avis elles s'interprètent aisément, par l'effet des remaniements: il y a sur les glaciers, des bédrières, moulins et autres courants de fonte où se façonnent des galets très arrondis; or chacun sait combien le tracé en est capricieux, changeant; des cours anciens ont pu être abandonnés, leurs galets ronds ont pu être enchâssés dans la glace, ou rejoindre peu à peu la moraine de fond, tandis que l'apport de matériel neuf, presque anguleux, continuait et que l'arrondi se façonnait ailleurs, sur d'autres galets suivant un nouveau parcours. Retraits et avancées alternants du glacier ont augmenté les chances de mélange. Pour peu que ces vicissitudes se soient répétées plusieurs fois (et on sait qu'en fait elles se sont répétées) on doit aboutir à un mélange très poussé; c'est bien ce que BOYÉ et moi nous avons observé sur la moraine latérale de l'Ege (Groenland); M. JAYET nous en apporte d'autres exemples. Ceux-ci me paraissent explicables par notre interprétation; c'est le contraire qui ne s'expliquerait pas.

L'interprétation de M. JAYET est autre: « Nous pensons » c'est lui qui souligne « que l'arrondi des galets n'est que la forme ultime qu'ils peuvent prendre à l'intérieur des moraines et en milieu sableux et aqueux. C'est en somme le polissage poussé à son maximum. » Opinion très nette. Mais si elle était exacte, les galets arrondis devraient être abondants dans les moraines de fond des inlandsis. Or tel n'est pas du tout le cas, ni en terre Adélie, ni dans le quaternaire, domaine

nord-européen; à Varsovie, 95% des galets au moins sont polyédriques, à faible émoussé; en Allemagne il en est de même et c'est seulement à l'approche des anciens fronts quaternaires que les galets arrondis apparaissent, ainsi que l'ont montré J. TRICART et R. SCHAEFFER. A l'échelle du continent, galets arrondis et zone de fusion marchent de pair; le terme le plus fréquent du polissage glaciaire inlandsisien n'est pas du tout le galet globuleux ou ellipsoïdal, mais bien le polyèdre à faces presque planes, et à arêtes émoussées, ainsi que les géologues nordeuropéens l'ont montré (1870—1890). Sur le glaciaire local, voir les remarquables travaux de HANS POSER (1952). Sur le glaciaire américain, ceux de WENTWORTH (1936).

Mais si notre interprétation s'écarte de celle de M. JAYET quant au mécanisme de l'érosion, elle la rejoint quant à la conclusion générale; car torrent intra-glaciaire implique glacier. Lorsque M. JAYET attire l'attention sur l'importance des dépôts d'ablation (p. 292), et lorsqu'il dit, des graviers de l'avance glaciaire «Ou bien ils n'ont pas eu l'importance que l'on suppose, ou bien ils ont été réincorporés au glacier lors de cette avance», il arrive à la même conclusion que TRICART et moi-même (1953).

Son recours à des «bancs de glace aujourd'hui disparus» (p. 292) nous paraît fondamental; toutefois, il peut s'agir, suivant les cas, non seulement de glace de glacier, mais encore de glace adhérente au fond de lits torrentiels, tels qu'il en existe, au printemps, à Disko (Groenland) (J. MALAURIE, Bull. Soc. géol. France 1953, 703).

Je ne suis plus M. JAYET lorsque, parlant des terrains quaternaires en général, il dit (1949, p. 439) «Ceux-ci correspondent, comme ceux des autres époques, à des séries normales continues.» Non, les séries sédimentaires, même d'autres époques, qui nous paraissent continues, ne le sont pas forcément, même dans les formations marines, *a fortiori* dans les formations terrestres comme celles du quaternaire suisse. Des périodes à faible érosion ont pu alterner avec des périodes à forte érosion (par exemple, suivant l'agressivité du climat), des périodes à transport lointain avec des périodes à transport proche (par exemple, suivant le régime hydrologique). M. JAYET écrit: «Si donc il y a une lacune par l'absence fortuite d'un des sédiments, ce sédiment doit néanmoins se retrouver en d'autres points.» Mais si ces autres points se trouvent par 2000 m de fond, en Méditerranée, les coupes subaériennes n'en montrent pas la trace. Le Quaternaire émergé de France ou de Suisse forme souvent des séries discontinues.

Quant au nombre des glaciations et à leurs causes, la discussion nous entraînerait trop loin, et en a été faite ailleurs. A notre avis, les travaux de M. JAYET ont le mérite de souligner le désaccord *apparent* entre les témoignages de la morphologie et de la stratigraphie nord-européenne, en faveur de 4 glaciations environ, et ceux de la paléontologie des Mollusques et Mammifères plutôt en faveur d'une ou deux glaciations, Riss et Würm. Il y a là un fait probablement fondamental. Une faune terrestre vraiment froide n'a pas encore été décrite du Günz ni du Mindel. Peut-être faut-il seulement en conclure qu'alors les espèces froides n'étaient pas encore apparues et que, faute de concurrents, survécurent quelque temps les espèces chaudes les moins mal adaptées? S'il en était ainsi, le désaccord tiendrait simplement au retard entre l'évolution climatique plio-quaternaire et l'évolution biologique qui en a été, pour une part, l'une des conséquences. Il faut savoir gré à M. JAYET d'avoir su soulever de si intéressants problèmes.

Bibliographie

- BOYÉ, MARC (1950): *Glaciaire et périglaciaire de l'Ata Sund nord-oriental, Grœnland*. Ac. Sci. Industr. Hermann, n° 1111, 176 p.
- CAILLEUX, ANDRÉ (1952): *Premiers enseignements glaciologiques des Expéditions polaires françaises 1948—1951*. Rev. Géomorphol. dynam. 3, I, 1—19.
- (1952): *La géologie*. Coll. «Que sais-je?», 128 p.
- JAYET, ADRIEN (1949): *Découverte d'une faunule malacologique de la fin du Pléistocène au contact de graviers Günziens à Boppelsen (Canton de Zurich)*. Eclogae geol. Helv. 42/2, 436—441.
- (1952): *Quelques caractéristiques peu connues des dépôts glaciaires pléistocènes et actuels*. Eclogae geol. Helv. 45/2, 287—293.
- (1947): *Une nouvelle conception des glaciations quaternaires, ses rapports avec la paléontologie et la préhistoire*. Eclogae geol. Helv. 40/2, 316—320.
- POSER, HANS (1952): *Beiträge zur morphometrischen und morphologischen Schotteranalyse*. Abh. Braunschweig. Wiss.-Ges. 4, 12—36.
- ROMANOVSKY, V., & CAILLEUX, A. (1953): *La glace et les glaciers*. Coll. «Que sais-je?», Pr. Univ. France, 120 p., 20 fig.
- TRICART, J. (1952): *Les formations détritiques Quaternaires du Val de Pontarlier (Feuille Pontarlier au 1/50000)*. Bull. Serv. Cart. Géol., 133—149.
- (1953): *Les séquences morainiques et l'hypothèse du défonçage périglaciaire d'après l'exemple de la Mure (Isère)*. Geologica Bavarica 19, 195—200.
- TRICART, J., & CAILLEUX, A. (1953): *Cours de géomorphologie: le modelé glaciaire et nival*. C.D.U., 5 pl. de la Sorbonne, Paris. 408 p., 144 fig.
- TRICART, J., & SCHAEFFER, R. (1950): *L'éroussé des galets, moyen d'étude des systèmes d'érosion*. Rev. Geomorphol. Dyn. I, n° 4.
- WENTWORTH, C. K. (1936): *An analysis of the shapes of glacial cobbles*. J. Sed. Petr., 6, n° 2, p. 85—96, 5 fig.
-

